

PAVLI AEGINETAE

MEDICI INSIGNIS OPVS DIVINVM,

QVO VIR ILLE VASTISSIMVM TOTIVS

artis oceanum, Laconica breuitate, sensibus ar-

gutis, merisq; aphorismis in epi-

tomen redegit.

ALBANO TORINO VITODVRENSI

INTERPRETE.



Cum gratia & priuilegio Cefaræo.

B A S I L E A E

AN. M. D. XXXII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

REVERENDISSIMO IN CHRISTO PA

TRI, ILLVSTRISSIMOQVE PRINCIPI AC DOMINO, D. MAT-
THAE O, Ro. Ecclesiæ TT. S. Angeli presbytero, Salispur-
genſi Archiepiſcopo, ſummo ac unico ſtudiorum
Meccenati, & incomparabili noſtræ æta-
tis decori, ALBANVS TORI
NVS Vitodurenſis S. D.



ON HANC Celſitudinĩ tuę lucubratiunculam meam
ILLVST. PRINCEPS, quaſi tuis non minus ſerijs
quã arduis etiã ſtudijs, clauo Chriſtianæ cymbæ in-
cumbente, dignam offero, neq; quod tibi eadem ullum
me operæ precium facturũ autumem, id enim mihi de
meo tam hirtio ingeniolo ne per ſomniũ quidem ſpera-
re licet, ſed quò uigilijs meis ex inſcriptione clariffimi nominis tui, quod
iure optimo literati omnes colunt, uenerantur & ſuſpiciunt, gratiam ali-
quam, pondusq; & autoritatẽ captem: Vnde enim gentiũ maiorem nan-
ciſci poterint autoritatẽ, unde lumen queſo ſplendidius indipiſci, quã
ab eo qui ampliffimo uirtutum ſaſtigio inter mortales ueluti inter ignes
Luna minores, excellit? Hiſce enim uero coloribus nuper te mihi pluri-
ma de T. R. D. auidiſſime (guſtum nanq; multo ante heroicarũ tuarum
uirtutum acceperam) percontanti totum geſtiens, ardenti oratione de-
pinxit Io. Honterus Coronenſis, uir eximie literatus & candidus, præ-
ſtantiæq; laudum tuarum buccinator egregius, qui nobis præſulem opti-
mum, eundemq; Principem cum primis illuſtrem, nõ minus integritate
morum, quã fortunæ dignitate clarum, ingenijs felicitate, corpore etiã
ad omnem uirtutis uſum functionemq; affabre ſculptum & ad unguem
deniq; factum, ante oculos ponunt: Omitto quæ cum ille laudum tuarũ
præco tum conſtans etiã fama uel ad cœlum uſque extollunt, fidem
nempe imitatione dignam, & perpetuis honoribus illuſtrandam: Con-
ſtantiam præterea qua uel Q. Scæuolam, uel Metellum etiã Numidi-
cum anteis: Taceo probitatem, qua nõ es Catone inferior: Prætereo pie-
tatem, qua Aenæ non cedis: Tranſeo præſentiffimum in rebus ſingulis
agendis, quo uel Neſtora uicis n, conſilium: ſimplicitatemq; columbinã,
cum ſerpentina prudentia coniunctam. Quid quod adeò magnanimus
ſis iniuriarũ contemptor, ut illatas quantum uis magnas nolis retaliare?
Splendorem in priuatis nõ attingo: liberalitatem erga bene meritos, &
ad ſubueniendũ honeſtis omnibus promptitudinem cum reliquis doti-
bus ne harenas numerem, miſſam facio: ſiquidem uirtutes tuas ampliffi-
mas ne doctiffimus quiſpiam, & in dicendo ſingulari eloquentia prædi-
tus iuſto uolumine pro dignitate laudare ſatis, nedum ego in epiſtola,
poſſit. Illud mihi multo maximũ magisq; ſtupendum uidetur, & animũ
id quidem meum in primis in hanc ſententiã pertraxit, ut hæc C. T. nun-
cupanda duxerim, quod ſolus ferẽ ſis ex omnibus (abſit uerbo inuidia)
Germaniæ epiſcopis, ne Principibus etiã dicam, qui intelligat, quanto

fit anima corpore prestantior, tanto magis animi, quam corporis esse bona affectanda, quæ sola nulli fato obnoxia, letum uere dicuntur perire. Cernis pro tua singulari providentiâ te demum hac ratione mortalem superando conditionem, numini posse coniungi, & hac denique uia honestissimū cunctis mortalibus exemplum, quod sequantur, de te relicturnum, quo nomine bonas etiam literas tanto studio prosequeris.

Quemadmodum enim animus ipse diuinâ (ut Horatius inquit) particula auræ æternus est; ita & hæ animi ueræ imagines, quibus tu cum reliquis innumeris uirtutibus alijs omnifariâ scates, immortales sunt. Quas qui nâlo suspendunt adunco, ne hominis quidem uocabulo dignos cenſeo. Has tu uirtuti literisq; natus, & Germaniæ phoenix, tam intentis neruis extollere conaris, ut ad eas non solum ipse reipub. Christianæ negotijs, ac ut uerius dicam, negotiorum fluctibus inuolutus, imò prope modum obrutus, ocio suffurato, recurras, sed earundem etiam candidatos, & literatissimos quosq; summis honoribus extollas, maximis præmijs inuites, munificentia demerearis, humanitate inſeſcas, comitate allicias, dignitate tuearis, splendore illustres, & quamlibet liberalissime deniq; foueas: Vnde eam nominis celebritatem consecutus es, ut nemo sit uſpiam e studioſorum cohorte, qui te non politioris modò literaturæ Meccenatem, uerū aſylum etiam prædicet, nomenq; tuum ut ſacroſanctum tantum non adoret. Quid, quod aulam tuam nobilibus ingenijs patentem, ornamentis alioquin omne genus ornatissimam, uiris eruditione uitæq; ſanctimonia iuxta præditis ita condecoraueris, ut præ hac nonnullæ etiâ frigeant, proh dolor, Academiæ? Felicia profecto ingenia, quibus ſuarum uirtutū intelligens ac ſauens contigit Princeps: Terq; quaterq; beatus Princeps, qui eo regni ſui molem moderatur tempore, quo rerū geſtarū iſtiusmodi queat habere teſtes, qui magnas uirtutes, bonorūq; glorias immortales, & ut ſummatim perſtringā, quæq; ſamæ diuturnitate nō indigna facinora, ſuis coloribus graphice depingere, Principis memoriam quammaxime longam efficere poſſint. Ex quorum numero, ut cæteros non tam eruditione quàm uirtutibus claros ſilentio præteream, Philippus Gundeliuſ Patauienſis, *ἄλλος ἀνὴρ πάλαι ἐν τῷ αἵματι*, Poëta, diſj ſuperi quàm felici ingenio, quàm acri iudicio, quanta diſciplinārū ſcientia, quanta humanitate demum præditus eſt: cui carmen utraq; lingua ſeliciter ſcribenti aſpirat Apollo, Muſarū chorus arridet: & Orator appoſite & eleganter, ubiq; Rhetorica ſubſeruiente, diſſerens, ita quidem ut breuiter uberrimum ſacundiæ horreum appellari poſſit. Iuriſconſultum porrò perſpicaciſſimū & alterum uno uerbo ſcquolam præſtat: qui iam olim nobiliſſima Viennenſi Academia maxîma auditorum frequentia, deum immortalẽ quanta cum maiestate, quanto cum omnium ſtudioſorum applauſu, publicus bonarum literarū profeſſor fuit: eiufmodi uiro utitur T. R. D. conſiliario: Tales pluſculum dignationis, ornamentî non parum, honeſtamenti plurimum epiſcoporū aulis conferre ducis.

Quæ

Quæ singula, amplissime præful, primarium quendam Musarum cultorem, ac ueluti incomparabilem antistitem, ueræq; nobilitatis, quæ in sola uirtute posita est, clarissimum exemplar arguunt. Sed nolo tanti herois decorum in præfens, ut dixi, catalogum pertexere, quæ laudem tantum non omnem superare, argumento esse abunde magno id potest, quod laudatissimis sapientissimisque, ac omnium seculorum memoria dignissimis Ro. Imperij Principibus CAROLO Augusto, necnon germano eius fratri FERDINANDO Regi, cum primis maxime gratus; *ὁ ἐν τῷ καρδίας φίλτατος* sis: quibus uel placuisse summa utiq; laus est. Hæc raptim cursimq; percurri, non hercle palpani, auram uel captandi gratia, sed ut alij de C. T. exemplum capientes, ad uerum uirtutis cultum incitentur. Nunc se ad autorem conferat oratio.

PAVLVS ille noster, Aegina Græciæ ciuitate natus, Vlyssæo à prima ferme iuuentute animo præditus, nō tam iugi uariarum urbium, morumq; mortaliū desiderio, quàm indefesso quodam cognoscendæ artis, medicæq; materiæ studio allectus, permultos etiam remotissimos mundi tractus, præter Græciam omniū artium parentem, peragrauit. Quod ipse de se breuiter & elegantissime binis senarijs, quos operi suo ueluti inscriptionis loco præfixit, insinuat:

*Παῦλος πόνον με πένον τὸ γῆνε τὸ πάρος
διαδραμόντος, πῶντος ἐκ γῆς Αἰγίνης.*

hoc est:

Pauli laborem me nosce, qui plurimum

Peragrauit terræ, Aegina natus patria.

Vbi itaq; maximam orbis partem perlustrasset Pæoniæq; artis res abditas, cum omnibus Medicinæ mystertjs, curiosa quadam obseruatione undiq; indagasset (animum enim cum coelo trans mare currendo mutare studuit) & disciplinas omnes calleret ad unguem, morborū causas & indicia, medicaminumq; non tam rationem quàm experientiam quæque ad amussim perspectas in numerato haberet, maturo iam grauiq; iudicio, Principis medicorum Hippocratis & Galeni, cuius abbreviator esse uidetur, Oribasij item & aliorum ueterū monumenta euoluit, apūq; more ex singulis succulentiora quæq; decerpens, uastū illud Apollineæ artis mare sparsim ab alijs ac diffuse plaustralibus libris comprehensum, dii boni quàm Laconica, quàm diuina quadam breuitate, summo cū ordine, tum artificio, stilo emuncto, multaq; uerborum concinnitate, in seipsum uolumina quasi in compendium redegit: In quibus Medicinam, per Apollinem, integram non pluribus, nō paucioribus, quàm res ipsa cognitu necessaria postulare uidetur, complexus est. Quemadmodum enim corporis alimentum si immodicum, euacuationem efflagitat: si minus quàm natura, ferat macilentiam conciliat: moderatum uero bonam corporis habitudinē inducit: ita doctrina animi cibus, paucioribus uerbis, quàm opus est tradita, parum erudit, pluribus implicat, arcet, & deterrēt: mediocribus autem recte instituit. Nullum ferē in hoc scriptore

uerbum ociosum, meros dicas esse aphorismos, quoniam ubiq; paucissimis uerbis plurimum comprehendit sententiæ. Haud igitur iniuria occipies, *πειρα μὲν ἀλλὰ πολλὰ λυγίως*. Illud ego polliceri auserim, Medicinæ candidatos longè plus solidæ doctrinæ paucis mensibus ex accurata Aegine te lectione reportaturos, q̃ si pluribus annis inexhaustos aliorum cōmentarios legendo repetant. Sed lubet nunc græci exemplaris ut unici, ita & scēdissimis mendis inquinatissimi, uitia quædā cōmemorare. Principio cuncta ferè per uniuersum græcū uolumen habentur confusa, absq; diastolis & punctis, uel iisdem omnino præposteris: quæ sententiā cōmutare, amphibologias ciere, labyrinthis interpretē uel ingeniosissimū inuoluere in cōfesso est. Quot ubiq; uerba, & sententiæ nō raro, transposita: binæ identidem aut ternæ uoces in unam coaluerūt, sæpicule duarum partes, uocibus ita laceratis, ut sæpius ne uestigiū quidē Græci relinquantur uocabuli: In summa, singulis penè uerbis hærendum, subsistendum, & diuinandum. Ah quoties cum talibus monstris congressi, exclamauius: *οὐ μὲν ἰ δαίμων τίρατι συγκαθύρξει*. Non deerunt tamen sat scio exantlatis tot sudoribus zoili, atque utinam non adeò multi: Siquidem nullum scripti genus obrectationi adeò obnoxiiū esse uidetur, atq; ex linguarū tralatione constans: nam idiotis etiam procliuē est, alia tanquam parum luculenter, alia quasi perperam reddita arroderē: Eruditis quædā ceu oscitanter, quædā ueluti improprie & parum eleganter tralata (sic uti *τὸ μιμηθεῖσθαι αὐτὸν φέρει τὸν ἢ μιμηθεῖσθαι*) sugillare, & quilibet aliās idem se, philautiæ uitio, elegantius præstare potuisse sibi pollicetur. Sed inanum hominū coaxationem prudentis est cōtemnere. Occurret aliquis forsan, qui culpabit Musam nostrā Caricam: Philologis me transtulisse hæc, nō logophilis respondeo: Alijs elocutione quidem, si de uero nemi ni cedere. Reprehendar ab alijs quod stilus omnino sibi uideat dispar, his inquā nos sæpius inuita Minerva nunc alacriores nunc tristiores calamū arripuisse. Neq; enim cōtinuò, sed intercifim, negocijs cum publicis, tum priuatis districtos, maxima temporis angustia ad prælorū clepsydrā atq; momenta hæc qualiacūq; sint exarasse. Quid quod interdū laborib. ita confectis, ut nobis ipsis molesti essemus, pensum tamen quo quo modo fuit absolueudū, proinde nō mirū si turbidior quandoq; fluat oratio, & abortiuū etiā, canis festinantis more pariam. Sumpsimus autē hanc interpretandī prouinciā Io. Bebelij, uiri talis, ut breui nullius officinæ plus debuerint bonæ literæ, precibus & precio tandē expugnati. Cæterū quia summū medicū summi quoq; Principis nomine illustratū, in lucem prodire conueniebat, tu mihi Illustris. Princeps, hoc ipso nomine primus occurristi, cui opus hoc consecrarem: Siquidem quicquid ornamenti in tam multis orbis proceribus cōsistit, in C. T. ubertim confluuit. Suscipe igitur antistitiū splendor, & seculi tui decus, læta fronte munusculum hoc literariū: Sic enim non mihi modò maiora ædendi animū eriges, sed etiā alios ad multa, quæ C. T. & æuū fortasse tuū illustrent, scribenda excitabis. Vale. Basileæ, calend. Mart. An. M. D. XXXII.

INDEX RE

RVM AC VOCABV-
lorum totius operis com-
pendiosus. Prior nume-
rus paginā, posterior uer-
sum designat.



Brotonū. 333.27
Abfcessus foris
imperentia.
262.2

Abies. 358.10
Absinthium. 347.10
Absinthii Pontici. 333.27
Acacia. 337.20
Acalyphe. 337.20
Acantha Arabica. 337.40
Acanthaleuce. 337.30
Acanthion. 337.30
Acanthos. 337.30
Acerbum. 332.25
Acetum. 395.20
Acetum scilliticū. 440.10
Acirus. 338.40
Achras. 347.10
Achores. 105.39.279.10
Aconitum. 338.10.324.40
Acorus. 338.20
Acopū bromium. 495.20
Acopū Azanitæ. 495.42
Acopum Basilij. 495.2
Acopū lypioniū. 495.10
Acopum diversifolius. 495.19
Acopū barbaricū. 495.30
Acopum diffusum. 495.42
Acrides. 338.20
Acte. 338.20
Acuti natura. 332.23
Adarce. 334.40
Adenes. 46.18
Adiantum. 335.4
Adipes. 410.30
Aegylops. 136.40.335.25
Aequinoctio autumnali
qui ingruat morbi. 54.17
Aequinoctio uerno qui
ingruat morbi. 53.43
De Aere. 20.17
Aerugo. 305.10
Aër optimus. 20.17
Aër pestilens. 20.11
Aera. 337.10

Aes usum. 420.10
Achale. 335.42
Actonychon. 335.19
Affectus oris. 153.36
Affectus quæ exercitia fe-
quuntur. 8.39
Agallochum. 333.37
Agaricum. 334.2.426.20
Agaricum nigrum. 330.26
Ageratum. 334.6.384.30
Agnos. 334.10
Agrostis. 334.17
Aigua. 421.2
Aizoon. 335.12
Alabastrites. 335.10
Alana. 352.30
Alauda. 377.10
Alcea. 339.6
Alcyonia. 339.10
Alcyonæ. 498.35
Alga. 350.1.419.30
Algore lacis convenien-
tia. 16.17
Alipon. 340.10.427.30
Alica. 41.26
Alisma. 354.20
Allium. 41.4.409.10
Aloë. 339.30.424
Aloës usum. 456.20
Alopex. 340.10
Alpectia. 101.8
Alpine. 340.10
Althæa. 338.40
Altercum. 323.5.417.30
Alui excrementa. 72.9
Aluum mouens. 424.30
Aluum sanis emollientia.
17.32
Aluus puerorum qui mol-
lienda. 430
Alyssion. 340.10.427.30
Amaracum. 340.10
Amarī natura. 332.29
Amarum. 145.11
Ambrosia. 340.30
Ambuxus. 373.30
Ampelagria. 145.12
Amentia. 112.40
Amentum. 342.2
Amianton. 340.40
Ammi. 340.30
Amnos. 341.2

Amomum. 342.10
Amoniacum thymiana.
342.10
Ampelitis. 352.10
Ampeloleuce. 342.30
Ampelos medana. 342.30
Ampelos hemeron. 342.20
Ampelos agria. 342.20
Ampeloprasum. 342.10
Amphisbena. 313.18
Amurca. 341.10
Amygdala. 44.32
Amygdaloru usum. 451.41
Amygdala dulcia. 342.40
Amygdala amara. 342.30
Animi defectio. 98.27
Anagallis. 342.10
Anagyrus. 342.20
Anarrhinon. 343.10
Anchyllops. 136.42
Anchusa. 334.22.386.20
Andrachne. 342.20
Androsamon. 342.20
Androsarces. 342.30
Anemone. 342.30
Anethum. 342.40
Angina. 156.31
Angylosis neruoru. 296.35
Animalū partes letales.
320.20
Animalia exitiosa. 320.6
Animo deficientes. 86.18
Anisum. 343.10
Anodina doloribus inten-
sis adhibenda. 133.10
Anonis. 343.10
Anorexia medela. 2.8
Anthemis. 420.40
Antherum. 457.33
Anthyllis. 343.4
Anthracis. 270.4
Anthracosis. 141.35
Antidotorum differentia.
437.10
Antidota multa. 433
Antidotus scitæ. 442.20
Antidotus Philonis. 441.4
Antirrhinum. 343.10
Aparine. 343.20
Aphace. 346.40
Aphroditarium. 457.4
Aphronitron. 347.10

INDEX.

Aphroscelinus. 385.30
 Aphtha. 4.30
 Apios. 345.20
 Apium. 39.28.406
 Apium rusticum. 358.10
 Apium grande. 365.30
 Apobregma. 497.35
 Apocinon. 343.30
 Apochyma. 343.30
 Apomel. 462.28
 Apophlegmatismi. 19.4
 Apoplexia. 125.6
 Appetit^{us} auersio. 93.8.176.4
 Apulotica. 285.14
 Aqua. 20.21.33.1.3.417.20
 Aquæ bonæ malacæ no-
 tax. 20.34
 Aquæ celestis. 463.32
 Aqua pluuiialis. 20.43
 Aqua glacialis. 21.10
 Aqua maris. 363.20
 Aquæ aluminosæ. 22.6
 Aquæ bituminosæ. 22.10
 Aquæ sulphuratæ. 22.8
 Aqua putrescibilis. 21.5
 Aqua perniciofa. 20.28.
 320.25
 Aqua saluberrima. 20.25
 Aqua malsa. 50.19
 Aquam eductia. 428.20
 Arabius. 385.10
 Araneus. 343.40
 Arbutus. 374.40
 Arction. 344.10
 Arceuthos. 344.10
 Arctium. 344.20
 Anus procidens. 214.39
 Ardore affectorum cura.
 16.24
 Argemon. 139.8.343.40
 Argentum uiuum. 330.18
 Ariditatis & caliditatis &
 aliarum compositarum
 distemperaturarum me-
 dela. 36.24
 Aridū massiliotæ. 457.41
 Ariobarzanius. 475.10
 Arifaron. 344.2
 Aristolochia. 344.10.427
 Armenia. 44.4.352.20
 Armeniacum. 344.20
 Armeniacus. 385.30

Arnabo. 344.30
 Arnoglossum. 344.30
 Arquatus. 204.18
 Arsenicum. 345.10
 Artemisæ. 345.10
 Arteriarum ariditas. 35.14
 Arteria quid. 61.29
 Arthritis. 234.13
 Artos. 345.10
 Artus flaccidi. 297.16
 Arum. 344.40
 Asarum. 345.10
 Ascalabotes. 345.20
 Ascarides. 301.19
 Asclepias. 345.30
 Ascyrrhon. 345.30
 Aspalatos. 345.40
 Asphaktus. 346.20
 Asparagus. 345.40
 Asparagi holerū. 40.15
 Asphodelus. 346.20
 Aspis. 315.16
 Asplenium. 346.10
 Astaphis. 346.10
 Aster atticus. 346.10
 Aster Magni. 467.42
 Asthma. 162.30
 Astragalus. 346.10
 Astringētis natura. 332.20
 Athanasia. 441.10
 Athara. 335.22
 Atheroma. 277.39
 Athiopis herba. 336.2
 Attonitus morbus. 125.3
 Atraphaxis. 346.30
 Atriplex. 39.20.346.30
 Atramentum. 388.10
 Atramentū scriptorium.
 388.33
 Atramentū sutoriū. 420.2
 Atticus aster cur bubo-
 nis dicitur. 269.7
 Auditus curatio. 12.37
 Auditus difficilis. 148.28
 Audiana. 369.20
 Auena. 428.35.29
 Aues. 45.10
 Aurei floris planta. 358.36
 Aureus. 46.14
 Auricularia. 145.22
 Auriculamuris. 340.10.
 396.40

Auripigmentum. 339.34
 Aurū humectatōes. 5.10
 Aurium dolores. 145.22
 Aurium sibilu. 148.10
 Austeru. 44.10.
 B
 B Acharis. 347.30
 Balanus. 347.20
 Balaustium. 347.30
 Balnea. 21.25
 Balote. 348.2
 Balsamum. 347.30
 Barba iouis. 422.30
 Basiliscus. 316.4
 Batrachū. 348.20
 Batrachium. 348.10
 Barus. 348.6
 Bdellium. 348.20
 Bechium. 348.40
 Befasa quid. 460.4
 Beta. 39.3.414.10
 Betonica. 348.30
 Bilem atram purgantia.
 427.13
 Bilem eductia. 424.35
 Bisacutum. 353.10
 Bitumen. 346.20
 Blatta pistrinaria. 407.20
 Blitum. 39.20.349.1
 Bolus armenus. 352.33
 Bothrium. 339.6
 Botrys. 349.10
 Branchus. 159.11
 Brassica. 39.8.378.10
 Brassica agrestis. 378.30
 Brassica rustica. 343.30
 Brathy. 349.30
 Bretanica. 349.40
 Bromus. 350.1
 Bruchū. 367.30
 Bryon. 350.1
 Bryonia. 350.10
 Bubo. 268.13
 Bubonium. 346.10.349.10
 Bubonocete. 206.33
 Buccina. 372.10
 Bucelatus catharticus.
 430.13
 Buglossum. 349.10
 Bulbi esculēti. 40.31.349.1
 Bulbus uomitorius. 349.1
 Bulimia. 94.16
 Buntium

Bunium mentiens.	422.30	Capitis uitia.	104.5	Centaurei duplex.	376.20
Bunium.	349.20	Capitis diuersi dolores.	108	Centunculum.	355.30
Buprestis.	321.9.349.10	per totum.		Cepe.	379.10.42.4
Buphthalmon.	349.30	Capita menidum.	371.10	Cephalalgia.	107.10
Butyrum.	349.20	capita smaridum.	371.20	Cephalalgiae uariæ species.	107.10
Buxa spina.	386.30	Caput muris.	371.20	Cephalaea.	109.42
C					
Acacia.	367.10	Caput lacertæ.	371.20	Cephalææ uariæ curationes.	110. per aliquot fol.
Cachexia.	199.25	Cardina.	141.35	Cephalicū remedi.	456.20
Cacoëthe.	286.13	Cardamus.	368.20	Cera.	372.2
Cadmia.	367.10	Cardiogni curatio.	1.33	Cerafa.	43.30
Calamagrostis.	367.10	Carduus.	408.30	Cerastes.	315.18
Calamintha.	367.10	carduus albus.	420.30	Ceratia.	44.39
Calamus aromaticus.	367.20	carduus niger.	420.30	Ceratonia.	371.10
Calamus phragmitis.	367.30	cantharides.	320.367.12.40	Cerebri temperaturæ in-	
Calculi articuloꝝ.	240.26	capnos.	368.10	adicia.	28.14
Calculus.	189.25	carbunculi.	270.2	Cerebrum.	46.29
Calculos confringentia.	446.40	cardamomum.	368.20	Cerebrum leporis.	356.20
Calidæ distemperaturæ.	33.41	Caris.	368.30	Cerebrū gallinacæ.	356.20
Caligatio oculorum.	13.6	Cari & ueterni discrimen.	114.40	Cerebrū mustelæ.	356.40
Calli.	244.22	Caryca.	43.11	Cerebrū hirsutinis.	356.30
Καλλιδιαφα.	137.41	Carya.	469.10	Cerebrum ouis.	356.30
Calx.	329.33	Carya pontica.	369.20	Cerium.	105.41.279.12
Campæ.	367.30	carpestium.	369.10	Cerota thaidis.	153.30
Caucalis.	370.5	carpesia succus.	324.22	Cerussa.	329.19.423
Cancer.	235.6.271.39	caron.	369	Chalaziti oculorū.	157.25
Canina appetentia.	94.22	Caros.	117.3	Chalbane.	419.7
Canis rabidi morsus remedia.	306.2	Carn. elixæ assæ fixæ.	45.22	Chalcanthos.	420.2
Canis non rabidi morsus curatio.	308.15	Caro ouilla.	46.3	Chalcuanthos.	420.10
Canopon.	368.6	Caro caprina.	46.4	Chalcitis.	429.41
Canorū præseruatio.	103.31	Caro hircina.	46.5	Chamæcissos.	420.20
Caneanus.	366.30	Caro bubula.	46.6	Chamelaæ.	427.2
Canthamum.	366.40	Caro leporina.	46.6	Chamaeleon.	322.35
Cancri fluuiales.	368.35	Caro ceruina.	46.7	Chamaeleuce.	420.20
Cancri marini.	368.40	Caro cucumeris.	398.30	Chamaeleō melas.	420.20
Cannabis.	368.35	Caseus.	48.11.426.30	Chamaeleō leucon.	420.30
Capparis.	40.11.368.10	Castamon.	369.30	Chamaedrys.	420.10
Capillorum conseruatio.	102.31	Cassia.	369.30	Chamamelini præparatio.	409.38
Capillos augentia.	102.40	Castorium.	369.40	Chelidonium.	421.20
Capill. nigrificatia.	102.40	Catalepsis.	116.24	Chelidoniū minus.	421.30
Capillorū profluuiū.	103.12	Cataphoræ cura.	89.14	Chelidones.	421.30
Capillos densiores facientia.	103.18	Cataplasmata.	455.30	Chia.	351.40
Capillos nigricans.	103.40	Catapotia.	187.4.429	Chimeda.	241.36
Capilli qui colore flauo inficiantur.	104.7	Cassarhus.	159.3	Chironia.	186.13
Capillos candidos efficietia.	104.42	Κασσαριδύ.	143.15	Chironia.	276.31
		Catochos.	112.37.115.39	Chole.	421.30
		Catochi ratio.	116.21	Cholemassa.	96.25
		Catochi cura.	116.28	Cholera.	179.17
		Cedrus.	370.10	Chondrilla.	422.10
		cenchrus.	315.2.370	Chondr. alica.	41.26.422.10
		centaurium.	426.30		

Chorion. 230.42
 Chryfocolla. 422.20
 Chryfocome. 422.30
 Cibi mediæ materiæ. 38.24
 Cicada. 414.10
 Cicatrices atræ. 287.35
 Cicer. 359.20
 Cicera. 42.20
 Cichorium. 373.20
 Cici. 371.10
 Cicis. 371.30
 Cicuta. 323.34.380.30
 Cimolia. 352.10
 Cinerula. 401.24
 Cinis. 414.20
 Cinnamalis. 335.3
 Cinnabaris. 372.10
 Cinnamomum. 372.20
 Cippi seleniacum. 505.8
 Circea. 372.20
 Cissaris. 372.30
 Cissos. 373.2
 Cistos. 372.40
 Citrium. 373.11
 Citta. 1.40
 Clavi remedium. 243.22
 Clauus. 339.38
 Clematidis. 373.20
 Cleopatraz interitus. 315.21
 Clinopodium. 373.30
 Clysteres. 16.15
 Cnicus. 373.30
 Coagula. 403.10
 Coccimelea. 374.10
 Coccus baphicus. 374.10
 Coccus cnidius. 374.10
 Coelia gales. 374.7
 Coeliaca affectio. 180.21
 Coeliacum clidium. 451.22
 Cœloma. 139.7
 Cœnidi oportunitas. 15.14
 Cœruleus. 379.30
 Colocynthis. 374.30
 Colica aggritudo. 185.8
 Colocynthe. 374.30
 Colliquatio. 88.11
 Colophonium. 408.10
 Columella oris. 156.39
 Colus agrestis. 346.30
 Collyria. 465.1
 Collyrium acbupum. 133.22
 Collyrium Cleonis. 463.12

Kαλυπτάδες. 44.24
 Comarus. 374.40
 Comitalis & eius cura. 118.25. & sequenter.
 Commi. 371.10.375.2
 Conia somnus. 112.35
 Conia. 375.10
 Conion. 380.30
 Conchylia. 373.40
 Condylomata. 230.10
 Confectio anetina. 494.7
 Conos. 380.40
 Consolida maior. 413.2
 Contusa. 274.24
 Conuulsio. 129.25.275.28
 Conyza. 375.10
 Καψωρίς. 148.18
 Corallium. 376.30
 Cor. 46.34
 Cordis affectus. 171.12
 Coris. 376.40
 Coris herba. 377.10
 Coriandrum. 323.18.377.10
 Coridos. 377.10
 Cornu caprinum. 370.30
 Cornu ceruinum. 370.30
 Cornu tauri. 370.40
 Cornulaca. 415.30
 Coronopodium. 431.20
 Coronopus. 377.20
 Cornus. 378.10
 Corpori suaueolentiam
 conciliantia. 11.40
 Coryza. 159.5
 Coryza infantis. 4.4
 Costus. 377.50
 Cotyledon. 377.30
 Coxendicis antidotus mi
 tigans dolorem. 449.15
 Coxendicis affectus & cu
 rationes. 232.16
 Crabrones. 308.31
 Crambz species. 378.10
 Crataegonos. 378.20
 Crethmon. 378.20
 Credica. 352.10
 Crimmon. 378.30
 Crisis instantis cognosce
 nz ratio. 60.6
 Crite. 137.29.378.30
 Crocinum. 502.20
 Crocinū diarthodū. 468.33

Crocodilium. 379.10
 Crocomagma. 452.20
 Crocus. 379.10
 Crommyon. 379.10
 Cucumis. 43.5.407.10
 Cucurbita. 42.41.374.30
 Cucurbita aspera. 410.2
 Cucurbita syluest. 425.30
 Culices profligantia. 304.21
 Cuminum. 380.10
 Cupressus. 380.10
 Cutis constipatio. 9.26
 Cyamus. 379.20
 Cyanos. 379.30
 Cyclaminos. 379.30
 Cyclaminos altera. 380.2
 Cydoniarū medicamen
 tum. 443.40
 Cygnarium. 464.30
 Cygnus flauus. 464.34
 Cygnus candidus. 464.4
 Cyma. 40.16
 Cymæ bryonia. 40.23
 Cyminum. 380.10
 Cynosbatus. 380.10
 Cynocrambe. 343.30
 Cyparissus. 380.10
 Cyperus. 380.26
 Cyphi. 504.16
 Cyphi magnum. 504.38
 Cyphoides. 445.30
 Cypros. 380.20
 Cytisum. 380.30

D

Ades. 354.10
 Damascena. 44.37.
 Damassonium. 354.40
 Daphne herba. 354.10
 Daphne arbor. 354.30
 Daphnoides. 355.10
 Daucus. 354.30
 Dauci. 40.39
 Dentium custodia. 12.27
 Dentisio puerorum. 4.14
 Dentitibus quid agen
 dum. 4.20
 Dentium dolores. 154.20
 Diariz febris notæ. 73.3
 Diabetes. 194.31
 Diarthodon collyr. 468.18
 Διάρθρον. 497.11
 Διάρθρον δαμάσκηνα. 469.22
 Διάρθρον

I N D E X.

Διὰ τοῦ βασιλέως.	460.40
Διὰ τοῦ γένους τοῦ.	474.39
Διὰ ζυμῶν.	465.20
Διὰ χυμῶν.	457.29
Διὰ οὐροῦ τῶν.	457.25
Διὰ δακρύων.	465.40
Διὰ καυκαλίδος.	470.38
Διὰ γράφιδος μέλους.	498.6
Διὰ κρυῶν.	467.28
Διὰ λιθίων.	435.40.467.32
Διὰ μέσων.	460.2
Διὰ περὶ τῶν.	460.13
Διὰ χυμῶν βρωμῶν.	460.22
Διὰ γλῶττιδος.	460.30
Διὰ λῶν.	468.30
Διὰ σμυρνῶν daudiacū.	466.5
Διὰ χυλῶν τῶν.	468.10
Διὰ οἴνου.	469.39
Διὰ λιμνῶν.	475.30
Diacrocum.	470.27
Διὸς ῥαε reperculsiuorum.	465.24
Diathexæ puerorum co-	
hibitio.	4.37
Diarhodon albū.	468.24
Diarhodon Nili.	468.40
Diacodidū cōpositum.	441
Diaprasij syntheton.	442
Diatrion pepereon.	78.10
Dictamus.	355.20
Deiectionum diuersæ spe-	
cies.	71.10
Dies decretorij.	58.20
Didymi inflamatio.	208.8
Difficultas mictiōis.	195.10
Dilurum quid.	325.22
Dionysia.	263.9
Dionysias.	355.20
Diospolites medicamen-	
tum.	444.20
Diphyrges.	355.20
Diploma.	45.34
Dipfas.	314.4
Dipfacos.	194.34
Dipfacon.	355.30
Distrahentia.	240.36
Distemperamentorū fri-	
gidorum medela.	35.3
Δυσκολία medicamentū.	442.20
Dolor.	87.11
Dorycnium.	326.13.355.30

Dothienes.	269.17
Dracontion.	355.30
Dracontij.	302.12
Draco marinus.	316.18
Dracunculi.	302.12
Drimyphagia.	314.17
Dropax.	494.35
Dropax Gallus Oribasij.	497.20
Dryinus.	313.23
Dryopteris.	356.10
Dulcis natura.	332.34
Dulces, et utiles potiones.	461.5
Dulcis radix.	353.20
Dysenteria.	182.36
Dysenterix remed.	455.20
Dysenterijs utiles globu-	
li.	448.20
Dyspnœa.	162.30
Δυσπνœα.	195.10
Δυσπνœα.	493.10
E	
Ebenus.	356.10
Ebiscus.	338.40
Ebulus.	338.20
Echidna.	360.20
Echymoma.	274.36
Echinastrum.	351.10
Echinus.	360.40
Echinus marinus.	361.10
Echinus terrestris.	361.1
Echlon.	361.10
Ectyloica.	289.30
Eclipsimus.	145.35
Ectrimatis curatio.	242.
Ectropia.	136.34
Egyptia.	460.34
Erinaceus.	361.10
Elaomeli.	357.30
Elaoselinon.	358.27
Elate.	358.10
Elaterium.	330.26.407.10.
	426.6.557.40
Elatine.	358.10
Elaphoboscos.	358.10
Electri in pastillis usus.	451
Electrum.	362.20
Elenium.	358.10
Elimus.	359.5
Elephantiasis.	247.8
Elephas.	358.20

Embole.	480.5. et sequent.
Emollientia.	240.32
Emmotō quid.	243.1.270.38
Empetrum.	359.10
Emphysemata.	136.3.
	273.32
Emplastra.	471.17
Empla. ὁξυκαμίας.	475.40
Emplastrum deinceps alia fe-	
re infinita.	476
Empl. ὁξυκαμίας.	444.17
Emplastris ingredientia.	485
Empl. hederaceū.	474.23
Empl. melandorū.	474.30
Empl. Mnasæ.	473.7
Empl. ex dracodid.	478.16
Emplastrum ex semine li-	
ni.	472.20
Empl. ὁξυκαμίας.	472.25
Empl. ὁξυκαμίας.	472.30
Emplast. ὁξυκαμίας.	472.36
Emplast. botanicū.	472.40
Empl. diazophoridū.	473.2
Empl. ex fermento.	473.5
Emplast. dothiene.	473.10
Emplast. ὁξυκαμίας.	473.16
Emplast. smilium.	473.20
Empl. ὁξυκαμίας.	473.28
Empl. ὁξυκαμίας.	473.33
Emplast. pyrine.	473.40
Emprosthodonos.	130.13
Empyema.	168.3
Encephalum lagoi.	356.20
Encauthis.	138.33
Enula campana.	358.10
Enumeratio simplicium	
uenenorum.	320.6
Enterocœle.	206.33
Entheastici.	121.34
Ephemerum.	360.30.325.31
Epulis.	154.33
Epicauma.	139.10
Epimelis.	359.20
Epilepsia.	118.25
Epithymon.	359.90.427.20
Epithymbron.	427.20
Epimedium.	359.10
Epipactis.	359.20
Epiphora tumor oculo-	
rum.	134.27
Ephialtes.	123.14

Ephialus.	79.16
Epibole.	123.12
Epinyctides.	257.21
Epiphora oculorū.	133.35
Epithemata.	488.10
Equisetum.	365.30
Erebīnthus agrestis.	359.30
Erethria terra.	352.10
Eria rhypara.	359.37
Erice.	360.1
Erigeron.	363.20
Erinos.	110.26.360.1
Eruangina.	395.40
Eruca.	39.35.360.20
Eruca piceæ.	321.29
Eruum.	395.40
Eruī usus in medicamen- tis.	442.10
Eryngion.	363.20
Escarotica.	254.33
Erysimon.	360.20
Erysipelas.	265.25
Erysipelas cerebri.	114.15
Erysi sceptrum.	345.40
Eupatorium.	360.20
Euphorbium.	360.30
Euzomon.	360.20
Exanthemata puerorum.	3.33
Exercitij fructus.	6.20
Exercitationum omnia ge- nera.	6.41
Exochades.	211.20
Extrahētia corpori infixa.	291.22

F

Faba.	42.26.379.20
Fames uaccina.	94.6
Fauum hulus.	105.41.
	279.2
Febrientiū alui cura.	97.14
Febriticantium sitis.	95.3
Febriticantium aspera lin- gua.	95.3
Febrientium nausea.	96.7
Febriles rigores.	90.30
Febris quotidianæ signa.	78.24
Febris quotidianæ cura- tio.	78.36
Febris quotidianæ & ter- tianæ discrimen.	76.6

Febris diaria.	73.8
Febris euphoria.	74.1
Febris epialus.	79.2
Febris humoralis notæ.	75.3
Febris humoralis curatio.	75.20
Febris synocha.	79.34
Febr. cōtinuæ notæ.	80.10
Februm ardentū.	80.29
Februm aestuantium cu- ra.	80.35
Febris erysipelata.	81.6
Febris hectica.	81.27
Febr. hectica curatio.	82.19
Febris hemitritæa.	82.30
Febres populares.	83.19
Febris pestilentialis.	84.19
Febres ex humorum re- dundantia.	85.22
Febris tertianæ cura.	76.30
Febris tertianæ notæ cu- ra.	77.12
Febris quartanæ signa.	77.30
Febris quartanæ curatio.	77.41
Fecis uini usus.	456.30
Fel.	421.40
Fel multorū animalium.	422
Fel fustum.	421.40
Fel caprinum.	421.40
Fella autium.	422.10
Felis morsus.	311.5
Fermentum.	361.30
Ferula.	393.10
Ferulago.	363.30
Ferrum.	407.10
Fex aceti.	416.20
Fex uini.	416.10
Fibri testiculorum usus.	453.30
Ficosa exanthemata men- ti.	110.6.35
Ficus.	43.13.412.10
Ficus terrestris.	421.21
Ficus Aegyptia.	412.30
Ficus hulsæra.	106.25
Figuratio capitis.	27.40
Filicula.	356.10.401.20
Filix.	402.30

Fistula.	289.25
Flos aris.	420.10
Foeniculum.	388.2
Foeniculū erraticū.	365.21
Foenum græcum.	42.32.
	414.30
Formicæ hulsæra.	260.8
Frigiditatis præsidia.	36.14
Frictio præparatoria.	6.12
Frictiones omne genus.	7.30
Fru mentacea.	41.26
Fructus omnes flatuosi.	22.38
Fructus ex arborib.	43.12
Fuligo.	335.42.383.20
Fuligo pictorum.	345.20
Fumus.	368.10
Fungi.	41.16.327.35.391.30
Furunculi.	268.11.269.17
Fusca cōtra calculū.	446.30

G

Gagates.	384.40
Galactites.	384.10
Galla.	371.30
Galbanum.	419.7
Galion.	350.30
Galipfis.	350.30
Ganglium.	260.22
Gangrana.	264.24
Garus.	351.2
Gelidi natura.	332.32
Geminalis.	396.2
Genista.	410.10
Genituræ nimietas.	153.39
Geranion.	351.10
Geras ophios.	352.30
Ges enteræ.	352.40
Gigarta.	353.10
Gingidium.	40.4.353.10
Gingiuæ incōmoda.	155
Giris.	354.4
Glabretæ cura.	102.24
Gladiolus.	394.2
Glandes.	45.5
Gluticium.	353.10
Glechon.	353.10
Glicyides.	353.20
Glecos.	353.20
Glecon quid.	274.16
Gluten.	374.30
Glycyrrizon.	353.20

Graphæ

INDEX.

Gnaphalium. 353.30
 Gona sylleptica. 506.37
 Gongilis. 353.30
 Gonorrhoea. 209.15
 Gorgilon. 353.40
 Gramen. 334.17
 Granum cnidium. 364.30
 Granum tinctorium. 374.4
 Grauidarum uictus. 1.18
 Gruina herba. 351.10
 Gruum caro. 45.19
 Gummi cerasorum. 371.10
 Gyrgathum. 123.9
 Gypsum. 329.9.354.10
H
 Habitus qui calfacien-
 dus. 12.1
 Hamatites. 384.10
 Hamorrhagia locellorum.
 217.14
 Hamorrhoides. 213.37
 Hamorrhoidus. 313.41
 Halatia purgantia. 430.40
 Halimon. 39.5.339
 Halme. 339.20
 Harena. 341.10
 Harmation. 469.30
 Hastula regia. 346.20
 Hecatombe. 467.22
 Hedera terrestris. 420.20
 Hediofion. 362.10
 Helicysmata. 358.20
 Helleborine. 359.20
 Helleborus. 358.30.425.10
 Helleborus quibus dan-
 dus. 435.31
 Helleborus quomodo sit
 praeprandus. 436.40
 Helichryson. 358.30
 Heliocates causticus. 457.20
 Heliotropium. 362.10
 Helxine. 358.40
 Helxine cissampelos. 359.1
 Hemerocalles. 362.20
 Hemisrania. 109.42
 Hemionitis. 362.30
 Hemiplagia. 126.8
 Hepar. 46.34
 Hepata diuerforum ani-
 malium. 362.30
 Hepatica remedia. 445.40
 Herba lactaria. 414.40

Herba uenerca. 338.20
 Hermodactylus. 360.10
 Hermodactyli mica sto-
 macho. 237.7
 Hernia. 206.40
 Herpes. 265.26
 Herpes miliaris. 265.33
 Herpes corrodens. 265.33
 Hiera Antiochi. 433.10
 Hiera lusi. 433.20
 Hiera Galeni. 433.30
 Hiera Rupi. 433.40
 Hircina origanos. 415.30
 Hippocampus. 365.10
 Hippolapathon. 365.20
 Hippomarathon. 365.20
 Hippophaes. 365.40
 Hippopotamus. 365.30
 Hippofelinon. 365.30
 Hippuris. 365.30
 Hircus sub alis. 173.38
 Hirundines. 421.30
 Hirundinaria. 421.20
 Hirudines. 322.20
 Hordeum. 421.378.30
 Hordeolum. 137.29
 Holera esculenta. 38.33
 Hominis morsus cura.
 317.3
 Hulnera articulorum. 291.2
 Hulnera flaccida cum hu-
 more. 284.28
 Hulnera cacoethe. 286.13
 Hulnera cacoethe curans.
 454.40
 Hulnera sordida. 281.39
 Hulnera immatura. 280.18
 Hulnera plantae. 243.3
 Hulnera uermiculosa. 282.14
 Hulnera cicatricem desin-
 derantia. 284.37
 Hulnera inflammata. 280.14
 Hulnera concaua. 280.42
 Hulnerum lacuna. 287.21
 Hulus simplex. 279.13
 Hyacinthus. 416.40
 Hydrargyros. 417.10
 Hydrocele. 206.40
 Hydroper. 417.10
 Hydrops. 200.2
 Hydromalum. 461.43
 Hydrosolanum. 462.10

Hydron. 417.16
 Hydrophobica affectio.
 306.16
 Hydrus. 314.31
 Hygidium ammonij. 466.24
 Hygra. 412.3
 Hypocyanus. 323.5.417.30
 Hypericon. 417.30
 Hypocoon. 417.40
 Hypoglosson. 418.25
 Hypocistis. 418.5
 Hypophaston. 418.10
 Hypopum. 418.10
 Hypochyma. 143.24
 Icterus. 140.8.152.36
 Hyposphagma. 135.36
I
 Iaspis. 384.20
 Iaton. 500.29
 Ichthyocolla. 366.30
 Ictus uenenatorum. 308.3
 Ichor quid. 221.35
 Idæa radix. 364.30
 Iecoraria catapotia. 446.10
 Iecoris temperaturae no-
 ta. 32.5
 Iecoris affectus. 196.8
 Ignis sacer. 114.15.265.25
 Ignis exustiones. 257.13
 Ilambonis. 465.30
 Illecebra. 414.30
 Ileo. 188.4
 Ileos stomacho. 178.20
 Ilex. 402.10
 Impetigo. 252.15
 Impotentiae cura. 15.20
 Incubi. 123.13
 Infatio. 273.32
 Intemperantiae frigidae cu-
 ratio. 34.27
 Intemperaturarum pulmo-
 nis indicia. 30.32
 Intercus. 200.2
 Inflammatio. 260.35
 Insanientes amore. 124.22
 Intertrigines femorum in-
 fantis. 57
 Intestinorum lenitas. 180.21
 Intybum. 38.39
 Iocinorosorum remedia.
 445.20
 Ionithi. 153.16

INDEX.

Iris. 386.10
Iris Illyrica. 426.30
Iris sylvestris. 393.40
Iris. 360.26
Irritamēta Veneris. 14.38
Istia. 366.10
Isopyron. 366.10
Isotheum. 469.34
Itea. 366.10
Iuncus odoratus. 413.20
Iuncus quadratus. 380.20
Juniperus. 344.10
Ixia. 325.15
Ixos. 365.10

L

L Abrū Veneris. 355.30
Lacaphthion. 505.1
Lac. 350.10.47.6
Lac coagulatum. 318.33
Lactipotatio. 47.17
Lactis elixatio. 47.30
Lac diacochleon. 47.40
Lac fissile. 48.2
Lactis trutina. 2.34
Lactis vitiosi emendatio. 3.2
Lac generantia. 3.18
Lacerta. 405.40
Lacerta chalcidica. 406.30
Lactarius lapis. 384.10
Lactuca. 38.34.364.10
Ladanum. 381.10
Lagopos. 381.10
Lana succida. 359.30.394.20
Lapathon. 381.30
Lappa. 393.30
Lappa minor. 344.20
Lapides. 383.40
Lapides in spōgijs. 385.10
Lapfane. 381.20
Laserpitium. 407.30
Lateralis dolor. 169.25
Lathyrus. 381.20.426.10
Laureola herba. 355.10
Laurus. 354.30
Legumina. 42.21
Lemneftis. 496.33
Lemnia terra. 351.20
Lentes. 42.21.428.20
Lenticula palustris. 418.20
Lentigo. 152.28
Leniscus. 413.10

Leontopetalon. 382.40
Lepidium. 382.10
Lepis. 381.10
Leptra. 251.7
Lepus marinus. 321.39
Lethargus. 114.25
Lethargicuratio. 115.2
Leucacanthos. 382.20
Leucas herba. 382.30
Leuce. 254.18.383
Leucoion. 382.30
Leucomata. 140.35
Libanum. 467.38
Libanotides. 383.6
Libanotos. 383.10
Licapfos. 386.20
Lichen. 381.40
Lichenæ. 251.15
Lichenes caballorū. 382
Lien. 46.36
Lienis affectus. 202.24
Lignorum. 405.20
Lignys. 383.20
Ligusticum. 383.30
Lilium. 378.40
Lilium sylvestre. 362.20
Limaces. 377.30
Limonium. 381.40
Lingua. 46.15
Lingua febrientium fca-
bra. 95.31
Lini semen. 386.2
Linozostis. 386.10
Lippinadines. 133.3
Liquida Erasistrati. 471.3
Liquores letiferi. 320.11
Lithargyros. 383.30
Lithospermon. 385.40
Liucris emendatio. 11.20
Lixitium. 375.10
Locellorū exulceratio. 222.2
Locustæ. 338.20
Lolium. 337.10
Lonchitis. 386.20
Lotium hominis. 397.10
Lotij significationes. 72.31
Lotium cientia. 17.33
Loti species. 387.10
Lucis perturbatio. 133.22

Lumbrici. 392.31
Lumbrici terræ. 352.40
Lumbrici teretes. 298.18
Lupini. 42.31.363.44
Lupinus agrestis. 364.4
Lutum Aegyptiū. 351.20
Luxata. 274.24
Lycan. 124.3
Lycanthropia. 124.2
Lychnis. 387.2
Lycion. 386.30
Lycopos. 334.13
Lynceus oxydoricus. 468.43
Lysimachium. 386.40

M

M Acer. 387.20
Maciei membrum
rum cura. 25.40
Macilentorum educatio. 25.28
Madarosis. 137.39
Madarosis superciliorū. 138.15
Magnites. 385.3
Maiorana. 340.20
Malabathrinum. 469.34
Malabathron. 387.20
Malacia curatio. 15.35
Malagmata omnis gene-
ris. 488.10.493
Mala. 390.4
Malorum usus. 443.20
Malum terræ. 344.10
Malus persica. 390.10.389
Mala medica. 2.14
Mala punica. 44.14.375.10
Malua. 38.41.307.30
Malua semen. 447.30
Mammariū afflictionis &
cura. 172.18
Mamiras. 387.30
Madradora. 324.28.387.40
Manna. 387.40
Mania. 121.17
Marathrum. 388.2
Marrubium. 401.40
Marrubium nigrū. 348.2
Marrubiniū semen. 447.20
Mastiche Chia. 388.10
Mastiche Aegyptia. 388.10
Mastucha. 505.22
Mastu-

I N D E X.

Mastucha præparatio.
 505.22
Maza. 42.5
Medicamenta extenuan-
tia. 24.42
Medicamen e citrio. 430.7
Mecones. 389.20
Melan. 388.15
Melancholia. 121.17
Melâcholiæ species. 121.20
Melanteria. 388.10
Melanthium. 388.20
Mel. 388.30
Melamarum. 388.40
Mel uenenatum. 388.2
Melea Armeniaca. 390.10
Mela. 389.2
Melicerides. 277.39
Melilorum. 389.6
Melirites. 384.10
Melissophyllon. 389.10
Melitera Oribasij. 456.30
Meloplacuntij præpara-
tio. 445.30
Memaculos. 389.10
Memoriæ labes. 117.3
Menses trahentia. 19.33
Mensium mora. 215.25
Mensium nimietas. 117.14
Menta sativa. 362.10
Mentis agitatio. 112.5
Meon. 390.20
Mercurialis. 386.10
Mespila. 44.16.389.10
Metalla uenenosa. 320.22
Metopium. 501.19
Metrenchitæ. 301.36
Micetæ. 41.16
Milax. 390.20
Milium. 42.9.370.8
Milij folis usus. 447.10
Millipedæ. 395.4
Minium. 351.30
Mirepica. 347.20
Misy. 390.30
Mithridatidis. 439.30
Modius Italicus. 496.42
Modus elixationis ingre-
dientium emplastra. 485
Mola. 224.32
Moly. 392.20
Molybdena. 390.36

Molybdos. 390.30
Monemeron. 464.20
Mora. 43.25
Morbus comitalis. 118.25
Morbus regius. 204.18
Morea morus. 391.10
Morosis. 117.9
Morsus uenenatorum. 311.2
Muliebris nimia purga-
tio. 217.14
Muliebrium locellorum af-
fectiones. 215.7
Mulieris grauidæ signa.
 1.12
Mulierum accidentia. 1.10
Mulus. 416.2
Muræna. 316.11
Muria. 399.20
Murices. 391.22
Mustela. 350.30
Mustela uenter. 37.7
Myargos. 391.20
Myaros. 392.20
Mycetes. 391.30
Mydriasis oculorum. 142.26
Myelos. 397.30
Myeroxos. 384.10
Myocephalon. 139.35
Myoptasis. 145.15
Myos otis. 391.40
Myrice. 392.2
Myriophyllon. 392.10
Myræ. 498.34
Myræxora. 498.36
Myrobalanum. 347.20
Myrrha. 392.10.409.30
Myrrhine. 392.10
Myrsinatum. 475.23
Myrtetum. 462.23
Myrtus. 392.10
Myza. 391.40

N

Napy. 392.30
Narcissus. 393.10
Narce thalassia. 393.10
Narcotica. 186.42
Nardinum. 466.42
Nardus Celtica. 392.40
Nardus oreæ. 393.2
Narium affectiones. 150.6
Narthex. 393.6
Nascaphthon. 392.30

Nasturtium. 39.38.368.20
Natrix. 314.31
Naxias. 385.20
Nephelia. 140.38
Nepita. 367.10
Nerium. 393.20
Nervi pūcti remed. 294.26
Nervi faucij. 293.35
Nerutorum abscessus cus-
ra. 263.6
Neuras. 393.20
Nigella. 330.26
Nitrosæ aquæ. 22.2
Nitrum. 386.10
Nomæ. 283.15
Notæ finis morbi. 58.10
Notæ morbi diutini. 57.24
Notæ salubris letalisq̃
morbi. 56.38
Nuces. 44.8.369.10
Nuclei acinorum uux. 353.10
Nux pini. 43.42
Nutrix qualis eligenda.
 2.18
Nutricis aeræ. 2.22
Nutricis nutritus. 2.20
Nymphæa. 393.28
Nyctalops. 143.7

O

O Beforum extenua-
tio. 24.33
Ochra. 352.30
Ochri. 42.35
Ocimum. 39.39.423.40
Ocimum aquaticum. 369.2
Oculorum phlegmone.
 133.34
Oculorum hulcera. 139.4
Oculorum cicatrices. 140.33
Oculorum chemosis. 135.23
Oculorum caligo. 13.6
Oedema. 273.4
Odoratus oblatio. 150.8
Oenanthe. 394.10
Oenanthij præparatio. 503.2
Oesypus. 394.20
Oleastellum. 421.10
Olex lachryma. 357.10
Oleomel. 357.46
Oleosinatura. 352.35

Olea. 356.30
 Oleorum cōcinnationes. 498.14
 Oleorum genera. 499
 Olearia cotis. 385.30
 Oliuæ. 44.23
 Oliuæ cathartica. 430.20
 Olostium. 394.30
 Olympus. 466.30
 Olympiacum. 466.30
 Olynthi. 394.20
 Olus atrum. 39.28
 Omphacion. 394.30
 Omphacomel. 462.20
 Onagra. 394.30
 Onoclea. 334.23
 Onochilos. 334.32
 Onobrychis. 395.2
 Onoma. 394.40
 Ononis. 395.10
 Onyches. 395.10
 Onyx oculorum. 140.11
 Opisthotonos. 130.30
 Opium. 324.10
 Ophiāsis. 101.14
 Ophthalmia. 133.3
 Oreofelinon. 395.30
 Orchis serapias. 396.10
 Origanus. 395.30
 Oryza. 42.13.396.10
 Oris facri exphulcerati cus
 ratio. 99.35
 Orobos. 395.40
 Orobanche. 395.30
 Orchis. 396.10
 Orys. 356.10
 Orminon. 396.
 Orthopncea. 162.30
 Osiris. 396.20
 Ossa. 396.20
 Ossa suum. 396.30
 Ostraca. 396.40
 Ostracites. 385.20
 Ostrea. 397.6
 Ostreorum usus. 456.40
 Othonna. 394.10
 Qua. 45.27
 Qui albor. 423.10
 Qui uisellus. 423.20
 Ozana. 150.25
 Oxymel. 429.10
 Oxymel lulianum. 421.4.

Oxymel quomodo fiat. 440.6

Oxymel splenicū. 446.10

Oxymel scilliticū. 440.20

Oxymel pro calculosis. 446.20

Oxycanthos. 395.20

Oxyter. 467.5

P

Pæonia. 353.20

Pæonia antidotus. 446.10

Palisurus. 397.30

Palma. 44.19

Panax Heracleum. 397.40

Panaces Asclepiion. 398.2

Pancracium. 397.30

Panicum. 42.9.359.1

Panis. 41.30.345.10

Pannus. 403.20

Panus. 268.10

Papauera. 389.20

Papaueris usus. 441.20

Papaueris succus. 324.7

Papauer nigrum. 389.30

Papauer corniculare. 327.2

Papula. 257.2

Papyrus. 398.10

Paralysis curatio. 125.40

Paralysis partium. 210.39

Paraxyp. 171.2

Parasyrmatū cura. 459.33

Paraphrosyne. 112.15

Parasotw. 156.33

Pardalianches. 338.10

Pareses singularum par-

tium. 128.8

Paresis. 126.26

Paresis quæ colicam sequi-

tur. 129.14

Paristhemia. 156.9

Paronychia. 398.10.243.41

Paronides. 149.17

Papuyep. 475.34

Parthenion. 427.30

Partes animalium. 46.13

Partus difficultas. 230.41

Parulis. 154.38

Passer. 416.20

Pastinacæ. 40.39.410.20

Pastinaca marina. 316.11

416.10

Pastillorum differentia.

449.30

Pastillorū scilliticorū præ-

paratio. 437.30

Phœnix herba. 419.30

Phœnix. 419.10

Phœum. 465.6

Phormion. 419.20

Phoxæ. 28.8

Phrenitis. 112.5

Phrygius. 384.30

Phlegma. 106.42

Phthisis. 142.38.168.3

Phthisicis conferens ele-

ctuarium. 442.3

Phu. 419.20

Phusca cathartica. 430.30

Phycos. 419.30

Phyllitis. 419.34

Pica unde. 2.3

Picearū erucae. 328.29.400

Piceæ cortex. 400.8

Picea Galeni. 444.30

Pili. 416.10

Pili ex cōbustionibus na-

scuntur. 359.15

Pilos extenuantia. 103.4

Piper. 398.20

Piperis usus in antidotis.

441.20

Piperū trium medicamen-

tum. 444.16

Pira. 44.12

Pirum syluestre. 347.10

Pirus. 343.24

Pissa. 399.30

Pisselæon. 399.30

Pisces. 48.17

Pisces corio testaceo præ-

parati. 48.30

Pisces molles. 49.2

Pisces sine squamis. 49.7

Pisces cetacci. 49.15

Piscium gluten. 366.30

Piscium ius. 361.40

Pistacium. 399.40

Piniū euacuantia. 427.40

Piniū uentris cura. 16.32

Pitydes. 400.2

Pityæ. 403.10

Pityusa. 400.30

Pityriasis. 105.5

Plantago

Plantago. 344.30
 Plantæ mortifera. 320.10
 Platanus. 400.10
 Pleuritis. 169.25
 Plumbum. 330.14.390.40
 Plumbago. 90.30
 Pneumon. 400.10
 Podagra. 34.15
 Podag. præseruatio. 34.22
 Podagr. antidotus. 448.20
 Podagrica ex hermodactylis. 431.2
 Pœcillum. 405.35
 Polemonion. 400.30
 Polenta. 42.3
 Pollen. 354.10
 Polion. 400.4
 Polygalon. 401.2
 Polygonaton. 401.10
 Polypodiū. 401.20.427.19
 Polycnemon. 401.10
 Polypus. 150.22
 Poma. 44.7
 Pomorum in medicamentis usus. 443.20
 Pompholix. 401.30
 Ponderum & mensuratio. 511
 Populus alba. 383.2
 Porrigo. 105.5
 Porrum. 41.4
 Porrum agreste. 341.10
 Portulaca. 342.20
 Potamogiton. 401.30
 Poterium. 393.20.401.30
 Præson. 402.3
 Præson. 401.30
 Præparatio sanguinis te-
 studinis marinæ. 316.30
 Præster. 314.10
 Protrigines. 243.13
 Priapismus. 210.18
 Principium morbi quod. 50.28
 Proteus. 409.14
 Pruritus puerorum. 4.10
 Prunus. 374.10
 Propolis. 139.33
 Procidētia umbilici. 106.2
 Præcocia. 44.4
 Propolis. 402.10
 Profluuiū muliebre. 218.28

Prophylactica omnium uenatorum. 304.8
 Procidētia uteri. 227.2
 Prurigo. 153.11
 Psaron. 457.17
 Psilothra. 206.17
 Psilothrū podagr. 458.41
 Pseudodictamon. 422.40
 Psitacium. 475.20
 Psora. 251.7
 Psoricon. 423.10
 Psorophthalmia. 136.6
 Psyllium. 423.5
 Psydria. 105.21
 Psarmice. 151.20.401.22
 Pterygia. 141.18.244.19
 Ptelea. 402.20
 Pteris. 402.32
 Ptilosis palpebrarū. 138.11
 Pūfana decoctio. 42.14
 Pūfenda curans pūfillus. 453.40
 Pudendorum uitia. 210.16
 Pudendorum carbūculi. 271.30
 Pueri educatio. 3.21
 Pueritæ & reliquarū ætatū educatio. 5.30
 Pulegium. 353.10.427.20
 Pulcaris her. 323.30.423.10
 Pulmo. 4637.400.24
 Pulmonaria. 163.40
 Pulmonis tēperiei signa. 30.32
 Pulsus quid. 61.21
 Pulsuum genera. 62.2
 Puls cathartica. 431.30
 Pulicula. 335.22
 Pumex. 372.37
 Purgātes se, quid faciant. 432.3
 Purgatorium aquagium. 439.30
 Purgatoriū ē cottonijs con-
 secum. 430.4
 Purgatoriū ex rhodome-
 lite. 429.30
 Purpure. 401.10
 Pycnocomon. 402.30
 Pyrethrum. 402.40
 Pyrites. 384.20
 Pyros. 403.4

Pyropus. 208.8
 Q Valitatum gradus. 333.5
 Quatuor corporis partes. 52.13
 Quæ grauē arcent odo-
 rem. 24.25
 Quercus. 356.10
 Quinquēfolium. 398.10
 Quomodo corporis color
 emendetur. 12.10
 R
 Radices esculentæ quæ
 sint. 40.27
 Radices uirulentæ. 320.13
 Radicula. 41.2
 Radix rhodia. 404.10
 Ranæ. 348.20
 Ranunculum. 348.10
 Raphanus. 403.30
 Rapum. 353.40.379.30
 Raucedinis cura. 160.18
 Recrementū argenti. 20.
 Renes. 46.23
 Renum affectiones. 189.25
 Res Venerea. 14.22
 Resinæ. 403.40
 Rigor & differentia eius. 130.32
 Rha. 403.30
 Rhagadam cura. 211.29
 Rhagades digitorū & reli-
 quarum partium. 243.14
 Rhamnus. 403.30
 Renum dolores sedantia. 447.10
 Rheumatibus medicamen-
 tum conueniens. 442.30
 Rheum. 403.30
 Rhicinus. 372.10
 Rhinarium. 467.10
 Rosatū thymia. 503.27
 Rhodia. 397.8
 Rhodiarrhiza. 404.10
 Rhodomalum. 462.12
 Rhodostachium. 462.35
 Rhœa. 404.20
 Rhœtum. 462.39
 Rhus. 404.30
 Rhyphos. 404.40
 Rhyas. 138.35

I N D E X.

Rofa. 404.10
 Rofacei prepar. 409.28
 Rofmarinum. 383.10
 Roftra. 45.14
 Rubeta. 322.10
 Rubia paffua. 360.10
 Rubigines ignitæ. 114.15
 Rubrica finoptica. 351.30
 Rubus. 348.10
 Rugati corporis medela. 11.34
 Rupia. 290.30
 Ruptura. 275.12
 Ruta. 399.20
 Ruta fylueft. 390.26.392.20
 Ruta Venerem obtridit.
 S (15.2)
 Sabina. 349.30
 Sachar. 388.40
 Sagapenum. 405.10
 Sandaracha. 329.34.405.10
 Sandyx. 405.10
 Salamandra. 321.19.405.10
 Sales. 339.30
 Sales theriaci. 349.11.439.18
 Salis flos. 339.30
 Salua. 406.30
 Saluaris. 402.40
 Salix. 366.20
 Salix amerina. 334.10
 Salfi natura. 332.33
 Sambucus. 338.20
 Samia terra. 351.40
 Sampfychon. 405.10
 Sanguinis profluuium ex naribus. 151.30
 Sanguinem euacuaria. 133.5
 Sanguinẽ fiftentia. 292.33
 Sanguinis e uena arteria ue eruptio. 291.21
 Sanguinis fillicidiũ. 98.6
 Sanguinis nariũ eruptio. 98.6
 Sanguinis ufus. 439.40
 Sanguis. 46.42.336.6
 Sanguis diuerfi generis animalium. 336.11
 Sanitatis tuẽ dæ ratio. 51.41
 Saphirus. 385.30
 Sapo. 405.20
 ſapo Conſtantini. 458.37

ſarcoma. 150.24
 ſarcophloma. 274.33
 ſarcocolla. 405.20
 ſardonía. 336.29
 ſatietas quid noceat. 13.20
 ſatietas & fames obſunt. 3.41
 ſatureia. 364.30
 ſaryrion. 405.30
 ſaryria caantidotus. 448.10
 ſaryriaſis. 209.37
 ſaura. 405.30
 ſaxiphragos. 405.30
 ſcammonia. 425.30.408.10
 ſcammonia nocet ſtomach. cho. 236.41
 ſcandix. 408.10
 ſcilla. 408.20
 ſcillæ medicamen. 440.30
 ſcingus. 408.20
 ſcirrh. 275.35
 ſchiſtos. 384.10
 ſclerophthalmia. 136.19
 ſcleroma uteri. 224.2
 ſcolopendria. 408.30
 ſcolopend. duplex. 310.29
 ſcolymon. 408.30
 ſcopi qui in febr. diſcu tiendi. 56.10
 ſcordion. 408.40
 ſcorodon. 409.10
 ſcorodopraſon. 409.10
 ſcorpion. 409.10
 ſcorpíus terreſtris. 409.10
 ſcorpíus marinus. 316.25. 409.10
 ſcorpionis iclus. 308.33
 ſcoria. 409.20
 ſcoriæ ueritatis. 118.2
 ſcori inflammatio. 208.8
 ſchoenos. 413.20
 ſcytale. 313.18
 ſecuridaca. 362.10
 ſedis uitia. 211.16
 ſedis unctiones. 434.10
 ſel uſina. 351.40
 ſemina letalia. 320.8
 ſeminalis. 401.10
 ſe minis incontinentia. 209.15
 ſemperuium. 335.12
 ſeneſciuntis ratio uicte. 11.8

ſeneſcia ſerpentis. 352.30
 ſeneſcia aſpidis. 352.30
 ſepedones. 281.27
 ſepiæ teſta. 406.20
 ſelinon. 406.2
 ſeriphum. 406.10
 ſeris. 406.10
 ſerpentaria. 355.30
 ſernula campana. 389.10
 ſerpyllum. 360.19
 ſeſamum. 406.20
 ſeſamoides. 406.30
 ſeſeli. 353.40.406.10
 ſialon. 406.30
 ſiccitatis præſidia. 362
 ſiccificans medicamentũ. ſicyos. 407.10 (442.40
 ſideritis. 406.30
 ſideritis Achillea. 406.40
 ſie liſmus ſtomachi. 175.38
 ſigna temperaturæ cor dis. 318
 ſilpha. 407.20
 ſilphium. 407.30
 ſillybon. 407.20
 ſilurus. 407.20
 ſinapi. 393.38
 ſinapiſmus quid. 186.31
 ſinapiſmi præpar. 497.32
 ſingultus. 96.35
 ſinus attritis ueliſibus ſimi les. 289.2
 ſion. 3929.407.40
 ſiſaron. 407.40
 ſiſeris. 40.39
 ſiſon. 407.30
 ſiſymbrión. 408.2
 ſitis febricitum. 95.3
 ſmegmata uana. 455.30. 458. per totum
 ſmilax. 409.20
 ſmyris. 385.10
 ſmyrna. 409.30
 ſmyrniũ. 39.33.409.40
 ſolanum. 326.13.411.30
 ſolaris maior. 362.10
 ſorba. 44.16
 ſolaſtrum. 406.30
 ſoliſtitio æſtuali qui re gnant morbi. 54.18
 ſoliſtitio brumali qui inci dant morbi. 53.38
 ſomni

Somni. 30.12
Sonchus. 410.1
Sorbus. 394.10
Sory. 413.36
Sparagion. 40.10
Spasmus. 129.25
Spasmus cynicus. 128.12
Speclariou. 40.10
Sphecle quid. 298.28
Spondyliou. 413.10
Spina alba. 337.30, 382.20.
 409.30
Spica nardi. 392.36
Splenicus pastillus. 451
Splenium. 257.33
Spodiocum. 453.43
Spodion. 410.20
Spōgia hydropicis. 409.2
Spongos. 410.10
Spuma argēu. 330.23, 33.36
Spuma nitr. 347.10
Spuma salis. 330.40
Spum consideratio. 75.21
Spatum sanguinis. 164.38
Squama. 382.16
Squamationes. 359.23
Stachys. 410.30
Stactū Prosechij. 468.18
Staphyloma. 339.36
Staphylinus. 410.20, 354.36
Sticata. 410.30
Stecatoma. 277.3
Stercora animalū. 375.20
Sterilitatis curatio. 228.2
Sternutamenta. 92.35
Sternutamentaria. 402.20
Sternutationes proficiē-
tia. 151.26
Stimmi. 412.11
Stigmata. 256.22
Stoebe. 411.13
Stoechas. 411.20
Stomacho accidētia. 174.9
Strabismus. 195.27
Stratiotes. 411.20
Strigmenta. 404.40
Struthocamelina caro. 179.8
 45.18

strumax. 276.31
strychnon & eius species.
 411.30
stypteria schiste. 412.3
styrax. 412.10, 428.7
succedanea pharmaca.
 507.3
succus cyrenaicus. 431.20
sudor. 364.40
sudores febriles. 91.31
sudorifica medicamina.
 19.42
suffocatio uteri. 235.34
suffusio oculorum. 145.4
sugillata. 140.8
suilla caro. 45.9
sulphur. 363.30
super cliū Venēris. 392.10
sulinum oleum. 300.16
sycomora. 44.40, 412.26
syncopa. 171.20
syderatio. 284.24
symmetria ceræ ad oleum
ad confectiōes empla-
strorum. 434.34
syc. 412.10
syriacis infantum. 5.16

T

Tædæ. 354.10
Tanæx. 300.26
Talum bouis. 396.36
Tamarix. 392.2
Tauri gluten. 413.40
Taurocolla. 413.46
Tarichorum piscium caro
 413.30
Taxus. 409.20, 326.7
Telaē corpore extrahē-
 tia. 291.12
Telephion. 414.30
Telephia. 286.13
Tellinæ. 414.2
Telis. 414.36
Temperaturarum omniū
notæ. 26.9
Temulentia. 14.2
Tenefmus. 182.2
Tenontes. 276.15
Terra. 351.10
Terra culta. 351.10
Terra sigillata. 351.20
Tephra. 414.20

Terminthos. 289.34, 414.
Terbinthus. 414.10 (10
Terrestris crocodilus.
 408.20
Teste. 396.40
Testes. 46.23
Testes fibrorum. 369.40
Testiculus canis. 396.10
Testiū tēperaturæ notæ.
 33.4
Tetanus. 330.32
Tetrapharmacū basilicū.
 472.10
Teucrios. 414.26
Teutlon. 414.16
Thalia. 465.36
Thalasserus. 469.26
Thaliotrum. 363.20
Thapsia. 330.26, 363.36
Thapsi. 364.16
Thelipteris. 364.16
Thecodotum parū. 467.5
Theriaca aduersus uene-
na. 305.38
Theriacales pastilli. 437.40
Theriaces preparatio. 43.8
Theriaces consideratio.
 437.20
Thermarū genera. 21.46
Thermus. 363.40
Thermus agrius. 364.46
Tibia. 418.46
Titanos. 415.16
Tithymallus. 414.40, 426
Tofi. 240.26
Tormē intestinorū. 182.36
Toxicum. 327.16
Thus. 383.16
Tymbra. 364.36
Thymiana crinasti. 504.32
Thymiamata. 504.16
Thymus. 364.26
Trachoma. 137.14
Trachomaticum. 420.8
Tragacantha. 415.20
Tragion. 415.20
Tragoriganon. 415.34, 427
Tragostitodes. 415.40 (30
Tremores. 132.11
Tria animalū uentris ge-
nera. 297.31
Tribolos. 415.38

INDEX.

Trichiafis. 138.24.
 Trichocallia. 138.30
 Tridax. 364.10
 Trifoliū odoratū. 389.20
 Trigle piscis. 426.2
 Trigon thalassia. 416.10
 Triphyllon. 405.30
 Tripolium. 416.6
 Triscum. 413.4.403
 Tricugo. 420.10
 Troglodites. 421.20
 Tubera. 417.20
 Tuber terræ. 417.20
 Tumor. 273.2
 Tussis. 159.15.161
 Tussis infantis. 4.4
 Tussis febrilentium. 92.8
 Tussilago. 348.40
 Tylosis. 137.16
 Tyros. 416.30
 Tympanite quomodo ab alijs tumoribus differat. 273.16
V
 Valeriana. 419.20
 Vari. 153.16
 Verbascum. 419.5
 Verbenaca. 398.30
 Venarum ariditatis præsidia. 35.14
 Venerea. 386.20
 Venena. 317.20
 Venenatorū curatio com-
 munis. 304.40.318.35
 Ventrículus. 46.38
 Vētriculi temperatura si-
 gna. 29.40
 Ventris inflatio. 178.28
 Ventris incōmoda. 174.9
 Venus nocet aridis & fri-
 gidis. 34.34
 Veratrum. 358.30.425.10
 Veratrū candidū. 330.26
 Veratrū nigrum. 425.20

Veratrū in pastillis. 454.20
 Verberib. percussis. 159.7
 Vergilarū exoru quido
 minentur morbi. 54.6
 Verticillum. 413.10
 Vesicæ remedium. 448.3
 Vesicæ abscessus. 192.8
 Vetrerus. 51.33.114.25
 Veteramenta. 355.10
 Vertiginosi. 118.2
 Victus singulorū anni tē-
 porum. 22.20
 Victus degentiū in nego-
 tio. 23.6
 Victus iter facientis. 23.28
 Victus nauigantis. 24.13
 Vigilia. 51.8
 Vigiliæ febrilentū. 88.24
 Vinum. 331.3.394.20
 Vini facultates. 49.23
 Vinum uermiculū. 49.29
 Vini purgatoris. 450.10
 Vini abstinentia podagra
 liberat. 239.30
 Viola alba. 382.30
 Vipera. 360.30
 Vipera morsus. 311.40
 Vires alimentorū. 37.32
 Viscum. 365.16
 Vitex. 334.10
 Vitiligo. 254.19
 Vites. 341.20
 Vitrum. 417.3
 Vlarum unctura. 140.10
 Vlms. 402.20
 Umbilicus ueneris. 177.30
 Vnctiones oris, gutturis
 que. 459.12
 Vnguenta. 19.6
 Vnguenterum concinna-
 tiones. 498.14
 Vnguiualis herba. 398.10
 Vnguis oculorum. 140.11
 Vnguium mala. 243.41

Vnitatis solutio. 1275.12
 Vociferationum utilitas. 8.16
 Voluuli stomachi. 178.20
 Vomitoria medicamenta. 435.2
 Vomitus prolicientia. 17.2
 Vranium. 468.5
 Vrina. 72.30
 Vrina stillicidium. 195.10
 Vrinariarum partium abs-
 cessus. 192.6
 Vrtica. 40.2.437.20
 Vstilago rustica. 355.20
 Vteri morbi. 215.7
 Vteri clausura. 227.35
 Vteri inflatio. 225.4
 Vteri suffocatio. 225.34
 Vteri abscessus. 221.8
 Vulpes. 340.10
 Vultus uitia & medelæ. 152.12
 Vuluæ rhagades. 230.10
 Vuæ. 43.12
 Vuapassa. 346.10
X
 Xanthion. 393.30
 Xanthion. 457.13
 Xerocollyrium. 470.13
 Xerophthalmia. 136.25
 Xiphion. 394.2
 Xiris. 393.40
Z
 Zæa. 361.20
 Zingiber. 361.20
 Zomos. 361.40
 Zopirus. 446.3
 Zosimi synchrisma. 497.
 14
 Zythus. 361.30
 Zyme. 361.30

INDICIS FINIS.

PAVLI AEGINETAE

MEDICI OMNIUM PRAESTANTISSIMI,

IN LIBROS DE ARTE MEDENDI

PRÆFATIO, ALBANO TORL

NO VITODVRENSI

INTERPRETE.



ON qui ueteribus, eorum quæ ad artem spectant præ-
termissum quicquam putem, institutū nobis hoc opus
est, sed qui in cōpendium doctrina redigatur: Contrā
enim, non tam recte quā absolute etiam illis ad un-
guem omnia elaborata cenſeo. Recentiores uero nos-
træq; ætatis homines, præterquam quod eos attinge-
re non curant, etiam (proh pudor) uanitatis accusant, unde cōmentatio-
nis huius cōsiliū cœpimus: his quidem cōpendium, quod ut uerissimi-
le est, quærunt, nobis uero exercitiū futuram: Absurdum enim est rhe-
toras forensiū rerum præceptis breuib; ac ueluti coambulonibus (sic
enim uocāt) quibus legum quidem omniū summā quandam ad usum
expedita tenetur, uti, nos autem eadem negligere: Quanquam illi non
mōmentum solum & perexiguū, sed iustum cogitandī reputandīq; ne-
gocij tempus prorogare sibi possunt: nobis contrā, uel nunquā, uel per-
raro sanē facultas ea datur: quando in morbis quibusdam, recusare cun-
ctariq; sæpenumero absque graui discrimine non licet: unde recte ad
modum Hippocrates *ὁπῶν τῶν κακῶν*, id est, subitariam ac pernicem esse
occasionem, docuit. Illos siquidem in solis propemodum urbibus usus
occupat negociorum, ubi magna librorum copia est: Medicis uero non
in urbibus, agris uē, aut solitarijs locis tantum, sed iam & mari, in ipsis
per sæpe nauibus, repentium morborum necessitas incidit, in quibus
mora uel interitum, uel extremum periculum adfert. At uero, uel ratio-
nem, uel ipsam per singula materiam medendī uniuersam memoria te-
nere, nihil magis arduū, & nullus tam impossibilis queat esse conatus:
hinc epitomen illam parauimus, ē priscorum medicorum monumentis
conſarcinatam: Neq; enim ex nobis natum quicquā adiunximus, pau-
cis quibusdam exceptis, quæ in arte exercenda notauī, & experientia
deprehendi. Plerisq; uero medicorū illustriū scriptis cōgressus Oriba-
sij præsertim (qui & ipse sua aliunde decerpſit, uniuersam in eis meden-
dī rationē cōplexus: nam post Galenum, & iuniores etiam Galeno fuit)
præcipua ex omnibus de legi, morbo nullo, quantū id fieri potuit, præ-
tergresso: Nam illud in septuaginta libros diuisum Oribasij uolumen,
medicinæ quidem argumētum omne tenet, Sed parare tam immensum
opus haud cuiusuis est, Epitome uero ad ipsius filiū Eustathiū scripta,
quæ ab integra morborum omnium tractatione multū abest, etiam cæ-

Exordium abe-
ruptum.

ARGVMENTA LIBRORVM.

terarum disputationem imperfectam habet, nec causis, nec differentiis interdū etiam nec curatione ipsa, & alijs etiam quæ cōmemorari solent, plene & cōsummate perscriptis. Hoc uero quicquid est opusculi, morborum omne genus uel in similaribus, uel instrumentarijs corporis partibus, uel partium continui dissolutione uisuntur, cum notas, tum causas, tum curationes cōplectitur, neq; in summa tantum, sed ubicunq; res ipsa ferebat fufius etiā. Ante hoc uero idem, de tuenda sequunda ualitudine perscripsimus negotium totum. Postremo de simplicium medicamentorum uiribus compositisq; sermonem fecimus.

QVIDAM SEPTEM TOTIVS OPERIS VOLVMINVM (uniuersum enim opus in septem libros diductum est) scopi.

SCOPVS LIBRI PRIMV.

In primo quidē uolumine, uniuersam quæ ad sequundā ualitudinem tuendam spectat, materiam cōperies, & affectionum, ætatibus, temporibus, temperaturis, & alijs quibuscūq; peculiarium, tum præcautionem, tum emendationem, facultatesq; ac usus omnium alimentorū, quemadmodum in capitibus explicauimus.

SCOPVS LIBRI SECVNDI.

In secūdo uolumine de febribus singulis docetur, præmissis quæ huc conferunt omnibus, uidelicet excrementis superuacaneis, diebus decretorijs. & alijs earundem indicijs, subiectis quæ has febres comitantur symptomatis.

SCOPVS LIBRI TERTII.

In tertio uolumine de affectionibus per singulas corporis partes, à summa capitis coronide, ad imam usque pedis plantam, extremosq; ungues ingruentibus, agitur.

SCOPVS LIBRI QVARTI.

In quarto uolumine de his quæ forinsecus corpus impetunt malis, & ueluti in aperto cōstitutis, quæ non in præscriptis, sed in plerisq; corporis partibus insurgūt, sermonem facit. In quo de lumbricis quoq; & dracontijs tractatur.

SCOPVS LIBRI QVINTI.

In uolumine quinto de his quæ uenenum ictu morfuue relinquunt, inibiq; de rabiosi canis morfu petitis, & affectione hydrophobica (quo morbo à cane rabido morfu capiuntur, & aquam perinde atque rabiosi canes

ARGVMENTA LIBRORVM.

canes horrent) deq; canis non rabidi, hominisq; morfu: inter quæ de uenenis pariter & alexipharmacis, hoc est contra uenena præsidij, tractatio fit.

SCOPVS LIBRI SEXTI.

In uolumine sexto quæ ad Chirugiam attinent omnia, siue secundum carnem, ubi quæ ad tela extrahenda spectant comprehenduntur, siue secundum ossa dicitur, inibi de fracturis & luxatis agitur.

SCOPVS LIBRI SEPTIMI.

In uolumine septimo omnium medicamentorū cum simplicium tum compositorum uires continentur, præsertim eorum, quorumcunq; in superioribus sex libris facta est mentio, recitatione maxime maiorum, puta eorum quæ præparationes appellantur, neque enim in eodem omnes, quorū sparsim meminimus, ne doctrinæ fiat confusio, ordinare possumus, ut quærens quispiam unam aliquam plures uel nobilium præparationum, facile reperiat. Postremo quæ ad compositiones medicaminum insciuntur, & de succedaneis speciebus dicitur, ita ut uniuersus sermo ad ponderum & mensurationem transferatur, exordientes à prima litera.

HYPOTHESIS LIBRI PRIMI.

Primo huius operis uolumine uniuersam de tuenda sanitate materiā prosequuti sumus, ceu iam pridem in præfatione ostensum est, & deinceps denuò per capita dicitur. Illud autem ingenue sateri libet, magnam partem eorum, quæ primo & secundo libro tractantur, huic ex Orisatio traductam; nolumus enim propriam laudem ac gloriam querere, uerum ex omnibus utilitatem deglubere. In reliquis quinque libris minima tantum ex illius monumentis digesta sunt.

CAPITA LIBRI PRIMI.

De his quæ in foetura prægnantibus accidunt, quoq; nutritu alendæ sint grauidæ. Caput I	Iussu uidetur, educatio.	XXIII
Quemadmodū nutrice[m] eligere & uiscitare conueniat. II	De frictione præparatoria.	XXV
Quid lac nutricis examinandum sit. III	De exercitationibus.	XVI
Quomodo lactis uitia emendentur. IIII	De omnibus exercitationū generibus. Caput	XVII
Cuiusmodi pusionis educationem esse oporteat. V	De frictionum, secundum quantitatem & qualitatem generibus.	XVIII
De exanthematibus quæ puello oboriuntur. VI	De uociferatione.	XIX
De tussi & coryza infantis. VII	Cuiusmodi affectus exercitationes excipiunt.	XX
De pruritu puellorum. VIII	De cutis adstrictione.	XXI
De dentitione. IX	De spontaneis lassitudinibus.	XXII
De aphtha oris hulcere. X	Cuiusmodi rationem uictus senectus postulet.	XXIII
Ad femorum intertrigines. XI	Ad rugatum contractumq; corpus leuigandum.	XXIII
Contra apurum humectationes. XII	Ut suauiter spiraret corpus.	XXV
De capitis infantum ardoribus. XIII	Ad calfaciendum habitum.	XXVI
Puellorum & reliquarum deinceps ætatum, usq; ad eam quæ uigorem transi-	Ad uitium corporis colorem.	XXVII
	Ad liuores & fulcedines.	XXVIII

CAPITA PRIMI LIBRI.

Quæ dentes præferuent.	XXXIX	Defiguratione capitis.	LXII
Aduersus grauem auditum.	XXX	Quæ sint temperamēti cerebri indicia.	LXIII
Ad caliginem oculorum.	XXXI	Quæ uentriculi tēperaturę indicia.	LXIII
De plenitudine.	XXXII	De intemperaturis cum uentriculo con-	
De temulentia.	XXXIII	jugatis, atq; adeo de indicij pulmonis	LXV
De ijs quibus alimenta corrumpuntur.	XXXIII	Quibus nam cordis temperaturæ notis	
De re Venerea.	XXXV	deprehendantur.	LXVI
Ad eos qui futuere nequeunt.	XXXVI	Iecoris temperaturæ indicia.	LXVII
De immodica futuitione.	XXXVII	De notis temperaturæ testiu.	LXVIII
De nimietate genituræ.	XXXVIII	De omiffis.	LXIX
De ijs qui ex frigore noxam contraxe-		Qui calidæ corporis distemperatiæ cor-	
runt.	XXXIX	rigi possint.	LXX
De ijs qui immodico ardore iniuria af-		Qui frigidæ intēperatiæ corrigant.	LXXI
fecti sunt.	XL	Siccorum distemperamentorum in uen-	
De pituita in uentre superiore abundan-		triculo exēpli loco, paulo uero post re-	
te.	XLI	liquarum etiam intemperaturarū me-	
Quomodo quis facile uomitu promo-		dela.	LXXII
ueat.	XLII	Quæ sint alimentorum uires.	LXXIII
De ijs quæ secunda ualetudine cōstitu-		De oleribus esculentis.	LXXIII
tis, tum aluum emollire, tum lotum		De olerum asparagis.	LXXV
clere pulcherrime possunt.	XLIII	De ijs quæ edendo sunt radicib.	LXXVI
De clysteribus.	XLIII	De tuberibus ac fungis.	LXXVII
De glandibus.	XLV	De frumentaceis.	LXXVIII
De caput purgantibus apophlegmas-		De legumentis.	LXXIX
tismis, deq; ijs quæ per nares euacua-		De temporarijs fructibus.	LXXX
ant, & de unguentis.	XLVI	De his quæ ex arboribus decerpuntur	
Quæ menses trahant muliebres.	XLVII	fructibus.	LXXXI
Sudorifica medicamenta.	XLVIII	De animalibus, primitusq; de uolucris	
De aëre.	XLIX	bus.	LXXXII
De aquis.	L	De ouis.	LXXXIII
De balneis.	LI	De quadrupedib. animalib.	LXXXIII
De thermis sua sponte prouenientibus		De animalium partibus.	LXXXV
LI		De lacte.	LXXXVI
De uictus ratione singulis anni tempori-		De lactis potatione.	LXXXVII
bus utili.	LII	De lacte fissili.	LXXXVIII
Victus ratio in negotio degentibus ser-		De caseo.	LXXXIX
uanda.	LIII	De piscibus.	XC
Victus iter facientibus obseruandus.	LV	De corio testaceo præditis.	XCI
Nauigantibus quæ uictus ratio conue-		De mollibus.	XCII
niat.	LVI	De piscibus sine squamis.	XCIII
Quomodo purgandi & exterminandi		De grandibus, cetaceis ue.	XCIII
obesi.	LVII	De uiribus uini.	XCIV
Qui nam macilentis educandi sint.	LVIII	De melle, & aqua mulla.	XCVI
Quomodo partibus attenuatis meden-		De somno.	XCVII
dum.	LIX	De uigilia.	XCVIII
Optimæ temperaturæ indicia.	LX	De Verno.	XCIX
Quæ sint malæ temperaturarum corporū		Diocli epistola prophylactica;	C
notæ.	LXI		



PAVLI AEGINETAE

MEDICI PRAESTANTISSIMI, DE ARTE

MEDENDI LIBER PRIMVS,

ALBANO TORINO

VITODVRENSI INTERPRETE.

De his quæ in scetura prægnantibus accidunt, quocq; nutritatu
alendæ sint grauidæ. CAP. PRIMVM.



20

VVM fœminas utero gerentes eiusmodi magna
ex parte casus affligent, corporis ferè totius redun
dantiarum moles, iugis uomitus, sputatio, erosio
nes stomachi, & horror deniq; cibi: operè omni
no precium me facturū arbitror, si suppetias, qui
bus eis subueniatur, scribere aggrediar. Utantur
itaq; præsentî cōmoditate: inambulationibus, aliis

Ratio nescit.

30

coloris salerno, quod pariter & ab odore commendetur, in primis autem
lustrico: cæterū potationi perpetuò non nisi mediocri indulgeant: Quip
pe hæc omnia tum superfluitatum saburræ, tum crebræ quoq; uomi
tionem non dico compescere, sed arcere etiam consueuerunt. Atqui medi
camentorū in eadem affectione prouinciam pulchre subeunt, sanguina
lis herba, quæ *πυλίσανος* græce uocatur, aqua elixa & epota: pariter &
anethum, radixq; pontica, uernaculo ab indigenis gentis suæ uocabulo
Rha appellata: hæc indiscriminatim tam ante q̃ a cibo, cum prima tum
secūda mensa, sumi utiliter possunt. Forinsecus autem præcordijs cenan
then, syluestris puñicæ florem balaustrum, trifolij (sic enim, *κνίση* inter
pretor) ac smyrnæ comam, sceniculiq; semen, cataplasmatîs modo appli
care expedit. Neq; uel tantillum interest utcunq; misceas, cum palmulis
ne, an uino ueteri, modò loco prædicto imponas: Hostioli præterea uen
triculi lancinationibus (quos *καρδιαγμῖδες* Græci nuncupant) aquæ cali
dæ potio, deambulationes tranquillæ, præcordiorumq; quod è molliore
lana conficitur, scæparnon, sæpenumero succurrūt. Fastidiosas & ab edu
lijs appetitus auersione laborantes, diuersi generis dapibus uesci, amylo
arido, hoc est, placentis, aut alijs nonnullis ex tritico esculentis, genioq; li
berius indulgere hortando, restitues. Peculiariter uero & magnifice hæc
grauidis conferūt, quæ telluris glebam deglutire gestiunt, quemadmodū
in malatia, quam Græci *κίση*, id est picam indigitant, quæ circa tertium à
cōceptu mensem ideo plerunq; ingruit, quod nequeat tum partus, ob im
becillitatē, omne quod à locellis nutrimenti causa recipitur, neq; cōficere

Medicamenta.

Cardiagmides

*Fastidij & ma
litiæ cura.*

Vnde interom
gestantū pica

Quae morose
xian tollant.

Contra pedum
tumores.

Mala medica.

neq; consumere: superuacanea, ob eam causam, ac uaria in stomacho rementa (quibus *σύντροφον* græce nomen est inditū) ueluti strues cōgeruntur: unde tam diuersarū, tamq; portentosarū rerum nascitur prægñanti-
bus appetitus: Verbi gratia, carbonū extinctorum, cretæ cymolæ, & id genus innumerorum ferme: ex qua ratione nomenclaturam hanc id ma-
lū inuenit, ob picturatā illam scilicet eius auis uarietate, uel quod istiusmo-
di affectus illarū subinde auem impetat. Aescæ porrò desiderium exerci-
tationes & longiusculæ peregre profectioes restituūt. Quod si qua præg-
nans mulier genialiter uisitare, lautiusq; cuticulā curare assueuerit, hæc
subitas nulla commoditate subibit motiones. Datur præterea cibum ab-
horrentibus nonnunq; potus acrimonia quadam imbutos, præsertim si
napi, degustare. Aduersus pedum tumores, præsentissima cum utilitate,
solastrum, quā anthyllidem uocant, in aceto maceratum, & brassicæ la-
tioris folia, necnon & creta cimolea ex aceto illita, alumen pariter ex ace-
to, adhibentur. Profunt item mala cognomento Medica, quæ & citrea di-
cuntur, in aqua lauandis pedibus elixa.

Quemadmodū nutricem seligere, & uisitare conueniat. Cap. 11.

Nutricis etas,
& diuersitas.

Quæ uilenda
nutrici.



Vper nutrice igitur, quæ nulli uidelicet præter naturam affe-
ctioni obnoxia sit, accurate prospiciendū est, quæ scilicet neq;
natu grandior, neq; iuuenis admodū: ita tamen, ut minima qui-
dem natu, iuxta ad minus quinq; numeret, maxima uero septi-
mum non excedat: pectore latiore atq; procero: māmōsior esto, papillis
neq; conuiuentibus, neque curuitate auersis: reliquo corpore quadrato,
quod est, neq; ualde obeso, neq; supra modum gracilento. Magnifice por-
rò iuuabit infantem, non ita pridem peperisse nutricem, & præcipue ma-
sculum: uitet cane, ut ita dicam, peius & angue arefacientia immodice, sal-
sa, acris, acerbæ, acuta, amara, uehementer calorifica, graue admodū olen-
tia, quæq; odore nimis insignite fragrāt, cōdita, aliæq; id genus acridinem
preferentia. A concubitu præterea frugi nurrix sedulo abstineat. Manus
ac humeros ungendo, texendoq; exerceat, necnon in ulnis huc illuc in-
fantem gestando, quem tamen non nisi trimestrem & quadrimestrem ul-
nis suscipere ferendum censeo.

Quā lac nutricis examinandum sit. Cap. 111.

Tristitia lactis.



Primum bonitatis honorem lacti tribues, si obesitate, copia, co-
lore, odoratu, sapore, symmetron, hoc est mediocre cōspicitur.
Inculpatum item, neq; incommodum illud quoq; iudica, quod
dum super pollicis unguem, nitoris contemplandi gratia, in-
stillatur, flexo ungue, nec ocys, nec serius delabiū. Atqui istoc etiam mo-
do bonitatis periculum facere cōuenit: Lac emulctum uitreo uasi, minus
capaci, infundito, digitisq; circumactis frangito, deinde quoad coagule-
tur quiescere permittas: si tum minus casei, quā seri in eo appareat, hoc
parum frugi ducito. Penitus uero diuersum concoctioni renititur. Opti-
mum uero, quod inter utrunq; excessum mediocritatem obtinuerit.

Quomo

Quomodo lacūs uitia emendentur. Cap. iiii.



Actis uero malicia isthac ratione corrigi: si iusto obesius sit, uomitionibus pituita eximenda est, quod quidē munus aceto mulso pulcherrime committitur. Oportet autem nutricem ante cibū laboribus extenuare, cui negocio, organū, hyssopus, fatureia, scandix, thymus, exiguum raphani, & falfamentum uetus cum oxymelite, accōmodatissima, ne dicam necessaria sunt: Sin aut acrius, & tenuius lac ipsum compareat, tum laboribus numerosis subleuare, sorbitionibus, porcellinisq; carnibus nutricem ali, conuenit. Potus aut ipsius defrutum esto, & uinum dulce. Quod si lac parcius reddatur, non sorbitionibus modo, uerū largius etiam ac liberalius genio indulgere res ipsa postulat, merumq; ut dixi, suauius, bibendum: pectus & mammae studio sius cōfricentur. Quibusdam cucurbitula loco adhibita manus auxiliares praestitit. Medicamina uero quae eiusdem liquoris pariundi facultatē habent, tamen si usui nō nihil, proficuaq; esse intelligā, crebro tamen eis uti, quod uiolētius quā par sit eliquāt, minime praecipio: Eius generis sunt, quum semen, tum radix foeniculi, prifana, cythi folia, uino aut prifana decocta, papauer nigrum, dulce, anethum, pastinacae syluestris tam semen quā radix, quae quidem aqua calida macerata exhibenda sunt.

Generantis lac

Cuiusmodi pusionis educationem esse oporteat. Cap. v.



Rimum sanē alimentū quo pueruli recenter in lucem editi uesci utiliter possunt, est mel: exhibendum itaq; praeceteris esculentis omnibus: mox deinde etiam lac, bis in die, uel ad summum ter. Vbi uero alacer iam, & ad sumendum promptus uidebitur, & spem concoquendi praebat, iam tum minus replentibus edulsi alii expedit. Nam si per imprudentiam innumeris dapibus infartiat, somnolentior confestim euadit, segniorq; uentre saburrato inflatoq;. Lotium inde quoque aquosius redditur: quibus ego tum ne tantillum quidem exhibendum censeo, sed biennio integro lacte, deinde plenioribus cibarijs ali, sufficit.

bus cibarijs ali, sufficit.

De exanthematis, id est, pustularū eruptionibus, quae puello oboriuntur. Cap. vi.



Vaecunq; circa summam pusionis cutem florescunt, principio quidem equi boniq; faciendā sunt: Sed ubi defloruerint bene, tum lauacris, adiecto myrto, lentisco, rosissq; medendum: dein de rosaceo, aut oleo lentiscino, cerotoq; cum cerussa uti, clementerq; atq; omnino molliter nitris abstergere competit: uehementiora namq; subsidia tolerare nequiuert. Utilissimum uero fuerit & nutricem mellissimis ferculis pasci, & uictus rationem pueri hoc modo institui: Summo quidē emolumento genio puelli neq; nimis indulgetur, neq; supra modum defraudatur (iuxta enim satietas & fames officit.) Quod si praeterea infantis alius durior & astrictior sit, melle cibo adiecto nutries: at si ne tum quidem oletum fecerit, aegerimeq; cunniat, resinam te-

Satietas & fames obijciunt.

rebinchinam ciceris magnitudine adijcito: Si contrà lubricus fuerit pueruli uenter, milium impendio quam compescendo prodest.

De tussi & coryza infantis. Cap. vii.



Vando autem tussis aut destillatio (quam coryzan uocant) infantem impetit, mellitissimis (quod est, ecligmati ex melle) utendū est, caput multa prius calida aqua ablutū, mox magna mellis copia perungi, postremo lingua digito molliter cōprimi debet; mirum enim dictū, quantam pituitæ uim ea ratione euomet.

De pruritu puellorum. Cap. viii.



Vod si pruritu (gingiuarum uel cōmorsionibus) puellus torquetur, non fomentationibus modò, sed abundantī quoq; unctione ex oleo crudo, non sine modico cere liquefacto, utendum cenfeo.

De dentitione, siue dentū productione. Cap. ix.



Irca mensem ferè septimum pueris dentes plerunque proueniunt atq; prorumpunt, quo quidem tempore gingiuarū, maxillarū, tendinumq; phlegmonæ, quod est inflammationes, non raro neruorum etiā conuulsiones, infestant. Tunc temporis neq; pusillo quicq; quod multo aut difficili conatu cōmanducadū sit, ex-

Quibus in dentitione gingiue fricandæ.

hibere oportet. Cæterum gingiuarū digitis à balneo assidua quadam fricatione palpandæ, gallinaceorumq; adipe, aut leporino cerebro emolliendæ. Vbi uero iam dentes emicant atq; profiliunt, lana delicatior atq; syn-

Quomodo diarrhoea sitanda.

cera ceruici, capiti & maxillis applicanda: quæ, embrocha quoq; ex oleo dulci ac calido, fouere, auditorijsq; id meatibus instillare, congruit. Quo

Quædammodi alius mollisda

tēpore infantē uberiore uictu nutrire, necnō & calida lauare cōuenit. Porro si diarrhoea, alui fluore, quoq; infestetur, aluum epithematis cōpescere, quæ comprimendī facultate prædita sunt, emolliendum, inspergentes lanæ uel cyminum, uel anethum, uel apium. Profuerit autē & semen rosarū inferere, & uniuersum simul feruefactū arefacere. Si uero alius sui obliti officij nihil dehiciat, melle in balani formā redacto, aut nepetæ farina cum melle illita, clementer irriteretur. Puto autem efficaciter cōuulsionibus puerorum herbam quam heliotropium Græci, solarem Latini dicunt, aqua elixam opitulari, si eo puerulum decocto laueris. Expedit autem multo magnificentius, si oleo irino, cyprino aut sicyonio illitus, tantus quantus est, incaluerit. Atqui ubi iam pridem dentes erupuerint, si digitos morfu fauciat, utile fuerit iridis radicē coctam, neq; admodū siccam cōtinere, id quod & ulceribus quoq; præsidio est. Butyrū pariter cum melle illitū ei in illo succurrit. Postremo, gingiuarū pruritus balsamēti ueteris caro lenit.

De oris ulcere, quam Aphtha Græci nominant. Cap. x.



Lcus quoq; oris, cui Aphtha apud Græcos cognomentū est, nuper natis plerūq; incidit, aliās quidem subcandido, aliās rubefcente, nonnunq; atro colore, & qualis in adustorum crustis uidetur, quod omnium periculosissimum, & maxime letiferum dicitur. Cui præsidio iris est cum melle, aut arida, si siccam inflare malis.

malis. Pulchre itidem subuenire consueuerunt rosarum folia confusa, pariter & earundem flosculi. Crocus, pusillū myrrhæ, galla, thus, cortex thuris, aut unā simul, aut priuatim seorsimq̃, melle irrigata ac excerpta. Præterea aqua mulsa, quod Græci *μυλίνη* nominant: & mali deniq̃ Punici dulcis cremor puerorum aphthis succurrere moliantur.

Ad foemorū intertrigines. Cap. xi.

ADuersus intertrigines (quæ Græci *μυρμηκία*, Romani nunc atrita, nūc confricata membra appellant) foeminum myrtus sicca, & cyperus, & rosæ, magno cōmodo insparguntur.

Contra aurium humectationes. Cap. xii.

HUmecta aurium uicia, lana ex alumine indita, arefacito; uel cenomelite, quod est uino mulso, uel uinum perantiquum in aurem instillato, uel crocum deniq̃ ex uino tritum stillatim immitemus.

De capitis infantum ardoribus, quos Syriases uocant. Cap. xiii.

Innflammatiō partium circa cerebrum & eius panniculos membranasue (quos *μυρμηκία* Græci nuncupant) in infantibus, syriasis est. Concauum fit in ea synciput, concaui itidem cum pallore oculi, accedit etiā totius corporis ariditas. Succurrit huic malo infantum syncipiti cum rosaceo luteum oui (quem uitellum dicunt siue rubrū) pigmenti modo impositū, sic tamen ut assidua mutatione renouet̃.

Aliud contra Syriases præsidium.

Conuenit eidem quoq̃ loco, caluariæ scilicet, infantum, herbæ, quam Græci aliās heliotropium, aliās scopiuron, Latini solarem appellant, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem peponem uulgo nominant, adiacentē carni pelliculā, aut hortensis solani cum rosaceo cremorē imponere.

Puellorum & reliquarū deinceps ætatum, usq̃ ad eam quæ uigorē transiisse uidetur, educatio. Cap. xiiii.

Bi iam ablactati fuerint infantuli, relaxato utcunq̃ animi freno, suo modo in hilaritate, animiq̃ securitate uitam ducere, permittentur. Exercitia ludicra, leuiāq̃, nutritus item minime ponderosi, sunt admittenda. Verum simulatque sextum iam, primumue septennium attigerint, tam sanè puelli, quā ipsæ quoq̃ puellæ pædotribis mansuetis, non immanibus tyrannis, at humanis commitendi sunt. Ei namq̃ cum summa animi tranquillitate ac gratia, tenellos animos cum literis tum moribus pulchre imbuunt: Et certe animorum securitas, relaxatioq̃, haud parum ad uegetam corporis educationem momenti adferre liquidò constat. Duodecimum pueri natalem ubi iam peregerint, Græmaticos & Geometras uisitare, corpus ipsum in palestra exercere, calcaribus nonnunquam additis, necessum est. A quarto & decimo anno ad uigesimalū usque primum mathematicis ac philosophicis rationibus sedulam nauet̃ operā, & difficiliora magis exercitia, pro corporis fortitudine, subeant, quō animū ac corpus iuxta exercitates, a Veneris stimulo

Circa primū septennium & pueri & puellæ literariisq̃ traduntur benignis.

Quæ ætate sex rursus studiis incumbendum pueris.

lo coërceantur. Illis tum eligenda & præstanda sunt tua munera Bacche. In summo uero ætatis incremento, absoluta numeris omnibus uictus ratio tum animi tum corporis exigif, proinde nullo non exercitiorū specie utendum, maxime quibus singuli operam dare consueuerūt. Cibos abundantiores, plenioresq, inculpatæ alimonie, usurpent. Quibus uero iam ætatis suæ status senium uersus declinat, sijs uictus philosophicus & frugalior tam animi quàm corporis impendiō confert. Cæterum exercitationes, omne mne genus, pro ætatis ratione perpetuò relaxandæ sunt: deq, pleniore alimento, pro inclinationis modulo, usq, subtrahendum, frigore iam eorum habitudinem corripiente.

Ætatis habenda ratio.

De frictione præparatoria, quam *ῥυακισμὸς* Græci nominant. Cap. xv.



Xercitationem mediocris quædam corporis calfactio præcedat, syndone crudiore scalpentes, mox nudis etiam palmis oleo madentibus confricantes, tantisper quoad abunde calefiat, & mollius reddetur corpus, floridoq, rubore suborto, iusti ac decens habitus moles inducatur.

De exercitationibus. Cap. xvi.

Exercitij fructus.



Ehementior corporis agitatio siue motus, exercitatio est: meta aut uehementiæ esto, animæ ad spissitudinem alteratio. Exercitationes porro instrumentales corporis partes preparant, quominus afficiantur, et robustiora atque infracta ad operationes quasq, reddant: ad hæc, ut cibi ualidius ab iisdem attrahantur, promptius permulentur, & inde alant liberalius, emoluant, ob inductū ex uehementi pulmonis motione feruorem. Præterea nō meatus tantum expurgant, sed redundantias etiam corporis ferme omnes, uehementes pulmonis motus, conficiunt & euacuant. Quoniam ergo inculpatior alimenti in corpus, eiusq, partes distractio (quæ uulgò digestio, Græcis *πιάσις* dicitur) fit, quum nulla neq, plenitas, neq, ulla etiam cruditas tam retrimentorum, quàm humorum siue in uentriculo, siue in intestinis accumuletur, (periculum quippe ingens, ne ante in totius animantis partes rapiantur, quàm coctura probe conficiantur) liquet exercitationes oportere cibi susceptionem præcedere. Porro opportunitatem atq, adeò temporis occasionem lotij color arguit: quippe aqueum, crudum etiam dum succum ex uentriculo redditum præfert. Rubrum uero ac biliosum, concoctionem iam pridem ad unguem absolutam insinuat. Quod uero utcunque ac modice pallet, inchoatā nunc primum cocturā portendit. Tum igitur exercitationibus manus admouendæ, uesica prius uentreq, exonerato.

Labor cibum præcedat.

Concoctionis & cruditatis nota ex lotio.

De omnibus exercitationum generibus.

Cap. xvii.

Uehemens exercitatio.



Niuerse semel exercitationi commune id est, quod ex se ipsa animantibus caloris augmentum excitat, facitq, Peculiare uero est, quod singulis speciebus discernitur. Valens quidem (quam

10

20

30

40

utroq,

ὑπόμνημα Græci uocant) hoc est, uiolenta, & robusta exercitatio, musculos & nervos ad robur præparat: cuius farinæ sunt, fodere: ingenti onere subleuato, aut eodem in loco manere, uel paululum procedere. Accliuais, longaq; pro cuiusq; uirili inambulatio, huius quoq; generis est. Tum si quis per funem manibus apprehensum scandat, atq; id genus ferè innumera. Sed quæ celeritate, citraq; robur & uolentiam peraguntur, sunt cursus, umbratilis armorum meditatio, duorum cum summis manibus concertationes, *ἀγχιπομπὴ* Græci nominant. Iam quæ uel coryco, uel pila sit corporis exercitatio, huius quoque generis est. Robusta uero exercitatio celeri non raro componitur: quæcunque enim robustæ exercitationes sunt, sjs omnibus ut uehementibus quisque utatur, motionis modò celeritatem adijciat. Porro exercitationum genera alia lumbos potius quàm brachia, aut crura, exercēt: alia spinā totam, aut thoracē modo, modo pulmonem. Exercitetur autem quisq; donec corpus intumescat, & color ille floridus appareat, motionesq; ualidas æquabiles ac promptas edat: inter hæc etiam sudorem calidum cum uapore misceri cernes, tam diu omnino exercitationi indulgendum, neque antea desistendum, quàm ubi quiddam memoratorum senseris immutatum: Verbi causa, si contrictior paulò corporis moles, tumorq; uidebitur, interdicenda confestim corporis exercitatio. Neq; minus certe, si coloris gratia marcescit, euanescitq; quiescendum est. Iam si motionis quippiam collabi olfeceris, protinus utiq; desistendum est. Itidem si sudoris ulla, uel quantitatis, uel qualitatis alteratio, puta si minor, uel frigidior sit, exercitio uale protinus dicito. Mox oleo circumfuso fouere, recreare, ac deinceps recreatoria, *ἀντιδρῶντες* Græcis nuncupata, ceu pædotribæ uulgo faciunt, frictione uti conuenit.

Exercitationes ualide.

Exercitationes citæ.

Finis exercitij.

De frictionum, secundum quantitatem & qualitatem, generibus. Cap. XVIII.

Friktionibus, duræ quidē ac uehementis uis est stringendi, atq; indurandi: Mollis uero, cum laxandi, tum corpus emolliendi: proinde quæcuncq; corpora non ad amussim temperata, laxiora sunt, duriter: quæ uero coacta magis & tanq; compacta, molliter ac clementer fricare, congruit. Atqui si quis temperato sit corpore, perspicuum sanè est hunc neque leniter, neque uehementer esse confricandum, imò summa ope niti decet, quo utrunq; uitemus excessum. Præterea multa eademq; dura fricatio adhibita, molem corporis cōtrahit: E diuerso, exigua mollisq; in molem attollit. Tria quippe frictionum discrimina, quæ à quantitate sumuntur, si tribus quæ à qualitate ducuntur, copulaueris, nouem syzygias absolues, perinde atq; in subscriptione sequenti, tanquam in tabula, liquidò uidere licet. Vna quidem frictionum secundum quantitatem: uerbi causa, multa, tribus qualitarum coniugata, duræ inquam, molli & mediocri. In duritia tres constituit differentias. Contrà exigua siue pauca fricatio, ternis eisdem, ternas producit alteras.

Exercitationis uires.

Mediocris uero qualitate iisdem tribus connexa, tres alias efficit, quemadmodum subscripta figura licet liquidò cernere.

QUANTITAS		QUALITAS.	QUALITAS QUANTITAS.	
			GALENVS.	
I	Multa	&& Dura. Mollis. Mediocris.	Dura	Pauca.
II	Multa			Multa.
III	Multa			Mediocris.
IIII	Pauca	&& Dura. Mollis. Mediocris.	Lenis	Pauca.
V	Pauca			Multa.
VI	Pauca			Mediocris. 10
VII	Mediocris	&& Dura. Mollis. Mediocris.	Mediocris	Pauca.
VIII	Mediocris			Multa.
IX	Mediocris			Mediocris.

De uociferatione & exclamatione. Cap. XIX.

Gratum sonum
fragor
utilis est.



Nuociferationibus nihil quidem ad rem, neque uel tantillū ad sequendā ualeitudinis tutelam facit, scita & cōcinna plausibilisq; modulatio: Sonituum autem grauiorū fragor tantopere conducit, ut iugi exercitatione usui accommodandum censeam. Ea quippe ratione, plurima aëris uis in corpus per respirationē attracta, nō tam thoracem quā uentriculum, totiusq; corporis meatus expandit, diducit atq; disponit: quapropter inter legendum superflui etiam humores identidem excernuntur, legentibus quidem sonorosius non absq; contentione, frequētius, idq; per sudores: lis autem qui mansuetius uocem intendunt, per abditam ac obscuram uniuersae molis exhalationem, fit etenim screando per attenuationem plurium recrementorū, puta sputi, mucici, phlegmatis excretio atq; expensa. Quidnam igitur aliud praesentioris praesidiij, ijs qui praeter algore recalcificationem desiderant, adhibebimus, quā sedulam respirandi functionem? Legendum itaq; subinde esse arbitror, totiusq; tum corporis mole remissa, tum carne liquata, arteriam, reliquaq; spirandi instrumenta in concinnam raritatem diducendo, per ceteras uocum grauiores functiones uerba facere conuenit. Neque id uero temere, nihil pensi habentes, agendum: sed corpore prauis, corruptisq; humoribus exorte, stomacho immensis euidentibusque cruditatibus carente, tum denique modulari, ac uocis exercitationem aggredi expedit, ne plures uitiosi halitus atque uapores in uniuersam corporis molem eiusq; partes distrahantur.

Cuiusmodi affectus exercitationes excipiant. Cap. XX.



Lacerosus quidem affectus à recrementorum copia, tenuium simul & acrium prouenit. Tensionis uero lassitudo nullam, de qua ratio ulla sit habenda, superfluitatem, corporibus incumbere portendit. Verum in lacertis atque neruis, affectio quaedam effectricis causae potestatem praefrens, residet. Inflammatiua uero, qua

Clamora lectio
utilior lectio.

- qua nimirum partes ueluti contusas aut phlegmone obfessas sentimus, tum potissimum incidere insueuit, quum musculi supra iustum excafacti, attraxerint quippiam ex circumfusus sibi redundantibus. Est porro & alia affectio, quarta: quæ quidem incidit, dum plusquã par sit, musculi exiccantur, sicut squalens contractumq; corpus appareat, & ad motiones quodammodo pigrum. Cæterum ulcerosæ lassitudinis remedium est, si quæ redundant secernas & euapores, frictione multa molliq; oleo non parca manu infuso, à quo omnis adstringendi uis abest. Altera uero defatigatio, in qua tensio sentitur, hoc sanationis propositum habet, quam Græci *χάλασις*, id est laxationem dicunt. Laxatur itaq; & remittitur quod distensum est, frictione exigua pariter & molli, ex oleo dulci, tranquillitate item & quiete, lauationibusq; tēperatis, & pluscula deniq; in calidis undis mora: si iterum atq; iterum hoc modo lassum laueris, plurimum sanè profueris. Tertia lassitudinum phlegmonosa, sanationis treis sortita scopos est: Superuacanei uidelicet excrementi euacuationem, extenti relaxationem, & inflammationis refrigerationem. Oleo igitur copioso, tepido, frictionibus mollissimis, mediq; temperamenti aquis longa & diutina mora, illiusmodi lassitudinibus succurritur. Pari modo & multa quiete, præsertim continua. Quartus affectus, primo quidem die nihil sanè eiusmodi mutationis, cuiusmodi meminimus, opus habet, excepta calidiore aqua, quæ lente adstringere festinat. Postera dies recreatoriã (quam apothepiam dicunt) exercitationē postulat. Lauacris præterea protinus exiliant, maxime ubi gelidam aquam subierint. Omnes postremo defessi, alimento refici quamprimum deliderant.

Vicerosæ lassitudinis præsidia.

Tensivæ remedio.

Inflammationis defatigationis, tres sanationis scopi.

Quarta lassitudinis subsidia.

De cutis astringitione. Cap. XXI.

- V**is constipatio (quam *στυψις* Græci nuncupant) uel meatibus obstructis, uel illis ipsis densatis incidit. Obstructio uero & obduratio illa è lentis, crudis, crassisq; humoribus originē habet, quum uidelicet confertim ad cutem ruunt. Densatio uero *στυψις* modo ab ijs quæ refrigerant, modo astringentibus, & nonnunquam ab arefacientibus conciliatur. Procliue uero admodum est istuc deprehendere, denudato nempe corpore, ex albicante pallore, pariter & ex cutis tum duritie, tum etiã eiusdem densatione, & quod inter laborandū quis egre tandem incalescit. Medetur huiusmodi quidē affectioni perpulchre excafactio: minus itaq; prolixis exercitationibus, lauacris uero calidioribus, indulgendum. In solio porro egelido mora diuturnior non sit, sed neq; aqua etiã in qua lauatur sit admodum gelida. Cæterum induendi iam, oleo prius aliquo, mediocrem calfaciendi uim habēte, dulci, ac tenui, perungantur. Postremo, cutis densitati sanandæ satis efficax remedium oleum anethinum censetur, præcipue si ex uiridi anetho concinnatum sit: Hoc ipsum & oleum, quod ex abietis semine populō ue constituitur, efficacissime præstare asserunt.

Obduratio uide.

Densatio uide.

Constipationis densationisq; curatio.



Vandoquidem ulcerosus, ut dixi, affectus ex uitiosa succositate acrium retrimentorū nascitur: ea si exigua fuerit admodū apothērapīe modo exercitatione corrigitur: sin uero grandior alius radices egerit, huic tum exercitationem, tum omnem penitus motionē interdīcimus, imō quietē, somnumq; præscribentes, abstinentiam per integrū diem precipiemus: deinde aduētante uespera, libera liore oleo perunctos, & mediocriter temperato lauacro lotos, alimentis optimi succi, sorbilibusq; tenuiter alemus. Minime uero gentium Bacchi muneribus eisdem defraudauerimus, quoniā semicrudes (si quid aliud) cōcoquant humores. Et si beneficio eorū, quorū meminimus, symptōma cessauerit, ad institutū iam olim receptum, priscamq; consuetudinem, ceu ratio postulare uidetur, hominē reducere cōuenit. Quod si sequēti quoq; die perdurauerit, iam tum de ualētiorē auxilio dispiciendū est. Quippe si uirū robur permiserit, alterū ex duobus, aut uenam secare, aut euacuare, expedit: atqui utrum alteri præferendū, inq; rem potius fuerit, discernendum: In inualidis enim parumq; robustis, à uenæ apertione prorsus abstinendum est. Sed ut non expedite, & ne quid nimis, ita cum modo subpurgandum est. Vbi uero crudorum succorū moles infestaret, tum neq; uasa aperienda, neque purgandum, neq; exercitationibus deniq; uacandum, imō ne moueri quidem neq; lauari contulerit. Verum omni in quiete, hoc modo affecti, seruādi sunt. Epulis item ac potionibus, medicaminibusq; quibus extenuādi dissecandiq; potestas, absq; euidenti calfactione, utendum. Eduliorum itaq; loco oxymel, pisanæ exiguum, interdum aquam etiam mulsam, exhibebimus. Quum autem cunctis in hac conditione constitutis hypochondrium suspendi, inflariq; procliue admodum sit, (quoniam quicquid eis offertur, prompte flatuolum redditur) operæ omnino precium fuerit dapibus piperis aliquid confundere. Præstat autem in primis Diospoliticum medicamentū usurpare. Sed & illud quoq; quod ē tribus piperū generibus constat diatrionpiperion, quasi *diatrion piperion* dicitur, appositissimum sic affectis fuerit remedium. Vtilissimum eis fuerit oxymeli. Pro potu apomelite, hoc est, cremore ex fauis aqua ablutis, utendum censeo, potissimum ubi utcunq; subacuit. Vinis item quæ leuiter subacescunt. Nutrimētis præterea quæ absque calore extenuant: cuius generis habetur capparīs, quem Romani Persicum sinapi dicunt, uel ex oxymelite, uel ex oleo et aceto pariter sumptus. Tensionis defatigatio, dum nō ab exercitatione proficiat, nimietatē quandā solidas animantis partes expandentē, insinuat. Cæterū neq; quenq; fugere, quia luce clarius, potest, quod quandocunq; sanguineus humor nimia abundarit copia, cum incisa uena detrahare, uel malleolū ferire presentissimū est remedium. Spontanea uero lassitudo, in qua phlegmōnes sensus est, ne unius quidē atq; alterius hore, nedum duorū triumue dierū interuallo, moram sustinet, nisi enim quispiā sanguinis missione occuparit atq; præuenerit, febrim

Vinum crudos
humores coq.

Vires perperam
dende.

Diatrionpiperion.

Tensius defatigatio.

Inflammatus
defatigatio.

10

20

30

40

febrim illico inducet acerbissimam. Commodius uero, atq; adeo magis in rem laborantis fuerit, si nihil impedimento sit, bis eodem die detrudere. Sed priore quidem detractioe nō ad animæ hominis usq; deliquium auferemus, posteriore uero ne animi quidē defectionem formidabimus. Si qui in ea affectione constituti sanguinem mittere superfederint, eis profecto, nisi uenti ualde secundi flauerint, naufragium factum putabis.

Cuiusmodi rationem uictus senectus postulet. Cap. XXIII.

- 10 **E**lidi quidem aridiq; temperamēti ipsa senectus est. Emendatur uero tum calorificis, tum humectadi iuxta calfaciendiq; uirtute peditis: proinde sunt, sed nō ad lassitudinem usq; fricandi. Alimentum autē imbecillioribus ter administrandum: circa horam diei tertiā pauxillum panis cum Attico melle: post hæc hora septima, præmissis frictionibus & exercitijs, pro senectæ modulo, balnei quoq; usu adhibito, ante omnia quidē quæ aluū derijciant, mox etiā pisces atq; alites porrigemus: postremo uero in cœna, quæ inculpatos succos pariant, quæq; ægerrime corrumpantur in stomacho, exhibebimus. Vina ex melle condita libenter admitto, potissimū si quis senum uel in renibus lapillum, uel pedum affectionem, quam *modicæ* nominant, incumbere speret, adijciendumq; huic cœnomeliti petroselinum. Si quando res ipsa
- 20 postulat, ea quæ in uentre pituitā progenerat incidant seligere, transeundum, ut reor, confestim ad humectantem educationem, fici quidem ante alios cibos, & in primordio cœnæ exhibitis: brumali uero tēpore caricas, nullo symptæmatis sensu in dextro hypochondrio infestante, utiliter offeremus. At ubi serosa, pituitosaq; retrimenta in senio confectis corporibus suggeruntur, singulis diebus lotium mouere, & aluum, maxime ante cibum, absorpto prius oleo, subducere expedit. Sed illud liquidò constat, quod in prima mensa olerū omne genus cum oleo et garo, ex muria item oliuæ, & pruna deniq; Damascæna manducāda sunt: quod si uehementius aluus suppressa fuerit, Mercuriali & cnico succurritur: quibus non
- 30 minus cōducit & terebinthina, interdū unius modò ponticæ nucis instar, nonnunq; duorū aut trium magnitudine sumpta: neque raro item ex oleo clyster, aluo duræ & adstrictæ saluberrimum est præsidium.

Ad rugatū contractumq; corpus. Cap. XXIIII.

Rugatam quidem corporis cutem reddit erui farina, unā cum uite candida commixta.

Aliud smegma indefinenter abstergens.

Ficus pingues unā cum bryonia in farinā conteruntur, eruiq; farina usta, sepis pifcis testa, pauco melle instillato, in eundem usum contunduntur.

Vt suauiter spiret corpus. Cap. XXV.

- 40 **I**cca cupressi coma contusa, piceæ cortex ungento confusus, suaueolentem corpori inducunt odorem: memento tamen ne quis matutino diluculo, unā cum indumentis iam corpori applicatis, parum uel cassiæ, uel fauinæ degustare detrectet.

Senectus in
temperiei cor
rectio.

modicæ
-modicæ

Quomodo in
cidendum cōu
max phlegma

Quoniam habitū instaurari posse obiter insinuauimus, solutus ad calfaciendū illum intrito calorifico utatur: Quod ex his cōstat: Nepeta, sampsocho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, (quam Græci *λυμνωτιάδα* nuncupant) lapide Pyrite, sale, fece uini combusto, nitro, pumice, pro uniuscuiusq; ratione, exiguo sinapi, uua timinia, & grano Gnidio. Post balneum uero calorifico utatur acopo, ulno rufo ueteri, potione ex uino mulso, pipere, rutha, & consimilibus.

Ad uitiatum corporis colorem. Cap. xxvii.

Vitiatus corporis color eximie corrigitur uita amœna blādaq; dapibus succi inculpati: miscere autē radiculam, porrumq; cum uiridi cicere oportet. Coloris quoq; miram quandam gratiam inducit, dulcis mali punici cremor absorptus. Vtile uero fuerit oleū adijcere, elixa in ipso diutius bryoniæ radice: Hoc sanè & cuticulam curat, & corpus expolit. Scissuris conglutinantia miscere atq; illinire conuenit, quæ abstergēdi aliqua facultate polleāt: Verbi causa, farina, bulbus, narcissi, & bryoniæ radix. Pulchritudinem quoq; coloris ipsa opulentia facit. Amygdalę item tum radix tum fructus, elixa in aqua. Cuius quidem usus potissimum probatur in lauacro.

Scissurarum
medicula.

Ad liuores & fuscedines. Cap. xxviii.

Enum cum liuorem tum fuscedinem pulchre emendabimus, si cutem spissam, & affectionibus minus obnoxiam, habitu nemq; omnem longe calidiorē reddemus: quod quidem multo citius assequemur, si salibus in balneis utemur. Fuscedinem uero spongijs, in raphani absynthijq; iure submersis, fouere expedit.

Quæ dentes præseruent custodiantq;. Cap. xxix.

Dentes, si quis hæc fecerit, corruptionē nō sentient. Ante omnia quidem corruptiones ciborū uitandæ sunt. Fugienda pariter assidua uomitio. Horrere item oportet escas dentibus aduersas ac inutiles: cuius generis sunt, ficus aride, mel coctū, frangi contumax, palmulæ, & quæcuncq; ægerrime conteruntur, quæq; glutinosa sunt, atq; fractionis adeò difficilis ut dentes uel loco dimoueant, uel eorundem stuporem (quam doloris speciem Græci *αἰμωδία*, Romani torpedinem uocant) inducant. Cibi omnes egelidi & marcidi. Sunt uero à cena dentes semper accurate expurgandi.

Aduersus grauem auditum. Cap. xxx.

Audiendi promptitudinem in primis conducit, meatus for-
dium expurgatio, ad tempus enim retentę, linimentū madens dropace unguine, quod ē pice cōficitur, in ipsum demittito, & simulatq; expressum fuerit, extrahito: Vna quippe sic opera et
meatus expurgatur, & auditus restituitur. Post hæc autem instar erui ad diem adhibito, obtura meatū: postera die detrahens, singulis diebus oleo amygdalino illine, aut nardino aut chamæmelino, aut adipe anserino, aut modico

modico felle bouino. Rursum iusto tēporis interuallō imposito, sinapi & sicu in farinam suffriatis, conformato peniculo (quod καλὴν Græci appellant) horis duabus applica, quo deinde detractō, oleum in albuci radicis cremore, uel sola cum radice feruefactū, concuitati infundito.

Ad caliginem oculorum. Cap. XXXI.



Vo caliginē minus oculi corripiantur, ipsis egelida aqua submersis modice suspiciant, quippe acies oculorum, uidentisq; facultas miris ita modis intenditur. Caue tamen ne unquam aua

Que uitanda caliginis.

- 10 ac dulci: Epulis item, quæ diu supernatantes ægre tandem in uentericulum demigrant, quæq; concoctioni resistunt, atq; luccos lentæ, crassæq; materie gignūt. Quin & ab erucis, porroq; & à quibuscunq; acoris quiddam sursum transmittitur. Iam uitare pariter expedit meridianum somnum, si pinumq; decubitus, uentos ex aduerso obuiam flantes, fumum, atq; puluerem. Infunditur porro præsentī remedio oculis perpeti mense singulis diebus aqua, ad hunc sanè modum accurate præparata: Fœniculū uiride, simul & aquam pluuialem uasi testaceo foris picato inijce, dein de fœniculo exempto, reliquias in eum usum reponito.

De plenitate, satietatē ue. Cap. XXXII.



20 Vmmopere in alimentorū satietate delinquitur, nam & si probe uenterculus suo fungatur in coquendo officio, uenæ tamen plus iusto refertæ afficiuntur, expanduntur, finduntur, oppræssantur, flatuq; infartuntur, & mira quadam deniq; grauedine pessum eunt: atq; ut semel dicam, grauissimas ex satietate, uenarum ue plenitudine (qua nihil in morbis pestilentius) ægritudines prouenire perspicuū est. Ventris porro plenitas, quantq; eo quod redundantias uel uomitione, uel alui deiectione excernit, multo quidē tolerabilior sit, ea quæ uenis oboritur, tamen & ea quoq; dānanda est. Attamen siquādo quis se plus æquo ingurgitarit, protinus uomitu ejicere studeat: periculū enim ne si 30 probe cōcoxerit, uenæ præ plenitudinis mole molestant, præsertim dum quis iugiter per intemperantiam sese largius inuitans, nullam cōminiscatur euacuationem. Vomendū est itaq; antea quā cibaria sumpta in uentericulo corruptantur. Si cui tamen est quod uomitionem impediāt, alui deiectio plerunq; maximo fuit præsidio. Verum si ne id quidem est integerū, somno prolixiori indulgeat, & crebrius in potu aqua utatur calida. Vbi uero quantum satis est concoxerit, potissimū si aluum deiecerit, lauare, fomentis uti, paululū salsamenti gustare, potumq; dilutū haurire, expedit. Quod si neq; defecerit, neq; mature coxerit, et uniuersi semel corporis moles pōderosa, & ad motus omnes inapposita, somnolentiorq; & mens 40 quoq; nulla euidenti ratione pigritia torpeat, hæc profectō uenarū plenitatem, ne dicā redundantia, portendunt. Qui uero præter hæc lassitudine quoq; capiunt, eos tranquillitati permittere, quoad uētriculus pro sua functione cocturā absoluat; mox deinde exercitationibus inanire satius est.

Venerum repletio nocensissima.

A crapula illi eo nomen datur.



Aturus sanè uomitus saluberrimum temulentis est remedium. Expediit autem ubertim aqua & mulso epotis uomitū elicere, quo partim bene multa proficiant, partim uellicationes, quas secum fert ebrietas, hebetiores reddant, & obundant. A uomitu uero inambulatione leni, & illinitione abundanti utendum censeo. Reliquo deinceps tempore tantisper tranquillitati, quietiq; sub stragulo dormientes, uacent, donec id quicquid est uilli edormierint, & ipsa afficiens discutiatur ebrietas.

De ijs quibus alimenta corrumpuntur. Cap. XXXIII. 10



Acta alimentorū in uentriculo corruptione, quibus retrimen-
ta corrupta excernuntur, rectissima semita ad sequundā ualetu-
dinem tendunt: Qui uero nihil deijciunt, ijs quæ iucunde sine
molestia uentrem molliunt, irritandi sunt. In ea affectione con-
stitutis, uomitiones ante cibū, uini, passi uē potatione, citæ conferunt. Ad
hæc, quicquid est uaporosum, quicquid uirosū, interdiciamus: atq; in uni-
uersum omnia quæ ocys corrumpuntur esculenta, uelis remisq; uitanda
sunt: Sed ea quæ inculpatū succum generant obsonia, cum delectu uenan-
da censeo. Sic se habentibus, ex tēporis interuallo modestę, ac opportune
alui subductiones, ex clementibus catharticis, presentaneā opem adferūt. 20

De re uenerea. Cap. XXXV.

Moderate Ve-
neris cō moda.



Molumenta quæ Venerē ceu umbra comitātur, hæc sunt: Ple-
nitatem exhaurit, corpus agile & expeditum auctiusq; reddit,
& uirū arguit: Quod uero ad animū attinet, implicitā ac per-
plexam rationem extricat, furentem indignationem mitigat:
Qua de re atrebulario appositissimū (si quicq; aliud) est subsidium: Resti-
tuit hominem modestiæ, & aliās quoquo modo dementes. Affectionibus
item quæ pituita proueniūt, efficaciter opitulatur. Acibis appetitus auer-
sionem, in ciborū appetentiā, bella metamorphosi, reducit & cōmutat.
Aliquot multos à frequentibus somnijs uindicat. Atqui homines calidioris 30
ris, humidiorisq; naturæ, Veneri multo magis sunt apppositi, procliuiore
quippe reliquis ad libidinem uulgo conspiciuntur. Porro siccanti atq; re-
frigerātī uictus rationi Venus est alienissima. Senij itidem etas, tempusq;
autūni. Victus itaq; calidus ac humidus offerēdus est. Esto præterea fru-
galis quidam tum laborū tum alimentorū modus: ut enim laborū summa,
ita Veneris quoq; (si mediocritas seruiatur) cōmoditas est: haud enim ad
opus modo excitant, uerum promptitudinem quandam, ei qui assueuerit,
præbent. Veneris ergo desiderium, præ cunctis alijs rebus, cupidariū ir-
ritat redundans copia. Proinde que plurimi alimenti sunt cibaria, ad hanc
rem uel ad unguem facta uidentur: Cuius generis ex piscibus sunt Polypi, 40
(qui aliās sanè ad Venerem stimulare haud uulgariter putantur) & omnis
mollities, uel, ut ita dicam, pellicia. Ex oleribus uero geminalis, erysimon,
cruca, rapū, atq; hæc instar medicaminis habentur. Legumina uero id ge-
nus,

Calidi et humi-
di Veneris ido-
nei, frigidi et
siccī, ineptio-
res militat.

Irritamenta
Veneris.


nus, fabæ; cicera, ochri; quas eruilas dicunt, dolichi, quas filiquas haud inepte dicas, pisa, quoniam flatuosa sunt, & uberi alimenti, Idcirco rutha, eo quod status dissipat, atq; penitus ferè demolitur, Venerem hebetiorem reddit atq; obtundit. Vuas maximopere commendo, humectant enim, & spiritu sanguen infartiant, id quod ad res Venereas potissimum ueluti impetu quodam stimulat. Futurus itaq; caueat ne plenitates, cruditates, labores, uomitus & purgationes molestant: pari quoque modo studiose uitandum ne tum repentina diarrhoea (id est fluor alui) quæ diuturnam exiccat, corpus infestet. Clinopalen atque æstuantem adeo libidinem ut minime probò, ita manibus pedibusq; ei renitendum præcipio, maxime quorū ulli affectioni obnoxium corpus est. Multo itaq; satius fuerit post exercitationes, lauacra, exiguo alimento sumpto, in Venerem cōgredi. Illud enim uero tum ad corporis robur, tum aduersus frigoris noxas, plurimū habet momenti. Veneris utiq; opportunior occasio à cibo (ceu mox mihi dictum) & ante somnū. Protinus enim à coitu somnum capienti labor relaxatur: Adde quod temporis id liberis procreandis longe cæteris accommodatius est, quā alijs sanè nominibus, tum quod mulier somnū capiens semen genitale melius ac ueluti mordicus continet.

Rutha Venere rem obtundit.


Congressus in Venere quid cauendum.

Coitus opportunus.

Ad eos qui futuere nequunt. Cap. XXXVI.


10  Iri nō uiri penis pinguitudine subinde illitus, incitatur ad libidinem, adiecta interim radices narcissi, aut grani Cnidij, aut pyrethri, aut uuæ timiniæ, quam *σακίδος ἀγρίου* nominant, aut seminis urticæ, aut anisi exigua particula. In quē usum etiā propinanda sunt, piper, aut satyrion, aut eruca, aut cnicum, aut uno etiam fasce omnia. Ante escas, & in cœnæ semper primordio, bulbi tosti sului & exiles, cum sale oleoq; aut scyllæ parum marcidæ, deglutienda sunt. Præterea in hanc militiā cōpertis & confectis medicamentorū præsidij uti, ac res deniq; obscenas iugi admodū lectione euoluere, inguinibus fauciat.

De immodica futuitione. Cap. XXXVII.

30  Voniam è clinopale, immodicæ re Venerea corpus rarius, frigidius, aridius, imbecilliusq; redditur, astrictior, calorificq; humectatrix, roborificq; potestatis rebus utendum censeo. Quam ob causam libidinis assiduitate culitræq; palestra defatigatis impendio conducit, stragulum calidū, tranquillitas somni ad naturę necessitatem, tantisper scilicet quoad corpus ex cōtentione relaxetur atq; instauret, ipsiq; tandē à debilitate refocillati sese recuperent atq; reficiant.

Rebus libidine quid conducit.

De nimietate genituræ. Cap. XXXVIII.

40  On pauci feruentis genituræ copia faburrati, petulantes laxis habenis in amabiles congressus feruntur, qua semel perflusa corpus debilitatur, stomachus resoluitur, gracilescit, & excuscus omnino efficitur. Verum si eam ob rem se Venere defraudauerint, capitis grauedine capiuntur, nausæabundi redduntur. Deinde mox in somno profusione polluti, eadem patiuntur. Ea de re nihil quod ge

Quæ ex genitali retento incommoda.

nitale semen auctius reddat propinandum est, sed contrā quā ipsum corā
rumpunt & cōficiunt potius, tum alimentis, tum medicamentis, uti: Lum
bos item, ubi lauerint, oleo rosaceo, melino & omphacino oblinire con
uenit: Præstantius uero fuerit, confusa eis, crassitudinis gratiā, cera inun
gere. Adijciuntur etiā utiliter succi quidam frigoris, Semperuiui in
quam, solani, umbilici Veneris, & psyllij: atque hæc quidem ætatis tem
pore: sed cæteris temporibus tum sales, tum lactuæ cremor, tum lini se
men aqua elixum, quippe & hoc refrigerantem succum exhibet. Lamina
porrò plumbea lumbis supposita, genituræ per somnū fluorem cōpescit.
Hoc ipsum efficacissime quoq; præstant herbulæ quædam egeliæ, unā 10
cum rutha, & teneriusculis nonnunquā uiticis (quam *ἀγροπ δὲ λυγροπ* Palliati,
falicem amerinam etiā Togati nuncupāt) extremis furculis, substratæ.
Semina quoq; lini atq; ruthæ comesta idem efficiunt. Obseruare uero ad
unguem conuenit, ne dum tanto certatim studio lumbos refrigerare mo
limur, renes iacturam faciant.

De his qui ex frigore noxam contraxerunt. Cap. XXXIX.

Algore, perfrictionē ue cum tremore plus æquo male affecti,
unctulo uel cyprino uel irino delibuti decūbant: deinde non
nihil calore restituto, piperis quiddam aut myrrhæ cum uino
dulci, odoris optimi, annoso, uel succum cyrenaicū, ē mero si 20
ue aceto, uel pyrethrum, uel castorium deniq; ex aceto, & omne uno uer
bo alimentum calidius, exhibere oportet.

De his qui immodico ardore iniuria affecti sunt. Cap. XL.

Qui ardore autē atq; inuersione uerius noxam non leuem con
traxerunt, in penetralibus aulisq; auræ undique expositis at
que uentosis decumbant: Vultum præterea, manus, crura, ege
lidis undis irrigare: Sitim potatione frigidæ pro consuetudi
nis ratione sedare, expedit. Hæc sanē consultò, non ubertim, sed pe
detentim facere, alimenti parum, rite dispositum, liquidum potius quàm
solidum, assumere confert. 30

De pituita in uentre superiore superabundante. Cap. XLI.

Quod si quando assequutus fueris quenquā qui plussculi ac ualidi
nutrimēti oblationes auersat, fastidit, atq; omnino renuit, quicq;
si assumere impellas, nauseat, neq; fortassis quicquam, præter
quam quæ acridinem præferunt unquam admittit, imò ne s
quidem capitur, sed uentriculo inde inflato nausea quoq; oboritur, atque
sola eructuatione uel minima recreatur, nonnunquā ipsos quoq; iam sum
ptos cibos corrūpit, in acidam maxime corruptionē: persuasum habeas,
prima esse sanationis præsidia in euacuatione uētris à phlegmate, sita. Ipse
quidē olim in eiusmodi affectione constitutū cognoui, qui radícula ex ace 40
to mulso deuorata longē fide maiorem crassæ pituitæ uim euomuit, atq;
ita extemplo sequundam ualetudinem inculpatam assequutus est.

Quo

Quæ alui stric-
tum soluant.

barbarū appellatū) miscebimus. Cōueniunt etiam aluo emolliendæ, oua
forbilia: Ex oleribus beta, malua, ius cochlearum, & hæc aliquando faris
opis conferunt. Validiores in hac re uires habent, mercurialis, in aqua
cum salibus elixa & esui data, & elixatio eius potui exhibita: Similiter &
sambuci folia, polypodij & radicis duo denarij salsamēto insparsi, aut cum
pisana deglutiti. Eiusdem classis est serum lactis, trium aut quatuor hemi-
narum mensura, cum sale & melle sumptum. Simili potestate est iusculum
peruetusti gallinæ, tam per se, quàm cum binis cniçi denarijs acceptū.
Aloē quoq; à cœna, quæ trium cicerum magnitudinem æquet, identi-
dem assumere expedit. Saluberrimus itidem fuerit, epithymus cum uino
post frugalem cœnam epotus. Verum si cui uehemētiore cum euacuatio-
ne succurrendum est, ueris tempore circa auroram epithymi drachmam
ex oxymelite hauriat.

De clysteribus. Cap. XLIII.



Abent natura uentres quidam adstrictiores, quorum præde-
bilitate stomachus non sustinet medicamenta, quæ per os sum-
pta aluū deiciunt: ijs lauaminibus, quæ Græci nunc κλύσματα,
nunc κλύστρο, Medicorū schola clysteres, & infusa, nuncupant)
succurrendum cenſeo. Pituitam quidem quæ intestino fixius inhæret, ius
re caricarum, betarum, nitri, radicis cucumeris syluestris, cum melle &
oleo uel chamæmelino, uel anethino: Quod si ariditas haud mediocris
molestauerit, elixatio althæe, scœnogræci, chamæmeli, adiecto oleo & mel-
le haud ita multo, & nonnunquam oleum per se dimidiati acetabuli quan-
titate, per inferna in aluum immisſum, id quod desiderabatur ad amuſ-
sim, ut dicitur, absoluit. Neque tamen id crebro sine iusto temporis in-
teruallo agendum, ne natura ijs perpetuo usu assueta, ultroneæ deiectioni-
nis, sui muneris, obliuiscatur.

Enematis cum
temporis inter-
uallo utendum

De glandibus, quæ uulgus medicorum suppositoria
uocat. Cap. XLV.



Sus quoq; glandium celebris admodum est, oletuli excernendi gratia, ac in his quoq; quibus etiā dum clysteris reliquæ, uel
quicquid iniectum est, ueluti mordicus retinentur. Finguntur
uero balani è sale asſo, melle & nitro, thymus quoq; non raro
melli crudo, formādi glandinis gratia, inferitur. Formantur nonnunquam
& è terebinthina resina, admixto nitro, & modico aliquando cocco Gni-
dio. Cæterum quoniam ferè lancinatio inde semper conſtat, non citra
adiecti portionis olei ijs utendum. Porrò dum pyrethrum, aut piper infe-
ritur, opitulantur dissolutis, & præ algore inflatis. Additur item sæpius
& centauriū, pici aut cerato implicitum, resolutioni uerendorū accōmo-
datissimum præsidium: Pusio-ibus uero (quibus durior alius clementer
mollienda est) salis granū inditur. Ex ficu deniq; adiecto nitro, nonnunq;
glandes conformari pulcherrime possunt.

De caput purgantibus apophlegmaticis, de quibus quæ
per nares euacuant, & de unguentis.

Caput XLVI.



Humores quidem capitis per sputa & sereatus commodissime
euacuantur. Id si obiter modo facere fert animus, confundimus
piper mastichæ: Si ualidius uacuare studebimus, aliâs pyre-
thrum mandere, aliâs herbam pedicularem, (quam Græci
σικαρία ἀγρία nominant) præcipimus. Præterea utriusque orcutunicæ, quam
σινάπιδος eadem gens appellat, commanducata radix, phlegma extra-
here efficaciter ualet. Capparis quoque radicis cortex, eundem humo-
rem euocat. Retrimenta igitur serosa, rebus hætenus enumeratis eua-
cuantur. Sinapi uero cum oxymelite gargarizatum, aut defrutum in quo
firæum, origanum, uel hyssopum elixatum sit, crassiorē pituitam excers-
nit. Ipse uero sapa sinapi cum oxymelite confundo. At si à muco quo-
que purgari cerebrum expetit, irritando per medicamenta quæ acorem
obtinēt, quorum bene multa sternutationem eliciunt. Purgat itaque
per nares anagallidis, utriusque orcutunicæ, ac betæ cremor, foliorum quo-
que syluestris cucumeris succus uel seorsim ipsus, uel cum decocto uel cre-
more betarum naribus infusus. Verum si crudi humores in thoracis, pul-
monis, capitisque partes sese receperint, sternutamentum quidem, neque uel
tantillum opis conferre potuerit.

Vnguentum oris huiusmodi confert.

Sinapi cum betæ cremore dilutum, partibus palati, atque columellæ
illitum, haud mediocri remedio est. Idem per nares quoque purgandi
facultatem obtinet. Euphorbio item naribus illito subinde usus sum, me-
lanthioque, quod equidem interdum, per acri aceto per diem maceratum,
deinde posteriore die cum aceto denuo dilutum, emollitū, & eliquatum,
naribus infundo. Interdum uero melanthion oleo ueteri liquefacio, at-
que pari modo uisui adhibeo. Ad hunc ferè modum Archigenes quoque
in obturatione narium melanthion usus est. Priori, quod aceto constat, Cri-
to felle suffusus succurrebat.

Quæ menses trahant muliebres. Cap. XLVII.



Væcunque, ut semel dicam, lotia proritant, eadem & mulie-
bria impellere possunt: Verbi causa, brassicæ radices elixatio,
in potu, persicæ radix, rutha, calta, (Sic enim Romani *χουρά-
βριον* uocant) dictamon, semen erucæ. Reperiuntur uero non
nulla quæ uel appositu modo, maxime si ori locellorum admoueantur, men-
ses promoueant: cuiusmodi habetur rutha, cum melle illita, porri cremor,
allijque contriti succus, myrrha uino diluta, & leporis denique coagulū.

Sudorifica medicamenta, quæ à Græcis *ιδρωτικά*

appelluntur. Cap. XLVIII.



Vdorem prouocant chamaemeli farina, oleo inspersa, summa cu-
te haud molliter modo, sed ualide etiam perfricata: seseli, pyre-

chrum, canchry, anisum, pari modo oleo excepta: nitrū tostum haudqua-
quam ualde tenue cum oleo: flos salis oleo temperatus: succus cyrenaisus,
aqua dilutus, & in perfrictione corporis adhibitus, ciceris item quanti-
tate haustus. Consimiliter & nepeta, tum si cum mulso sumatur, tum si fo-
ris quoque corpus ex eo fricetur.

De aëre. Cap. XLIX.

Aer optimus.



Aluberrimus aër est, qui ad unguē purus est: cuiusmodi fue-
rit, quem neque stagnorum, neque paludum, neque alicuius bara-
thri, pestiferam auram eructantis, exhalationes perturbant:
Eduerso, qui latrina quapiam uastū aliquod oppidum expur- 10

Aer pestilens.

gante inficitur, pestilens est. Neque etiam is qui nebulosus est, frugi uideri
potest. Viciosus item quisquis in ualle undique celsis iugis inclusus, nullā o-
mnino suscipit auram. Quicumque ergo ad hunc modum aër infectus est,
omni pariter ætati, omni temperamento, iuxta tantopere officit, quanto-
pere inculpatus ille uniuersos & amoenat & adiuuat. Sed qui in qualitate,
ardore inquam, algore, siccitate & humiditate diuersus & inconstans est,
omnes sine discrimine afficere neuiquam potest. Temperatis nanque
corporibus, aër temperatus, Intemperatis uero, qui contrarij tempera-
menti fuerit, utilissimus est.

Similes autem
lebra lactucat

De aquis. Cap. L.

20



Vae singularū ferē aquarū cum uirtutes tum uitia sint, explo-
rata & ueluti in numero habere conuenit, utpote quæ multi-
plicem in primis tantum nō omnibus usum, ad quāuis educatio-
nem suggerunt. Latere itaque neminem debet, saluberrimā esse

Aqua saluberrima.

aquā, quæ omnis planē tam gustu quā olfactu qualitatē expers est: sed
ut potanti extemplo suauissima, ita intuentibus lymphidissima uidetur. Quæ
uero per præcordia maturime descendit, hac nullam potiore aliam inue-

Aqua per-
niciosa.

stigare conuenit. Quæ uero præcordiis diutius immorabūtur aquæ, uen-
trem uexabunt, inflationes facient, & ponderoso onere graues erunt, o-
mnium deterrimas constituere oportebit: eæ sanē neque calefcunt ocyus, ne- 30
que frigescunt promptius: quin & quæcunque in ea elixantur, longa mora
& egerrime tandem cōcoquunt. Satiū itaque fuerit ex perimento huiusce-
modi aquam discernere. Qui uero notis quibusdam talem deprehendere
studuerit, ex his quæ deinceps memorabimus faciat iudicium. Enim uero
quæ septentrionē uersus & occasum labitur, ea ut ægre transmittitur, ita
coctū difficilis & cōtumax est, & calefit & frigescit lentius: cōtrā quæ ad
orientē, per meatū quempia siue tellurem defluit, leuique momento calefcit
& refrigerat, de hac summæ bonitatis spem concipias. Ea quoque frugi pu-
tanda est aqua, quæ æstiuo tēpore frigidior, brumali uero calidior est. Nec
desunt qui aquæ bonitatē trutina explorant: ei sanē leuiiores cæteris præ- 40
ferunt: Si id cum his quæ mox recensuimus commune habet, probatur.

Quibus notis
bonitatem uo-
lunt, aquæ
deprehendas.

Pluvialis aqua

Hæc quippe sola, nisi & alijs fulciatur, exactæ probitatis coniectura mi-
nime satis. Cœlestis præterea aqua, teste Hippocrate, nullo pondere gra-
uis,

uis, dulcore abundanti, lymphiditate neutiquam uulgari, tenuitate denique
 censetur, eo quod à sole leuissimum trahatur & tenuissimum. Idque non ex
 alijs aquis modo, sed ex mari etiam, corporibusque colligitur: proinde &
 omniū celerrime putrescit, quod ē diuersis admodum qualitatibus confi
 stat. Nemo uero citius putrescibilem aquam deterrimam esse iudicet, al
 terationis quippe procliuitas uirtuti magis quam uitio adscribenda est. Qua
 propter quæ inculpatæ aque inditijs prædita facile putrescit, saluberrima
 censenda est. Atqui ubi iam alterari cœperit, sumentibus in potu, rauce
 dinis, tussis, molestiæ uocis, occasionem præbet. Cæterum ex pluuiali
 10 bus aquis æstiuæ & tonitruosæ, bonitate procellosæ præpollet. Glacialis
 uero niualis que omnium uitiosissima habetur, quod aquarum conge
 latione omnes tenuissimæ partes exprimuntur. Vtile autem fuerit limo
 sam, teterrimi que odoris aqua, uitiosa que qualitate affectam, elixatione prius
 corrigere, & sic tandem bibere. Et uinum miscentes, aquæ uitia emenda
 mus: stypani quidem dulcius, cæteris uero acerbius. Nonnullas porro
 aquas, uerbi gratia limosam, falsuginosam, bituminosam, excolare expe
 dit. Valde uero gelidam post alimenta, sed ne tum quidem ubertim in
 gurgitandam iudico. Inueniunt nonnulli cibos ac potus, quibus aqua
 rum uitijs occurrunt. Nec desunt qui ciceris decoctum offerunt, uel ipsum
 20 met deuorant: alij pedes gallinaceos (quas *παραλιδας* Græci nominant)
 cum pisciculo quopiam elixato, pariter edunt. Consimiliter & scenicu
 lum. Quidam betam denique & cucurbitam sale conditas unâ cum uino
 diluto absument.

Putrescibilis

494.

Aqua à glacie
niueque defluens

De balneis. Cap. LI.

Robo sanè natationem frigidæ, quam *ψυχρολουσίαν* Græci nun
 cupant, atqui temere & ordine nullo uiuentibus ut nihil con
 ferre, ita ipsi modo qui ad amissam uitam instituunt, laboribus
 item & alimentis loco ac tempore commodissime utuntur, mul
 tum momenti adferre arbitror. Qui uero copiosiore egent refrigerio, eos
 30 uel induxisse nonnunquam natationi æstatis tempore satis fuerit, iuuenes
 maxime, & corpulentos, frictionibusque præcalfactos. Sint autem neque re
 bus Venereis, neque alia quauis re defessi oportet, neque cruditate interim,
 neque uomitione, uentrisque fluore, aut uigilijs denique, exhausti. Periculo
 sum quippe simpliciter egelido lauacro uti: calidum autem ut optimum, ita
 & tutissimum fuerit: solatur enim lassitudinem, plenitates dissipat, calorem
 inducit, placat, mollificat, status discutit, etiam si altius radices egerint, so
 mnum accersit, & corpulentiam inducit. Est uero utilissimum cuique, tum
 uiro, tum mulieri, tum puero, tum seni, magistratibus atque priuatis.

De thermis sua sponte proueniens. Cap. LII.

Hermarum naturalium, hoc est, quæ ultro scaturiunt, quædam
 sunt nitrosæ, quædam falsuginosæ, quædam aluminosæ, quædam
 sulphureæ, aliæ aeris, aliæ ferri denique naturam emulant. Sunt
 40 item nonnullæ quæ ex earundem rerum mixtura constant, idcirco in



Thermæ nitroſæ.

Aluminoſæ.

Sulphureæ.

Bituminoſæ.

*Quæ æris,
quæ ferri natura
tam imitantur*

uniuerſum omnes quotquot per ſe ultro thermæ emergunt, uirtute areſcendi calfaciendiq; præditæ ſunt, frigidisq; ac humidis naturis in primis conducunt. Cæterum quæ nitri ſalisq; naturā obtinēt, capiti, thoraci, deſtillationibusq; affecto, ſtomacho humecto, hydropicis, e morbo item pullulantibus tumoribus, & quibus pituita moleſta eſt, cōueniunt. Quæ alumine cōſtant, ſanguinis excretionibus, uomiturienti ſtomacho, ſcæminarum inordinatis locellorū purgationibus, & iſis quæ identidem abortiūt, opitulantur. Quæ uero ſulphuris uim poſſident, neruos emolliunt, calfaciunt, fatigationibus ſubueniunt, ſtomachū non modo effceminant tantum, uerumetiam ſubuertūt. Sed bituminis naturam imitantes, caput replere, ſenſiſq; ſedis officere ſolent: calfaciendi uero emolliendiq; uim obtinēt, ſi quis diutius in eis perennat. At quæ æris confuſione conſtant, os, tonſillas, columellam, & oculos, miris modis adiuuant. Quæ poſtremo ferri naturam retinent, ſtomacho, lieniq; accommodatæ ſunt. Oportet autem aquam citra tumultū ingredi, quo ſcilicet ipſius potentia pedetentim irrepenſ, promptius in diſſolutum & laxatum corpus demergatur.

De uictus ratione ſingulis anni temporibus utili.

Caput LIII.

Hyem.



Primum ſanè fuerit quæq; anni tempora obſeruantes, uictus rationem præſcribere. Per hyemem quidem ualentius exercitari, & plenioribus alimentis uti oportet, præcipue quando

Ver.

aëris tempeſtati Boreas imperat. Vbi uero auſtrina tempeſtas fuerit, pari quidē exercitationi, ſed cibo, potationiq; frugaliiori, indulgendum. Et in uniuerſum, ut madido tempore ſiccus omnino reddere corpus, ita & per frigidum tempus calidius, ueſci uero tum carnibus, oleribusq; calidis, atq; uinum bibere meracius, expedit. Primo autem uere aduentante, hic quidem uomitionibus, alius alui deiectionibus, euacuetur, alius ſecta uena ſanguinem detrahat, pro recepta cuiuſq; tum conſuetudine, tum animi quoque prompta uoluntate. Aëſtatis uero tempore tranquillitas expedit, laborum item alimentorumq; diminutio, quæ quidem

Aëſt.

Autumnus.

ex frigidiore genere ſunto: potatione quoq; uberiore uti, atq; omnia tandem quæ refrigerium humiditatemq; conciliant, adhibere conuenit. In autumno exactiorem obſervationem ac cautelam circa uictus rationem reſpoſtulat, quoniam omnino inæqualis ac inordinatus eſt, & morborum omnine genus facillime parit. Summo etiam ſtudio nitendum eſt, ne quid deſlinquatur circa refrigerationes. A Venere etiā potuſq; egelido cauendū. Matutinum porrò frigus, meridianumq; eſtum iuxta manibus pedibusq; declinare atq; effugere etiam ſtudebimus. Pomorū quoq; repletio uitanda eſt, moleſtiam quippe non ſaturitate modo, ſed quod κακοχολίαν, hoc eſt, uicioſum ſuccum, atq; ſtatus quoq; inferit. Optimi nanq; omnium fruſtuū ficus, ac uue, ſtatus excitant. Atq; niſi ante alias eſcas accipiantur, alimenta corruptū. Præ alijs uero ſerculis aſſumpti, neq; inſtant, neq; corruptunt. Vbi frigidiorem reddidit aër, pro algoris ratione corpus calfaciendū eſt, omniaq;

*Omnes fruſtus
ſtatioſi.*

Omniaq; perinde obrepente, atq; progressa hyeme, peragenda. Operæ quoq; precium fuerit, post æquinoctium, aut æquidiale, (quam *ionusclay* Græci uocant) euacuatione quapiam prædictarum rerum corpus inanire, ne quid superuacaneum per hyemem retentum, noxam inferat.

Victus ratio in negotio degentibus seruanda. Cap. LVIII.



10 **Q**uisquis in negotio degit, aut sese superiore uita exercitare solitus fuit, aut etiam dum exercitationibus uacat, diligenter animaduertat, facile ne illiusmodi cōsuetudinē sustineat, ita quidē ut neq; alijs identidem morbis, neq; anhelitus difficultate, infestetur. Huiusmodi quippe corporis naturam, haud quāq; in aliam consuetudinem alterare congruit. Neq; in totum etiam eius, qui non nisi ex longis quandoq; intervallis aduersa ualitudine prematur. Sed si perpetim quispiam ualitudinarius uideatur, idq; fertur plenitati acceptum, per uniuersam tum uictus rationem, quantumuis salutarē, hunc scopum tibi præfigas, ut is uidelicet deinceps iugiter quandam humorū symmetriam possideat: Sin humorum uitijs, ut ei quam saluberrimi cōtingant succi, remissis cōtendendū est. Quodcunq; igitur corpus plethora quasi saburratū conspicitur, eos prius lotos, mox frictionibus uti, parumq; agitari oportet. Quicunq; autem hæc facere anticipauerint, his nostro quidem cōsilio, 20 hæc eadem augere, tenuiusq; ali profuerit. Cæterum qui uitiosos humores cumularunt, neutiq; uno sanationis scopo curantur, eo quod multiformes sint uitiosorum humorum species. Quidam enim frigidiores, pituitosioresq;, quidam calidiores, felleumq; magis, nonnulli atræ bilis denique maiorem aceruū congerunt. Abstinentum itaq; cum à cibis tum potibus, qui acruatum humorem insita indole atq; natura gignere possunt. Quibusuis porro ex illis cōmune fuerit auxilium uentris deiectio.

Victus iter facientibus obseruandus. Cap. LV.



50 **I**tinis incōmoditatibus, atq; iniurijs etiam, minus multo uexabitur obesus, maxime quū lentius iter festinat. Perq; æstatē præterea mollis quædā fascia (quæ uocant Græci) sex aut septem digitorū latitudine, neq; minus q̄ quinque cubitorū proceritate, sinuoso quasi uolumine lumbos ad ilia usq; implicet atque inuoluat. Pedum quoq; subsidio uiatoribus plusculum fuerit: Vbi enim per decliue descendendū est, corpus inualidū ac ægre sese iam cōtinens, contastatuminis cuiuspiam uice fulcit, & sustinet: In accliuē uero scandentes, faciliore corporis motum eius præsidio perfici liquidō constat. Quocirca ab itinere dum iam cessatur, & inungere, & exiguum quiddam alimenti æstiuū promere, potionemq; moderatā hoc tempore propinare, proficuum sit. A prandio quoq; priusquam denuo iter quis arripiat, ad tempus quiescendū est. Quod si quē nolentē uolentē res ipsa proficisci impulerit, euq; 40 sitis aliquā premat, tenuē potentē in aqua cū sale exiguo utiliter bibat. Aestus porro solisq; ardores cauēdi sunt, neq; corpus etiā nudū in solare, imō ne ab itinere exiccatū indurescat, studiosius cooperire atq; uelare cōuenit.

Non minus mea
dendi scopus.

Scipio quid
opis ferat iter
facientibus.

Hoc quippe pacto & labor minus afficiet, & nullus memoratorum affectuum hominem corripiet. Hyeme quidem frigida, ante arreptum iter, euacuatum, & unctum, ciborum hyemalium partem bene magnam, positionis uero paululum, sumere, fasciâq; proceriore nō lumbos modo, uerū spinā quoq; ac pectus, probe ac scite inuoluere, expedit. Vbi uero trāquilitati quis se dederit, sub eiusmodiq; refectioe frigus fuerit intēsam, neq; ungitum, cibum uē ac potū, neq; recreationē quamuis aliam, capere praestat, si quis eo loco permanere uoluerit. Ad hoc, post diuturnam profectiōnem, cāterosq; labores ualidiores, etiam si quis nihil defatigetur, restitui tamen atq; mederi fatigatorum more non dubitet, quo scilicet minore deinceps molestia infestetur.

Leſitudo praeuenienda.

Nauigantibus quæ uictus ratio conueniat. Cap. LVI.



Uomitionibus quæ nauigantibus usu frequenter ueniunt, initio quidem ut ægre, ita inutiliter quoq; resistimus, siquidem plurimū opīs plerunq; ferre consueuerūt. Oportet autē à uomitione neq; multū, neq; sine discrimine quiduis alimenti offerre, sed lenticula cruda, siue cocta, cum exiguo pulegij adiecto, uesci. Panis aut nauticus uino diluto atq; perodoro bene maceratus esto: potatione porro modica, nempe uini aquosi, uel aceti mulsi, utantur. Cāterum lētes tantisper sunt elixandæ, quoad omnino molliores reddantur, mox dein de in farinam terendæ, arefaciendæ, tum deniq; in uas aliquod testaceum in eum usum reponendæ. Quū uero plusculum temporis crebræ uomitiones perseuerauerint, alimentis uehementer repressiuis utendū, exiguoq; potu, puta aceto mulso, in quo thymus sit maceratus, siue pulegium. Aqua item cum polline mixta, peraccommoda putatur. Quin uino quoq; odorato aqueo, quod polentę florem adiectū habeat, uti utiliter possunt. Aduersus porrō nauigiorū graueolentias, teterrimosq; odores, mala cydonia, aut thymum, aut pulegium, odorari debent. Et quamminimū quidem fieri potest, salum intueri oportet, donec assueuerit quis nauigijs tandem immorari. Danda postremo est opera, ut aque, quæ miscēt, lymphidæ, ac mundæ sint, neq; grauem aut foedum odorem, neq; salledinē præferant.

Panis nauigantium.

Quæ grauius nauium odorem auert.

Quomodo purgandi & extenuandi obesi. Cap. LVII.



Vm supra iustū adeo modum crassum est corpus, ac obesum, aliquandū sanē & expurgandum cenſeo. Calidiorē autē temperamentō, corpus ipsum macilentius, graciliusq; (ceu demonſtrātū est) redditur. Hoc igitur obesīs, quo ad mediocritatem reducantur, inducemus. Neq; te fugere, intellexisti enim, potest, quod exercitia ualida, nutricatus extenuans, medicamenta item quæ extenuandi uirtutem habent, animiq; sollicitudines, corporis temperamentum multo siccior, atq; ob id quidem corpus quoq; gracilius, reddūt. Tenuis itaq; uictus ratio uel cæco etiam perspicua est. Medicamenta uero ad hunc scopum efficacissima habentur, ruthæ semen, præcipue syluestris, unā cum acinis, malum teræ, quam Græci *πεισιλαχίαν τροχίλλου*, id est, aristolochiam rotundam

Medicamina extenuantia.

rotundam dicunt, tenue centauriū, gentiana, polium, & quæcunq; acrius impellunt lotium: Exempli gratia, petroselinon: horum nempe singula cum seorsim per se, tum adiectis unâ etiam alijs, abunde humores ut extenuant, ita quoque exhauriunt & euacuant. Porro adustarum quoq; uiperarum sales efficacem attenuandi uirtutem possident. Theriaca pariter & distrahendi & attenuandi potentia regnat. Inunctum item oleum, in quo cucumeris agrestis radix elixata sit. Necnon & altheæ, gentianæ, panacis, & mali erratici, id est, aristolochiæ, radices. Adjice (si uideretur) polium, atq; centaurium. Oportet aut alimentū non statim à balneis exhibere, uerū ut dormiant à lauacro priusquā cibū capiant, mandare. Satiū aut fuerit, si aqua lauacri ex rebus dissipandi facultatem habentibus constiterit, præsertim ubi ultro emergentis copiam habere possumus, cuiusmodi Mytilenæ datur cernere: Sin minus, salis flos aque marinæ confundendus est. Ad hoc uinum tenue atq; candens bibendum est. Præterea frictio sicca (*hyperpneia* græce appellata) quæ panno crassiore, citra lotionem & absq; illinitione conficitur, impen-dio satis extenuare potest. Cibi quoque minus, quàm exercitationis ratio postulet, offerre. Permultum uero diuq; soli exponere eufarcos, hoc est, corpulentos siue carnosos, expedit: quibus neq; uel tantillū miscere, neq; alimenta nisi semel duntaxat, offerre præstat. Frictione quidem asperiore, nitro uidelicet & salibus, corpus perfricetur: Multum etenim nitri, in lauacris non uulgarem extenuandi uim obtinet, breuiq; temporis progressu ad uberius alimentū, Græci *ωρραγία* uocant, ceu calcaribus quibusdā corpus irritat. Tenuius ad hæc præterea corpus macilentiusq; reddit, medicamentum quod piperis ac petroselinū duplum, asari uero & anisi dimidiū continet, id quod cum lotium tum alui quoq; excretionem pulchre promouet.

Theriac Mytilenæ.

Nitrum.

Quinam macilentū educandi sint. Cap. LVIII.



I autem macie confectos ac graciles admodum reficere studemus, uino utiq; crasso, dapibus crassioris succi, exercitationibus lentis, frictioneq; mediocri, & ut simpliciter dicam, omnibus, quæ cum proximo capite enumeratis ex diametro pugnant, restaurandi & uindicandi sunt. Profuerit autem plurimū ijs, trium aut quatuor dierum picatio. Si quis sobrius lauetur, anteq; lauacrum intraret, multū præsidij tulerit eatenus fricari, quatenus corpus ruborē quendam contractū præferat. Deinde dura quidem non tamen multa frictione cutim stipantes, densam atq; adeò solidiorem efficimus. Præterea qui iam decolorati redduntur, quiq; tabescunt, & alimenta non sentiunt, ijs furorem feruidiq; animi quædam irritamenta inducere confert.

Quomodo paribus attenuatis medendum. Cap. LIX.



Acies quæ membris quibusdam accidit, magna ex parte uel ob diuinam ipsorum desidā atque orficionem, uel propter perfractuum deligationis modum, oritur. Quocirca robore partium potentias, cōuellereq; sanguinis plurimū, cōuenit.

Frictionibus præterea moderatis, concinnisq; motionibus, atq; aspergi-
ne aquæ temperate admodum calidæ, utendū. Hæc uero tantisper facien-
da, donec affectæ particulæ ruborem tumoremq; contrahant, et priusquā
remittantur, desistendum est. Operæ precium uero fuerit partem, quo do-
cuimus modo, pice illinire, quam quū gelidiorē senseris, si donec ac ca-
lorifico quoque medicamine confricare. Ipse quidem tapisia nonnunq;
aliās ex melle, aliās cum cerato usus sum.

Optimæ temperaturæ inditia. Cap. LX.



Optimi temperamenti homo est, ubi corpus ab omnibus extre-
mis ad unguem parī distat spacio: uerbū causa, maciei, obesitatis, 10
tis, mollitiei, duritiei, ardoris, algoris, humiditatis et siccitatis,
atq; uno uerbo, quum non naturalia modò, uerum & animalia
munia ad eò exacte, ut ne Momus quidem illam carpendi causam habeat,
obierit: ad amissum quoq; mediū hispidi, glabriq; atri item coloris & can-
didi, obtinuerit. Capillos præterea puer quidem rubicundiores q̃ nigrio-
res, adolescens uero contrariò planè modo habeat.

Quæ sint malæ temperaturarū corporum notæ. Cap. LXI.



Vacunq; corpora temperate sunt calidiora, ut dentes citius
edunt, ita quoq; ad augmentū celerius maturāt, palpantibusq;
calidiora cernuntur. Pinguetudinis quoq; minus possident. Co- 20
lore autem rubro, atro capillitio, mediocriter hirsuta, & amplis
admodum uenis existunt. Quod si quis pinguis crassusq; iuxta fuerit, ac
uenas simul latas habere uideatur, is consuetudine potius quàm natura
pinguetudinem accersit.

Frigidioris temperaturæ signa.

Frigidioris uero temperamenti notæ sunt, quū gelidum palpantibus,
glabruq; ac pingue corpus apparet. Color istiusmodi unā cum pilis quo-
que rufior est. Et si frigiditas plurima exceßerit, colorem liuidum ac plum-
beum præferunt, arcioresq; oculis contemplantur uenæ. Ad hæc, graci-
lis si fuerit eius temperaturæ quis, neūquam sanè necessariò, sed consue- 30
tudinē talis euasit.

Siccæ temperaturæ signa.

Cæterum aridum temperamentū tum durius, tum & macilentius sem-
per medio temperamento, & subhirtū, quandoquidē à sicca temperie in-
separabilis omnino durities est. Porro gracilitas nō congenitas modo co-
mitatur temperaturas, sed ascititias etiam, quæ ex longa cōsuetudine pro-
ueniunt, sequitur. Argumentum uero duritiei ariditatisq; fuerit, si corpus
ægre moueatur, & siccum interim ac squalidum, ex illis quæ sunt arefa-
ciendi uirtute prædita, redditur.

Humidæ temperaturæ signa.

Humidum quidem in reliquis fere omnibus bono temperamento re- 40
spondet, uerum molliore & carnosiore corporis mole est, à qua neq; mol-
lities neq; crassitudo separari facile potest, propterea quod nō cognatam
ac insitam solum sequitur temperaturam, sed quod ex diutina quadam cō-
suetudine

suetudine cōstituta, substantiam habeat. Peculiare uero maditatis inditiū est, onerari ab humidioribus corpus.

Calidæ & siccæ temperaturæ signa.

Quibus calidum atq; siccum fuerit temperamentum, si extreme denso ac hispido sunt corpore: capitisq; cesaries ipsi in tenera statim ætate facile in capite ortum habet, quam atram quoq; & multam illico in lucem editi nanciscuntur: Progressu uero temporis caluities atq; glabreta comitant, & uenas latiores adipiscunt, arteriæ pariter & amplæ sunt, & uehemētio re ictu percutiunt, uniuersumq; simul corpus ualidius, solidius, atq; firmū, lacertosum item & macilentum conspicietur. Cutim uero cum durio rem, tum atriorem obtinent.

Frigidæ & humidæ temperaturæ signa.

Quum uero egelidū ac humidū temperamentum fuerit, thorax cum reliquo corpore angustus, ac glaber est: cutis tenera, lenis, candida q; capillitio subrufo, præcipue per suæ ætatis iuuentutem: neq; in senectâ caluescunt, neq; glabricitant. Sunt præterea huius temperaturæ adeo formidolosi, ut uel muscas præteruolantes expauescant, & trepidant: segnes, obscuris uenis, crassi, pingues, cruribus ac lacertis imbecillibus, inualidis atq; incompōsitis, & lingua plerumq; titubante sunt. Quod si modum mador frigiditasq; permultum exceßerint, color hominis unā cum capillis rubens erit: & si longe lateq; plus æquo intendantur, luridus.

Calidæ & humidæ temperaturæ signa.

Calidum ad hæc humidumq; temperamentū, & mollius est, & carne magis abundat, q; optimū & inculpatum. Si enim uehementer augeatur, promptius his quæ ex putrefactione proficiuntur ægritudinibus, corrumpitur: Sin humidius paulò quidem, sed multò calidius temperamentū sit, molliores sanè utcunq; tales bene temperatis, & corpulentiores, nō uero paulò hispidiores euadunt. qui & multo tangentibus calidiores apparēt.

Frigidæ & siccæ temperaturæ signa.

Quod si frigidum unā cum siccitate exacta quadam paritate intenda, natura durius, & gracilius habent corpus, candidum item & parum musculosum, imbecillū quoq; ac depile, tactu uero frigidum uidebitur: pinguedo pariter (etiam si tenuia sint eiusmodi corpora) inter carnes hinc inde intercalata cernit: capillitij uero color, frigiditatis modulo proportionatq; amussatim, ut ita dicā, respondet. Quin quod ad animi mores spectat, pusillanimes, meticulosi, mœstitia quodāmodo semper perculsi, eiusmodi temperaturæ homines sunt: atq; ut uno uerbo perstringā, in temperamentorū coniugatione semper uincentis qualitatis notæ dominabuntur.

Defiguratione capitis. Cap. LXII.

Hixium herelé caput, uitiosam cerebri supellectilis constitutionem cōposituramq; peculiariter significat: neq; tamē ob id ingens, necessariò bonæ cerebri constructionis nota habetur. Nam si propter insitæ potestatis robur multam ac optimā ma

Notæ à figura
capitis bonæ.

Notæ ex ijs
quæ à capite
oriuntur.

gōfæ

teriam fingentis conueniat, bonū utiq; inditium : Sin uero propter materia duntaxat copiam, certe malum. Proinde distinguenda sunt hæc, forma scilicet capitis, & ijs quæ inde originem ducūt. Ex forma quidem, si decens omnino atq; concinna est, nunq; profecto mala hæc nota censenda. Ex ijs uero quæ ab ipso capite nascūtur, si scite disposita sunt, & quicquid neruorum est, copiosa nutritione bene coaluit, firmitatēq; obtinuit, & lynceo, ut ita dicam, perspicaciores insunt oculi. Acuta uero & pyramidis instar fastigiata capita, quæ gōfæ græce dicunt, deficientē seruant in fronte siue occipite eminentiā, uel supra q̄ conueniat auctam. Quemadmodum itaq; capitis cum magnitudine tum paruitas, sic hæc quoq; tam distortæ reprehenduntur figuræ : quanquam nonnunq; rarer tamen nonnullæ ceu bonæ cōmendantur, ubi singens scilicet potentia robustior extiterit.

Quæ sint temperamenti cerebri inditia. Cap. LXIII.



Mediocris temperamētī cerebrū, animalium functionū, retrimentorumq; mediocritatē continet, minimeq; gentium à singulis quæ foris occurrant, offendit. Signa uero caliditatis cerebri hæc sunt:

Notæ calidi cerebri.

Capitis quidem capillamentū per infantiam subrufum habent, in puerili uero ætate subflauum, in adolescentia deniq; redditur flauum, idēq; medium omnino inter ad unguem crispum & rectum ac simplex spectatur, neq; procliuiter calui fiunt. Si calidius eo quod pari spacio ab utroq; extremorum abest, fuerit, cūcta quæ caput ambiunt calidiora & rufiora uidentur, & oculorum uenæ uisum non effugiunt, coma capitis mox in lucem editis promicat. Et quum plurimū in caliditate à mediocri temperamento recesserint, nigra, fortis, atq; crispa. Quum uero nō multum, principio quidem subflaua, mox deinde nigricat, progredientibus uero ætatibus caluitium facile admittunt. Retrimenta eiusmodi pauca habent, quum inculparam ac integram habuerint sanitatem. Implentur atq; aggrauant eorū capita caloricis cum esculentis, tum poculentis, tum odoribus, atq; ijs quæ forinsecus incidunt. Breues autem somni, minimeq; profundī, id genus temperamenti sufficiunt.

Notæ gelidi cerebri.

Qui frigidius q̄ par sit cerebrū habent, huiusmodi inditijs deprehendunt: Redundantiæ bene multæ per proprias effluxiones priuosq; meatus defluunt: cæfaries recta, rubicunda, stabilisq; leui præterea momento à gelidis causis offendunt, κατάρσις em̄, id est, destillationibus, & κρησίνες, quod est grauedine, sine interuallo corripunt: luminū uenę inuisibiles, oculis nō usurpātur: ad hæc somno, ne dicā sopori, quodāmodo dediti cōspiciunt.

Sicci cerebri signa.

Aridioris uero cerebri notæ censentur: Nulla meatuum redundantia, sensuū summa & exacta cōsummatio, perspicacitasq;. Ad uigilias proprii sunt eiusmodi: robustissimos statim atq; in lucē editi sunt capillos, crispioresq; interim, producunt, uerum breui tempore caluere incipiunt.

Humidi

Humidi cerebri inditia.

Humidioris uero cerebri inditia sunt, capillamentum planum, neq; unquam calui sunt, sensus aut caliginosi ac turbulenti, superfluitatum abundantia, somni multi atq; profundi. Et hæc de simplicibus distemperamentis cerebri.

Signa calidi siccis cerebri.

Quibus uero cerebrum calidum & aridum fuerit, excrementis uacant, sensibus regnant uigentes, plurimum uigilant, & celerrime caluitium admittunt: & prima quidem capillorum origo ocyssima, ac plurimo abundans alimento, nigricant capilli, & calidi tangentibus caput apparent, & sunt usq; ad summi incrementi (Græci ἀκμὴν appellant) ætatem rubicundi.

Calidi & humidi cerebri inditia.

Coniugate in-
temperaturæ.

Sed ubi caliditati maior quoque accesserit, pauculumq; modo utraq; à summis finibus equaliter distans mediū superant, ijs cum uenustus color, tum & calor, et prominentes in luminibus uenæ apparēt, superfluitatū copia modice decocta, capillitium rectū, uergens ad flauum, quo quidē haud prompte destituuntur. Rebus calfacientibus & humectantibus eiusmodi capita facile replentur, & grauedine citius infestantur. Quod si uehementior calor humiditasq; creuerit, his caput fit omne ferē genus egritudinibus obnoxium, & retrimentis abundans, multoq; celerrime à calorificis humectantibusq; lædi cōsuevit: neq; diuile uigilare possunt: cum aut somnus subreperit, imaginationib. per somnia obruunt: species oculorū caliginosa ac turbulēta, ac ne sensus quidē ad unguē absoluti uitio carent.

Quid incom-
modi incubat
calido & udo
cerebro.

Frigidi & siccis cerebri signa.


Gelidum uero pariter & siccum cerebri temperamentū, frigidū quoq; & minime coloratum caput efficiunt: oculorū uero uenas latentes & obscuras obtinent, & à causis frigidis prompte offenduntur, eiusq; rei gratia inæquali sanitate fruuntur: sensus per iuuentutem quidem ad amissim exactos & inculpato possident, sed progrediente ætate mature tabescunt, marcescuntq; atq; (ut uno uerbo eloquar) ocyus celerrimam circa caput senectutem minantur. Porro in lucem editi, capillos uix tandem male coalitos siue nutritos, atq; etiam rufos producunt.

Signa cerebri frigidi & humidi.

Hudum postremo egelidumq; cerebri temperamentum his signis deprehenditur: Vaternola pariter & somnolentia hominem tentat: sensus quoq; hebetes minimeq; uigentes, atq; excrementis redundantes reddit: algortales facile molestat: plenitate caput temere afficit: destillationibus grauedinibusq; prompte tentantur huiusmodi temperaturæ, neq; tamen hi caluitiei admodum obnoxij sunt.

Quæ uentriculi temperaturæ inditia. Cap. LXIIII.

Signa siccis uentriculi.

40  Entriculi natura quidem siccioris notæ sunt, si quis mature siti quidem uehementior e prematur: sed exiguis tamē potionibus sedatā plurimis quippe grauedine & fluctuationibus afficiunt,

quum superfluitet id quod abundat: ad hæc, cibarijs plerunq; aridioribus capiuntur.

Humidi uentriculi signa.

Humidioris aut inditia sunt, quū neq; siticulosi fiunt, & humorē superabundantem facile tolerant, & edulij oblectantur humidioribus.

Signa calidi uentriculi.

Calidior præterea natura uenterculus, exactius quidem cōcoquendi q̄ appetendi functionem absoluit, præcipue si dura & coctu difficiliora ingerat; delectatur pluribus tum cibis tum potibus, neq; quicquam gelidis, si moderatus ipforū fuerit usus, leduntur.

Frigidi uentriculi inditia.

10

Frigidior uero natura uētriculus, ut appetendi quidē uirtute uiget, ita coquendi munere friget, maxime si ijs quæ suapte natura difficulter cōficiunt, & frigidis alimentis, oneret: procliuē enim in ipso acescunt. Amat uero gelida, sed facile ab eorundem immodico usu offenditur. Praue uero temperaturę, quę morbi ratione uentriculū occupant, hoc à cognatis dissident, quoniā cōtraria, neq; uero similia affectāt, quemadmodū naturales. Quocirca si uenterculus decoquendo probe sua exequitur munia, *διεργάζετο*, quod est temperatus, dicitur: sin secus, *διωρράζετο*, quod male temperatus sonat, est. Quod si fumosas ructationes edit, atq; uaporosas etiam exhalat, immodicus igneusq; est eius calor: Sin acidas, planē e contrario, nempe 20 frigidus. At qui cibaria cōcoctioni resistentia consumunt, iustum caloris modum excedunt: Qui imbecillo sunt calore, hos minime conficiunt, sed pisces facillime cōcoquunt. Consideratione uero quadam obseruandum, propter humorem ne aliunde admeantē symptōma fiat. Phlegmatici namque acidum, biliosi nidorosum, uirosū, aut alias quaspiam qualitates absurdas, alienasq; ructant: utrosq; autem nausea infestat. Atqui ubi sanē si nuosum crenosumq; uentriculi loculamentū uisiosi humores infartientes, superfluxerint, uomitu eijciuntur: uerum in tunicis hostioli uentris cōtenti humores, inani nequicq; ad uomitiones nausea uellicant.

De imtemperaturis cum uentriculo coniugatis, atq; adeo de inditijs pulmonis. Cap. LXV.

30



On uenterculus modo siticulosos, & ab omni planē siti uacuos reddit, & frigidi calidi uē potus appetentes, sed ea quoq; uiscera quę in thorace sunt, uerbi causa, cor & pulmo, atq; adeo ipsum quoq; hepar, sitibūdos efficit: & quū potauerint, nō pro tinus leuantur siti, & potius quū frigidū hauserint, q̄ quū calidum nimis, eorū cōpescitur sitis. Refrigerat aut eisdem & gelidi aëris inspiratio, quū ne tantillū quidem solatijs eis adferat, qui uentriculi ratione sunt sitibundi.

Pulmonis frigidi inditia.

Ita & hi qui contrario modo, uel ex diametro, ut dicitur, sese habere uidentur, ab egelido inspiratu sensu perceptibilem omnino sentiunt affectum: & hoc quidem summum ac maximum esto frigidi pulmonis inditium. Quin & pituitæ excrementa cum sreatu & tussis expuunt.

40

Signa

Signa pulmonis aridi.

Cæterū quemadmodū pulmonū siccitates ab omnibus retrimētis, atque adeo pituita sunt uacue, ita & humidi excrementis maxime abundant: uocem reddunt raucam: Superfluitates enim talibus identidem intercidunt, præcipue quū uehementius aut acutius uerba facere contenderint.

Quibus nam cordis temperaturæ notis deprehendantur. Cap. LXVI.

Signa cordis calidi.

Simplicis temperaturæ cordis indicia.

10 **C**ordis quidem feruentioris notæ censentur, amplitudo respirationis, percussus seu pulsus cū uelocitas tum frequētia, quādoque audacia, & furiosa temeritas, thorax hispidus, et pectore tenus comprimis, & ea quæcūq; sunt hypochondrijs partes proximiores. Magna uero ex parte, & uniuersum ferè corpus calidū, calidi cordis temperatura reddit, nisi iecur uehementius obstitit. Præterea ingens thoracis capacitas, grandisq; latitudo, ceu caliditatis inditium notatur, nisi & hic quoq; magnopere cerebrum renitatur.

Notæ cordis frigidi.

In frigidiore uero corde percussus temperatis minores existunt: metuculofo natura sunt genio præditi, eiusmodi temperaturæ cor fortiti, & pusillanimes, sine audacia, maxime si nudum pilis habuerint pectus.

20 Cordis siccit indicia.

Cor siccius duriores reddit pulsus, & iram minus quidem procliuem, promptamq; sed ferocem, & quæ non facile placari queat, atq; magna ex parte totum simul corpus siccius, nisi hepar cum uicinis partibus renitat.

Notæ cordis humidi.

Humidius cor arguunt percussus molles, mores ad iram quidem procliuiores, sed ocys pacabiles, atq; uniuersum corpus humidius, si hepar non resistat.

Signa cordis calidi & siccit.

30 Calidum & aridum cordis temperamentum indicatur è percussu cum duro, tum magno, tum ueloci, tum deniq; denso: Item respirationibus magnis, perniciousibus, & crebris: et sunt omnes eiusmodi pectore pariter & hypochondrio hispidissimo: cæterū ad functiones expediti, animosi seu iracundi, impudentes, moribus tyrannicis: atq; ut sunt quidem ad furorem admodum proni, ita facile pacari nequeunt.

Notæ cordis calidi & humidi.

Compositæ cordis temperaturæ signa.

Quod si calor & humiditas iuxta excefferint, minus quidem prædictis sunt hispidi, uerum ad munia quæq; promptissimi: animo minime quidem fero, sed ad iram duntaxat prono: percussus magni, molles, ueloces, atq; frequentes.

Notæ cordis humidi & frigidi.

40 Si cum humiditate frigus uicerit, percussus quidem molles, moribus uero pusillanimes, sed timidi & desides existunt: tales glabro sunt pectore: & ut nunq; insaniunt, ita minime ad iram facile commouentur.

Notæ cordis frigidi & aridi.

Cor deniq; gelidū & aridū percussus quidē duriores reddit ac paruos:

Ei uero prę omnibus ab ira sunt alienissimi, sed semel perciti, iram mordicus retinent: maxime uero omnium pectus habent pilis nudissimum.

Iecoris temperaturę inditia. Cap. LXXVII.

Signa calidi iocinoris.

*Incompositę
iocinoris inter
periri note.*



Ecoris calidi notę sunt, amplitudo uenarū, flaua bilis abundantior: tempore deinde status, summiq; incrementi, (æquā Græci nominant) sanguinē habent tales calidiorem, & ob hoc uniuerso etiā, nisi cor ipsum reclamet, corpore, uentre, ilijis, præcordijs ue, hirsuti spectantur.

Notę iocinoris frigidi.

Frigidioris uero iocinoris inditia sunt, uenarum angustia, pituitę abundantia, sanguis gelidus, atq; totius quoq; corporis habitudo frigidior, nisi cor nō nihil caloris per corpus diffundat. Venter & ilia glabra.

Sicci iocinoris notę.

Siccioris notę sunt, sanguis cum crassior, tum & minime abundans, uenę aridę, atq; durę, uniuersusq; corporis habitus aridior.

Iocinoris humidę notę.

Humidioris uero hepatis inditia sunt, sanguis copiosus & liquidus, uenę molliores, pariter & uniuersum corpus, præterq; ubi cor obstiterit.

Calidi & aridi hepatis signa.

*Compositę in
temperantie
hepatis note.*

Calidi simul et aridi hepatis signa sunt, ilia hirsutissima, sanguis crassior & minus abundans, amari fellis cōplurimū, atq; per uigoris ætatem atrii, uenarū latitudo & duritia, pari modo corpus simul uniuersum & calidum & aridum: quoniā calor à corde proueniens, frigiditati quę ab hepate proficiscitur, facile dominat, quemadmodū & caliditas à frigiditate uincitur. Frigiditatem uero nequit cor humidius ad contrariam naturā traducere. Ad hæc liquidō cōstat, quod ubi in unum utriusq; principij temperamentum confluxerint, ad unguem omnino corpus secundum illas afficietur.

Calidi & humidę iecoris notę.

Verum calidum & humidū iecur, minus quidem hirsutum reddit præcordium (καρδιόειπον dictum) quā calidum & aridum, sed plusculū sanguinis, uenas amplas, habitudinem humidam ac calidam parit, nisi cor uehementer resistat: Si uero permultus supra iustum nature modum fuerit utriusq; qualicatis excessus, hoc pacto affecti, in morbos qui ex putredine, uitiosisq; succis proueniunt, procliuer prolabuntur. Idq; longe magis, si plurimum humiditas, calidum uero paululum, augeatur. Vitiōis præterea humoribus corripiuntur.

Humidi & frigidi iecoris signa.

Humidius hepar ac frigidius pilis nudum habet præcordium, sanguinem reddit pituitosiores, uenas arctas, uniuersumq; corpus consimiliter infestat, nisi à corde in contrariam partem traducatur.

Frigidi & sicci hepatis signa.

Frigidum uero & aridum iecur parū sanguinis, uenasq; angustas reddit.

dit, corpus frigidius, præcordiū glabrū, nisi in hac re quoq; cor imperet.

De notis temperaturæ testium. Cap. LXXVIII.

Calidæ, frigidæ, humidæ, & aridæ temperaturæ testium inditiā.



Alidum sanè testii temperamētū procliue fertur ad libidinē, & mariū est opifex, et fœcundū: genitales partes protinus obsepit pilis, & circūiacentes quoq; locos cōtingit. Frigidius uero contraria efficit. Humidū, semine cum multo, tum humido abundat. Aridū uero parū quidē seminis genitales, sed crassum generat.

Calidæ & aridæ temperaturæ testium notæ.

- 10 Calidum & aridum testiculorū temperamētū semen modice crassum producit, & fœcudissimū est, & celerrime ad cōgressum mox à principio stimulat animans. Proinde ocyslime eiusmodi temperaturæ homines genitalibus uicinisq; partibus hispidi reddunt, superne umbilicō tenuis, inferne uero ad media usq; fœmora, petulci, uehementiq; impetu prolabant & irruunt in Venerem, sed continuo satiantur: at si cogant, iacturam faciunt.

Signa calidi & humidī testiculorū temperamenti.


- Quod si humiditas calori adglutinet, hispidi quidē illiusmodi sunt, genitaliq; magis abundant semine, neq; sanè in libidinē proniores alijs, sed minore detrimētō Veneri præter modū indulgēt. Si uero utraq; hæc, calidum & humidū, modū uehementer excefferint, haud sine detrimētō à Vene

20 reis abstinent. Frigidī & humidī testiculorū temperamenti notæ.

Si præterea testiculi frigidæ ac humidæ temperaturæ fuerint, uicinae undiq; partes glabrescunt, & serius futuere incipiunt, neq; procliues in libidinem irruunt: Aqueum & tenue semen habent, inefficax atq; infœcundum, muliebris modo sexus procreatum.

Frigidæ & siccæ testium temperaturæ notæ.

Aridū deniq; & egelidū testium temperamētū per cætera quidē ante dictæ ad amissim respōdet: sed crassius, & omnino paucū eiusmodi tēperaturæ semen genitale existit. De omisiss. Cap. LXXIX.

- 30  Væuis nostri corporis particule priuato quopiam cum temperamento, tum effectu præditæ sunt, uerū de omnium in præsentia notis differere non est operæ precii, quum infinitæ propè modum sint, & rem nobis omnē compendio perstringere sit propositū: super his modo differentes quæ unā maxime uniuersum quodque corpus afficiunt. De cæteris per earundē methodū ratiocinandū ducimus, non ab excrementis modo, uerum ex reliquis etiā tum functionibus, tum symptōmatis, ipsarū temperamenta indagantes. Tempus igit, ne dicam, res ipsa postulat, ut ad ea, quæ incōmodas totius corporis temperaturas emendare possunt, reliquam orationis partem cōuertemus.

- 40 Qui calidæ corporis distemperantiæ corrigi possint. Cap. LXX.



Vando igit in calidis intemperaturis flaua bilis plus iusto abundat, dū sanè per inferna subit, nec quicq; negotij facessere neq; satage re liquidò cōstat: Cū uero sese ad superiorē uētriculū recipit, post

Epitomen
dit Arginetæ.

exercitium, ante cibum, epota aqua, uomitione euacuandum est. Ad hæc, magna cum utilitate tales exercentur, nō quidem citata exercitatione aut ualida, sed deside, & blandiore. Sunt qui dum uehementer calent, nihil planē exercitationis admittunt, sed inambulasse, atq; lauasse sat habent. Quin à cibo etiam balneis capiuntur, ac gaudent potissimum.

Calidæ & siccæ intemperaturæ medela.

Qui cum calore simul aridi sunt, ei sanē humenti nutrimentu indigēt, neque tam humidis cibarijs, q̃ & id genus balneis. Ab exercitationibus uero tum plurimis, tum uehemētioribus abstineant. Aestatis idcirco tempore citius lauare, deinde post cibum denuo, debent. Gelida quoq; potio præsentissimo illis est præsidio.

Aridæ diffemperaturæ remedia.

Siccis præterea intemperaturis nihil sanē alienius est Venere: à laboribus itēm, æstu, solitudinibus, uigilijsq; quā fieri maxime potest abstinendum eiusmodi temperaturæ hominibus præcipio.

Humidæ temperaturæ medela.

Temperamenta porrò natura humida in ætate pueritiæ affectionibus, causæ rationem ex defluxione & plenitate & putredine habentibus, tentantur. Quare exercitationibus multis, & ad unguem facta in uentre decoctione, atq; per lotium quoq; secretionē, egent. Hisce iterū atq; iterū priusquam nutrimentū quid capiant, lauari, & thermis naturalibus uti, plurimum prodest. Atqui prospiciendū est, ne defluxionibus, balneis, exercitio longo, ante cibum molestent: secretionē pariter quæ tam per lotium, quā interiorē aluum fit. Apophlegmatismis etiam interdum atq; purgationibus, edulsijsq; boni succi, ac uino deniq; urinam ciente, utendum.

Qui frigidæ intemperatiæ corrigantur. Cap. LXXI.

Sicca intemperatiæ pessima.



Elidorū intemperamentorū tria habentur discrimina: quorū omnium quidem insaluberrimū est aridum. Nam quod in ætatis processu grandioribus natu accidit, id ab initio statim tales infestat. Proinde humectandi calfaciendiq; sunt eiusmodi, id quod pulchre quidem exercitationibus modicis, cibis humentibus ac calidis, uini calidioris nature potatione, somnoq; diuturniore ac prolixiore, conficit. Nobis præterea diligenter, ut omnes quæ singulis diebus in corpore saburrant redundantia superfluentes, euacuent, prospiciendū. Venus aridioribus simul uniuersis officit, potissimū si cum siccitate frigiditatē copulāt: Solis ea calidis & humidis innocua est. Vitiosæ quoq; temperaturę censent, quæ sunt unā cum humiditate frigide, frequēter enim egrotationibus, quæ ex defluxionibus oriunt, solēt corripī: Talibus aliorū, exercitationes itēm crebræ, tenuior nutritus, & linimēta deniq; modice calidiora, opitulant. Quicunq; porrò frigidiores quidē natura existunt, modū uero siccæ ac humidæ temperaturę iustum obtinent, horum calor tum excitandus, tum roborandus est. Quod postremo ad humorem & ardorem attinet, aurea in uniuersa uictus ratione cōmendatur mediocritas.

Venus nocet aridis & frigidis.

Siccorū

Siccorū distemperamentorū in uentriculo exempli loco, paulō uero post reli-
quarum etiam intemperaturarū, medela. Cap. LXXXII.



Ridorum quidem distemperamentorū aliud sanē in elementa-
libus solidæ essentiæ corporis partibus, (quas Græci ὁμοιομερῆ
σώματα, quod est similes, nuncupant) consistit, quum uideli-
cet aridiores, quā modo naturæ cōueniat, illæ redduntur: Id
(per louem) deploratum est, neq; uel Aesculapius ipse facile succurreret.
Aliud uero peculiari humiditate, qua corporis partes alūtur, penitus de-
perdita, in substantia ex humore compacta, constitutum est. Hæc per sin-
gulas animalium partes roris instar dispersa, pulchre quidem in iisdem
continetur, sed absq; alimentorum beneficio in partibus reponi nequit:
quare perardua fuerit talium quoq; affectum medicatio.

Similariū para-
tū ariditas nul-
lo medicamento
nimitur.

Ariditatis uenarum arteriarumq; prædida.

Siccitatibus uero quæ in exiguis cum arterijs tum uenis cōsistunt, haud
admodū difficulter mederi datur, si incōpositas partes singulas peculiari
humore suo humectantium alimentorū exhibitione impleuerimus. Non
alienū itaq; fuerit, ægrotantem in aqua balnei mediæ temperaturæ diutū
lē immorari: Post lauacrum illico lac recens emulctum propinandum est.
Oportet autem mellis tepidi nonnihil, sed non ita multum, lacti confunde-
re: deinde tranquillitati, ad secundum usq; balneū, permittere: tum deni-
que mediocriter, oleoq; pingui cōfricandi, quicunq; in hoc statu constitui-
ti, sunt, donec exhibitum lac ad unguem confectum, non ex ructibus mo-
do, uerum ex uentriculi etiam tumore liceat colligere. Moderatum præ-
terea temporis interuallum, quatuor uidelicet aut quinq; horarum æqui-
dialium, inter primum atq; secundum balneum intercaletur, si tertio homi-
nem lauare institueris: sin uero minus, plurium. Porro à singulis quibuscq;
balneis ipsum oleo, priusquam uestibus amiciatur, obliniendum censeo.
Quin à secundo quoq; balneo lac magna cum utilitate exhibebitur, si eo
delectetur: sin secus, prifanam ad amussim, ut aiunt, elixatam, uel alicam
prifanæ modo confectam atq; præparatam, quam Græci χυρδὸσπιοναίω ap-
pellitāt. Deinde tranquillitate quietē ue denuo interposita, uel ad tertium
lauacrum uel ad cœnam agemus. Panis præterea quo uesci oportet, exi-
mie atq; egregie præparatus, probeq; clibano (unde κλιβάνος à Græcis di-
citur) assatus, et syncerus, minimeq; impurus esto. Obsonij loco sumant pi-
sces saxatiles, siue Oniscos piscis, quem Romani asellum, nōnunq; mille-
pedam dicunt, Græci etiam banchon, & chellarem, siue gallariam nuncu-
pant, è iure candido: Atq; ut summatim perstringā, caput recte educatio-
nis, in eiusmodi corporis statu est, ne quæ esui sunt, concoctioni renitant,
sed nutrimentū exquisiti, optimi, neutiq; glutinosa, neq; plurimi retrimen-
ti. Potum præbeat uinū dilutum, colore candidum, non impurū, nullarū
fermē uinū. (si modo ἐλκυστός hoc quicquid est interpretamenti admis-
sit) clementē quandā adstringendi facultatē habēs. Summæ quidē ac ma-
ximæ siccitatis remedia hæc (quæ hæcenus recensuimus) habentur.

Caput educa-
tionis status
aridi.

Ariditas mediocris non tam exactam ad unguem uictus rationem desiderat, neque solidiorem ualentiorisque alimenti nutritiū abhorret: Verū in medium ponatur nobis ariditas superiori haudquaquam absimilis, cui mediocris quædam fuerit copulata, & tanquam adglutinata frigiditas, in qua certe calorificorum materia pro frigiditatis modulo scite muranda est: prædictis namque hucusque, de eadem re non nihil adiiciemus: lactis quidem usui, plusculum mellis, uinum non tam dilutum quam id quod propositum est, exhibebimus, sed meracius. Quin & cibaria caliditatis feruentioris, non naturalibus modo atque insitis temperamentis, sed nuper etiam accersitis ascitijsque qualitatibus, administrari nullo incommodo possunt. Porro nardino aut mastichino unguento eiusmodi temperaturas iugiter ungendas censeo.

Frigiditatis ariditatisque præsidia.

Contingat in
temperici præ
sidia.

Si uero plurima frigiditas cum siccitate iustum modum longe excesserit, tale quidem temperamentum ut multo difficilimum iudicatur, ita cum primis correctioni renititur. Verum uel eisdem ei medicamentis, uel mel le per se elixato despumatoque, opitulatur. Vinum quoque admodum uetus eisdem eligendum existimo. Nihil est quod aliud salubrius ita affectis medicamentum, requiras eo, quod picatores iugiter usurpant, uentriculolium, & etiam dum calidum, priusquam refrigeratur auulsum: dormire præterea cum puerulo eusarco, ita ut is superiorem uentriculum perpetuo attingat. eiusmodi temperamento non facile inuenias quicquam magis idoneum.

Ariditatis & caliditatis modicæ medela.

Vbi uero ariditati mediocris caliditas commisceatur, in hac quidem temperatura primam illam educationis rationem obseruare conuenit, ne uidelicet mellis unquam uel tantillum degustent, in hac affectione constituti, minimeque gentium uina peruetusta hauriant: cæterum edulia tepida ac lactea offerre, & uentrem cum omphacino, tum melino perlinire conducet. Verum immodico quodam studio eos qui ita afficiuntur infrigidare, discrimine minime uacat, quoniam febris quodammodo naturam hic status æmulatur, ubi calor uidelicet supra quam par sit, modum excesserit.

Calidæ & humidæ distemperantiæ præsidia.

Supponamus ediuerso calidam quidem intemperiem excedere, sed ei humiditatem iungi atque annexi: Eiusmodi sanè intemperamento, aquæ gelidæ porione opitulabimur. Salutaris atque peridoneus etiam fuerit tum frigorificorum, tum constringentium esculentorum usus. Sunt autem & istæc alimenta sic austera, ut calfaciendi interim potentia careant.

Humidæ intemperaturæ solitariæ remedia.

Si uero humidum distemperamentum sine additamento solum fuerit, are facientia alimenta, quæ neque calfaciendi neque refrigerandi uirtutem habent, præsentissimo sunt præsidio. Conseruetur idem præstar portionis defraudatio & abstinentia.

Humidæ & gelidæ distemperantiæ subsidia.

Cæterum humidæ intemperantiæ cum frigore copulatæ, haud meliora subsidia

subsidia inueniuntur, quàm quæcunq; acrimoniam quandam præferunt, admixtis interim quæ adstringēdi facultatem sine euidenti uirtute frigidifica obtinent. Eximium quoq; ita affectis fuerit auxiliū, modica potio, præsertim uinorū apprime calfacientium. Eiusmodi igitur habemus malarum temperierum quæ in qualitatibus consistunt, suppetias. Quoniam aut humor qui uel in sinuoso uentriculi loculamēto (sic enim *κυστα* interpretor) continētur, uel in tunicis ipsius impactus est, distemperamentū subinde conficit, haud absurdum (arbitror) fuerit, de ijs quoq; sermonem facere.

- Quare si quem prior affectus tentauerit, euacuato uomitu humore facile
 10 compescitur. Quod si rursus ex alia quadam, aut alijs proueniat partibus, adamussatam indagationē requirit. Causæ quippe exacta cognitio protinus curationē excipit: Quando uniuersam medendi rationem mittenti particulæ adhibere oportet, suscipiēti uero interim prospicere atq; succurrere, ne tam procliuē quod influit suscipiat. Quam quidē prouinciā non adstringentia solum, sed ea etiam quæ euexiam, id est, bonā corporis totius
 20 habitudinem conciliant, pulchre absoluunt. Vitosos uero qui in uentriculi tunicis continentur succos, medicamentis molliter purgātib; educere expedit: ē quorum numero est aloē, & quod inde præparatur medicamen, amara, *ωίπε* Græcis appellata, & nō raro *ιψη*, quod est sacra. Lentus porro atq; uiscosus simul uētri impactus humor pituitosus, primo dissectandus, atq; ita deinde expurgandus est. Vbi uero quis opportunus & appositus fuerit, uomitione, radiculæ beneficio, eijciendus: Sin aut neq; glutinosus, neq; crassus humor infestat, satis fuerit uel ptisanæ cremore uel mulso uomitionem ciere, aut cremorē absinthij ex mulso sumere. Pari insuper ac simili ratione & reliquorū deinceps membrorum in prospectis temperaturis medendum est, humoribus ad cōmōdos meatus deriuatis. At si, qui sensu saltem percipi queat, meatu pars destituatur, reduridantes ipsos cruores (quos *χυμα* Græci uocant) siue humores, ueluti spiritum quoque flatuosum in ipsa contento, in halitum redactos, solutosq;
 30 euacuare conuenit.

Quæ sint alimentorum uires.

Cap. LXXIII.



- Vper alimentorum facultatibus orationem, quæ bona pars operis, corpori hominis tuendo dicat, esse uidetur, rebus hæcenus memoratis subnectere consentaneum arbitror, si antequam singillatim membratimq; eius commentationem aggrediar, exiguis quibusdā ac pauculis adeo anticipauerimus. Opus sanè necessariūq; omnino, si quicq; aliud est, alimentorum, sine quibus uiuere non possumus, uires, intus & in cute, quod aiunt, pernosse. Epulæ igitur extenuatoriæ facultatis, meatus ueluti obice obstructos recludunt, cōge-
 40 latos compactosq; ac tenaces immodico lentore seu glutine humores discutiunt, proijciunt atq; abstergunt, crassos dissecant attenuantq;. Cæterum diuturnior eius facultatis alimentorum usus, cum serosa, tum biliosa excrementa auget atq; coaceruat. Quin si quis largius ex quo ipsi infar-

*Cause mor-
taliæ flatus
quætur
diuatio.*

citur, atrebiliarius inde sanguis cōstituitur. A iugi propterea ipsarū usio-
ne abstinendum est, præcipue ijs qui biliosiorē naturę statum sortiti sunt:
conducunt namq; his tantūmodo, qui pituitæ, crudi ac uiscosi, crassiq; hu-
moris ceu struicem quandam ingentem ac grauem aceruarunt. Cæterū
quæ impinguantis naturæ sunt alimenta, idoneum & quantū satis est nu-
trimentū præstant. Et si in uentriculo & iocinore pro debito utriusq; mu-
nere probe conficiantur, inculpatum sanguinem pariunt, splenem uero
heparq; obturant. Horum uero alia quidem crassioris duntaxat succi exi-
stunt, uerbi gratia, lens: alia uiscidi, ueluti maluæ: nonnulli cum crassi tum
glutinosi humoris facultatem obtinent, ut quæ testa integuntur, & inde 19
ὀσπράκιον græce nominantur. Ad tuendam igitur incolumitatem longe-
tutior extenuans educatio est, ea quę impinguandi uirtutem possidet. Sed
quoniam paucissimi alimenti consistit, nihil neq; firmitatis, neq; roboris
corporibus præbet. Oportet præterea nonnunquam quum indigentia
quempiam corripit ac urget, escas plurimi ualentiorisq; nutrimenti offer-
re: Potissimum uero absq; discrimine sumpserint ei, qui exercitationibus
uacant, & qui ex sententiā sua somnum, quantum uidetur, capiunt. Qui-
buscunq; autem quā cibum sumant, exercitationibus operam da-
re non est integrum, dapes quæ crassiores succos efficiunt uitent cane, ut
ita dicam, peius & angue. Inertes quoq; & ignaui, ne per somnium qui- 20
dem id genus alimenta admittant. Quemadmodum porrò ignauia per-
petua & immodicum otium ad tutelam sanitatis multo plus officit quā
conferat, sic mediocris agitatio ad tuendam ualitudinem summopere con-
ducit. Mediæ uero materiæ cibi, quæ neq; impinguentes neq; extenuan-
tes sunt, omnium præstantissimi habentur, utpote qui mediocris essentia
sanguinem generant. Vt igitur eius farinæ, corporibus nostris cōmodis-
sima sunt esculenta, ita quæ uitiosum producūt succum summo sunt dispen-
dio: quapropter manibus pedibusq; semper uitari debent. Detestari de-
nique uaria diuersiq; generis edulia satius est, potissimum si diuersimodis
atq; repugnantibus fuerint potentijs prædita, concoctu namq; difficilima 30
quæcunq; hoc modo assumuntur ingerunturq;.

Deoleribus esculentis. Cap. LXXIII.

Λατuca, λευκῆ κίβη.



Actuca liquidā cum refrigerandi tum humectandi facultatem
obtinet, quo nomine etiam soporem cōciliat. Hæc ut inter ole-
rum omne genus præcipue nutrit, ita egregij eximijq; etiā suc-
ci sanguinem producit.

Intubum, ἰντὺβον.

Intubus eandem quidē cum refrigerandi tum humectandi facultatem,
ueruntamen lactuca nonnihil inefficaciorē, possidet.

Malua, μαλάχη.

Malua frigorisficæ quidem uirtutis est, sed clementis atque obscuræ:
efficaciorē uero habet humectandi potentiam, unde & propter gluten
& uisco-

& uiscositatem suam uentris quoq; subducendi potestate prædita est.

Beta, *τσίντορ*.

Teutlon, quam Romani betam dicunt, sua abstergendi facultate duram quoq; aluum lenit ac deficit: proinde si crebrius aut largius estur, uentriculos, qui *σάμαρες* à Græcis appellatur, lancinat: hepar item ac splenem uicinasq; ipsorum partes ceu obice quodam obturat.

Brassica, *κρόμβη*.

Brassica recocta si ea datur aluum cōprimit: semel uero duntaxat, ac ne tum quidem ad unguem elixata, sed quasi subcruda, cum oleo & garo *10* lē uē cōmansa, uentrem potius lubricat: perinde atq; cremor quoq; ipsius lentis cremorem purgandi facultate, uiribusq; præcellit. Cæterum brassica marina multo euidentius atq; adeo magis etiam aluū præmollit, atq; subducit, nam falsitudinē quandam, subamarulentumq; saporē præfert.

Halimon, *ἡλιμόρ*.

Halimon item, quod Romani Albucū quoq; dicere uidentur, quoniā falsuginosum est, uentrem exonerandi potestate uiget. Cæterum brassica stomacho accommodatior & utilior, eo quod mediocris quoq; astrictoriæ uirtutis esse deprehenditur. Lac porro semenq; prolificum auget.

Blitum & Atriplex.

20 Blitum atq; Atriplex aquosiora sunt inter olera, aluumq; molliūt atq; derijciunt, sed pauxillum alimenti præstant. Aculeata uero omnia, cuiusmodi carduus & atractylis est, quod est cnicum satium, uel ut alij dicunt, colon rusticā, & huius classis alia, stomacho summopere cōueniunt: dempta cinara, prauī nanq; succi hæc est esca, & præcipue ubi durior iam euaserit. Quare præstantissimum fuerit elixam hanc oleo, garoq;, unā cum coriandro esui accommodare.

Apium, olusatrū, sion, smyrnium.

Apium satium, olusatrū, (quorum illud Græcis *σίλιον κατσίαν*, hoc uero *ισπασίλιον* dicitur) sium, quod odoratum iuncum quidam, alij anagallidem *30* aquaticam appellant, smyrniū, omnia quidē ac singula proritandi & impellendi lotij potestatem obtinent: cæterū posterius hoc odore & acrimonia præstantius est, & urinam pariter ac menses commouet. Sed apia sua uiora sunt, ideoq; stomacho idonea magis uidentur.

Eruca, *δύζιμερ*.

Eruca, olus hoc magnam excalfaciendi uim obtinet, & geniturā augere credit, & ob id in Venerē stimulos addere, capitisq; eum dolorē, quam Cephaleam nominant, inducere.

Nasturtium, ocimum, sinapi.

Nasturtium, *κέρδαμερ* græce, ocimum, sinapi, olera calidæ admodum *40* sunt potentia, & acorem præferunt, (in primis uero nasturtium) concoctioni resistunt, stomacho sunt noxia, & prauos succos, quando eiusdem naturæ habentur, in corpore pariunt.

Vrtica, ἀκλήριον.

Vrtica (quæ à Græcis cum ἀκλήριον tum κνήδην nūcupatur) maxime tenuium est partium, uentrem autem modice subducit, & parcius alit.

Gingidium.

Bisacutū (sic enim Romani γογγύδιον appellant) olus est scandici non ab simile, plusculum astringentioris qualitatis, amaritudinisq; retinens, aptius est stomacho, ita quidem ut cibum fastidientibus appetentiā reuocet, cum aceto sumptū, sed exiguū corpori alimentum præbet. Quæ præterea syluestria olera prædicantur, pestilentissimum omnino succum generant.

Capparis.

Capparis quoq; cibi appetitum illicit, hepatis & lienis oppilationem laxat ac discutit, pituitāq; educit. Vfus eius in primordio cœnæ cōmendat ex oxymelite, quod est aceto mulso, uel oxelgeo, hoc est, ex oleo atq; aceto.

De olerum asparagis. Cap. LXXV.



Litum, lactuca, atriplex, malua, betaq; stirpē quidē humidam habent, asparagum uero (quo nomine Græci cymam uocant) siccum. Raporum cōtrā, sinapis, radiculæ, nasturtij, pyrethri, brassicæ, et omniū deniq; aliorum calorificam uirtutem habentium, planta quidem arida, cyma uero humida est: cæterū à spinosis fruticosisq; plantis, & qui in harundinetis, uliginosis palustribus uel locis nascuntur cymæ, quæq; à bryonia decerpuntur, stomacho quidem accommodatæ sunt, & lotium cient, parum tamen nutriunt: & si probe concoquantur, olerū asparagis in nutriendo efficaciores sunt. Pari etiā modo & chamædaphnes (id est, humilis & terrestris lauri, quam Romani nūc laureolam, nunc uincamperuincam dicunt) asparagus nutrit.

Cymæ Bryoniae.

De his quæ edendo sunt radicibus. Cap. LXXVI.



Apus atq; rapa denuo elixæ, si estur, nō minus alimentum quàm reliquæ stirpes ac olera præbent: Quum uero assidue eduntur, crassum succum generant.

Bulbi qui edendo sunt.

Bulbi, astringentis abstergentisq; naturæ sunt: appetentiam quoq; cibi inuitant, stomachum roborant, uiscidos thoracis humores pulchre euacuant. Si bis decoquantur, uberius quidem nutriunt, sed minus educunt, eo enim pacto ipsorum propulsatur amaror: semen præterea prolificum producant, libidinem accendunt, si iugiter crebriusq; sumantur, peditus insuper conciliant, torminaq;. Atqui ex garo, oleoq; comestis, dulcissimi, flatu carentes, optimi alimentum, faciliq; decoctionis sunt.

Pastinacæ, dauci, siferis.

Pastinacæ, dauci, siferis, multo minus alimentum, quàm rapæ præstant: adurentes uero sunt, & euidenter odoratæ, lotiumq; impellunt. Supra uero modum, & immodice perperamq; utentibus, præuos succos generant: concoctu difficiles, cōmuni radicum modo, existunt. Sunt qui syluestrem pastinacam daucum nūcupent, ea multo uehementiore uel lotium promouet.

Radiæ

Radícula.

Radícula attenuādi adurendiq; potestātē habet: edenda in prima mensa est, ex oleo scilicet & garo, uētris lubricandi gratia: in secūdis uero mensis detestetur.

Cæpe, allium, porrum.

Cæpe, allium, porrū, quoniā acrimoniam præferūt, corpus calfaciunt, extenuant, & dissipant crassos qui in ipso continentur humores. Bis quidem elixa exiguum, cruda uero nihil alimenti sufficiunt. Allium quippe obstructions discutit, dissipandiq; potentia regnat. Efficaciores porris arefaciendi uires habent ampeloprasa, ueluti syluestria. In summa, olera
 10 simul uniuersa, si incocta sumantur, deterioris succi sunt quā elixa, multoq; magis superflua humiditate participant. Quæ porrō cum muria tum oxyhalme condita reseruatur, stomacho magis conueniunt, & appetentiam acrius excitant, crudes humores disijciunt, ægre conficiunt. Et præterquā uel natura uel moribus cōparatum est abutentibus, uitiosis succis infarciunt.

De tuberibus ac fungis. Cap. LXXVII.



Vber nullum manifestæ qualitatis ex seipso cremorē præstat, frigidiorē uero & crassiorē exhibet. Micetg, (quos Latini

Micete.

fungos nuncupant) gelidi, pituitosi, & uitiatī cremoris sunt.

Omniū innocētiore habentur boleti, qualitatis notatu dignæ
 20 expertes, probe elixi. Qui uero amminitæ uocantur, secundum post boletos bonitatis locum obtinent. Cæteri omnino uitandi sunt: pars quippe bene magna ex ipsis letalis est: quinetiā ipsi quoq; boleti, nisi ad extremū elixi edantur, præsens discrimen, mortisq; causam sepæ numero minant.

De frumentaceis. Cap. LXXVIII.

Chondrus & alica.



Xeis quæ frumentacea dicuntur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos uiscidoq; lentore parit humores: sed puls ex eo confecta pestilens est, eo quod quamprimū crassescens incōcocta

30 dro ad summum ptisanæ instar decocto expressus. Alica uero (*ἀλίκη* à Græcis appellata) in cæteris quidem chondro (hoc est, frugi, unde hæc omnia sunt) haud absimilis est, uerum alium intensius moratur.

Triticum.

Triticum quidem elixum, mansum, ægerrime conficitur, peditus generat: ubi autē confectum siue concoctū fuerit, alimentū præstat ualidissimū. Porrō ubi in panem fuerit reductum, inflandi facultatem & concoctionis difficultatem exuit, eo quod fermenti salisq; particeps sit.

De panibus.

Siligineus uero panis omnium firmissimus est: post hunc simlagineus:
 40 deinde cui nihil ademptum est, quem *στυγνός* Græci uocant. Sordidus panis
 hoc est, frumentaceus panis, alimonix quidē minus ceu firmissimus præbet, promptius uero per aluū deficitur. Amylus, hoc est, ex amylo
 farina factus, minimi alimenti est, nō aliter q̄ qui lotus in cibo ministrat.

Sordidus panis

Amylus.

Hordea, polenta, maza.

Hordea frigorisica & absteriug sunt potentia: elixa uero instar pūfanae, humectant: fricta uero ad modū polentae, arefaciūt. Polenta in gēsta ante balneum cum aqua pota, siti subuenit. Hordeaceus panis imbecillior, & minus nutriendo est. Maza non facile conficitur, & amplius quā hordeaceus panis inflat, & si cum melle fuerit subacta, per aluum facile descendit.

Avena.

Auena, (sic enim *Ἀβρουα* interpretor) natura siccandi uim habet, & minoris in nutriendo potestatis est. Milium ac panicū refrigerandi, siccandiq; & exiguas in nutriendo uires possident, aluū morantur: praecel-
lit autem per omnia milium panico.

Oryza.

Oryza aegre concoquit, & exigui nutrimenti est, & praeter haec etiam aluum cōpescit. Coquitur aut pūfana hoc modo: Vna eius pars in quin de cīm aquae partibus, pauxillo olei adiecto, elixat, et quū intumuerit ebullieritq; aceto etiā: ubi uero ad unguē decocta fuerit, superinfundus quaeque tenuis atq; friatus sal. Nec desunt qui porri aliquid atq; anethi addāt. Caeterū auena chondrusq; perinde atq; pūfana coquunt & concinnant.

De leguminis, Cap. LXXIX.

Lentes.



Eguminū lens quidem uitiosi cremoris est, melancholicūq; humorem auget, aluum compescit, potissimum bis cocta. Ius uero ipsius cum aceto & garo sumptū, uētre m soluit. Admiscere aut lentis, quoniam inflat, uel satureiam uel pulegium debet.

Faba, pisā, cicera, lupini, foenogracum.

Fabae lenes sunt, & uentris flatus pariunt, abstergendiq; potestatem retinent. Aegyptia uero faba, nostra humidior censetur, & plus retrimenti relinquit in corpore. Pisum laxum quidē ac molle est, caeterū peditus rariores facit. Cicera inflationes pariunt, abstergunt, semen prolificum gignunt, libidinem excitant, lapides cōminuunt, fricta inflandi quidem uim deponunt, sed aegre in stomacho conficiunt. Lupini quoq; concoctioni resistūt, & aegre transmittūt, crudūq; succū cumulant. Foenogracum calfaciendi, uentremq; subducendi facultatē habet, si ante dapes caeteras sumptum fuerit.

Ochri, phaseli.

Ochri, quae eruliae dicunt, & phaseli macerati, quoad radices promiscant, si ante cibum ex garo edunt, aluū soluunt, & maiores alendi uires q; foenogracū obtinent. Phaseli, quae & dolichi, hoc est, siliquae, dicuntur, integri cum lobis, uiridesq; sumpti, in gentē retrimentorū uim pariūt.

De fructibus quae inter aestatē & autumnū maturescūt. Cap. LXXX.

Cucurbita, pepones.

Cucurbita refrigerandi & humectandi uim obtinet, uentremq; subducit, sed alimentum praestat perexiguū. Pepon in uniuersum prau

Decoctio
pūfana.

30

30

40

pravi succi, gelidus, uisus, ac uomitorius est: non cōcoctus choleram inducit: semen eius ciendæ urinæ, & frangendis renum calculis natum, atq; in totū abstergit abunde. *Melopepon* minore efficacia omnia hæc possidet. *Melopepon.*

Cucumis, oīevos.

Cucumis minore frigiditate & humiditate pepone prædita est, sed maiore ad promouendum lotium potestate: difficilis concoctu, & si tandem concoquatur improbi tamen succi est. Sed ut summatim, atq; uno (ut dicitur) uerbo perstringā: Omnes fructus quos profert autumnus frigoris & humentis naturæ, ad hæc minus nutriendo, deploratiq; succi sunt.

10 De his quæ ex arboribus decerpuntur fructibus. Cap. LXXXI.

Ficus, uuæ, & caricæ.



Icus & uuæ primas inter fructus autūnales meruerunt, quando ipso succus culpa tantum non omni uacat, & alimenti minime uulgaris sunt. Cæterum ficus honore & bonitate succi uuas præcellunt, & liberalius nutriunt: alui præterea, urinæq; ciendæ, & renes purgandi prouinciam pulcherrime subeunt & absoluunt, comprimis autem quæ fuerint exactam cōsequutæ maturitatē. Pari etiam modo caricæ: atqui flatus interim sanguinemq; uitiatum pariunt: ideoq; pedunculos assiduus earundem usus conciliat. Vuæ retentæ non conficiuntur in uentriculo, & crudum succum faciunt: deiectæ uero moderatiores redduntur. In uuis passis maior calfaciendi uis est, conueniunt etiam magis quàm uuæ stomacho, neque tam exigui alimenti sunt, sed imbecillius aluum deiciunt.

Mora.

Mora, quæ & sycamina dicuntur, uehementem quidem humectandi, mediocrem uero refrigerandi facultatē obtinēt: à primordio coenæ & ante alios cibos deuorata, aluum exonerant: neq; admodum stomacho aliena, sed nutrimenti ferè nullius.

Cerafa.

50 Ex cerasijs autem suauiora cunire quidem faciunt, cæterum stomacho officiunt. Quæcūq; uero acerbitati participant, atq; astringunt, ut stomacho nunquam sunt noxia, ita & per aluum nihil transmittunt. Atque eadem sanè ratio non tam uis ac moris, quàm alijs compluribus exacte cōgruit. In summa: Quæcūq; astringendi uim obtinent, in prima mensa, aut alias ante escas uel comesta, uel bibita, aluum comprimunt. Quicūque aluum ob imbecillitatem astrictam nacti sunt, hos quod eam lubricket atq; resoluat quippiam, uerbi gratia olera, siue pisces, siue eiusdem farinae cætera, præmittere, deinde quod conspissandi facultatē habeat, sumere oportet, quæ aluo robur adferentia, per inferna impellant atq; ad deiectionem retrimenta excitent.

Nux pini, & persica.

Nux pini, quæ strobilus etiā appellat, probū crassumq; cremorē continet, edendo quidē, sed difficilis decoctionis est. Persica pravi succi sunt,

acescunt & corrumpuntur ocysissime, proinde in prima mensa sumenda, quo desiciantur promptius, neq; propter cunctationem in uentriculo uidentur. Præcocia, doracia, & armenia.

Præcocia porro, & doracia, & armenia, potiora sunt perficis, quoniam neq; acescunt, neq; pariformiter apta corruptioni, & capiunt magis ac delectant amplius. Poma.

Ex malis, dulcia quidem maiores reliquis in calfaciendo uires habent, & quamprimum transmittuntur, maxime dum uel affantur, uel elixantur.

Acida poma.

Aspera.

Acida sibi cum refrigerandi, tum humores in uentriculo dissecandi, præstantiorem facultatem uindicant. Austeria dein stomachum roborant, aluum suprimunt: præ cæteris tamē magis cydonia, cotonea à Latinis uulgo appellata. Pirorum pari etiam modo grandiora atq; matura, eandem quidem facultatem seruant, sed uberius nutrimentum lumentibus suggerunt. Mala punica frigorificæ uirtutis sunt, & paululum alimenti præbent.

Mala punica.

Mespila, & sorba.

Mespila & sorba uehementiores in astringendo uires retinent, idcirco lubricæ fluentiq; aluo accommodata sunt.

Palma.

Palmae stomachum quidem solantur, nisi præpingues extiterint: uentrem cohibere, crassos, glutinosos humores gignere, & cum capitis dolore, quem κεφαλαλγία dicunt, inducere solent.

Oliuæ.

Oliuarum post hæc druppæ stomacho officiant, & crassum succum pariunt. Oliuæ salsae siue condite, quas Græci καλυβήδες appellant, ante alia edulia comestæ, appetentiæ cibi reuocant, aluum difficilem leniunt, idq; sanè acrius quum uel aceto, uel aceto mulso, præparentur condiantur ue.

Nuces.

Nucum uero basilica quidem siue iuglans auellanis minorem in nutriendo potestatem habet, stomachoq; uulior est. Virides nuces humidiore sunt, uentremq; subducunt. Arida uero, si quis maceratis in aqua & ab interiore putamine purgarit, recentioribus potentia nihil cedunt. Amygdalæ dissecandi, extenuandi q; uirtute præditæ sunt, quocirca tum uiscera, tum thoracē, sed uehemētius efficaciusq; amaræ, purgant. Assimilem sanè potestatem habent & pistacia (uulgo fictici dicti) hepatis contractiones constipationesq; maiore efficacia laxant.

Damascena.

Damascena, si in prima mensa, aliàs ue ante cibos edantur cum cruda, tum in mulso elixa, uentrem difficilem molliunt. Syriaca cōcoctu difficilia sunt, stomacho hostilia, & exigui nutrimenti. Ceratia (siliquæ) ægerrime cōcoquuntur, aluum cohibent, & uitiosum succum possident. Sycomora abundantem refrigerandi & humectandi potestatem habent.

Ceratia.

Citream malum.

Medici mali extima pars acedinē sapit, & cōcoctioni renitiū: que uero carnis

carnis quandam imaginē repræsentat æmulaturq; et si edendo sit, tamen æque cōcoctioni resistit. Medulla uero, siue interior pars dicere malis, siue acida, siue aquea fuerit, abunde infrigidat.

Glandes.

Glandes non inefficaciores frumentaceis in alendo uires habent, cæterum nō sine difficultate in stomacho tandem conficiunt, & crassioris succi sunt, lenteq; transeunt. Castaneæ per omnia glandibus præstantiores & salubriores creduntur.

De animalibus, primitusq; de uolucris. Cap. LXXXII.

- 10 **A**ves imbecillius multo leuiusq; quadrupedibus alunt, potissime uero suis: sed concoctrici animantis facultati promptius obtemperant, præcipue perdix, attagena, columbarum pulli, gallinæ, phasianus, turdi, merulæ, passeruli, necnō & pyrgiæ solidiorem alimoniam præstant: & his etiam magis turtur, palumbus, anas. Sed longe sunt solidiores ac duriores, & concocturæ contumacius renitentes, pauonū carnes, utpote fibrosiores. Porro anserina & struthocamelina caro maiorem redundantiarum saburram prædictis cumulat, & in stomacho ægrius conficitur, exceptis alis, quæ succi bonitate reliquis ausibus minime cedunt. Gruum caro referta fibris & durior est.
- 20 In summa, iuniores auiculæ ueteribus semper humidiores sunt, minus concoctioni resistunt, plus alimenti præbent, & per aluum proclius descendunt. Quin & elixæ ab assis & in sartagine frictis parī interstitio dissident. Quæ deniq; in siccis regionibus atque montanis degunt, ijs quæ in uliginosis aluntur, concoctioni minus obluantur, & nihil ferè superfluitatum relinquunt.

Caro anserina
na & struthos
camelina.

Gruum caro.

Carnes elixæ,
assæ & frictæ.

De ouis. Cap. LXXXIII.

- 30 **G**allinarum, & phasianorū oua, principem bonitatis locum occupant: sed anserum & struthocamelorum infimū. Atqui longe semper recentia ueteribus palmam præripiunt: & ut tremen-
tia nutriendo magis sunt, ita & forbilia facilius descendunt, & gutturis asperitates molliunt. Reliqua ad unum omnia concoctioni obstinate repugnant, & lentius per meatus excernuntur, crassiq; omnino succi sunt, demptis ijs quæ præfocata dicuntur, quæ quidem cruda in garo, uino & oleo irrigata, in diplomate, id est, uase gneo aut testaceo, mediocriter densantur, nam hæc coctū facilia, succiq; inculpati, hoc modo redduntur. Fricta aut in sartagine omnium sunt uisiosissima.

Oua recentia,
tremencia &
forbilia.

Diplomæ.

De quadrupedibus animalibus. Cap. LXXXIIII.

Suilla caro.

- 40 **E**destrium animalium, suillæ carnes omnium aliorum esculentorū efficacissimas in nutriendo uires obtinet, eo quod cum gustu tum odoratu peculiarē quandā germanitatē humanæ corporis emulant, ueluti à quibusdam qui per imprudentiā humanam carnē degustauere, animaduersum est. Verū quicquid nutrimenti ex

ipsis contrahit, uisco seu quodā lentore præditū est, & ægerrime dissipat.
Ouilla caro & caprina.

Hircina.

Bubula.

Leporina.

Cervina.

Ouilla caro plurimam retrimentorum congeriem, perditosq; succos cumulat. Caprinis carnibus acredo quædam succusq; minime bonus inest. Hircina caro deprauatissima est, siue succum eius malignum, siue concoctionis difficultatem respicias. Bubula porro caro atram bilem auget. Leporina uero crassum quidē succū habet, uerū in hoc à bouina & ouilla uincitur. Ceruina duri & coctu difficilis alimenti est. In uniuersum uero, recentiora, iunioraq; omnia ueteribus humidiora, molliora, & coctu faciliora deprehenduntur. Pari modo & castrata ijs qui testiculos etiamdum habent: Et bene curata cute, strigosis.

De animalium partibus. Cap. LXXXV.



Nextimæ animalium partes ut sunt neruis refertæ, ita pinguedine carneq; uacant, quapropter & uiscida cernunt, & exiguas in nutriendo uires, sed alui ciendę potestatē, habent: demptis autē (quod impendio siccæ sint) partibus. Rostra & aures cartilaginosa, concoctūq; difficilia sunt. Lingua mollis laxa ue, exanguis & lenis in nutriendo potestatis est. Adenes, id est, glandulæ, gustu suaves sunt atq; tenues: Suauiores uero multo mammillinae sunt, præsertim porcinæ, dum uidelicet lacte infarciuntur, neque imbecillius quidem ipsis carnis alimentum præstant.

Rostra.

Aures.

Adenes.

Renes & testes.

Renes atque testes uirosi sunt, (sic enim *Requies* interpretor) ægerrimeq; in uentriculo conficiuntur. Ceterum gallinaeorū saginatorum testiculi, suaves, & inculpatum corpori alimentū præstant. Taurorum porro e contrario, hircorumq; & arietum testes, uix tandem cōcoquuntur, & improbum succum faciunt.

Cerebrum.

Cerebrum pituitosum, densi prauiq; succi, lenti meatus, concoctioni renitens, stomacho ingratum, & nauseosum deniq; est: coctum uero ad summum satis idoneum alimentum præbet. Medulla spinalis, pinguis & suauior est cerebro, in cæteris autem nullo ab eo discrimine distinet.

Medulla

spinalis.

Cor & hepar.

Cor & hepar crassum habent succū, ægre decoquuntur, lente transmittuntur: sed suillum iecur bonitate reliquis præstat. Lien prauus succi est, & atrā bilem generat. Pulmo utriq; cum laxior, tum coctu facilius est, cæterū pituitam auget, & minimæ in nutriendo potestatis est. Ventrisculus, locelli, & intestina, dura sunt, & concoctioni oblectantur, atq; pituitam pariunt. Vno uerbo, feræ siccioris semper sunt alimonie quam ciues, neq; tantum retrimenti relinquunt.

Lien.

Pulmo.

Ventrisculus.

Sanguis.

Sanguis uniuersus coctu difficilis est, maxime uero crassus, atque atrebiliarius, cuiusmodi esse iudicatur bubulus.

Leporis autem sanguen

sanguen tanquā suauissimum primi meriti est: hoc multi unā cum iocinore coquere solent, nōnulli uero simul cum reliquis quoq; uisceribus. Estur & à quibusdā iuuenis porcelli sanguis. Caprinū postremo sanguinem elui fuisse, ab Homero proditum est memoriā.

De lacte. Cap. LXXXVI.



Ac coctum alendo quidem est, gingiuas uero & dentes in cōmodo afficit: proinde simulatq; ingestum fuerit, primum quidem mulso, deinde uino acerbo os abluendū est. Præterea capitis dolorē infert, præcordiorū (sic enim *καρδιῶν* interpre-

tor) & uentriculi quæ ex flatibus oritur distentionem conciliat, renū item calculos gignit. Cæterum dilutum imbecillius quidem alimentū præbet, sed intentius uentrem soluit: crassius cōtrā efficaciores nutriendi uires habet, ægrius uero per inferiora descendit. Caprinum postea mediocris essentiae lac est. Ouillum ediuerso crassioris, statim post partū tenuius, progressu uero temporis crassius, magis magisq; deprauatur.

De lactipotatione. Cap. LXXXVII.



Vicinq; lac poculēti loco haurire studuerit, à reliquis esculentis abstineat, donec in uentriculo conficiatur, & per inferna deiciatur. Satiū aut est ipsum recens multum circa auroram in gurgitare, & insuper non à cibus modo, uerum ab exercitatio-

nibus uehementibus abstinere, eo quod in laborantibus necessariò accescit. Profuerit autem clemēs inambulatio, & utgilijs interposita tranquillitas. Ad istum enim uero modum patranti, primū quidem per aluum deccedit: deinde post deiectionem aliud repetendum est: quin si illud quoq; deiciatur, aliud: in primis enim nō sine utilitate purgat, haud ita sanē multum reliquarū corporis partium molis, sed ea modo quæ in uentre deprehendit. Post hæc illico uenas subit, & alimentū præbens præstantissimū, nunquā amplius per inferna egreditur. In biliosis præterea fluxionibus, ubiq; uentriculū eliquari religio est, lac seruēfactū propinabimus. Atqui

Elizatio lactis

ad hanc rationem decoquendum est: Principio quidem pedetentim, sensimq; ita ut partim exhalat, partim concoquatur: mox incunctanter magis etiam atq; etiam coquito. Prospiciendum uero ne uel cōcrematur, uel in caseum coalescat, & quasi globosum reddatur. Operæ precii uero sit, non tam molliter clementerq; lac ipsum concoqui, q̃ confundendo quod abscesserit circūquaq; detrahi: ferula itaq; polita ac tereti agitandum est: & si quippiā in labijs olle comburitur ac feruet, id spongia purgandū est: inde nancq; non raro reliquum lactis corrūpitur. Quapropter lac quem admodū docuimus coquito, quoad crassius planē, & crudo lacte suauius reddatur. Porro cochleis (pro quibus nos fluminales uel marinos lapides accipimus) ex igne candentibus lacti immisiss (quod lac diacochleon appellatur) quicquid est tenue ac serosum imbibitur, insumiturq;. Et hæc quippelactis confectio uētris fluoribus, potissime uero biliosis conducit,

Lac diacochleon.

Lac iuxta fumum frequentē ad extremū decoquatur, serosum eius à caseo discernitur. Mox deinde à fecibus exactus, per linteum pannum uel coletur. Confunditur autē seroso uel melis, uel aceti mulsi, uel salis modicum, & alui subducendae gratia exhibetur: adultis quidem usque ad duorum sextariorum mensuram: minoribus uero natu, non minus sextarij pondere. Quod si calculi maris, ni igniti, aut candentis ferri immisione incrassatum fuerit lac, dysenteriae & alui profluuiio probe medetur.

De caseo. Cap. LXXXIX.

Caseus omnis acrimoniā habet atq; sitificus est, cōcoctioni prae terea reniuitur, prauum humorem, & calculum parit. Praestantior autem est & minus officit non uetustus, laxus, minime durus, nec insuauis, & mediocri sale cōditus. Qui contrarijs constat perniciosissimus est.

De piscibus. Cap. XC.

Omnes quidē pisces frigidioris humidiorisq; temperamēti esse perspicuum est: uerum saxatiles appellati, reliquis salubriores habentur, quia concoctioni minus resistunt, & probum succum relinquunt, neq; affatim adeo humectant, nisi solidiore carne consistant. Non autem saxatiliū, maritimi, plurimum discrepant ab ijs qui in limo degunt, aut ubi flumina irruunt. Sed omnium in saluberrimi stagnatiles atq; palustres sunt. Speciatim uero Capito quidem, si intra pelagus uersatus sit, mediocris suauitatis est, & coctu minus difficilis, succiq; minime mali: sanguinē uero tenuiorē atq; imbecilliorē gignit. Eiusdem farinae fermē lupus est. Mulus quoque in aequore degens, durior, & imbecillior cæteris piscibus uidetur, nullus quidem cocturæ renitens, esui aptus, per suauis, pinguedine carens.

De corio testaceo præditis. Cap. XCI.

In uniuersum, pisces quicunq; protegmīne (unde & ὀστρακοί, 30
iuxta à Græcis dicuntur) testā habent, salsum omnino crudumq; succum generant. E quorum numero, ostrea mollissima carne cōstant, & promptius per aluum decedunt. Chamæ præterea, & purpuræ, ungues, ὀστρεὶς à Græcis appellati, spondyli, buccinae, cochleæ, & quæcūq; id genus alia dura & crustata, μυλινὸς ὀστρεὶς, uocantur, utpote grāmari ὀστρεὶς, paguri, cancri, locustæ, squillæ, esui quidē sunt, sed cōcoctioni resistunt, aluumq; cohibent, si subinde in aqua dulci elixentur. Ius atq; cremor omnium quæ testis integunt uentrem promouet, quāobrem terrestres quoq; cochleæ aluū deducūt: sed dura carne, cōctuq; difficili sunt, mensis quidem idonea, prauī tamen humoris. Sunt qui ius cum 40
oleo garoq; condiunt, & sic alui deiectionem moliuntur. Echini modo dice frigorigici, exiguiq; alimentū sunt, & lotium proritant.

De

De mollibus. Cap. xcii.



Olles pisces, puta polypi, sepia, lolligines, duri atq; concoctu difficiles sunt: præ cæteris uero polypi: succo uero quodammodo falso sunt præditi, sed concoctione uicti, nutrimentum neutiquam exiguum corpori præstant.

De piscibus siue squamis. Cap. xciii.



Esquamatorum piscium, quos cartilagineos dicunt, torpedinibus, pastinacis, mollis persuasusq; caro est, quamprimum subiens, coctu facilis, mensisq; idonea. Raia, leuiraia, squatina, atq; huiusmodi alia, duriora sunt, coctionisq; renituntur, & uberiorius alunt. In summa: Dura carne animantia ægrius in stomacho cõficiuntur: Si uero concoctione uincantur, ualentiorum solidiorumq; in alendo facultatem obtinent.

De grandibus, cetaceis uel. Cap. xciiii.



Ngentes (sic enim *antiqua* Latio donamus) uerbi gratia, balenæ, phocæ, zygaenæ, delphines, thunniq; immanes, duræ, coctuq; difficilem & crassi humoris habent carnem: Quum uero sale condiuntur, excessibus eiusmodi spoliati, ad mediocritatem re-

ducuntur: cæteris præterea piscibus humidiores, excrementis magis res-

dundantes, & ad molestiã inferendũ potius & ignati appositi uidentur. Porro fassamentorum diuersitates pisciũ, e quibus conficiunt, differentias imitant. De uiribus uini. Cap. xc.



Aletudinis sequũde studiosum uini potestas fugere nõ debet. In totum igitur, Omne uinũ maximæ in alendo potestatis est: sed longe magis rubrum, ac crassum, atqui id deterioris succi est: Suaue uero, nutrimenti quidem alicuius est, stomacho uero minus cõuenit. Acerbum adstringens uel stomacho quidem amicum, sed lenti meatus, neq; tantũ nutrimenti præbet. Atq; adhuc etiam multo minus candidum. Primũ omnium uinorũ bonitatis honorẽ obtinet, quod colore *xythos*, id est, uermiculum seu rubens est. Peruetustũ multo plus caloris ariditatisq; insitum habet q; recens. Sed summatim uini potentia hæc est: In uniuersum uinum insitum atque naturalem corporis nostri calorem suscitatur: proinde & cruditas inde eximie corrigitur, & sanguis uitij exiit atque emendatur, alimentum (quandoquidem prompte penetrat) per uniuersum corpus deducit: cuius ergo ex ægritudine aliqua emaciatis ac strigosis, bonam corporis, ueluti affatim nutritis, habitudinem restituit. Fastidiosis cibi appetentiam & reuocat & illicit, pituitosum humorem extenuat, bilem per lotium euacuat, coloris gratiam inducit, animo lætitudinem alacritatem iucunditatemq; conciliat, corpus quoque robustius efficit. Eiusmodi igitur cõmoditatum auctor est uinum, moderate ingestum: Ingurgitatum uero præter modum, incommoda contraria adfert, inde ebrii subinde euertuntur, furiantur, & sopore impetuntur. Vitanda itaq; est temulentia, immodicaq; uini potatio. Quanquam per longa id

Vinum uermiculum.

Vini potestas.

Incommoda temulentia.

temporū intervalla liberalius ingerere, cōmodo sit: nam per urinas, quas admodum citat, sudoresq; uacuat. Optimum uero ducitur, protinus aqua mulsa sumpta ipsum uomitū eijcere, ne uel reliquijs quibusdam noxijs officiat. Qui uero sese prolixius pleniusq; uino imbuere instituunt, ac student, ab aliorum sanè ciborum satietate abstineant, atq; inter potandum in media mensa brassicam coctam, bellariaq; sumant, maxime ex amygdalis confecta. Hæc quippe capitis laborem mitigant, grauedinemq; subleuant, neq; ulla uomentes molestia afficiunt. Præsidium quoq; minime si culneum absinthij maceratum ac dilutum (quod ἀντισπασμὰς Græcis dicunt) adfert, ante potationē haustum: omnium enim maxime hoc crapulam arceat. Quod si quos uinū uellicet, gelidam hauriāt: postera die absinthij humorem repetant. Deambulationibus præterea, frictionibus item, ac balneo, & exiguo nutritu, ueluti aqua (ut aiunt) aspersa reficiuntur.

De melle & aqua mulsa. Cap. xcvi.



El percoctum ualentis quidem ac maximæ in nutriendo potestatis est, sed aluum leuiusculè, minus potenter deijcit: Crudum, econtrario. Gelidis præterea ac humidis temperaturis magis expedit: calidis alienum est, eo quod in bilem ab ipsis promptissime uertitur. Aqua mulsa, quod Græci μολιναριον dicunt, biliosos nihil ferè adiuuat, quoniā in ipsis quoq; facile in bilem transit. Vis igitur aqueum magis illiusmodi naturis mulsū miscere: neq; ijs qui aliquo modo uisceribus laborant, satis conuenit. Sed aqua de qua agitur mulsa, hac ratione cōcinnatur: Octuplum aque mellis miscetur, & sic quoad nihil amplius spumæ eijciat, decoquitur. Oportet autem spumam simulac primum exoritur, identidem tollere.

De somno. Cap. xcviij.



Onsequens prorsus esse opinor, post ea quæ de ratione uictus tradidimus, de somno quoque nonnihil perstringere: eo quod omnium nouissimus cætera cuncta plerunq; somnus suscipiat. Somnus itaq; (ut in uniuersum, & non citra formulam eloquar) est animalium facultatum tranquillitas, à bonæ frugis humore cerebrum irrigante, proficiens. Huic qui rite indulget, cum plurima comitantur emolumenta. Nam alimenta conficere, succos digerere, dolorem mitigare, cōsolari labores, distentis ac rigidis relaxationem reddere, diuinamq; illam aurg particulam, mentem scilicet, furentem emendare consuevit. Oc casio aut somni opportunissima à cibo iudicatur. Nam meridiari haud omnibus expedit: Non enim satis est ad exactam ciborum concoctionem tempus in quo nonnulli somnum capiunt, interrupta namq; & amputata ante tēpus coctione, meridie exporrecti, sæpius acetosa eructatione molestantur, sæpius item spiritibus infarciuntur: quin & fluctuationibus tentantur aliqui, nisi uel propter consuetudinē, uel quia satis sterterint, eiusmodi casus non eueniant. Nocturni somni omnium facile præstantissimi sunt: si quidem nocte, humiditate & quiete sua somnū inuitate, coctionem omnibus

Macerati absinthij cremor
crapule inia
miculatus.

Mulsi coctio.

Beneficia
somni.

Somnus meri
dianus non omni
bus idoneus.

Nocturni somni
optimi.

bus numeris absoluit. A somno porro nocturno plerumque ad alium subducendum maturamus. Esto autem debiti somno temporis limes, absoluta ciborum coctio, quæ non tam eructuationibus, quæ uentris conuiuentia contractione ue deprehenditur. Post quam uigilantia perutilis est, quod cōcoctionis retrimenta ad secessum proritet.

De uigilia. Cap. xcviij.

- Q**uoniam pacto uigilijs, quæ aduersa iam uale tudine correptos uel præ dolore, uel feбри, uel quocumque alio casu molestant, succurrendū sit, in uolumine quod de febribus inscribitur, studio sius persequemur. In præsens de ijs modò uigilijs, quæ bene habentes infestant, agendū est. Quocirca si quis uel ex moerore uel sollicitudine, seu alio quouis animi affectu somnū subire nequeat, ante omnia quidē moestitia pro uirili, uel in Cimmerias (ut aiunt) tenebras profliganda est: mox suauis sonorū auscultationibus *noyosap*, quod est cōsiderationē, proscribere expedit. Sunt uero qui leni aquarū stridore hoc ipsum machinantur, quia sanē demulcentia somnus facile conciliatur. Balneis præterea quos uigiliæ infestant, sub uesperam maxime, facta iam concoctione, utantur, edulijque humectantibus, puta lactucis, & id genus alijs. Papaueris etiam atri uiridia folia obsonijs nonnunquam confundant. Piscibus item qui nulla contumacia in stomacho conficiantur, uelci interdū utiliter possunt: Multū uini quoque tenuis, minime ueteris, ingurgitare: daturique iam membra grabato, rosacco, aut oleo in quo uel papaueris capita, uel mandragoræ elixa fuerint, caput oblinire. Quin anethinū quoque non antiquum somnificū est. Scimus porro quibusdam à labore statim facta tranquillitate somnum obrepisse. Coitus quoque moderatus hunc ipsum non raro conciliauit. Nec defunt qui capite ac pedibus infrigidatis somnum facile accersunt. Si qui autem uel propter alimentorum copiam, uel uitium, stomacho onerato uigilauerint, id quod usuuenisse comperi, ueluti contra alij nonnulli præter solitum genium penitus defraudantes, aut parcius cibus indulgentes, somnum oculis minime cernunt, considerare & occasionem abscindere conuenit.

De ueterno, siue sopore. Cap. xcix.

- S**i diuerso profundi ac ueternosi sopores, quæ *narakepa* à Græcis dicuntur, quempiam corripunt, lauacra illis continua, unctio nemque frigorificam interdiciemus: apophlegmatismis utemur, & in totum nutritionē cum calidiorem tum sicciorē, tenuis in nutriendo potestatis offeremus. A gelidiore quippe in primis, nec nō et humidiorē cerebrū madefaciēte materia, eiusmodi affectus cōtingit.

DIOCLES EPISTOLA PROPHYLACTICA, hoc est, de sequenda uale tudine tuenda. Cap. c.

Diocles Antigono Regi bene agere.

- Q**vandoquidem tibi Antigone, maxima omnium regum eruditio, atque grandæua iam ætas, omnisque philosophiæ peritia, & mathe

Varia concia
liendi somni
remedia.

Homiofle.

matics deniq; studiij (quibus singulis clarus es) palma facile contigit. *regiam* ego atq; adeo peculiarē esse suspicās eam philosophiæ quoq; partē, quæ incolumitatem tueri docet, deliniare atque describere tuæ maiestati hac nostra epistola uolui, unde nam mortalibus ægritudines proficiantur, deq; quibusdam præcedentibus notis, & quibus remedijs succurrendum sit. Quemadmodum enim cœli tempestatem nunq; non signa quædam manifesta præcedunt, quibus nauē ac ceteri multarum rerum periti homines, quid ipsis agendum, quo tutiores sint, colligunt: Sic neq; ullus præter naturam affectus unquā hominis naturam nullis præcedentibus præfagijs tentat. Tu itaq; nostris hisce præceptiunculis cōfusus, & obujs ulnis ea suscipere, & ad amussim etiam obseruare ne graueris.

Quatuor corporis partes.

Note futuri
doloris capitis

Diducimus iam hominis corpusculum in partes quatuor: caput, thoracem, uentrem, atq; uesticam. Quum igitur olim quid morbi caput læsurū est, hæc portenta solent magna ex parte præcedere: Vertigo, dolor capitis, superciliorum grauedo, murmur aurium, stimulatio siue punctura temporum, oculi matutino tempore lachrymantur, & caligant, odoratus hebetatur, dentium gingiæ attolluntur. Ergo quum eiusmodi quiddam portenti senseris, caput confestim euacuandum ducito, nullis sanē medicamentorū præfidijs, uerū sumptis hyslopi aut origani capitibus tritis, & in aulula ebullitis cum passo uel iuris semi sextario, quibus os ieiunus abluito, atq; quoad pituita deducitur, gargarizato. Hoc quippe capitis affectio num facilimum est præsidium. Saluberrimū quoq; fuerit, sinapi ex aqua mulsa calida macerato irrigatō ue, sobrium os colluere, & gargarizando à capite humorē deducere. Oportet autem caput ipsum antea tegmine quopiam calfacere, quo liquefacta pituita sine impedimento effluere possit. Quum hæc igitur quæ proposita sunt floccipenduntur inditia, cuiuscumodi ferē morbi succedere consueuerūt: Ophthalmiæ, glaucomata, aurium fissuræ, strumę in ceruice, cerebri tabes, *σφακλισμός* à Græcis dictus, *corryza*, grauedo, angina nocturna, tere dones, uua, profluuium capillorū, ulceratio capitis, dentium cruciatus.

Signa imminēntis morbi
thoracis.

Quum autē quippiam mali thorax passurus est, his signis portēditur: Sudor quidam undiq; corpus quidem occupat, sed thoracem maxime: lingua crassescit: eiciunt per spūta uel salua, uel amara, uel biliosa: in lateribus ac scapulis dolores citra occasionem oriuntur: oscedines crebrę, quæ *χολορρυ* à Græcis dicuntur: uigilie, suffocationes, sitis, ex somno animus merore affici: algores item pectoris, atque brachiorum, & manuum tremor, infestant. Quibus non imprudenter ad hunc modum succurritur. Vomitionem à cena non crapulosa quoad fieri potest ciere conuenit, absq; medicamine. Profunt etiam uomitus quos cibus sequitur, quos Græcorū nōnulli *εμετικισμός* nūcupant. Cui igitur sic placet uomere, radículas tenues, nasturtium, crucam, sinapi, portulacam deuoret: deinde aqua tepida hausta euomat. Qui dicta præfagia nauicēcerit, has affectiones metuat: Pleuritum, pulmonariā, melancholiā, febres

acutas,

- acutas, phrenitim, ueternū, & cum singulū ardorem. Si quis uero uentrem morbus occupaturus est, his signis prælagiri potest: Venter primus cōuoluitur & in sese ipso perturbatur, esculenta cum poculentis amari tudinem præferre putantur, genuum grauitas, lumborū rigor inflectilis, uniuersæ molis corporeæ lassitudo, idq; sine occasione, crurum torpedio stuporq; febriculæ exiles. Vbi hæc portenta senseris, uenter nullo medicamento quidē, sed uictus ratione mollificandus est. Satius enim ac longe tutius est sijs uti, quibus delinqui facile nō potest: ē quorū numero sunt, beta aqua mulsa decocta, allia elixa, malua, rumex, mercurialis, & omnia melle condita. Cuncta enim hæc alui sedimina deijciunt. Quod si præfagiorū aliquod magis magisque intendat, cnici liquorem omnibus decoctis confundito, suauior nanq; & tutior est. Vtilis item fuerit, leuis brassica in nō exigua aqua elixa, huius succus inquā quatuor heminarū mensura cum melle ac sale potui datus profuerit. Ciceris aut erui aqua in ieiunio epota eundem effectum habet. Hæc signa paruipendentibus, huiuscemodi affectiones superuenire solent: Ventris diarrhoea, hoc est, fluxus: dysenteria, lenteria, id est, intestinorū leuitas: uoluulus, *ἀλὺλὺς* à Græcis dictus: coxendix, febris tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoides, arthritidis.
- Quando aut uesicæ malum imminet, his notis deprehenditur: Post exitum etiam cibū plenitas infestare uidetur, peditus, cructuationes, uniuersi corporis pallor, somni graues, lotia lurida, & ægerrime emanantia, & circa pudenda cedemata. Quum hæc apparuerint præfagia, suppetijs odoratis lotia impellentibus opem ferre conuenit, id quod sine periculo futurū est. Sunt igitur scniculi apijq; radices in uino albo odorato macerandæ, unde ieiunus in matutino quotidie duosumat cyathos, cum aqua dauci, mirrhæ, enulæ campanæ, quodcunq; horū ad manū sit, iuxta enim singula iuuant: cicerum quoq; maceratorū aquam si cum uino potauerit, idem consequet. Qui uero dictas notas negligenter præterierit, hos morbos expectet: Hydropem, lienis magnitudinē, hepatis dolorem, *λιδιονίς*, quem calculum Romani dicunt: nephritū, id est renum affectionem: lotij stillicidium, plenitatem uentris. Cæterū in omnibus his quæ hactenus proposuimus signis, infantibus quidem clementiores, grandioribus uero natu efficaciores, medelas exhibebimus. Neq; post hæc silenter pertransibimus anni solstitia, in quibus singula quæq; accidunt: sed quæ ingerenda, offerendā ue, & à quibus abstinendū, tribus (ut aiunt) uerbis expedit. Exordiar itaq; à solstitio brumali.

Solstitium brumale.

- Solstitij brumalis tempore augetur in hominibus catarrhus, & humiditates, ad uernū usq; æquidiale. Calidiora itaq; tum ingerenda, & meracius prolixiusq; atq; ab origano bibendum est, libidiniq; indulgendum. Sunt autem usq; ad æquidiale dies nonaginta.

Æquinoctium uernum.

Ab æquinoctio uerno usq; ad uergiliarum exortum pituita, & dulcis

Præfagia morborum acutrimicubentiam.

Victus mollis alium.

Ventris incommoda.

Vesicæ morborum præfagia.

Actatis habenda ratio.

sanies, quos ichoras dicunt, sanguis in mortalibus, crescunt: idcirco quam maxime succosis acribusque utendum est, corpus diligenter & cum labore exercitandum. Concubitus tum quoque indulgendum. Numerantur uero usque ad uergiliarum ortum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

Hoc tempore crescit in hominibus bilis amara, & eiusdem qualitatis sanies, cruorque, ad æquinoctium usque æstiuale. Tum suauius aluum clementia ingerere, & Veneri minimum indulgere cōuenit. Numerantur autem ad solstitium usque æstiuum dies quinque & quadraginta.

Solstitium æstiuale.

19

Solstitij æstiuus tempus, atque bilis abundantiam in hominibus facit, usque ad æquinoctium autumnale. Utendum itaque egelidis undis, odoratisque omnibus: Venus uel omnino uitanda, uel simpliciter saltem ac candide, quæ de ipsa tradita sunt, admittenda. Inferuntur autem inter æstiuum solstitium & autumnale æquinoctium dies tres & nonaginta.

Æquinoctium autumnale.

Hoc æquinoctij autumnalis tempore pituita, & tenues fluxus in hominibus abundant, ad uergiliarum usque occasum. Oportet ergo tum fluxiones cohibere, & acerrima quæque, succosissimaque esitare, & quamminimū fieri potest uomere, sedulo corpus exercitare, & concubitus denique pro uiribus fugitare. Numerantur autem ab eo æquidialis usque dum uergiliæ occidunt, dies triginta sex.

Vergiliarum occasus.

Sub uergiliarum occasu augetur in hominibus humor pituitosus ad solstitium usque hyemale. Sumenda sunt igitur cibi loco maxime acerbæ, uina dulcissima: utendum præterea præpinguibus, exercitandum strenue. Sunt uero ad brumam usque dies quadragintaquinque.

LIBRI PRIMI FINIS.

In hoc uolumine totius operis secundo, de febribus potissimum agitur. Primo quidem de ijs quæ circa notificationem, uniuersamq; ipsarum apothérapeuticam animaduertenda incidunt; deinde super uniuscuiusq; febris speciei origine, atq; curatione; tertio de ijs quæ febrem comitantur symptomatis, compendio differuntur.

CAPITA SECUNDI LIBRI.

Præfatio libri secundi.	Caput 1	Aestuantium febrium cognitio.	XXIX
Quinam scopi in morbis præcipue febribus discutiendi sint.	II	Aestuantium febrium curatio.	XXX
Quodnam morbi principium dicendum sit, ex monumentis Galeni.	III	Febrium ab Erysipelate notificatio atque medela.	XXXI
Vnde tutus ne sit, an periculosus morbus, cognoscatur.	IIII	Quemadmodum hecticæ febres deprehendantur.	XXXII
Quibus notis acutum & diutinum morbum deprehendamus.	V	Hecticarum febrium medela.	XXXIII
Quemadmodum præciri possit quo pacto morbus soluendus sit.	VI	De hemitriteis.	XXXIIII
De diebus decretorijs.	VII	De publice grassantibus morbis.	XXXV
Decretoria signa si in principijs morborum apparent mala esse.	VIII	De peste, ex monumentis Ruphi.	XXXVI
Quemadmodum futura crisis prænosceda sit.	IX	De his qui plenitudine crudorum humorum infestantur.	XXXVII
Instans morborum iudicium quemadmodum sit agnoscendum.	X	De his qui præ tenuibus humoribus defatigati concidunt.	XXXVIII
Qua ratione optime tam peractam crism agnoscamus.	XI	De alijs occasionibus in quibus contingunt syncopæ.	XXXIX
De articularum pulsibus.	XII	De dolore.	XL
De alui excrementis.	XIII	De liquefactione.	XLI
De urinarum significatione.	XIIII	De uigilijs febricitantium.	XLII
Quid circa sputum considerandum.	XV	Curatio Cataphoræ.	XLIII
Ephemerarum significatio & medela.	XVI	Medela doloris capitis in febribus.	XLIIII
Quemadmodum febres ex putredine humorum accensas agnoscamus.	XVII	De curatione stomachi.	XLV
Curatio febrium quæ in humorum putredine accenduntur.	XVIII	De immoderatis febrium frigidibus rigoribusq;.	XLVI
Tertianæ inditia.	XIX	De sudoribus.	XLVII
Quo pacto tertianæ medendum sit.	XX	De iussu qui febricitantes infestat.	XLVIII
Tertianæ nothæ curatio.	XXI	De sternutamento.	XLIX
Quartanæ inditia.	XXII	De ciborum auersione.	L
De quartanarum febrium curatione.	XXIII	De bulimo, quod est fame prægrandi.	LI
Quotidianam febrem quibus inditijs deprehendere possis.	XXIIII	De canina appetentia.	LII
Curatio febris quotidianæ.	XXV	De siti.	LIII
De febre Epitela.	XXVI	De lingua salebrosa.	LIIII
De synochis febribus.	XXVII	De nausea.	LV
Qui continuæ febres deprehendantur, quibusq; prædictis curentur.	XXVIII	De cholemasia.	LVI
		De singultu.	LVII
		De aluo dura ac lubrica in febribus.	LVIII
		De stillicidio sanguinis, & eruptione sanguinis narium.	LIX
		De animi defectione.	LX
		Medela exulcerationis quæ os sacrum infestat.	LXI

56 PAVLI AEGINETAE

MEDICI PRAESTANTISSIMI, DE ARTE

MEDENDI LIBER SECVNDVS,

ALBANO TORINO

VITODVRENSI INTERPRETE.

De febribus, ex Galeni cæterorumq; complurium monumētis deprompta. Cap. I.



Ostquā tuendæ sanitatis artem superiori uolumine perstrinximus, in hoc quemadmodū male iam habentibus succurri, ualetudoq; aduersa profligi optime possit, à similiarum partium morbis tanquā simplicioribus exorsis, differere incipiemus. Cuius generis esse potissimū ei, quibus cognomētum febres, conspiciuntur. Rursus igitur cōpendiaria scribendi ratione, ex Galeni præsertim, cæterorum uero plurimorum etiam lucubrationibus Oribasio decerpta, & nos utentes, paucula quædam illi præterita referamus.

Quenam summatim capita in febrilibus præcipue morbis discutienda sint. Cap. II.



Nte omnia quidem disputare conuenit, salutaris ne, an exitialis ægritudo quempiā tentauerit. Deinde si salubris, num acuta, an diuturna. Hæc quippe & in alijs quoq; morbis uehementibus accurate inuestigāda censeo. Tertio, unō ne fasce & confertim decernat, quod est febribus peculiare, an particulatim soluat, indiscussum ne id quidem prætereundum est.

Quodnam morbi principium dicendum sit, ex Galeno. Cap. III.



Eq; profecto capitis dolores, neq; ardor, quemadmodū neq; uigilia, à cibisq; appetitus auersio, & uniuersi corporis grauitas, aut laboriosus deniq; sensus, imò unumquodq; horum quiduis potius quàm febris est. Febris dum quempiam inuadit, præsertim acuta, neq; nos latere, neq; quenquam uel imperitum ac stupidum potest. Esto autem, si uidetur, lateat: mirabor utiq; si diutius laborantem ipsum fugiat. Proinde illud tempus principium morbi appellemus, quū iam manifeste febrile orsi, decubuerint.

Vnde tutus ne sit an periculosus morbus cognoscatur. Cap. IIII.



Igna quidem letalia ducuntur, uultus nervosus, nasus acutus, oculi concaui, & quæcunq; alia pulchre sunt ab Hippocrate memorata: nisi uigilijs hæc, aut uehementi uentris solutioni, aut inedia deniq; succedant. Lucis præterea fuga, lachrymæ partim citra aliquam occasionem externam, partim oculis nulla peculia-

ri affectione correptis, fusæ. Ad hæc, alter ex oculis non nunquam altero minor apparet: quæq; in ijs alba esse oportebat, rubescunt, pallent, & nigricant: sordes uel innatant uel angulis inhærent, & per somnia oculorum alba cernuntur, palpebris non commissis, sed diductis, nisi id uel alui fluxione, uel permulta quapiam euacuatione eueniat, aut consuetudinis sitiplis casus & affecta: dentibus frendere, mentis inopem esse, floccos stragulis auellere, & festucas paleasq; excerpere, perniciosum est. Attendendus item accurate est decubitus. Nam supinum iacere, & tanquam resolutum, perq; cubile ad pedes delabi ac defluere, summæ imbecillitatis est inditium. Adhuc uero magis exitiosum, gelidus cum ex naribus tum ex ore efflans spiritus. Porro pulsus obscurus, densus, quumq; intercipitur ipsus, sudor item concisus & deliquium inducens, inter signa periculosa numerantur. Quocirca si uel uniuersa quæ recensuimus inditia, uel his adhuc etiam plura compareant, siue pauciora quidem, sed peiora, nulla salutari nota comitante, mortem præsentissimam portendunt. Expedita spiratio, pulsus inculpatus, mente constare, & bene se ad illa quæ offeruntur habere, uultus inde & cubatio bene habentibus ac sanis neuti quam dissimiles neq; abhorrentes, salubria & laudabilia signa ducenda sunt: Vno uerbo: Quæ rebus naturalibus maxime sunt aliena & contraria, perniciofa: Quæ uero ijs amica & similia, salubria tutaq; existimo. Postremo quæ à lorio, oletulo, sputoq; sumenda sunt inditia, paulò post exequemur.

Note salu-
tatis.

Quibus notis diutinum morbum deprehendamus. Cap. v.

Diuturnitas ægritudinis quatuor sanè nominibus deprehenditur: motu morbi, languentis habitu, pulsu, & febrium specie. Ex motione quidem morbi ad hunc modum: Quatuor numerantur particularis accessionis tempora. Vbi morbus acutior fuerit, non ocysus modo, sed minimo ferè temporis momento præteruolare consuevit: utpote cuius extremus terminus est septimana, pleriq; uero die quarto soluantur. Quod si longius quidem procrastinetur, neque tamen duodecimum terminorum spacium excedat, acutum esse morbum indicat, qui intra diem decimum quartum plerumque decernit. Atqui ubi adhuc diutius cunctatur & producit, atq; ita quidem ut exordium modo & incrementum in longiore diei ac noctis tempore amussatim perficiat, eiusmodi morbus diutinus seu longus, græce Chronicus dicitur. At si exacerbatione morbus particularem nullam obtinuerit, uerum ab initio ad finem usq; tanq; una & perpetua exacerbatione infestat, ceu in Cōtinuis datur liquidò cernere, hoc quodammodo inditium dicas esse grauiū. Ex constitutione uero ac habitu ægri hoc deprehenditur: siquidē moderato sit uultu, siq; reliquū etiā corpus uniuersum cōpressionem calamitatemq; minime uulgarem præferat, acutum morbum præfigit: At si omnino asym-

ptaton, hoc est, contractione & calamitate uacat, diutinu. Materiae enim quae longo tempore transmittitur, copiam significat. Atqui ab arteriaru motu scire & cognoscere hac quidem formula poteris. Pulsus magnus, ue hemens, uelox, densusq, grauem morbum indicat: contrarius uero, longum. Ex febrium deniq, specie, calidae quippe & urentes aegritudines quammaxime acutum morbum significant: Qui mitiores languidioresq, sunt, diuturnum ostendunt.

Quo pacto praesciri possit, qui morbus finiendus sit. Cap. VI.

Quemadmodum praesciri atq, cognosci possit, qua ratione morbus soluendus sit, ex his quae mox enumerauimus liquidd constat: Ex febrium uidelicet no specie solum, sed tempore: promptius tamen omnino a febrium (arbitror) specie. Calidi namq & urentes morbi, breues sunt, iudicatorijsq, diebus libenter decernunt. Clementiores uero mitioresq, diutini sunt, & magna ex parte finiuntur in abscessus. Ita liquet ex his quae diximus non modo quando, sed quo etiā pacto morbus soluendus sit. Vt enim in grauib, per excreta decretoriū magis perficitur, ita in diuturnis per abscessus.

De diebus decretorijs. Cap. VII.

In diebus decretorijs quidam sanè crebrò, cum fide, & salubriter, praeterea exacte & insignite admodum solunt. Quidam conditionibus ijs propemodū aduersis. Tertiusdecimus medium, inter utrunq, dierum genus, ordinem seruat. Sunt uero ex his quae recensuimus, qui simul atq, exiguum modo naturae impetum adepti sunt, decernunt: uerbi gratia, septimus & decimusquartus. Pleriq, tamen in uehementioribus naturae motibus morbos soluere nati, aliter decernere nequeūt. Caeterum neq, qui probi sunt, omnes iuxta probi sunt: neq, omnes qui prauī, omnes par ratione prauī: uerum neque certa cum serie bonitatē, prauitatemq, obtinent. Qui primae fortis sunt, hoc est, qui ex bonorum sunt catalago, isto pacto se habent. Primum ac praecipuū bonitatis locum possident, septimus & quartusdecimus. Secundum, nonus, undecimus & uigesimus. Proximi his bonitate sunt septimusdecimus, atque etiam quintus. Sequitur hos quartus, hūc uero tertius & duodeuigesimus. His quodāmodo contrarij, secundaeq, fortis hi sunt: Nocentissimus omnium, qui cum discrimine & obscure morbos decernit, tanq, ex diametro septimo oppositus, sextus est. Eiusdem notae factionisq, sunt octauus, decimusq. Post quos deinde sunt duodecimus, sextusdecimus, & undeuigesimus. Tertiusdecimus mediam inter hos ordines rationem obtinet, neque perinde abijciendus, ut hi qui secundi sunt ordinis: neque utiq, sic morbos soluere potest, sicuti ei qui primae fortis esse censentur. Et hunc quidem dignationis iudicatoriū ordinem Galenus usurpauit. Secundū post haec numerorum seriem boni iudicantur, tertius, quartus, quintus, septimus,

septimus, undecimus, quartusdecimus, decimus octauus, & uigessimus.

Mali uero, sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, & undeuigessimus. Mediam sibi inter bonos prauosq; sortem decimus tertius uindicat. Iudicatoriorum porro alij aliorum indices sunt: quos cōtemplatorios nuncupauit Hippocrates, eo quod, quæ sequenti decretorio die futura sunt iudicia, prælagiri ac præuideri in his possumus: quemadmodum quartus, futurum in septenario decretum de morbo prædicit, puta sudores quospiam, aut madores, uel particulares huiusmodi inanitiones nonnullas excitans, uel significationes insolentes & antea inusurpatas, uel cō-

*Mali decretorii
vij dies.*

*Quartus in
dex septimi.*

coctionis deniq; inditia, portendens. Verum Galenus sexti etiam (quam mali) quartum indicem esse asserit. Undecimus quartumdecimum præ se fert, & decimus septimus uigessimū. Et ad quartumdecimum usq; efficacissima uehementissimaq; redduntur super morbis decretoria. Proxima his sunt quæ usq; ad uigessimū sequuntur iudicia. Quæ post uigessimū usq; ad quadragessimū, pedetentim uehementiam remittunt. Primum tamen honoris locū uigessimus septimus, trigessimus quartus, & quadragessimus, obtinent. Post hos succedunt uigessimus quartus, trigessimus primus, & trigessimus septimus. Qui inter hos à uigesimo ad quadragessimū usq; iudicatoriorū numerus habetur, totus crisis siue iudicij expers est: quem admodum à quadragesimo ad unum omnes planè sunt languidi, cōcoctura magis & abscessibus, q̃ iudicationibus morbos solucentes. Quare alij omnibus qui post diem quadragessimū succedunt, Hippocrates medium quoq; unguem ostendere uidet. Sexagesimū tamē, & octogesimū, centesimumq; respicit. Post hos alia quidē septem mensibus, alia septem annis iudicari asserit: alia (ut uerisimile est) in binis annorū septenarijs et ternis.

Quod decretoriæ notæ, si in morborum initijs compareant, uitiosæ sint. Cap. VIII.



Ignæ concoctionis nunquam incommode cernuntur: quod omnis concoctio naturæ uictrici perficiatur, eoq; nunquam non salutaris habetur. Sed aliquando decretoriæ notæ non cōmode cernuntur, quoniam iudicium ambigit, nunc quidem bona, nunc diuerso mala, succedens, ceu mihi iam ante de iudicatorijs diebus ostensum est. Quapropter neq; in morborum principijs, neq; incrementi tempore utile ea est inditia conspiciere, sed in declinationis tempore, quum uidelicet natura morbum uincit & superat.

Quemadmodum futurū iudicium prænosendum sit. Cap. IX.



Quod si morborum exacerbationes intenduntur & sese anticipant, multoq; uehementiores reddantur, ac per tertium quencq; diem significationem sui exhibeant, inditia præterea concoctionis in lotio, oletulis, & sputo appareant, omnium ocysissime morbus decernet. At si exacerbationes cunctanter moueantur, eodemq; tempore aggrediantur, singulisq; diebus infestent, post longius temporis spacium de morbo iudicium spectabis. Qui porro cum concusa

sione cōmotioneque corporis, quod Græci *ῥίγος* uocant, maxime februnt, fieri nequit ut prius his morbus finiatur, quā rigor ac cōcussus remittatur, mitigeturque. Nam hæc si nihil remittat, fieri non potest, ut iam ad uigorē, quæ *ἀνὰ* græce dicitur, morbus peruenierit, nedum ad inclinationem.

Imminens morborum crisis qua ratione agnoscenda sit. Cap. xx.



Rauis omnino atque molesta nox, omne decretorium, quod interdiu aduenit, semper præcedit: Quod uero noctu agetur, dies antecedit difficilis, & inquieta. Superueniunt uero casus seu accidentia, capitis dolor, quam cephalalgiam uocant, qui nunquam antea fuit: ceruicis dolor: præcordia quoque ad superna trahuntur: Spirandi item difficultas derepente oboritur: necnon & alia quædam molesta symptōmata, quæ ægrum prius nunquam affligerunt, apparent. Quin si ipsi incidentibus pulsus quoque non concidant, sed in altum magis attollant, & uehementiores reddantur (symbolum tamen decretorius dies sui ipsius exhibens, ipse maxime ex bene iudicantiū numero existit) non futurū tantum iudicatorium diem, uerum salubrem etiam eum sperato. Percussus autem in his minime fueris, nec si desipere hominem, aut exilire conspexeris: Nam hæc superiora humores petere indicant. Veluti e contrario alia signa sunt, quæ succos inferiora subire portant: lumbis scilicet lacinatio, rosioque, circa umbilicū torsio, (quæ *σπασμός* Græce dicitur) lumborum dolor, & uentris murmuratio. Sæpius alia quoque his cognata inditia apparent. Ad hæc, si ægrotans per hæmorrhoidas euacuari consueuit, eiusque uacuationis periodus incidit. Pari modo in menstruis purgationibus, si mulier est quæ langueat, nihil absurdum per illiusmodi uacuationem morbi crīsim cōtingere. Porro sudores non ex corporis modo qui antecesserunt maioribus, præsertim in die contemplatorio, sed etiam meatuum laxatione præscire conuenit. Decretoria uero quæ supernis euacuationibus perficiuntur, ex ipsis potissimum deprehendes. Contēplandus quippe præter hæc quæ mox retulimus, laborantis etiam uultus, & si quam eius partem palpitare, uel uenas temporum percutere, genas, nasum, oculumque solito magis rubescere conspexeris, per superna potius uacuationem expectabis. Quod si præter uoluntatem illachrymant, uel splendores se intueri imaginantur, manusque ad nares scalpendi gratia tulerint, tum haud amplius futurum, sed magis iam manantem sanguinem cernes. Semel enim atque iterum uel leniter fricantibus, prorūpit. Rosio oris uentriculi, inferiorisque labij tremor, iudicium per uomitū fore multotiens insinuāt. Sed de his hæcenus. Accedunt etiam his quæ spem nostrā cōfirmant, ægrotantis ætas, natura, & insuper anni tempus, & præsens aeris cōstitutio. Vbi enim adolescens fuerit ægrotans, aut aliās naturæ calidæ, aut sanguineus, tum maior habenda spes est. Si iam antea eisdem, siue bene siue male habenti, sanguinis uacuatio facta est, ceu supra retulimus, hoc solū satis fuerit ad perfluendi sanguinis spem exhibendam. Si uero anni tempus æstas sit, uel si æstas quidem non sit, sed aliās præsentis

*Symptōmata
crisis.*

*Delirium in morbis
non semper
letale.*

40

ris

tis status aëris calidus, & sæpenumero illo tempore sanguinis fluore labores iudicati sunt. Adhæc præterea refertur sanguine corpus, & solenniū inanitionū moratio, & hæc quippe maiorem tibi spem exhibuerint. Pariformiter in reliquis quoque euacuationibus ratiocinandum est. Quod si horum nihil conspiciat, sed æger in aliquo iudicatoriorum, qui a vigesimo maxime sunt, dierum discutiatur, ac morbo in summo iam incremento existente, dolores in aliquo articularum, aut circa aures, aut in alijs quoque partibus, uel nulli quidem dolores, sed sudores particulares in membris aliquot iugiter exdant, per abscessus iudicium fore sperabis. Cæterum ea corporis præcipue
 30 particula laborabit abscessu, quæ sudores, dolores, tumoresque exercuerit.

Quemadmodum optimam iam peractam crismam agnoscamus. Cap. XI.



Icōueniens à cōcoctione euacuatio peracta est, & febris ægro tantum missum fecit, & ab alijs accidentibus vindicatus est, tum maior etiam pro uacuationis ratione colori gratia accessit, uegetiorque, ac sese erigendo robustior est redditus, quodque in primis periculo uacat, facilis toleratio hæc comitatur, saluberrimum hoc decretorium habetur. Verum si quo horum deficiatur, tantum aberit ab optimo, quantum præpollet id quo deficitur.

De pulsibus ex libris Galeni. Cap. XII.



Visus est cordis & arteriarum agitatio, quæ insurgendo seque extollendo, quod *συσπλην* Greci, contrahendo & consolidando, quod *συσσπλην* idem nuncupant conficere. Visum porro duplicem eius esse uel cæco liquere existimo. Eleuatione etenim, quasi expansione quadam extensioneque arteriæ, gelidus aër ingreditur, qui robur tonumque uitale, unde spiritus quoque animalis gignitur, sufflat, exulscitatque: Contractio-
 30 ne autem, quum confellu ueluti cōniuentia quadam & ascensu extremitatum ipsius arteriæ circa centrum existente, uaporosarum superfluitatum excretio fit euaporatioque. Arteriæ autem ipsæ secundum longitudinem uascula
 40 quædam concaua, quemadmodum & ipsæ quoque uenæ, sunt: uerum propter memoratam iam pridem motionem duabus tunicis distincta, & quoniam sanguinis cum spiritu abundantiore mixti, sint conceptacula, quæ e corde quidem proueniunt, sed per singulos corporis artus diffunduntur. Omnes itaque citra exceptionem arteriæ, pari quodammodo ratione ferunt atque pulsant, cum inter sese mutuo, tum ipso etiam corde, quo ex unaquaque ipsarum, cæterarum etiam ratio colligi possit. Neutiquam tamen fieri potest, ut motus omnium iuxta sentiat, sed promptius quidem multoque magis expedite in partibus corporis carnibus quodammodo exutis, exortibusque: obscurius autem minusque euidenter in carnosis partibus: neque enim
 aptiores, honestiores, aut commodiores denique usui habentur aliæ. Parum enim imò nihil egerit, quisquis uolam manuum in pulsus exploratione tetigerit.

Pulsuum genera.

Est igitur primum genus pulsuum, quod secundum motionis tempus, tam in diastole quàm systole cōsiderat. Diuersitates atq; discrimina quædam eius generis pulsus habentur: quoniam est & citus, & lentus, & mediocris. Quicquid enim mouetur, aut præcipitanter, aut cunctanter, aut mature, hoc est mediocriter, temporis ratione, mouetur. Citus autē est, qui breui temporis spacio, crebriori mouet intercapedine. Lentus autē tardus uē, qui longo admodum tempore, modico cōmouetur intervallo. Mediocris uero, qui mediū quoddā inter mouendū ad unguē obtinet.

De quantitate diastoles.

Alterum uero pulsuum genus, est secundum quantitatem diastoles, id est extēsiōis. Quoduis enim corpus tribus dimensionibus cōstat, longitudine, latitudine, et profunditate. Quū autē & arteria sit corpus, necessum est ut eadem quoq; tres habeat dimensiones atq; distantias. Verū in animante secundū naturā se habente, mediocriter atq; ad eō ipsam cōuenienter etiā modis omnibus distensam reperies arteriam. In eo autē quod præter naturam affectum est, pro re nata partim quidem deficit, partim uero excedit, atq; modū ipsum plus iustō superat. Secundū igitur unamquamque dimensionem oportet non esse immemorem, cuiusmodi fuerit naturalis pulsus: Nam si latitudine excellere deprehendatur, ab eadem dimensione Latī nomen adipiscit: si longitudine, Longi; si in altitudine, Altī nōmine gaudet. Liquidō uero constat, quod illis cōtrarij & naturalibus exliores percussus iuxta proportionē uniuscuiusq; alius angustus, alius breuis, alius humilis deniq; appellatur. Eorum uero quæ in singulis dimensionibus nō dissimiliter à naturali constitutione permutant, id quod in ea dimensione diminutū est, paruū, quod uero adauctum, magnum nuncupatur. Tertium uero pulsuum genus à robore uirtutis deprehenditur. Differentiæ uero eius tres sunt: Vehemens, debilis, & medius. Vehemens est, qui uiolenta percussione ferit tactum medici. Debilis uero siue obscurus pulsus, qui inualidum atque imbecillum percussum efficit.

Pulsus à tono
arrium.

Vehemens.

Debilis.

Medius.

Medius uero est, qui mediā quandam proportionē seruat ad utrumq; quem quidam naturalem esse autumauere: Nam in furore iræ uē, necnon & exercitationibus ipsis, pulsuum qui secundū naturam non est, uehementiorem fieri produnt. Quibus Galenus utiq; occurrit, pulsuum qui ex causis non naturalibus uehementius intēdi assueuit, non modo instabilem, sed prompte se ex quauis etiam occasione (ceu Protea) transmutantē, affirmans. Quisquis igit uehementior pulsus haud ita prompte sese transmutat, is naturalis & moderatus, seu medius æstimandus est.

Pulsus secundum constitutionem arteriæ.

Tertium pulsuum genus est, quod circa constitutionē atq; substantiam instrumenti, arteriæ corpus inquam uersatur. Sunt uero & huius generis differentiæ tres: Aut enim duritius, quàm natura ferat, instrumentū est, & durus appellatur pulsus; aut mollius, & ob id mollis dicitur: aut proportionem

portionē habens ad utrūq; , & in hoc moderatus siue medius nūcupetur.

Secundum quantitatem plenitatis arteriæ.

Quintum genus pulsuum est, quod secundū quantitātē repletionis arteriæ fit. Et hoc quoq; tribus differentijs dirimunt. Nam alius plenus est, alius uacuus, alius deniq; medius. Quandoquidem & unumquodq; uasculum aut plenum, aut uacuum, aut mediocriter refertum esse perhibetur.

Plenus itaq; pulsus est, (quemadmodum definit Archigenes) qui cor- Plenus.
pulentiorē ac pleniorē etiā præ se fert arteriam, & *ὑπερπληρὴς* eius in
succositate *ὑπερπληρὴς*. Tota enim humidior corpulentiorq; apprehen-
10 su est. Vacuus autem, qui ebullitioni siue bullæ aquæ tumefactæ simi- Vacuus.
lem arteriæ eleuationem efficit, ut secundum impressionem digitorū, quæ
si uacua quædā (pulsu sub tactū cadente) inambulatione cōtingat. Hæc igitur
quinq; pulsuum genera secundū eandē arteriæ motionē constituunt.

Pulsus à qualitate caloris.

Quoniam autem qualitas caloris qui in corde continetur, uidetur quodammodo magis secundum arteriam euidenter apparere, censuerunt hoc sextum etiā pulsuum genus non iniuria inter prædictorum seriem connumerandum. Reliquorum uero generum, quæ tum singulatim tum uniuersim accipiuntur, aliud sanè iuxta tempus quietis, aliud pararhythmū,
20 aliud secundum æqualitatem & inæqualitatem, quoddam etiā secundum ordinem, quoddam rursum secundum inordinationem.

Id igitur quod secundum tempus quietis est, septimum in ordine, à primo dirimitur (nam ab eo nonnullo discrimine dissidet) in densum, rarum, & medium. Nam eius arteriæ, quæ mouetur gemino motu, ex contrarijs motionibus composito, necesse est duplicem contingere quietem: alterā quidem post eleuationem & distensionem ante cōpressionem, contractionem uel; alteram uero post cōpressionē ante eleuationē, quam pleriq; sensu percipi non posse autumauerunt, ut inter duos motus, tranquillitas aliqua intercipiatur. Cui itaq; longū tranquillitatis est tempus, hic
30 appelletur rarus: cui breue, densus seu creber: cui mediocre, medius.

Pulsus secundum rhythmum.

Octauum genus pulsū pararhythmū est. Est uero rhythmus in genere habitudo quædā, siue proportio temporis ad tempus. Cæterū in pulsu secundū tempora quædam ipsius motus, ad tempus tranquillitatis, uerbi causa, distentionis & cōtractionis ad aliquod tempus, quod est medium inter quietem; iuxta aliorū autem sententiam, temporis aut motus ad motionem, ueluti distentionis ad cōtractionem cōpressionemq; aut quietis ad quietem, quemadmodū interioris ad exteriorē. Differentiæ autē rhythmī principes sunt due, Eurhythmus, & Arrhythmus, quasi consonantiā
40 & dissonantiā dicas. Arrhythmon, nō sanè nullum rhythmū habentē, hoc Arrhythmus.
quippe fieri nequit, sed inconcinnū *καταρρυθμὸν*, ceu *ἀρρυθμὸν* & *ἀτεθέλον*, id est, mutum & trūcum dicimus: hunc qui uitiatam ceruicem, illum qui uocem habet obscuram. Iam uero arrhythmus trifariam dirimitur: pararhythmus

Paraly-
tismus.
Heterorhyth-
mus.
Ecrhythmus.

enim est, qui mediocrem quasi iam adproximantem *υποδυμν*, hoc est bonę consonantię, deprauationē habet. Heterorhythmus magna ex parte digreditur ac pręuāricatur. Ecrhythmus uero toto (quod aiunt) cœlo à uero tramite errat, & omnem concinnitatem peruertit atq; corrumpit. Huius rei quam assero signum & argumētū est pulsio. Peculiaris quippe ac proprius puerilis ætatis pulsus secundum rhythmū, eurhythmus (consonus) nūcupat. In flore atq; uigore ætatis, heterorhythmus: quasi absonus & alterius ætatis numerus. Qui uero huius ætatis rhythmū penitus non seruat, ecrhythmus appellabit. De æqualitate & inæqualitate.

Nonum genus pulsū est, quod in omnibus generibus supradictis deprehendit, secundū æqualitatē & inæqualitatē, id quod uel in uno dumtaxat pulsu, uel in pluribus contemplat: quod etiam systematicū siue collectiuum nūcupat. De quo in primis, q̄ fieri potest lucidissime, differendū est.

Planus.

Planus æqualis uel pulsus est, qui consequenter æqualis est secundū magnitudinem, tenorē, aut celeritatem, aut secundum aliquid reliquorū, siue etiam secundū omnia. Inæqualis seu uariis, qui serie sua inæqualis est: nam si forte deinceps omnes magnitudine ad unguē pares inciderint, inæqualis huiuscemodi pulsus appellabitur. Quod si primus & secundus atq; tertius æquales uidebuntur, quartus uero inæqualis, is nimirū Inæqualis secundum magnitudinē pulsus nomen habet. Cuius generis omnino sunt,

Inæqualis.

Deficiens.

deficiens & intercidens. Haud enim uno solum dempto, aut pluriū etiam magnarum percussionum respectu, minor apparebit, sed nonnunquā penitus omni motu deperdito immobilis arteria permanet, & uocat pulsus deficiens: quemadmodum alter contrarius huic Intercidens, quum in medio expectatę quietis percussio quædam ueluti in uniuersum superflua intercidit. Sin autem secunda sit minor quàm prima percussio, tertia uero exilior secunda, quarta, tertia, & sic consimiliter deinceps usq; ad quam plurimas, huiuscemodi sanè Medici pulsus *μυωολιστος* & *μυωπος* appellant, de figurarum ratione, quę in acutum desinunt, appellationem mutuantes. Quotquot sanè eorundem usq; diminuuntur, neq; unq; ab eiusmodi affectione quiescunt, in immobilitatē prorsus finiunt, quos uulgò deficientes nūcupamus *μυωωπος*. Quotquot præterea interquiescunt, duplicem habent differentiā. Nam certe ex his nonnulli in ea qua primū quieuerūt prauitate, hanc ueluti mordicus per totum obseruāt. Quidam uero increscunt & augētur denuo, aut scilicet in parem quę à principio statim superuenit magnitudinē, aut in minorē, aut in maiorē, quos *μυωωπος* recurrētes uocant: Fiunt aut pulsus *μυωωπος*, licet sit nonnunq; iuxta quēuis pulsus inæqualitas, super quibus suo loco haud multo post pressius ageť. Eiusmodi utiq; pulsuum inæqualitas est, quę *ορυσμωωπος* appellat. Quæ uero secundū unumquę percussum, aut singulas etiam arterię partes, aut differentes densitates, efficiť, (quemadmodū ea quę motione existit) uniuscuiusq; sanè arterię partis inæqualitatis nomen sortiet. Quū uero sub aliquo digitulo aliter motum auspicata, aliter uero absoluerit, finieritq; ea quę mouet arteria incipiens

Intercidens.

incipiens multo quidem celerior, finiens uero segnior, uel ediuerso. Accidit autem hoc trifariam, aut motu indefinenter persistente, aut euanescente, & ceu postliminio reuertente, & quasi geminato percussu feriente.

Quapropter si continuo persistens, neque abruptus à ueloci in segniorem, aut contra, permutetur, & re & nomine eiusmodi pulsus dispar est: Sin aut sensim aliquantulum intercisus, deinceps uelocior appareat, *σπρονδίζων*, *pulsus caprisans.* quod est caprisans uocat, à caprea, quæ Græcis *σπρονδίζων* dicitur, sumpta metaphora. Ea saltatio hæret sublimis in aëre, atque alterum quempiam inopinatum multo celeriore perpetrat saltum.

Quod si percussus facta distractione regrediens, ante contractionem exacte denuo apprehensum tactumque ferierit, *δισπρονδίζων* à geminata percussione à Græcis, à Latinis uero bis pulsans talis appellatur. Huius rei imaginem quandam uidere licet in incudibus, quum uidelicet mallei semel quidem per manum sublatis in ipsas uerberant, reciprocantes ex incudis repercussione iterum atque iterum uerberant. Cæterum non solum secundum tempus motionis, quæ in singulis percussionibus est, qualibet arteriæ particula possibile est inæqualitatem contingere, uerum secundum etiam robur uirium, non tamen quantitate dimensionum, interuallorumue, non enim possibile ipsum pulsum in eadem particula magnum ac paruum fieri, neque etiam secundum aliud genus, sed in diuersis differentibusque partibus, arteriæ ipsius partiæ, incli-
nantes. In uno pulsu inæqualitas fit duplex: Nunc quidem motu perpetuo manente, & arteria sub aliquot digitis ocyus, sub aliquibus uero cunctantius, mota: Nunc uero motu intercepto, perinde atque si digiti quidam motui occurrant, nonnulli uero minime. Secundum item quantitatem distentionis, quæ in permultis partibus inæqualitatis euidenter apparet: Cuius farinæ sunt *μύσους*, iuxta quemlibet ictum adnutantes & circumnutantes: nam si secundum interiorem digitum magnus pulsus recidens & eleuatus ex ratione diminueretur, ita ut ab exteriori parte laborantis pollicis minima arteriæ particula appareat, *μύσους* nuncupatur, ad instar caudæ animalculi muris: aut *μύνους* à minuendo, in modum ritumque caudæ. Sin aut sub medijs digitis magnus recidens, atque eleuatus utrinque minuatur, minor apparens, hunc Archigenes nutantem & circumnutantem appellauit, uolens perspicue significare breuitatem diastoles cum ea quæ est ab utrisque limitibus, uerbi causa, in nutatione: haud enim tanquam ab intercisus statim, sed perinde atque in inflexis utrinque partibus in breuitatem contractus est *μύνους* magnitudine, pro utraque parte.

De inæqualitate ad magnitudinem.

Inæqualitate uero ad magnitudinem ipsam quoque celeritatem aut se-
ram etiã tarditatem assumentem, pulsus æstuantem & instar uermium sese mouentes fiunt: Sin autem & id quod est secundum thesim acceperit, & *αετμοειδής* & *κλωιδής* appellati constituntur. Ordinandum itaque ab undosis æstuantibusue, in quibus non simul, secundum istiusmodi inæqualitatem, tota arteria apparet distenta, sed hoc quidem primum, hoc secundum, item tertium

atq; quartū, motu continuo perdurante, instar elationis undarū: Nō nullę quidē in rectū omnino fluctū meantē habent: aliquę uero in obliquū declinant: aliquę in breui secundū longitudinē distantia, altitudinē sufficientē: quædam autem ediuerso: Quædam præterea latum, quædam item angustum & arcū. Pari etiā modo & iuxta celeritatem atq; tenorem inæqualiter se habēt. Fluctuās aut undosus uē totus in paruitatē decrescens, *σκωλακίζω*, id est uermiculans nūcupat, uermiū gressu persimilis. Quemadmodū aut pulsus undosus minorē effectū *σκωλακίζω* excipit, ita & *σκωλακίζομαι*, id est uermiculantem excipit alius, qui *μυρμικίζω*, id est, formicans indigita: quando uidelicet deficientibus motionibus permultis, in unam atq; eandem perquā exiguā omnino finiunt. Inditum aut & huic pulsui à similitudine animantis, quod Græci *μυρμικα*, Romani formicā dicunt, nomen est, cum propter paruitatē tum propter motionis speciē. Est enim uehementer pusillus formicans pulsus, quo nullus alius certe minor esse deprehenditur: consimiliter & omniū obscurissimus, multoq; densissimus, minime iuxta Archigenis sententiā uelox. Adhæret huic adiacetq; pulsus hecticus: Quemadmodū enim febriū una species est hectica, ita & pulsus habet hecticus, qui sanē nullam ingentē mutationem admittit, sed perpetuò in eodem tenore persistēs, qualisq; deinceps ut ab initio cœpit cōnectens, neq; unquā totum habitū morbose mutatu soluit. Pulsus autem *αασμωδός* 20: uerinq; ex finibus extremitatū protractū atq; extensū, contractūq; siue conuulsū uidentē, instar chordæ alicuius extensæ sensum præbentes. In ramosis motiuis uē autem (sic enim *κλωνωδός* interpretor) nihil istiusmodi, sed maior quædam in his est distensio eleuatioq; tanq; partium arteriæ, quæ quidem secundū unum idemq; tempus emergūt, referūtq; potissimum si quis motum eorum assimilauerit iaculis, quæ uiolenter emissæ ocysissime uibrata ferūtur. *Εμπριός* aut, id est secans pulsus, est quum uidetur quipiam esse laxatum in arteria, quando uidelicet ipsa non durior, sed molliuscula esse tactui apparet. Habet autem quandā etiam turbulentiam pulsus iste, & celer quidem ac densus, non semper tamen magnus est. 30

Pulsus uermiculans.

Pulsus hecticus.

Σπασμωδός.

Κλωνωδός.

Εμπριός.

Pulsus ex inæqualitate ordinis ex inordinationis.

Decimū pulsuum genus ex prædictis est, quod ex inæqualitate secundum ordinem & inordinationē nascitur. Hic enim ordinatus & inordinatus est: Secto inæquali in æquale secundū circuitus, atq; omnino etiam in dispar & inguale, secundum utranq; sectionū originem habent, puta secundum circuituū æquale, ordinatus: iuxta uero uicissim modis omnibus inæquale atq; distortum, inordinatus. Aequalis enim uero pulsus ad unguem etiam, ordinatus est, si modo æqualem deinceps ipsum diximus. Inæqualis aut nō omnino inordinatus: si enim equalitatē corrūpit, circuitum uero aliquē seruat, ut in eo qui est secundum quantitatem diaholes, si forte cōtigerit duos fieri magnos & unum paruū, inde uero rursum duos paruos & unum magnū, & sic cōsequenter, nuncupari possit eiuscemodi pulsus inæqualis quidem, sed ordinatus: Sin aut dum æqualitatē destruit nullū seruat ordinē, inæqualitatis ad disparitatem inordinatus talis esse dicatur.

citur. Pari etiā modo & in alijs hiſce generibus. Ex inordinatis porrò nō nulli ſunt per omnia inordinati, ne puſillā aliquā ſeruātes periodū: alij uero ſecundū periodos ordinati, quatenus enim uero cōtinenti ordine deſtituunt, inordinati uocent: quatenus aut periodū ſeruāt, ſecundū periodos ordinati dicent: ueluti ſi cōtigērit fieri, duos magnos atq; duos etiam paruos, inde tres magnos & totidē paruos, item quatuor magnos & totidem paruos: & rurſum tanq; recurrētes, duos magnos & duos paruos, & tres magnos cum totidē paruis: & ſic deinceps in alijs. Sciendū aut quod cuili bet aliorū oppoſitorū eſt aliquis medius: equali aut & inaequali nullus eſt medius. Necq; inter ordinatū etiā & inordinatū quiſpiā habet medius, niſi uolueris ſecundū periodos ordinē ſeruante, mediū inter ordinatū et inordinatū dicere. Et cæterorū quidē medijs ſunt ſecundū naturā, præterq; eius qui in uehementia & obſcuritate quemadmodū oſtendimus, conſtituit. Ex eorū aut numero ſolus æqualis planus ue eſt ſecundū naturā, reliqui uero ad unū omnes præter naturā, tum inæqualis, tum ordinatus, tum & inordinatus. Hæc itaq; ſunt genera pulſuū uniuerſa, atq; ſecundū genus ipſorū differentiae. De inæqualitate theſis atq; motus.

Quidā tamen hiſ & alia duo adnumerauerūt. Primū quidem in poſitione arteriæ, prout ſurſum ac deorſum, in dextrā aut ſiniſtram tendere ui-
 29 detur: Alterū genus in motu, puta ſi promptius ac maturius, uel ſerius ac ſegnius moueat: ē quorum numero eſſe diximus undofos & ramoſos, qui *undofos* à Græcis uocant, pulſus. Hactenus quidem ſimplices tantū paucis admodum perſtrinximus pulſuum differentias: ē prædictis aut, ſi modo animo eaſdem probe conceperimus, facile & cōpoſitas inueniemus.

De pulſuum cauſis.

Deinceps uero de pulſuū cauſis diſſerendū eſt, quas ſequunt, & à quibus præſagiū, atq; præcognitio à magnitudine igi, quæ ceteris magis eſt perſpicua, exordiū ſumemus. Magnus itaq; ſit pulſus aut propter neceſſitatē urgentē, quæ eſt utiq; in corde plus iuſtò abundās caliditas, flabelli in
 30 ſtar incubens animationi externæ: aut propter corporis gracilitatē macilentiamq; quemadmodum paulò poſt indicabimus. Augeſ uero calor uel propter cauſas naturales, puta ætatis florē atq; uigorem, necnō & pueritiam, aut ſimpliciter propter calidā temporis cōſtitutionē, aut regionem, aut temperaturam calidiorem: Aut nō naturales, ut corpus circūplectens caliditas, lauacra calida, exercitationes, eſculenta, poculenta, medicamenta calfaciendi facultatē habentia, uel etiam ea quæ ſunt cōtra naturā, uerbi cauſa, diſtemperatura calida, humorū corruptio, putrefactioq; furor, & id genus alia. Diſcernes aut ſingulorū mortalium pulſum, ſi inter hæc quæ ſecundum naturam ſe habent, magnitudo ſit conſtans ac permanens, in
 40 cæteris uero procliuius permutetur, & etiam dum te pertractante, ocuus nec multo poſt reſtituatur. Et magnis quidem pulſibus, qui ex calidis lauacris proueniunt, mollities accedit: quemadmodum etiam hiſ qui ex calido maxima cum ariditate diſtemperamento proueniunt, durities.

Qui autem exercitationibus moderatis nauant operam, & perfricantur, medium quendam statum habent inter duritiem & mollitiem: sed quæ pe-
 ctori sunt uicina, calidiora sunt, id quod etiam iracundis usu uenit. Non
 nullis uero propter cibi aut uini usum, aut furorem, ad magnitudinem &
 uehementia pulsus accedit: porro qui animum, furoremque, aut aliud
 quoduis facinus celare conantur, cōtra (quemadmodū fieri solet) præscri-
 ptum medici, uerbi causa, calidum medicamentum, & medicum cum ta-
 ctu pulsus sciscitantem, celare cupiunt, ad magnitudinem etiam euidentem
 inæqualitas accedit. In hoc autem casu & languentis ingenium, af-
 fectusque, & mos, non parum opis ferūt ad cognitionē indagandam: Mos
 quidem, affectus ne sit uehementer erga medicamenta, an abhorreat: In-
 genium uero, stupidumne nactus sit, uel contrā, & *ἀσθενὲς αὐτοῦ*. Qui ue-
 ro pulsus magnus ē putrefactione humorum factus, præter magnitudi-
 nem systolen etiam magis accelerantem habet. Sed quo pulsus ipse ma-
 gnus reddatur, non satis sunt quæ ad usum tantummodo spectant, uerum
 oportet etiam uirtutem subministrantem, & ipsum instrumentum symme-
 triæ secundū duritiem & mollitiem accedere. Quum igitur cordis auctus
 fuerit calor ex quacunque prædictarū causarum, primum quidem pulsus
 redditur magnus: Vbi uero ad usum magnitudo non sufficit, protinus ei
 uelocitas quoque accedit: Quod si etiam tum quippiam desiderabit, den-
 sitatem quoque assumit. Parui uero & tardi, & rari pulsus, etiam à cōtrarijs
 fiunt. Cæterum quotiescunque à magno, celeri, ac denso, in oppositos sit
 transmutatio, usu uidelicet deficiente, neque amplius quod primum in
 pulsu factum quiescit, sed quod posterius enatum emicuit, primum abiit,
 cit, redditurque protinus rarus, deinde tardus, postremo etiam paruus.
 Quod si magna ex parte tarditas ac paruitas usu uenerit, rursus raritas in
 densitatem demigrat, utcunque per ipsam, quæ ad necessitatem spectant,
 perfecta fuerint. Hæ igitur magni, uelocis, densi, & contrariorum etiam
 pulsum habentur causæ.

Pulsus una tantum dimensione præuaricantes.

Adnectenda uero etiam his quæ secundum unam duntaxat dimensio-
 nem redditur ipsius pulsus deprauatio, præuaricatioque. Latitudo itaque nō
 nisi per humorem plus iusto superabundantem augetur, siue id secundū
 naturam, siue ab externis occasionibus contingat. Quemadmodum alti-
 tudo propter organi tantum mollitudinē, addita in hoc interim etiam uir-
 tute. Longitudo autē ab ariditate & liquefactione carniū circūiacentium
 citra controuersiam concinnatur, alijs dimensionibus cōfluentibus: neque
 enim fieri potest ut prolixior quæ natura fert, ipsa reddat arteria, & magis
 si quis proprie gracilem huiusmodi appelleret pulsum, quemadmodum
 huic oppositum qui latitudine modo auctus est & profunditate, plenum
 seu solidum. Affectionibus his quoque contrarijs pulsus interdum inter-
 cidit, & secundum aliquam aut aliquas dimensiones prohibetur, humi-
 lis quispiam aut strictus aut brevis apparet, quum tamen talis re ipsa non
 sit,

fit, sed propter crassitudinē pinguedinis cuiuspiam, aut carniū aut membranarum adnatarum. Nonnunquā etiam totus exiguus uidetur, cum non sit reuera paruus, & obscurus consimiliter. Sed quid hæc pluribus recensceo, quum sæpenumero uisum sit nonnullis consummatam admodum *ἀσπυξίαν*, (id est nullam omnino arteriarum pulsationem) in omnibus quorundam arterijs deprehendisse, quum tamen reuera minime gentium sic esset, & præcipue eis qui minus accurate apprehensu tentantur, uerū propter molem carniū latitat motus uerē obscurus. Nemo itaque sibi persuadeat exactam asphyxiam homine etiamdum superstitē unquam uluere posse: quemadmodum ediuerso in membris macilentis parumquā carnis, etiam exiles pulsus magni uidentur, expanso nimirum uehementer corpore: arteria quæ dorsalis secundum spinam, epigastrii motum subinde insinuat: nonnullæ etiam earum quæ in membris hæcenus obscuræ latebant. Proinde singulæ causæ sunt exactæ diligentia rimandæ, & discutiendæ, ne nos subterfugiat cognitio.

Asphyxiæ bonum superfluum fieri nequit.

causæ singulæ

Vehemens autem pulsus à potentia uirium prouenit, nulla alia contra moliente causa, usu tantū deficiente, aut prope instrumenti rigorem atque duritiem. Obscurus uero pulsus imbecillæ atque infirmæ uirtutis, & humilior etiam solius est proles, etiam si nihil aliud suppetias tulerit. Vehemens itaque pulsus omnibus eget ad sui generationem causis. Obscuri sola debilitas parens est. Qui ergo ab initio statim uehemens existit, ætates, tempora, regiones, bene temperatum temperamentum comitatur: obscurus autem maligne temperatam temperaturam sequitur.

Sed qui ex obscuritate transiit in uehementiam, fit uirtute conualescens ex præterita uoletudine aduersa: conualescit autem uel beneficio eorum quæ intra corpus habentur, uerbi causa, humorum missione, aut excretionē, aut animo siue furore, uel quæ foris adueniunt, puta potus, cibi, exercitationes, & quæcunque intemperaturam emendant. Vires uero corporis dissoluunt & demoliuntur, inediæ, uigiliæ, euacuationes immoderate, mœrores, curæ, dolores præsertim syncoptici, & quæcunque denique uitiosum temperamentū cōciliant. Quidam in exercitatorū etiam pulsū durum, uehementem existere putauerunt: uerum exercitatum considerationem, tactumque minime potest effugere. Vehemens etenim pulsus magna ex parte cum magnitudine in altum attollitur, feriens tactum ualide ac uiolenter. Durus autem, magnitudinem nullus, propter duritiem arteriæ, admittit. Durum igitur pulsū instrumenti duritia maxime reddit: quā quidem uel frigus supra modum intensum, uel ariditas, uel extensio à phlegmone, id est inflammatione, aut cōuulsio denique inducere sueuit. Protinus autem duritiæ paruitas quoque, & celeritas interdum, & densitas, magnitudinis loco, propter usum & necessitatē succedit, quæ admodū & mollis pulsus humiditatem arteriæ comitatur: & hanc quidem longe liquidiorē, humidiorēque efficiunt. Ex rebus quidē non naturalibus

Quæ uires dissoluant.

Instrumenti duritia

Plenus pulsus

esculenta liquidiora, lauacra compluria, somni prolixi & immoderati; uetus præterea ratio delicatior, & animi delectatio atque hilaritas. Ex his uero quæ contra naturam sunt, maligni sopores, quæ à Græcis *νήματα* dicuntur, ueterni, quos *ληθάργους* eadem gens appellat, aquæ intercutē, & breuiter cuncta quæ pituitosum humorem uehementer adaugent, phlegmatica à medicis appellata. Plenus autem pulsus, aut humorum plenitudinem, aut nimiam cibi aut potionis uini præfert redundantiam: quem admodum & uacuu contraria, & uel ex diametro his, ut ita dicam, opposita, significat, puta famem aut inanitionem. Porro corpus quod arteriæ subiacet calidius, uehementē cordis caliditatem, reliquo corpore refrigerio demulcente, aut conuulsam accōtractam quandam arteriarum dispositionem, insinuat, quæ uiolenta commotione incaluerūt. Archigenes autem asserit locum arteriæ peculiariter in pituitoso humore superante grauioris somni sopore (quod mali genus *νέπληξ* dicunt) calidiorē inueniri, quem admodum in his quibus morbus pro foribus incumbit cum cataphora, id est, grauiore somni impetu, accidit.

Cataphora.
Cataphora.

De pulsu secundum rhythmum.

Quod autem ad eum pulsus qui secundum rhythmum fit, attinet, si quidem in motu & quiete ad unguem fuerit æqualis, *ὁμογενής*, id est temperatam, ne inculpatam dicam corporis temperiem, significat: quantum in semetipso, uel nullius ferē momenti & exiguā omnino deprauationem, preuaricationemq̃, ceu in ætate puerorum, & aliās exacte temperatis corporibus, conspicit. Sin autem plus temporis cunctetur in quiete quàm in motione, calorem dominari, & qualitates alias longe lateq̃ superare potendit, quemadmodū & in ætatis flore atq̃ uigore, aut huic etiā ætati proximis, liquidò datur cernere: non aliter quàm in senum corporibus admodum egelidis diutius multò moratur in motu quàm in quiete. Illud uero latere neminē debet, quod pulsus inæqualitas ratione rhythmī, intra modum celeritatis & densitatis consistit: hæc uero solum materiæ rationem ad rhythmum habere consueuit.

30

Epilogus, & significatio pulsuum.

Intercident.
Deficientes.

Cæterū deficientes & intercidentes pulsus, oppressa fractaq̃ & tanquam grauata uirtute, redduntur: Intercidentes quidem minus nocuementi, deficientes uero noxam maiorem, insinuant. & in uniuersum: Virtus quæ opprimē, uexatur, & grauatur, pulsus in inæqualitatem & inordinationem quandam traducit ac uertit, quum in quamcunq̃ aliam, tum in eam quæ in uehementia & magnitudine sita est.

Recurrentes.

Ex pulsibus autem qui *μνῆσαι* dicuntur, (quos duplices genere esse demonstrauimus, aut enim in ea inæqualitate, quæ *συστηματική*, quasi glomeratiua dicas, appellatur: aut in ea, quæ secundum unum tantummodo istum deprehenditur) Deficientes quidem extremam uirtutis ruinam calamitatemq̃ declarant. Redeuntes uero & recurrentes, & hi quidem

40

dem imbecillam, sed quæ etiamdum repugnare malo, sufficere item atque resistere denique possit, uirtutem præfagiunt.

Μύητοι autem *μύητοι*

qui unica plaga constant, & qui innutantes & circumnuentes appellantur, potissimum in ijs qui inflammationibus luteum colorem præferentibus, sensim pedetentimque marcescunt. Iam uero & plurimis eorum corporum adfunt, quæ circa arterias flaccescunt, & liquefacta iam sunt. Cæterum qui celeritate sunt inæquales, & *δρακονίζοντες*, id est caprizantes, magna ex parte seruoies febricitantium comitantur. Quod si primordia qui dem diastoles pulsus dissoluerit, & ad finem suam, & systoles exordium

Caprizantes

10 maturauerit, putrefactionis abundantiam significat, ad excretionem uaporosa excrementa impellente natura. Si autem contrà, systoles quidem principium soluerit, sed ad diastolen magis festinet, scito calorem supra modum auctum ac dominantem, refrigerium affectare. Sequitur autem hos in febre plerumque densitas, nonnunquam etiam magnitudo, nisi uirtutis officia, durities instrumenti impediatur. Quando arteriæ durities fuerit expansa, uirtute integra atque robusta, accidit pulsus *δίναντος* à Græcis

Δίναντος

Fluuiantis

appellatus. Fluctuans insuper pulsus, quem & undosum nuncupant, humidarum maxima parte ægritudinum comes est et affecta: sed ex his potissimum, intercutis carnosæ, ueterni, & *πνευματώδης*, hoc est pul-

20 monariæ. Verum ubi iam uirtus languere cœperit, sed etiamdum paululum resistit, fluctuans in uermiculantem incidit & demigrat. Postremo, uirtute decidente admodumque imbecilla, & hunc *μυρμηκίζου*, hoc est, formicans excipit.

Hæcticus

Σπασμώδης

δης

Hæcticus porro corruptis aliqua parte, phthisicis, & aliis liquefactis præsidet. *Σπασμώδης*, conuulsus siue contractus, quem & uulgo spasmosum dicunt, in animante conficitur, quando nervorum principium, inflàmata quadam dispositione, infestatur: quemadmodum in phreneticis, hoc est mente captis, morbo comitiali grauitè correptis, dum uidelicet in eo malo constituti, etiamdum calidi uitam in mortem commutantes efflant animam. Contrario planè modo ijs qui animi

30 deliquio concidunt, qui sanè uehementer egelidi, superstites tamen permanent.

Κλαυώδης, quem nostri ramosum nuncupant, pulsus, quum res ipsa ususque magnā diastolen expostulat, quo uigor ille uitalis functione sua defungi possit. Nihil autem præter arteriæ corpus refragatur, quominus possit præ duritia in magnam extolli diastolen: uerbi causa, in inflammationibus, quas *φλεγμοναί* dicunt, magnis & diutinis obturationibus.

Κλαυώδης

Εμπριμύ uero pulsus in uniuersum inflammationis index est, & præcipue nervosarum partium: minime uero costali morbo proprius, remittens quidem mollem & coctum faciem, extendens uero difficilem & concoctioni renitentem. Qui utique morbus uirtute quidem debili, periculosus, perinde atque morbus acutus est: Robustis uero uiribus, cum interuallo temporis digeretur: aut enim in suppuratione purulentam, quod Græci *εμπριμύ* dicunt, transit: aut in marasum, qui eundem morbum lenta tabe conficit, tandem permutatur.

Εμπριμύ

Nec ignorandum præterea est, quod inæqualitates ceu umbra comitatur inordinatio, raro enim uero pulsum inæqualem ordinatum inuenies. Inæquales itaque & ordinatos pulsus, mitiora nocumenta ac blandiores morbi: inæquales & inordinatos, maiores iniuriæ faciunt. Hæc quidem simplices sunt pulsuum & causæ & præcognitiones. Cæterum ex his & compositas (quemadmodum etiam in sermone de corruptione docuimus) citra puluerem (ut aiunt) licet deprehendere & assequi.

De alui excrementis. Cap. XIII.

Diectionum optima quidem mollis est, & cōpacta & cohærens, & tempore quo in sequenda ualitudine deijci consuevit, oletata egesta uē. Cuiusmodi fuerit etiam subrufa, cum conueniente copia, substantiaq; & nec admodum odore fædo grauiq; quod secus est oletum, insalubre iudicatur: Quod igitur oletulum his quæ assumuntur quum colore, tum tenuitate, tum siccitate (sic enim ὀξύμυρτος interpretor) respondet,ocyssimeq; transmittitur, crudum id esse censeto. Rufum præterea & syncerum stercus, per exordia quidem bilem morbi parentem, Vbi uero inclinationis quoq; tempore eiusmodi rubore & synceritate egeritur, pulchre & cum utilitate corpus expurgari portendit. Viride, ueneno imbutæ bilis, Nigrum uero cum atræ, tum sanguinis illic putrefacti expurgatiq; inditium est. Liuens, frigus quoddam uiscerisq; alicuius mortificationem neutiquam uulgarem denunciat. Pingue, liquefactionem pinguedinis quæ in corpore continetur, significat: quemadmodum & glutinosum, pingui deterius, animantium partes liquefieri insinuat. Graueolentius quam pro consuetudine, non exiguum putrefactionem declarat. Inter omnia autem hæc oletula, si qualitas excrementorum his quæ assumpta sunt edulij non cōueniet, tum ipsam quoq; dispositionem considerare oportet. Omnium postremo deterrimum letiferumq; magis habetur alui retrimētum atrum, luridum, pingue, quodq; ocys demittitur.

Quæ sint urinarum notæ. Cap. XIII.

Erinde atq; in oletulorum canone, prius sequenda, mox deinde agitata ualitudine degentium, sic & urinarum ordinem explicabimus. Lotium itaq; saluberrimum & ab omnibus ferè uitij aliis esse putatur, quod omnibus partibus urinis sanorum simile limum est, cuius, ut ita dicam, cæreg quum subrufum, tum subflauum ducimus: confestim uero hoc à mictione, obelitate non immodica conspicitur. Numerantur uero lotiorum turbidorum diuersitates tres: Aut enim mista statim resident, aut quamdiutissime manent, aut limpida quidē puraq; eminguntur, uerum post hæc interposito tempore conturbantur. Perniciosum est quod tertio, salubre quod primo loco posuimus: mediū inter utrumq; locum, secundum obtinet. Extreme crudum lotium quod aqueum planè, ceu deploratæ & obscure coctionis accidēs, uenosi generis est. Quando præterea urina ocys prorupit, impotentia lotij retinēdi, qui affectus Græcis appellatur, nascitur: uerum omnium ex crudis lotijs illud multo deterius

deterri- mum deprehenditur. Post hæc tenue admodum, candidum, dilu-
tumq; instar aquæ. Prædictis superioribus uicinum atq; germanum est
alterum lotium in plerisq; morbis apparēs, tenui alboq; satis propinquū.
Post hoc sequitur subpallidum; mox item pallidū atq; subrufum si reddat,
concoctionē iam quandam colore præfert. Est autem quod crassitudine
tantum ab aqua, quantū & colore secedat, si probe coctionis munus exa-
ctum sit. Quod si urinæ colore nihil ab ea quæ secundū naturam est rece-
denti, sedimentū (sic enim hypostasim reddo) candidum, leue, æquale, &
multū deniq; insit, absolutæ & ad unguem factæ cōcoctionis inditium pu-
ta: pleruncq; autem crudum humorem expurgari portendit. Dum autem
urina crassior utrunq; cum sedimine aliquo fuerit, non iam prorsus crudā
iudicabimus. Nam si lamīnea, aut squamulas referencia, aut fursurea, aut
atra, lurida, uiridia, aut graueolentia deniq; in lotio subsideāt, & si præter
hoc crudum sit, & aliās letiferum est. Cæterum boni & inculpati coloris
lotia, in quibus uel candidæ, leues, & æquales hypostasies, aut nubes ali-
quot pares, aut sublimia quæ *visciphuæ* dicunt, continentur, omnium sa-
luberrima sunt, præsertim ubi hypostasis fuerit istiusmodi: Secundo, si
eneoremata: Tertio, si nubeculæ: & simpliciter, si urinæ bonis consimilia:
tantumq; præstant, quanto magis ad inferna subsident.

*Saluberrimi
lotij note.*

20 Quæ sputi sint notæ considerandæ. Cap. xv.



Putat subflaua, subrufa, subspumosa, & tenuia, nihil præter cru-
ditatem denunciant, neq; quicq; insignis præferunt exitij: Sed
quæ incōmixta flaua, cruenta, spumosa, uiridia, lentore quo-
dam glutinosa, acuminata & rotunda, & omnium maxime atra
expuuntur, uitiosa & perniciofa censentur: excepto quippe sanguine, qui
dum syncerus reliquis humoribus destituitur, improbū sanè corporis sta-
tum, ex inflammato calore originem ducens, insinuat. Quibus igitur san-
guinis quiddam admixtum est, quin & quæ flaua, aut atra bile tincta sunt,
periculum minantur. Consideranda est præterea & eiectionis ratio: nam
30 si procliuus excreentur, liquidò iam constabit eiusmodi sputa minime ma-
la: & quæ contrarijs cōditionibus, perniciofa existere. Exacte porro con-
coctionis præsignia sunt, sputū leue, album, æquale, uel constitutione neq;
liquidū, neq; subesum: cruditas uero cōsummata significat, si ne tantillum
quidem expuatur. Quod si quis nihil atrī, sed tenue quiddam eijciat, con-
coctionem imbecillam declarat: si syncerū, rufum, aut flauū sputum fuerit,
malum. Si liuens deniq; aut rubiginosum, aut atrum, perniciosissimū est.

*Exacte coctio
nisi note.*

Diarrharum febrium significatio atq; medela. Cap. xvi.



Diarrharum autē febrium peculiare atq; inseparabile symbolum
esse censetur, urinarū in primo statim die cōcoctio: calor quoq;
40 id genus febribus amicus atq; gratus, quasi proprius, perpe-
tuusq; inest. Atqui post primam quidem febris solutionem, se-
data accessione, fidelius multo signum exeritur. Nam arteriarum motio in
hac febre per omnia sanorum motui responderet, nulla aliarū febrium, par-

Euphoria. tem secundum naturā habentem, subeunte. Febrientis quoque euphoria,
Qui diarie quod est non difficilis toleratio, summum diariæ febris habetur inditium.
magis obnoxij Promptius autē eiusmodi febre corripitūtur, in quorum corpore defluxus,
 nō uaporosi quidē, sed acriores longe, acutissimiq; & tanquā fumosi, con
 tinentur: ē quorum numero dicuntur, calidæ & aridæ temperaturæ ani
 mantia, & omnino amarulenta bile infecta. Qui igitur ex laboribus febril
 citare conspiciūtur, pingui atq; molli etiam oleo confricentur, & uoluen
 tur: Sed qui præ ariditate ephemera infestantur, hos minus quidem per
 fricare, sed uberius lauare expedit. At qui ex solitudinibus, mceroribus,
Vapores diarie uigilijs, ira, in hac adfectione constituti sunt, lauandi quidem rarius, sed
recidit. oleo permulto, tepido, minusq; adstringente, breui admodum tempore,
 cum perfricandos tum lauandos etiam pro solenni consuetudine, censeo.
 Iam ex feruoribus exustionibusq; febricitatibus, maturime ab initio sta
 tim frigorificis, lauacris quamplurimis, minime uero abundanti oleo, neq;
 frictione etiam, succurrendum est. Cæterū frigorifica quibus utendū est,
 rosaceū, omphacinumq; oleum, sine alijs frigus inducentibus, sunt. At
 qui his quoq; ipsis caput uehementer, sedata iam & inclinante febre, per
 fundere atq; lauare etiam cōuenit. Quod si quis perfrigeratus febricitet,
 & hunc in declinationibus lauato. Si autē febris unā cum catarrho accēda
 tur, ante concoctionē lauacrū uitare expedit. Quibus porrò æstu febris
 accendunt, ei his etiam dum præsentibus lauandi sunt. Algore autē quicun
 que modice inflāmantur, caput eorum uel irino uel nardino oleo irrigato.
 Quibus uero ex angustia febris originē ducit, his profecto dulcium aqua
 rum temperatarū lauacrū confert: necnon & ea que rarefaciendi uim ob
 tinet fricatio: exercitationes item, glycythymosq; (quod est si interprete
Glycythymos ris, uictus ratio animū demulcens, ac suaue ingeniū.) Si uero ex esurigine
medetur febri cibiq; abstinentia febris accensa fuerit, prima statim accessione inclinante
bus. in balneum ducantur: mansuetissime ad hæc perfricari, in calida cisterna
 multum diūq; uersari debent: A balneo uero, aspersa iam (ut prouerbio
 utar) aqua, in balneum ducendi sunt: deinde aqua calida potui exhibenda
 est: prisanæ item cremor, nōnunq; & lactucæ, & mollior pisciū caro, ex al
 bo iure. Cōmunis autem omnibus rationis uictus species, inculpati succi,
communis di & facilis decoctionis cibus esto, qui nulla omnino parte in meatibus con
ue uictus. tineatur. Vinum item dilutū, cum aspectu tum potentia aqueum, miscen
 dum est. Oportet autem circa primum statim febrium impetum, primam
 nōnunquam accessionem animaduertere: in quo sanē corporis intempera
 tura in calidum aridumq; conuersa, febres incendit. Qui deniq; unā cum
 inguinibus, quos Græci *Βασάνες* nūcupant, febre infestatur, neq; medico,
 quod oportebat maxime fieri, obtēperant: sed ulcus in quo inguen oritur
 prospicientes, circa remissionem accessionis lauantur. Ex re atq; usu fue
 rit, unum ipsis donec inguines euanescant, prohibere, & tenuiorem o
 mnino uictus rationem præscribere.

Quemadmodum febres ex putredine humorum accensas
agnoscamus. Cap. XVII.



Ebres ex putredine humorū originē habere deprehendimus,
quum nulla earū quæ præincipientes causæ à Latinis, Græcis
uero *προκαταρκτησις* (hoc est initiatrices atq; externæ) dicuntur,

*Humilis fe-
bris nota.*

cas antecedit. Proprium & hoc febrium, quæ ex putredine hu-
morum accenduntur, inditium est, si febris principium à rigore non sumit,
neque aliquis feruor, neq; uehemens ulla frigiditas præcessit: quemad-
modum & pulsuum afflictatio, & angustia. Sic autem nominant, quando
10 auspiciatē accessione paruos satis atq; inæquales pulsus habent: Peculiare
quippe atq; præcipuū huic generi febrium hoc signū existit. Maximū
uero est, febrīū quæ ex putredine proueniūt, argumentū qualitas caloris:
Nam quemadmodū fumus oculos, sic ipsa tactum uidetur erodere. Peculiare
item ac summū harum febrium signū est cruditas urinæ: hebes etiam
ac debilis concoctio. Verum magnum & memorabile concoctionis præ-
sagium in primis lotijs nunquam in huiuscemodi, quæ humorum sequun-
tur putredinem, febribus apparet.

*Angustia
pulsus.*

Curatio febrium quæ in humorum putredine accen-
duntur. Cap. XVIII.

20



Vum uires eius qui ex humorū putredine febricitat ualidas ex-
ploraueris, incunctanter uenam incidere conuenit, si nullus uen-
triculi cruditas obstare uideat. Vbi uero uel robur imbecillum,
uel ætas impedimento fuerit, à missione sanguinis prorsus absti-
nendum est: Præterea sanguine iam euacuato, putridi humores tum per
urinam, tum per aluum, tum per sudores deniq; expurgandi. Verum ubi
ultrò impetum in uentris hostiolum fecerint, & uomitionibus eijciuntur,
nulla alia præter naturam ratione, atq; inuita (ut dicitur) Minerua, elicere
irritare ue tentandum præcipio. Dispiciendæ uero atq; seligendæ etiam
sunt materiæ, quæ citra calorem & omnē ariditatem dictarum euacuatio-
num munus pulchre subire ualeant: cuius farinæ censentur ptisanæ cre-
mor, mulsum, oxymel, apomel, & apij radix. Aluo uero nihil egerente,
ex aqua mulsa clystere ipsam abluito. Oleo uero uniuersum corpus, nisi
prius euacuātū fuerit, laxare non expedit. Euacuato uero corpore, laxum
id reddere oleo tepidum quendam calorem habente, conuenit: è quorum
numero chamæmelinū, loco & tempore sumptum, & uinum dilutū potui
datum, omnia excrementa mouet. Lauacrum item temperatum ex aqua
dulci. Atqui si febris magnitudo insurgat, tum neq; uino, neque balneo,
neq; attenuantibus ungentis utendum est. Imò gelida admodum aqua in
istiuscemodi febribus hausta, nisi quippiam hoc quoq; impediatur, utilis est.

*Phlebotomia
nō nisi uiribus
robustis proba-
tur.*

30

Quod si uires quæ corpus regunt ualentes atq; robustæ fuerint, & febris
ardentissima, & concoctionis euidentissima inditia appareant, frigidam
audacter exhibebis. Si uero qui laborat eufarcos, hoc est corpore quadra-
to sit, constitutioq; calida & arida, hunc sanè nullo, etiam si in frigidi laua-

cri solum posueris, neq; incommodo, neq; iniuria afficies. Modica uero febre infestante, si uires integræ ualentesq;, unâ cum probæ coctionis inditijs apparent, talibus profecto balnea, uiniq; potatio, & quæcunq; laxandi uim obtinent unguenta, succurrunt.

De cognitione febris tertianæ. Cap. xix.

Quotidianæ
et tertianæ
discrimen.



Ebris tertiana, flaue bilis agitate proles, circa primordia statim cum uehementi rigore inuadit, à quartanæ rigore dissidens. In tertiana quidē materiæ corpus quodāmodo pungētis ac ferientis sensus repræsentat: in quartanis uero insultus statim refrigerationē uehementem habet. Quotidianas autem nullus omnino rigor, sed refrigeratio sola præcedit. Porro tertianæ ad unguem planè factum ordinem quendā pulsui seruant. Eadem illa febris sitim circa summū uigorem magnā inducit, & in super etiā hominē inflāmat atq; comburit, neq; adeò multo post summū illud incrementū, quam *αἰσχυρὸν* Græci nuncupant, sequitur, & feruor ad amissim ordinē suo quasi mordicus inhæret. Quod si manum circa primum insultum aggressionēq; imponas, calor ingens cum acredine quadam & ueluti cum uapore atque fumo quopiam sublato occurrit; qui utiq; paulò post à manu insistente, si ea diutule perrenet, uincitur. A potu uero cōtinuo permultū emittunt uaporis calidi per cutem, sudoris nuncium. Bilis adhæc uomitio apparet. Præterea uentris & uesicæ excrementa prorūpunt biliosa. Inter hæc aut in apyrexiam, hoc est febris remissionē, accessionis tempus finitur, quod in duodecim horas perfectas porrigebatur. Quod aut intra duodecim horas cessauerit, exactam acueram tertianam appellabimus. Quæcunq; autem huius generis febres diuturniorem accessionem habent, illis simpliciter tertianæ appellationem indemus. Quibus uero adhuc longius tempus paroxysmus protrahitur, paululum uero interualli si interponatur, hanc rursus tertianam protentam nominabimus.

Quomodo tertianæ medendum. Cap. xx.



Tertianæ ad unguem exquisitæ (nostri ueram dicunt) tanquam morbo à flaua bile originem habente, humectantibus & refrigerantibus medicamentis occurrendū, necnō & cum eiusdem effectus uiuendi ratione. Quicquid præterea sese in uentrē recipit & tanquā in sentinā confluit, id cum per uomitum, tum per inferna euacuandū. Ad hæc lotia quoq; et sudores eliciendi sunt. Aluū itaq; clementibus mollibusq; enematis commouere, lotia cum apio & anetho proritare, expedit, in poculenta utrisq; simul immixtis: et simulacq; concoctionis apparuerint inditia, cōsidens iam absinthij balneū ex aqua quæ bibendo sit, exhibe. Sed neq; nitrū, neq; salia, neq; sinapi, adicias: uerū oleo sumopere calorifico perfundēs, ingredi lauacrū iubeto. Cæterū neq; si bis philolutros laueris, delinques. Quod si concoctionis morbi inditia quædam exhibeant, etiam si pluries laueris nihil delinques. Vino aut penitus quoad morbus concoquatur interdicto: Atqui ubi iam confici coeperit, tenuē,

tenuē, dilutum, & paucillum primum exhibe, unā cum edulsijs quæ cum humectandi, tum refrigerandi facultatem obtinēt. Abstineat in eiusmodi affectione constitutus à melle, sinapi, fassamento, & quæcūq; naturam habent calorificam. His quidem utebant̃ prisci: & nihil neq; mirum neq; absurdum: nam exercitijs magis & cibi abstinentia tum homines diſtam obſeruabant. Nunc aut̃ ordine conuerſo, ut plurimū pituitæ cōmixta deprehenditur bilis. Proinde pleræq; tertianæ aut sine rigore, aut cum per quā exiguo rigore inuadūt: sed per mutant ea, quæ ad remedium attinent. Neq; enim lauacrū, neq; solidior aliquis cibus cōcoctioni resistēs, tertiana laborantibus cōgruit: neq; micæ quidem panis, & ouorū, & cōsimilium.

Quemadmodum tertianæ nothæ curentur. Cap. XXI.

Tertiana in tertianis spurijis circa initia statim non probant̃, sed dum iam ostenduntur concoctionis inditia. Neq; tertiana affecti singulis diebus, sed alternis tantum alendi sunt. Tranquillitas & fomentatio partium circa præcordia illis potissime conferunt: coctæ item sorbitiones, clysteres (quæ Græcis κλύσματε quoque, id est lauamina dicuntur) non admodū molles aut delicati atq; clemētes. Et si res ipsa sanguinis detractionē expostulet, caue modis omnibus ne hanc prætermittas. Cæterū uniuersa uictus rationis cōditio neq; frigorigifica nimum, neq; humectans admodū esto: sed ea quæ incidendi uirtute prædita sunt, usq; assumāt. Potissimū aut̃ ex re & usu fuerit pisanæ cremor, adiecto pipere aut hyssopo aut origano & spica nardi. Quin mulsum etiam in quo piper elixarū sit, potui dare expedit, & alia, quæcūq; scilicet lotij proritandi naturā habent, exceptis interim uehement̃ & supra modū calidis & aridis. Maxime uero à septimo quoque die absinthium administrabis. Iam uero & oxymeli, quod est aceti mulsum, eporū multis manus auxiliares præstitit, & quippiā etiā leniū ὀπυλάτωρ. A cibis postremo statim uome re, in hac febre diuturnotēporis tractu cōstitutis, præsentissimo est præsidio.

Quartanarū deprehensio. Cap. XXII.

Quartana multo cum frigore & impetuose ingruit, tanquam ex gelido atræ bilis humore originem ducens: sed feruorem atq; adeò combustionē febris, quo tertiana regnat, multo minorē. ne dicam nullum habet: sed neq; bilis etiam uomitus eandem comitatur. Inter hæc si tenuia, candidi coloris, & aquea lotia compareant, quartanam febrem esse ducito. Præstantissimum aut̃ atq; electum quartanæ inditium est, pulsus paruus atq; rarus. Præterea aut̃ni tempore potissimum oritur & infestat, errantibus febribus succedens. Certe nōnūq; & maxime quidem, in quartū diem typum constituit. Sed nō raro pluriū dierum interuallo, secundum quasdam periodos accessionem habet.

Curatio quartanarum febrium. Cap. XXIII.

Quartana laborantes leniter & mansuete tractare cōuenit, neq; medicamentū ullum uehemens admouere, neq; euacuationem moliri, nisi quis supra modum sanguis redundare uideatur, tum

Tertio quoque die cibis quartanarijs cōmōs de datur.

Diuretica quartanarijs conueniunt.

Vine quarta narū febrium.

Diatrionpiperum.

certe sine mora sanguis mitti debet. Porro rationē uictus non inflantem, *ἀποῖν* à Græcis appellatam, & accommodam offerre, atq; cōsuetis uentrem euacuare expedit. Si hæc nihil emolumēti conferāt, lauaminibus quos clysteres dicunt, inter initia quidem mollibus, posterius uero etiam acredine imbutis utendū est. Ad hæc suillis carnibus, & omnibus quæ glutinosa & tardi transitus sunt, abstinendū. Nec his minus, edulīs quoq; infrigidandi & humectandi facultatē habentibus. Præterea in hac affectione constituti uinū tenue, albū, & modice calidū, salsamentū item & sinapi cōmodis sime usupant. Quin tertio quoque die medicamentū quod ē tribus piperū generibus constat (unde *ἡ δὲ τριπλὴ ἀντισφίαις*, uulgoq; diatrionpiperū dicitur) aut diospoliticū, sumere utiliter possunt. Quod si quis singulis diebus pipere etiam sine additamento utatur, recte quidē ac bene fecerit. Si uero ægrotans in summo morbi uigore sit, tum nutriendus fuerit quam tenuissimè : protinus uero quiescere iubeas quam diutissime : ad hæc præterea uisceribus per mollesciantia & remittentia consulere. Deinde urinaris, *ὀυρῶν* (quod est, urinam promouendi potentiam possidentibus) nūcupatis, medicaminibus utendum : simul atq; uero ea quæ cōcoctionis argumento sunt, apparere uident, bono tum animo esto, & atros humores exaurientibus non semel modo, sed identidem utere. Post uero uehementē purgationem, etiam pharmacū ex uiperis exhibendum est, & id genus alia quæ aduersum hanc febrem probantur : Inter quæ in solenni consuetudine habetur omniū, mea quidem sententia, præstantissimus succus cyrenaicus.

Quemadmodū quotidianā deprehendere oporteat. Cap. xxiiii.



Quotidiana nuncq; cum horrore, rigore ue, primo (ut diximus) die inuadit : sed progressu temporis alior potius q̃ rigore infestat. Maligni hæc febris ardoris est, & perquam diuturnum habet augmentū : uerum minime comburens laborantes, neq; multā ac densam respirationē cum angustia quadam cōpellit, neq; efflāre pari crebritate & difficultate, aut gelidam bibere nolentem uolentē cogit. Accidunt autem uomitus pituitoli, & quæcunq; per aluum euacuantur, frigidiora, crudiora, & aquea magis in his febribus deprehenduntur. Quotidiana præterea affecti minime circa primos dies sudant, neque in apyrexiam auspiciantur : candido sunt colore : urinas emittūt albas, tenues, crassas, turbidas, atq; rufas.

Curatio quotidianæ. Cap. xxv.



Medelis uero, si quotidiana laborāti succurrere fert animus, oxy melite, id est aceto mulso, primis statim diebus utemur, & h̃s quæ lotiū pulchre ciere queūt : ad hæc uniuersa uictus rationis forma incidēdi facultate sit prædita. Circa summū uero morbi incrementū providere expedit uentriculo, præcipue uero ipsius hostiolo : deinde in hac affectione constitutum, radiculis, cibarijsq; sumptis uomere præcipito. Cæterū pituitosum humorē efficiētibz, *ὀυρῶν* tantisper dum febris suam tyrannidem posuerit, utendum.

diffidet. Iisdem præterea cōditionibus quarto quoque die suo insultu accedens, nec tamen in apyrexiam finiens, febris quartanæ cognata est.

Synocha igitur (id est cōtinens) febris est, quæ una accessione ab initio ad finem usque perpetuò, sine ulla feruoris remissione, permanet. Cæterum quæ omnino nullā inclinationis notam præ se fert, confinis atque adeò cognata hæc ardentibus (nam sic *καυσώδης* reddimus) est, à quibus sola acrimonia acutiusque dispescitur.

Quibus notis continuæ febresprehendantur, quibus item præsidij curenur. Cap. xxviii.



Continuæ febres (sic enim *συνωχία* interpretor) ex sanguine accendunt, aliàs quidem sanguinis duntaxat feruifacit, aliàs uero eiusdem etiā putrefacit, obstructione: quapropter unus modò atque perpetuus ad finem usque illis paroxysmus est. Notæ uero illius sunt huiusmodi: Pulsus magni, uehementes, ueloces, densi, æquales, minime mordaces. Lotia porro hac febre laborantiū nō multum admodum à sospitum & naturalibus urinis deficiūt. Primas aut in synochæ medendo, sanguinis usque ad animi deliquium, detractio habet. Quicumque enim in hac febre constituti uenā secare superfederint, in summū uitæ discrimen peruenient. Quod si magnopere euacuationem hanc quæ incisione uenarū fit, aliquares prohibet, tum alijs præsidij dissipantibus uasforū obturatio oppugnāda est: eius quippe farinæ medicamenta multitudinem euacuant, feruorem febrilem placant. Si quando in hac affectione constituti aliqua conspexeris cōcoctionis præfagia, neque in principe aliqua corporis parte phlegmone ulla, aut moles, tumorque cum humorū collectione, aut scyrrhus (hæc est durities quædam non sensilis) fuerit, neque in aliquam corpusculi partem egelidam nocumentū incidere, magna cum fiducia frigidā exhibe, præsertim si *ψυχρὸν*, hoc est, gelibibulus, ægroscans fuerit.

Aestuantium febrium deprehensio. Cap. xxxi.



Αύρου, id est ardentes febriculas hæc magna ex parte comitantur symptomata: Lingua arida, crassa, & colore nigro: rosio præterea uentris, alui excrementa perpallida, sitis uehemens, uigiliæ, quandoque uero & desipientia, quam *ἡσυχία* Græci, Romani delirium nominant.

Aestuantium febrium curatio. Cap. xxx.



Perfectam huius mali solutionē, horū quidem duorū necessum alterum fieri, aut biliosos humores egressisse, aut extinctos esse. Excernendi uero instrumenta sunt, sudores, aut uomitus, aut uenter inferior. Demolliendi aut ratio in egelido potu, aut omni qua medebimur *καύρου*, id est, maximis feruoribus, materia, sita est. Nutriendi autem ardenti febre laborantes sunt, neque aqua duntaxat, neque multo, sed dilutum multum coctum propinandum. Porro in ea affectione constituti, commodissime solis potionibus enutrientur. Ad hæc, æstuose ægrotantibus illis tantūmodo lauacrum expedit, qui nullo tumore inflammato,

Phlebotomia
ad lipothymia
usque probatur.

mato, aut erysipelato infestantur. Quod si concoctionis etiam notæ com-
pareant, multo magis ex re atq; usu fuerint balneæ. Quibus uero ex falso
humore caustos accenditur, eis sanè aliena sunt lauacra. Hi & ptisanæ tan-
dem liquore alendi sunt.

Febrium ab erysipelate medela atque cognitio. Cap. XXXI.



Ebres quoq; cum ignitis rubedinibus, quæ Græci *ἰσχυρίσματα* *Signa.*
dicunt, circa uisceru affectionē accidunt. Cognoscendū aut illud
est, ex uernaculo locali feruore imenso, dolore uehemēti, præte-
rea siti & caumate immodico: & ut summam perstringā, notis

10 putrescentis cum sanguine exiguo acutæ bilis. Medendū uero ad hūc mo-
dū: Abstinere à balneo oportet penitus: aqua uero egelida utendū secun-
dū morbi summū incrementū & consistentiā agonistica, (quali certatiua
dicas) quod est gelidissima: Inter morbi uero initium minime utendū. Cæ-
terum extrinsecus frigorigica applicemus, & si nihil opis contulerint, in-
tra corpus nolentes uolētes cogātur assumere. Præcipue uero expediunt
illis lactucæ, & quæ his potestate ad unguē ferè respondēt. Foris quidem
lactucæ cremor idoneus est. Quin & semperuiui, & quæcūq; alia sunt fri-
gorigicæ potētiae. Preciosissimo optimoq; in primis utamur: liquore enim
expresso, infrigidantiū quiddam pilæ, mortariō ue inficiamus, cum portu
20 laca, deinde contusis illis, exprimamus. In usu uero parum polentæ admi-
xto, & denuo in aqua frigida intincto, refrigeremus. Linteolū præterea
duplicatum in eo iure rigatum, foris circa præcordia superintendamus,
non sinentes illud ibidem perennare, aut procrastinare diutius, sed aliud
atq; aliud identidem frigidius siſdem partibus imponamus. Confundi-
mus uero nōnunquam & oleum omphacinum.

De cognitione febrium hecticarum. Cap. XXXII.



30 Hætica febris non in humoribus modò ac spiritu, sed in solidis
etiam partibus accenditur: citra uero dolorē qui sensu saltem
percipi possit omnino est, qua quidem febricitates nihil minus
quàm se febricitare autumant, neq; enim uel tantillum ardoris
sentiant, omnibus ad unum corporis partibus iuxtā non admodum calen-
tibus. Bisariam uero dirimitur hecticarū febrium species: Aliæ quidem
ardentibus febribus ut plurimū inoriunt, uidelicet nō æstuantibus calore
in tantū, ut cōficiat diurnitate ac tempore humorē cordis, uel manentis
etiamdū cōtinui, & integri. Aliæ uero, adhuc etiā persistente humiditate,
corpus tamē cordis cōprehendentes corripientesq; ex eodem inflāman-
tur. Iam una quidē hecticarū febriū dicta est originitio. Reliqua est, quā
à principio statim inuadūt, primā exhibent dispositionē ac genesis, febri-
bus quotidianis minime dissimilem, siue tristiciā, (qua afficiunt) siue tram,
40 siue laborē immensum, unā cū æstuatione factū, respicias. His quippe ar-
duū est mederi: atqui si flaccitas ac tabes illa, quæ marasimū nūcupant hec-
ticæ supueniat, atq; adeò ex hac occasione habeat, nullo medicamēto uinciet.
Ceterū febris hectica coincidens tabi marasmo, imò quæ iam eò peruenit,

*Hæticarū fe-
brium species.*

*Tricus
tricus*

promptissima est cognitu: Oculi namque illorum perquam immensam concavitatem praeferunt, & haerent lemæ in circumferentia siccae, & squallida quædam totius ferè cutis elucet dispositio. Est præterea in eisdem flos uitalis coloris extinctus: obducit frontem immoderata quædam ariditas, adeò ut ex siccitate dure scat, & circumtendatur: ac sæpius cõnuiunt, dormitantium more. Non est autem eorum affectio somnus, sed potius uigilandi impotentia: tempora amissa carne collapsa & concavis spacijs cernuntur. Et quid aliud omnino sunt quàm ossa & cutis? adeò ut si nudato corpore in partes ad uentrem attinentes oculos intendas, neque ex intestinis, neque ex uisceribus aliquod superesse censueris, & præcordia uehementer contracta appareant. Cutis ad hæc apprime tangenti arida: pulsus tenuis, frequens, & durus. Calor autem, quum primū manum admouet quis, obscurus est ac debilis, sensim uero pedetentimque asperitatē quādam & corrosionem exhibet. Quandiu autem in unoquoque corpore natua quædam humiditas dispergitur, hectica modo febris appellatur. Quum uero iam res eò periculi peruenit, ut ne tantillum quidem eiusmodi humoris super sit, tum exquilitus iam marasmus, hoc est, senilis tabes est.

Hecticarum febrium curatio. Cap. xxxiii.



Hectica febre correptos inter initia statim, propter mordacem humorem, ali oportet. Præcipuū uero ac saluberrimum his qui sic laborant præsidium, humectans ratio uictus est. Conducit itaque in primis cum ptisanæ cremor, tum alicæ forbitiones. Cōmodus præterea sic affectis exiguus in aqua frigida panis, atque eiusdē aquæ potatio. Quum autem hecticae neque phlegmone, neque humorū ulla putrefactio complicatur, abstinendum (quoad fieri potest) ab immodica exhibitione frigidae, etiamsi nō nihil periculi instare conieceris. Foris uero epithematis, medicamentis frigorificis, audacter utendū. Et balnea in hac affectione constitutis, quouis tempore conducunt.

De hemitritæis febribus. Cap. xxxiiii.



Quum febris tertiana non sine rigore, quotidiana uero citra omnē cum tremore algore frequenter ingruat, utrisque simul mixtis, *quæxlu*, hoc est horrorem, inducūt. Algor quidem cum tremore (sic enim *trivus* interpretor) minus, frigiditas uero plus, facessit negotij, eo quod extremas occupat partes. Mixtis hæc febris constat, proinde neutiquā ei absurdū, neque rationi dissonū, Hemitritæi, id est semitertiangæ (quali ex tertiana & quotidiana cōpositæ) nomen est inditū. Modus autem generationis hemitritæi duplex est: uel enim duæ accessiones in unum cōmittuntur, aut inter initia statim utræque inter sese inuicem permiscunt. Quū igitur tertiana prepotentior existit, horridior fit febris, atque ab initio accessionis sibi aliquid horrois affociat: statim uero & feruidior est eiusmodi febris, & plus habet incendij, atque bilis aliquid per uomitum, aut per aluum, aut per sudorem excernitur. Sed quū altera ex puita redūdante febris præualuerit, tum frigus uehementius extremis insi-

Hemitritæis
bisuriam fit.

det partibus, horrores habet summissiores, neq; sitim, neq; magnū adfert incendium. Vbi uero æquales magnitudine tertiana intermittens & quotidiana cōtinua simul inuadūt, insultus accessionis cum horrore fit: Vbi uero ea quæ ex pituita est præualuerit, conuulsiones accidunt atque horrores. At si calidior ex bile febris præpotentior est, plus habent incendij: Talis quidem exquisitus hemitritæus est, ex æquali duarum febrium temperatura cōpositus, ex bile uidelicet intermittente, & ex pituita continua. Sed qui exquisitus non est, aut bilem, aut pituitam præpotentē atq; exuperantē possidet, quæ sanè haud facile ullo medicamento uincitur. Promptius quippe semper minor uincitur humor: idq; tum copiosioris & præpollentis ualentia, tum artis quoq; præsidio. Proinde si pituita præpotentior multo fuerit, his quæ in febre quotidiana recensuimus potissimū utemur remedijs: Quod si flaua bilis præualuerit, instantes urgenti necessitati, auxilijs utemur ijs, de quibus in tertiana generali mentionem fecimus. Cauendum tamen interim ne omnino illam alteram paruipendentes, curam eius abijciamus.

De popularibus publicèq; grassantibus morbis. Cap. xxxv.

M Orbos qui publice in plurimos eadem tēpestate simul grassantur, *πανδημικοι* Græci, hoc est populares, et ex publica causa prouenientes, & *κοινοί*, id est cōmunes, nulloq; discrimine omnes infestantes, appellantur. Quorum quemadmodum origo, ita & causa publica atq; communis est. Communis itaq; alimentorum prauitas eiusmodi affectiones generant: publicum item aquæ, inquinamentis quibudam infectæ ac uitiosæ, poculum. Ad hæc defatigationes, miseriaq; immensæ atque innumeræ, exercitationes consuetæ omissæ, abstinentiæ, satietates, esurigine corripiente, aut abundantia proueniente: & regionū deniq; naturæ atq; temperamenta, populares morbos sæpenu-mero intulerunt: Interdum quippe paludem uicinam, interdum uero bathrum, hoc est fossam siue uallem, finitimum habent, uenenis imbutam euaporationem, & hanc quidē perniciosam exhalantia: atq; ob eam causam populosi uulgares quæ ægritudines consueuerunt solenniter publice grassari. Cæterum circumfusus & nos usque ambiens aër, temperaturas subinde transmutat, aut nimio incendio feruidior, aut frigidior, aut humidior deniq; factus. Ceteræ namq; morbi causæ nō pariter nobis omnibus sine discrimine accidunt, neque uniuerso solidotq; die in ijs (quemadmodum in prædictis) uersamur: sed circumstans nos aër, is inquam qui extrinsecus singulis circumfunditur, & uel à nolentibus uolentibusq; necessario tamen per respirationem attrahitur. Necessarium itaq; fuerit in solentibus illis immutationibus & deprauationibus, secundū temperamentum animantium corpora aliter atq; aliter affici. Proinde quicumq; huiuscemodi exacte cognouerit, non eos modo qui in præsens infestant, & illos qui pro foribus sunt morbos, ex statu & conditionibus cuiusque providebit,

πανδημικοι

Causa pestilentiæ.

sed machinamentis etiam suis, quibus contrariam omnino molitur uictus rationem, ambientis aëris inclementiam distemperamenta inducere non solum nō permittit, uerum ne is quoq; inficiatur pro uiribus prohibebit. Quaecunq; igitur ob suam intemperaturā morbis obnoxia sunt corpora, hæc utiq; a simili circumdantis nos aëris temperamento arguunt. Sed quæ contrario modo quā aër temperata sunt, ad nullam ferē iniuriā admittendam sunt apposita, ametrian temperamenti contraria ametria arcens te. Quisquis hæc percalluerit, optimus incolumitatis custos habet, corporibus contraria semper, tum uictus ratione, tum medicamentis applicans: nōnunq; si res postulet, ijs quæ refrigerandi facultatem habent, utens; interdum uero (puta in perfrigeratis) calorificis, in solum quidem descendere iubens aqua refocillat: otium, ciborū abstinentiam, potionem prolixam ac multo uberiorē, præscribit. Interdum amictu ac tegmine calfacit. Exercitationibus item & cibo abundantiore, quandoq; etiam tenuiore ac pauciore utendum præcipit. Porro si quis pyram accenderit, egregie quidem poterit udm aëra in calidum & aridum permutare, quemadmodū & Acronem Agrigentinum fecisse perhibent.

*Igne aer enim
datur.*

De febre pestilentiali, ex monumentis Ruphi. Cap. xxxvi.

*Pestis grauis
ma accidentia.*



N febre quidem pestilentiali usuuenire possunt quæque perniciosisima, grauissimaq; necq; tamen occultatū quippiam priuatū ue, quēadmodū in alio quouis morbo solet, habere celsue uit. Assolent enim crebro incidere deliria, flauæ bilis uomitiones, præcordiorū intensiones atq; cruciatus, aquæ inter cutem cōplures, extremarū partiū frigiditates, fluores (*διὰ ψευδὸς* à Græcis appellatæ) biliosis, tenues, bulle modō tumentes. Ad hæc urinæ aqueæ, tenues, biliosæ, nigrae, sedimenta (quæ græce *ὑποσύνες* dicunt) mala habentes, & *πυρρὴν*, quod est sublimia, proxime pessimis accedunt: stillicidiū narium, ardores pectoris, linguæ arescentes, sitibundæ, impure, inquietæ, cōuulsiones uiolentæ ac uehementes, & alia pleraq; mala. Quod si quis præguderit instantem atq; uenturam pestilentiam, contemplet atq; obseruet etiā pernicioſa tempora, & studia quæ sequūdæ ualitudini non cōducunt, & animantiū quæ perierunt cadauera. Quibus accuratissime consideratis, & illud perpende, cuiusmodi nam sit præsentis tēporis status, simul & uniuersi etiam anni, ē quibus sanē facile licebit uniuersam uictus rationem odorari, pulcherrimeq; deprehendere: Verbi gratia, tempus, quod pro suo naturali statu oportebat esse aridum, humidius est redditum, necessum fuerit tum ratione uictus, quæ arescendi potestatem obtineat, assidue uti, quo exuperans illa humiditas excicata consumetur. Neque interim minor cura adhibenda est uentri: quibus enim superior uenter pituita abundat, eos uomitionibus euacuato: quibus uero sanguis plus æquo exuperat, uena secta sanguinem detrahito. Necq; minus emolumentū adfert illa quæ per urinas fit expurgatio, & quaecunq; aliæ, quæq; per uniuersam possunt fieri corporis molem, Quod si plurimū ferueat languidus, flammaq; iam ad pectus

*Que perpendenda pestis
tempore.*

Medicæ.

pectus usq; tendatur, nihil designaueris absurdum, neq; à ratione alienū, si frigorifica pectori admoueas, atq; egelidam potionem offeras, non frustulatim parcaq; manu, cōcremat enim uehementius, sed cōfertim & prolixius, ut flamma quasi obruta extinguatur. Si uero ardeant interna, extre-
 mæ uero corporis partes egele scūt, summa cutis frigescit, præcordia con-
 tenduntur aut suspenduntur, uenter spūta aliās quidem per superna, aliās
 per inferna eijcit, uigiliæ infestant, deliria item, & lingua deniq; salebro-
 sa, quibus eiusmodi adfunt sympt^amata, calorificis opus est, quo ulcere-
 tur præ ardore undiq; corpus, & si qua alia uia possibile est ex imis cor-
 10 poris partibus ad exterarū feruorem euocari atq; subduci. Utendum præ-
 terea propotismatis, quæ aloës partibus duabus, ammoniaci thymiamatis
 partibus duabus, myrrhæ parte una, constant: hæc simul cōtusa ex uino
 fragranti colluito, deinde dimidium quotidie cyathum potui dato. Haud
 scio, inquit Ruphus, an quispiam hac potione frustra usus, pestem nō eua-
 serit. Hactenus quidem Ruphus. Galenus uero tradit contra pestilentia-
 les putredines armeniacam glebam potu sumptam excellentissimum esse
 remedium. Pari etiam modo uiperarum theriaca. Mehercle uigente in
 ipsa urbe Roma peste, quibuscunq; horum alterum non profuit, ad unum
 omnes perierunt.

*Febricitantes fri-
 gidam non poti-
 sent, sed pleno
 se proluant
 auro.*

*Propotisma
 Ruphi nunquā
 frustra adhibi-
 tum.*

20 De his qui plenitudine crudorum humorum infestantur
 & concidunt. Cap. xxxvii.

IN nonnullis magna quadam crudorum humorum in corpore
 saburrata multitudo febres accenduntur, cum praua affectio
 ne oris uentriculi, præcordiorum inflatione ampliore quā se-
 cundum naturam sit, uentris ipsius osculi tumore. Color præte-
 rea sic affectis ad alborem, & aqueum magis uergit: quibusdam uero in ni-
 grius. Nemini uero horum omnium sanguis absque summo discrimine
 detrahitur. Et opus quidem habent euacuatione, sed neq; sanguinis mis-
 sionem, neq; expurgationem tolerant. Alij uero etiam sine his repente in
 30 syncopen cōcidunt. Succurrendum est igitur in hac affectione constitutis
 perfrictione. Auspicandum autē confestim à morbi ipsius exordio. Princi-
 pio quidem à summo crurum deorsum cum linteis modice asperis, deinde
 & totas à summo ad imum manus: ubi uero artus satis iam calere uiden-
 tur, & laboriosi consensus (quæ est ueluti morbi conscientia) religio sit,
 oleo chalaistico utendum. Abstineri uero ab adstringentibus: hyeme
 etiam diaphoreticis, hoc est discussiuis uti expedit: cuius faring est oleum
 sycionium atq; chamæmelinū: confricatis interim eximie membris: dein
 de oleum abstergendum: scapulam uero totam perfundito, & confricato.
 Post hæc rursus crura aggredi, inde denuo manus, mox scapulas expedit:
 40 quibus sanè integro die insistendum. Cæterum melicrato non aliud neq;
 commodius neq; efficacius huic malo disquiras præsidium, in quo uidelicet
 cethyslopus esto elixatus. Porro neq; alimentum, neq; forbillamentum,

*Mellissæ præ-
 stantissimam
 præsidium.*

neque aquam potui dare conducit : quemadmodum neque omnino cuiusquam arbitrio, liberalius bibendi potestas permittenda est. Verum satis esse mulsum solum, per primum triduum inuicem præbuisse. Si autem firmitudinem non omnino deploratam, sed medicrem adhuc ægrotans habeat, & alius nequiter & male suo fungitur munere, clysmate cōfidenter abluere conuenit. Qui uero impetuosiore quàm cōueniat retrimentorum uentris motione ac impetu infestatur, ei principio quidem plus mulsum coquito, quoniam minus subducet. Quæ autem fertur plus quàm conueniat, sistenda est. Exhibendus autem est mulsi loco, pitæne succus. Quod si quæ offeruntur non deficiantur, sed permaneant, ex chondri potione alito. Si uero propter imbecillitatem uirium ex pulsu deprehendimus etiam postea lapsam uirtutem, panem uino temperatum offerre expedit, si neque uenter neque iecur phlegmone infestetur : ueluti si corpore crudis humoribus referto ac saburrato exarserit, deploratus erit ægrotans. At si crassos aliquando humores adurat, satis est in uniuersum oxymeliten pro aqua multa propinare. Quod si tempestas fuerit æstiuæ & calidæ, & gelidæ potator languidus, huic oxymeli frigidum misceto : hyeme uero calidū. Alienissimæ sic affectis sunt balneæ. Si autem in animi deliquium ceciderint, partibus corporis (de quibus supra mentionem fecimus) nullis inflammationibus infestatis, panis haud multū ex uino præbeto. Illico porro ad frictionem mittito, & modo quo diximus perungat. In quibus uero ob flauam bilem ore uentriculi iniuria affecto, syncope accidit, gelidum assumere potum, uinumque tenue, & colore uermiculo, seu giluo, atque uetustum, concedito.

De his qui præ tenuibus succis defatigati animo deficientes concidunt. Cap. XXXVIII.



Vi tenuibus uero humoribus confusi fractique ceu in deliquio concidunt, superioribus omnino contrarijs suppetijs medendi sunt. Enimvero signa quibus discernuntur, illis quoque deprehendes diuersissima. Alendi igitur, in hac affectione constituti, sunt pedetentim perpetuo. Illos autem huic malo obnoxios nullo medicamento curari posse ducendum est, quorum uirtute iam labante ac languente uenter inflammatur. In eiusmodi affectionibus, breui letalis in uultu constitutio fit. Iam tum quidem nutriendus est æger necessario. Cæterum quemadmodum in superioribus, summæ cutis superficiei, sic etiam in his, densum in rarum permutare, gelidumque aëra efficere, oportet. Adstringentibus præterea ungendi sunt. Alimentis non tam prompte penetrantibus utendum. Exhibendus itaque panis, & ex alica forbitiones, & fructus austeri, & corruptioni resistentes, non tam ipsi per se, quam cum ipso etiam pane. Vinum item dilutum statim inter initia in cibis sumptum, in hoc malo constitutis accommodatissimum uidetur.

De alijs occasionibus ē quibus subinde contingunt

syncopæ. Cap. xxxix.



Vnt porro & nōnullæ aliæ quædam occasiones in quibus syn-
copæ accidunt, quatuor: dolor uidelicet uehemens, uigilia, ua-
cuatio immoderata, & in cespitantibus insanientibusq; inter-
dum commotio. Mittere autem si uoluerit, distemperaturam
principiorum apponit. Promptissime itaque celerrimeq; internecio acci-
dit, corde ante omnia affecto, deinde uero ipso quoque cerebro, neque ita
multo post etiam iocinore.

De dolore. Cap. xl.



Edditur itaq; dolor gelida diathesi stupidus atq; obtusus. Pul-
satus uero, ut sic dicam, labor, immani phlegmone, id est inflam-
mationi, peculiaris ac proprius est. Si uero tanquā sub palo fi-
xus dolor inhæreat, aut ueluti à cerebro sauciātū quippiam esse
uideat, crassi intestini doloris species est, quæ stimulosa ac punctuosa, cir-
ca membranas atq; pelliculas existit. Impellens uero ac transiens dolor,
in uehementissimis acutissimisq; non solum hemicranij, sed & cephalæis
accidit. Est aut penētrans atque impellens, (quem *σύντονος* Græci dicunt)
quum tanquā in radice ordiens, à primitus affecta particula fertur statim
ad uicinas: extenduntur enim utrinq; nerui qui unā afficiuntur, & tendun-
tur ad utrasque extremitatum fines. Sed minime in latum extensos ha-
bent dolores nerui. Cæterum ualidissimos & stupidos dolores infert sub
cute distenta membranula, quæ inter carnem ueluti dilaniatam atque con-
uulsam est: plures nanque sunt quæ inæqualiter inhærent, & carnem am-
plectuntur atque copulant. Cæterum pelliculæ quæ ossa ambiunt, ne-
que summa cute, sed profundæ sunt, doloris ossium quodammodo ueluti
phantasiam opinionemq; inducūt. Quandocunq; igitur nulla foris caus-
sa doloris ostenditur, considera atq; accuratius perpende præcedentem
uictus rationem, ea num ignauior, magisq; ociosa quàm pro recepta con-
suetudine sit; aut cibis pluribus, maximæq; in nutriendo potestatis, usus fue-
rit homo: aut solita deiectio remoretur. Nam si quid horum, aut uno fasce
omnia, appareāt, exuperantiā affluentiamq; causam doloris reputa, &
proinde quàm fieri potest ocysime, hominē euacuatione exonera. Hocci-
ne nanq; modo licebit tibi hys quæ fluxus dolentiū partium eliminant, sum-
ma cum securitate uti. Si quidem sanguis naturę modū transiliat, uena se-
canda est continuò, magna uidelicet, affectam prope particulā. Sola nanq;
κακχυμία, hoc est uitiosa, ut sic interim loquamur, succositas, molestiam inte-
rens expurganda est. Coeuntibus autem utrisq; utraq; euacuatione, san-
guinem prius detrahentes, utemur. Quod si his rite peractis dolor nihil
de sua sauitia dimittit, neq; cessat, liquidò iam constabit dolorem in mem-
bro affecto in cuneum redactum. Tum euidenter sanè curatio, medicamen-
tis discessorij (quæ græce *ἀσπερσινὰ* dicuntur) si utare, futura est. Id ge-

Nulla foris cau-
sa appareat qd
perfundum.

Sanguinis ni-
metas detra-
henda.

Cacoehymia
expurganda.

nus etiam medicaminibus ex flatuoso spiritu prognato dolori opitulabitur, in ipsis diaphoreticis potius, quam attenuantibus eduljjs perseverantes. Infusis præterea, quos clysteres dicunt, & cataplasmatibus opitulantis, & fomentis, laxelcentes ipsum corpus. Quod si tumor grauians aut constringens dolorem concitauerit, dolori succurrendum. Quin si permordax denique humor doloris causa fuerit, maxime contraria his sunt quæ attenuandi, & excalfaciendi uim habent: exempli causa, anethum, quod oleo elixum & dolorem sedat & somnum conciliat: atque uiride efficacius quam aridum.

De colliquate. Cap. xli.



Bi uero ex uentre quippiam egeritur, non ex ferculis comestis, & concoctis, sed humorum aliquid e corpore sese in uentrem recipientium, assimilium quidem flauæ bili, tum per uomitum, tum per alui excrementa electæ, primi meriti existit quod foetidissimum odoris fluxum emittit, & qui ad fuluum magis colorem accedere uidetur secessus, & crassitudine uiscida, nonnunquam uero & oleaginea, tum pinguior caro & recentior, à febre urente resoluitur atque liquefcit. Diutino uero tempore permanente malo, non nihil etiam solidarum partium ab ipsa pessima febre liquefcit. Exhibenda gelidæ potio est, à terra frigidissima. Huiusmodi etiã esse oportet cataplasmata, & epithemata perfrigerandi potestate prædita, thoraci atq; præcordijs imposita & adglutinata. Ad hæc frigorifica quoq; exhibenda sunt alimenta.

De uigilia quæ febricitantes infestat. Cap. xlii.



Vi febre correpti, misere quoq; uigilijs immodicis infestantur, horum utiq; crura, & manus, illo quo soliti fuerunt tempore sompites in somnum uerti, liganda præcipimus, atque euigilaret: oculos uero interdum aperire, uel palpebris saltem coniungere cogimus, donec satis defatigati fuerint. Deinde protinus uinculis solutis, & sublata è medio lucerna, tranquillitatem bene multam esse mandamus. Acerbius uero magis atque magis insomnia molestante, in relaxatione accessionis abluenda est facies nigri papaueris capitum elixatione. Odorandum præterea papaueris candidi putamen siccatum atque frustum, & mandragoræ radice dilutæ ac maceratæ pariter in uino. Et ex oleo quoque rosaceo malagma concinnans, cataplasmatibus more frontem oblinito, & serpyllo cum meliloto in passo elixa, quo quidē & in accessionibus utendum: Aut tritis ac mollificatis papauerum capitibus refocillantes. Panem præterea ad hunc usum emplastri modo cum rosaceo, aut cerato applicamus. Educatio item accuratior somnum conciliat. Adijce autem arcendis uigilijs potioni, capitum nitidi papaueris semen, quantum capiunt coclearia tria: sed holeribus dulcorem inducto papaueris nigri. Quod si folia quidem fuerint uiridia, quantum tribus digitis comprehendipotest, sumitur: Sin minus, tum tria aut quatuor papaueris capita arida coniunctim

cōiunctim elixa eximant. Quum hæc opis nihil tulerint, obliuiant cremore papaueris, aut mandragoræ succo. Expedi etiam sic affectis ex papaueribus confectum eclegma, præcipue per elixationem eponum mensura cochlearij unius aut dimidiati: quæ utiq; quantitas somnum sapenumero illexit, inuitauitq;. Quin si caput alicuius in hac affectione cōstituti nō admodum humoribus fartū uidebitur, utendum est in febris remissione (quæ *ἀσπληνία* Græci dicunt) quod hoc modo conficitur, thymiamate: Accipe folij amomi, costi, foliorum salicis, (sic enim *ῥαπύλλιον* interpretor) singulorum unciam unā, carpobalsami librā unam, styracis, amomi, ammoniaci, bdellij Scythici, mandragoræ radices, cremoris papaueris, suffium cum lignis cupressinis facito.

Quemadmodum Cataphoræ, id est, in soporem dilationi
medendum. Cap. XLIII.



I grauiore somni impetu et accessu (quod mali genus Cataphora appellat) correptis subuenire uoluerimus, abstergenda est facies spongia posca infecta, (quod Græci *ὀξυκρατὴρ*, quasi aqua *Oxyratum*. aceto mixtū, nucupant) multo lacte tēperata. Extremæ corporis partes ualide cōprimendæ atq; domandæ sunt. Ad hæc odora menta quæ dissecandi uim habeant, adhibere expedit. Cæterū in remissionibus
20 quietisq; tēpore, scapulis, atq; spinæ (hæc Græci *σπίλη*, illas uero *μυτιπρηγγοί* dicunt) diligenter cucurbitulæ imponantur. Morbo uero his etiam actis perseverante, sternutatoria, accessione remittente, naribus adhibero. Aliis mentorum porro materia ex acutis & diducentibus, discutientibusq; constet. De quibus libro primo, de tuenda bona ualitudine egimus.

Curatio doloris capitis in febribus. Cap. XLIII.



Dolore capitis, quæ cephalalgia dicitur, febricitantes moles tante, post cōuenientē febrium euacuationē, circa summos accessionum uigores unctione capitis utendum. Principio quidem cōmuni oleo, ē nondum maturis oliuis expresso, aut rosaceo
30 cum pauculo olei temperato: æstate quidem, & febre cum maximo æstu, frigido: hyeme uero, & febre non æstuante, calido, aut tepido. Cæterū in oleo nōnunq; tum serpylli, tum polygani succus elixatur. In æstate uero papaueris capita, aut papauer: quemadmodū ediuerso hyeme peucedani, iusto seruato pondere, mediocritas: persistente uero dolore in fronte, nudo forte fortuna syncipite, cataplasmatis, quasiq; rectorijs & ad illiū comparatis (quæ Græci *ἐμπλαστὰ* uocant) utendum est, quæ ex ueteri polenta & polygano, aut ex pane pariter & rosæ, aut exigua myrrha, siue serpyllo, constant. Nonnullos uero pulegium quoq; capitis dolore leuauit, emplastri modo adhibitum: neq; defunt quibus, igneo etiam sensu existente,
40 te, psyllium cum polenta temperatum auxilio fuit. Aut uiscum etiam per se in elixatione factū, & identidem renouatum. Facit idem coriandrū polente permixtum. Aloë præterea in eundem usum cum aceto utiliter illinitur. Myrrha item & ammoniacum, Pari idem modo crocomagma. Pul-

Embrochus.

fosos aut, ut ita dicam, dolores ruta & mentha cum pane, instillato etiam oleo, discutiunt. Vehementiore aut quam diximus dolore infestante, primum quidem denudandum caput est ad cutem usque, deinde pinguioribus embrochis (sic enim Graeci liquida & humida quae alicui corporis parti fo uendi, discutiendi, compescendi gratia irrorantur, uocant) totum insper gendū: post hęc cucurbitule occipiti imponendae, partes insuper extremae ligandae, & palpendae. Pro sunt praeterea hirudines adhibitae. Atqui si ca tarrho quis aut coryzae (hoc est destillationi aut grauedini) cephalalgiam acceptam refert, tum certe ijs quae suo loco descripsimus succurrendum est praesidijs. Quin si a regionibus quae ad stomachum attinent uapora¹⁰ tiones sublatae caput afficiunt, tum maxime illis quae subordinauimus pro spiciendum, subueniendumque fuerit auxilijs.

De ea quae circa stomachum & uicinas eius partes adhiben da est curatio. Cap. XLV.



I quis imbecillo maleque affecto fuerit stomacho, a cataplasma tis roborandi uirtute praeditis petendae sunt suppetiae: qualia sunt quae ex palmulis, uino, polentis, croco, masticha, & aloë componuntur. Neque inutile sit, stomachum ungento ex absinthio, aut melino, aut mastichino, aut nardino, aut uino denique irrigare: & si plus satis incallescant, quae refrigerandi uim habent expedit confunde re: uerbi gratia, cremorem cucurbitae, lactuca, portulacae, solani, cichorij, labruscae. Quod si inflammationes circa uiscera appareant, relaxandi ac remittendi facultatem habentibus (graece χαλαστικὰ dicuntur) utendum: infusionibus nempe oleoque chamamelino, cyprino, adipe gallinae aut anseris, & bdellio, & ammoniaco, & consimilibus eiusmodi: Cataplasmatibus uero seminis apij, scenograeci, althaeae, floris chamamelorum, & ut summatim eloquar, compositam habeant potentiam, ex chalaistica quidem tenuis partis, amarae, & stipticae.

De immoderatis febrium rigoribus & rigoribus. Cap. XLVI.



Rigoribus quidem cum tremore qui diebus decretorijs iudica³⁰ torie accidunt, neque occurrere, neque impedire, neque omnino certamen illud dirimere, conuenit: Nam & pyrexia quae ex sudore provenit, hominem prompte restituit ac uindicat, neque quicquam uel defatigat uel molestat: In solo uero rigore, aut ea affectione quae horrorem praecedit, sed ex gelidiore, atque multo adeo frequentius pituita, accidit. Principio quidem membra multis modis constringenda sunt. Deinde primum oleo chamamelino, aut cyprino, aut irino ungenda sunt. Quod si copiosiore aut uehementiore opus est, pipereis aliquid oleo confundito, aut hordei, aut adarcae, aut castorij: aut frictione molli uniuersum demulcendum est corpus. Ne autem procliuus oleum defluat, haud abs⁴⁰ surdum fuerit & paucissimum cerae liquefactae conglutinare. Si uero algor cum tremore inexpugnabilis, nullo calore euinci possit, ad huc etiam ue hementioribus fortioribusque acopis, atque dropaci maxime ungento, & si⁴⁰ napismis,

napifmis, utendum est: aliæq; nonnullæ fomentationes concinnæ faberrimèq; machinandæ & emolindæ sunt: & acutiora, odoramentis peridonea, nepeta, pulegium, hyssopum. Potu uero sumendum est prius & ante significationē atq; initium accessionis, mulsum, in quo elixum sit piper, ruta. Ad hæc præterea succum cyrenaicum quantitate milij cataplasmatismodo inditū melli decocto, duabus horis ante accessionē exhibebimus. Pari etiam modo cremorem silphij, hoc est alboris balsami, & hoc in quar-
 10 tanis cum succo cyrenaico temperatum & cōpositum multis manus præstitit auxiliares. Cæterum in oleum percalidum descendere iubentes aut inducentes, cum tremore rigores abiguntur, quemadmodum tradit Archigenes. Cæterum Galenus ante indicationem atque initium accessionis febris, cutem abrotono, aut nepeta perarida, conyza (hoc est intybi tam fo-
 lijs quàm flosculis) aut costo, aut pyrethro, altero horū cum oleo, perfri-
 cardam edocet, & sic uel omnino non rigebunt, uel multo minus ac man-
 fuetius illo cum tremore algore infestabuntur.

De his quæ circa sudorem obseruanda sunt. Cap. XLVII.



Vdores quidem decretorios boni consulere & sustinere con-
 uenit usq; ad sufficientem euacuationē, adiuuantes etiam ac pro-
 20 ritantes motu mediocri atq; quiete, & calido diaclysmate, & sor-
 billatione, & somno. Neq; abstergamus sudorem, alius enim
 alium ducit, promouet, urget. Cæterum remissi & dissoluti sudores simi-
 lem decretorijs habent operationē. Atqui de his quæ sudorē eliciunt præ-
 sidijs, in superiore uolumine satis mihi est proditū, capite duodequinga-
 gesimo. Vbi uero sudores satis superq; profluūt, absterge, et subleua ac tol-
 le, ad refrigerandum, uelamina: Nam si plus iusto promanauerint, erupe-
 rintq; adeo afficiunt, ut & animi defectionē sæpenumero inducāt. Tenui-
 bus igitur uestibus amicianē, & udis: admittat aër multò frigidior, & so-
 minus: flabello fiat uentulus. Myrrha nigra in farinā trita emplastri more
 corpori imponat, & galla cōsimiliter. Cortex pini, electrū præterea, & po-
 30 lenta, cum uino adstringente, in mēbra recipientia imponant, & machediat
 uultus posca. Archigenes uero calce uiua (quam Græci *ἀσβήστις*, id est aqua
 non restincta, uocant) & fece uini combusta, nullo calore expugna-
 bilem suscipit rigorem, ambo enim (inquit) igne fota arent. Irrigare porrò
 media præcipit succo plātaginis aut coriandri, aut portulacæ, aut brassicæ,
 quo concreta sudores intus coherceant atq; prohibeāt. Tempore uero so-
 mni, creta cimolia in aqua dissoluta, metaphreno atq; thoraci supponat.
 Vniuersum præterea corpus rosaceo aut melino, aut myrteo, aut lentisci-
 no oleo, aut quæ ex illis concinnantur ceratis, illiniendum est. Accommo-
 datissima his quippe sunt alipasmata, hoc est inunctiones quæ abditos
 40 meatus obturāt, & humoris transitū decursumq; impediūt. Neq; quenq;
 ceu res perspicua, fugere potest, in hac dispositione constitutis alimentum
 aridius summo opere conducere, & uina quoq; mediocrē quandam inspis-
 sandi uim habentia. Verū plurimis interim poculis & ingurgitationibus

Sudores intus
 dici lipochyanti-
 am inducunt.

Materia siccis
 di sudoris.

abstineant, & in primis humidioribus. Frequētes quoq; clysteres fugiant; & si fieri potest, etiam *isopos* assumant in gelidiorē statu. Extremā illorū corporis partes quammaximē inalgescant & infrigidentur. Qui compressu uero & tribulationibus fiunt sudores, istiusmodi aut in doloribus, aut in conuulsionibus eueniunt, ligatione, & fotu extremorū, & ariditate, cum uestimentis lanceis, opportune succurrito.

De tussi quæ febricitantes infestat. Cap. XLVIII.



Vssi quæ in febris accidit, maxime uero cum rigore factis, occurrēdū est: nam in auspicatione & instātia tullis, id quod febrim cōstringit, scite dirigitur. Aduersus quod malū hypo-¹⁶ glottia porrigenda ex melle cocto concreto: linguæ uero subiecta & supposita liquefit, & dissoluit ac discutit impedimēta facilis spiritus. Tempus uero exhibēdi opportunū circa summos paroxysmorū uigores est, & usq; ad articulum initij accessionis febris, quam *adonapariū* dicunt. Præbeto quoque hydromel coctum: quibus autem non speratur neruofum temporis progressu, magna cum fiducia & oxymel exhibeto: si hoc displiceat, hyssopi elixationem: & hæc quippe ipsis etiam cum tremore algoribus subuenit. Præterea castoreum, si febris non fuerit ardēs, neruoso quoq; remedio est. Eclegmata uero ē pincis confecta & earūdem nucleis, iride, semine lini, amygdalis amaris, & urticæ semine. Eiusmodi plurima²⁰ alimentis quoque adijcere, ad hæc refinam & terebīthinam in ouo exhibere, utile est. Foris uero thoraci & partibus ad arteriam attinentibus lannam carpinatam imponito. Sed oleum uel rutaceum, aut irinum, aut anethinū esto. Quin & fascia, siue melius zona tensa atq; robusta in longum ligata, exacte tusses & omnino arcet & exterminat: dico aut mediocrium & extremorū. Necq; sanē temere & sine fructu uua agresti tussi discutiedæ gratia utemur, mansa uel tusa cum hemero uel cum masticha. Ad hæc partes extremas confricare, palpare, atq; ligare, expedit: atq; deinde rursum retrectationem soluere. Quod si propter febris asperitatem tussis irritetur, utendū anagargarismate aquæ tepidæ: sed & frigida sæpenumero³⁰ iuuat. Item poscæ & palmularum decoctionis, aut rosarum, aut dulcis radicis cōcinnatio. Ad hæc uisceribus & cordi, quæ mediocrem refrigerant di potentiam habeant, applicanda sunt.

De sternutamentis. Cap. XLIX.



Ale quandoq; afficiunt & perturbant febricitantes quoq; sternutamenta, nam caput implent, & uires ac potentiā arguūt: nōnullis sæpe sanguinē eliciunt, & pleraq; alias id genus subinde molestias inferūt. Occurrere igitur atq; succurrere etiam illis cōuenit. Cohibet aut & compescit irruentem sternutationem, frictio narium, frontis, oculorū, oscitatio, palati fricatio accurata, eructuatio, contentio⁴⁰ iliorum, sublimitas capitis, conuersio in latus, palpitatio extremorū musculorum, pinguedo (si sic dicere licet) masticatoriorū, calidi olei in aures infusio, aduenientis caloris materia. Obseruare præterea oportet repentīnam

pentinam ē somno excitationē, fumū, puluerem, acutiora odoramenta, piperis, castorei, sinapis, mentę. Conuenit autē mali, & polentę odor, obtundit enim eruptionē sternutationū. Inanes etiā spongię marinę. Quū autē irritus ad sternutandum insultus ac impetus sit, neq; sternutamentum in uociferationē prorumpit, quies & refocillatio labijs conciliē. Perpetuus item acutiorū odoramentorum suffitus, & animi securitas atq; relaxatio.

De ciborum appetitus auersione. Cap. L.



Quod si ex uitiosis succis stomachus omnia quę offeruntur respuit, (quod morbi genus Gręci *αισπεψια*, hoc est inappetentiam, & quasi eduliorum fugam nominant) exhibenda sunt quę esculenta, tum poculenta, quę illiuscemodi humores uel per uomitionem, uel per alui inferioris deiectionem elidere, aut temperando emendare, natura comparata sunt. Cęterum harum rerum sylvam uberem quę materiam in superiore huius operis uolumine habes. At si propter imbecillitatem uirium male habentes cibum horreant & fastidiant, oportet distemperaturę speciei contrarijs medicamentis succurrere. Omnifariā igitur atq; diuersimodā admodū de escarū horrore rationem libro tertio, capite de stomachicis, trademus. Cęterū in febricitantiū ciborum auersione, protinus inter initia manibus pedibusq; conabimur quā primū appetentiā restituere, potissimū uero aqua farinę irrigatę, aut posca, aut cramate, hoc est temulento deo sobrijs nymphis ualde diluto, aut quāpiam re odoris suauitate gratiore, aut acerborū adstringentiumq; potu morū fructuū ue decocto. Illinitio porro lenis ac blanda, mediocris item corporis totius frictio, palpatio, rigatioq; uultus, & exigua aque sorbitio, reuocādi appetitus potestātē obtinēt. Sed applicatione digitorū, lancina tus stomachus cōuertit quodāmodo fastidium oblatę alimonię in orexin, & p̄sertim sublata quadā biliosa aut acetosa materia. A primis uero diebus cataplasmatibus quoq; foris applicatis stomachus fastidiosus conuertē: uerbi causa, eo quod ex palmulis, (unde & *Αναγορίσιον* dicitur) malis item, & cęnanthe, ablinthio, & aloē, cōformatur. Amplius, alimenta adornentur compluria tum simplicia tum frumentacea, & alius cuiuscunq; materię quę uirtute alterandi naturę aptitudine sit prędita, quę que non procul ab ijs quę febricitantiū usui conueniunt, discrepent: inter quos fructus etiam numerentur qui non facile acefcunt, & in uappā transeunt, neq; nimium dulcescunt: maturi uero non usque ad satietatem admittuntur, sed quantū duntaxat in alia edulia appetitū excitant. Exhibeantur autem minutissimi quiq; sanandi & immutandi facultātē habentes. Cęterū quū iam febres a natura superatę cedunt, perseverante interim inappetentia, conuenient siser cum oxymelite, & lactuca, & oliuę salsę, & capparis, & salsa mentum, & bulbi, & quicquid stomacho conducere cognoueris, memoria repetitis cum illis ipsis quę in pręsens recēsumus, tum etiam ijs, quibus edulij sospites maxime exuperabāt. Deambulationes porro & *ισπαι*, id est, erectiones, uociferationes, & dropacismi ungenta, & frictiones,

& exercitationes assumantur. Propinationes uero cremoris absinthij, aut aloës, non mediocri sunt praesidio. Aceti postremo scyllitici mystri quantitate absorpta, efficaciter stomachum omnia respuentem uindicat & instaurat.

De pergrandi fame, quam Graeci βέλμων & βελμίων, nostri bouinam & uaccinam nominant. Cap. L1.

Atrophis.



Contrà in praegrande admodum & quasi Saguntinam (ut ita dicam) famem ex anorexia recidunt, obuiantque, (dico autem illam immodicam & insatiabilem famem, quam Graeci ἀτροφίαν nuncupant, qua affecti cibum non sentiunt, sed tamen corpus potius consumitur quam alatur) illos restituiimus si hac curatione utamur. Offerenda sunt compressis tum alia perodorata, tum suillae carnes assatae, tum etiam hoedinae: & ut summatim expediã, instaurationis summa est in hac affectione, omnibus miram quandam atque ingentem odoris suauitatem nidorisque fluxum emittentibus uti, quum uidelicet febrium acerbitas transierit. Oportet praeterea sic affectorum extremas corporis partes apprehendere, et moderari: ipsosque suscitare expedit. Maxillas porro uellicantes atque pungentes, capillos item uel aures expandentes, refocillabimus: medebimurque, panem ex uino supra modum diluto, aut aliud quiddam quod facile transmittitur, exhibendo.

De canina appetentia, hoc est membrorum inedia cum stomachi satietate. Cap. L11.

20

Canina appetentia et anorexia germane.



Vanquam non proprie hoc, quicquid est symptomatis, febricitantibus accidat, (sed nonnunquam etiam ipsos molestat) aliàs tamen, & ob eam quam cum anorexia, quod est cibi (ut diximus) horrore, habet cognationem & germanitatem, operae me omnino precium, potius quam absurdum, facturum putauì, si de nimia quoque & inexpugnabili eduliorum appetentia sermonem texere non grauaret: utrinque enim modus exceditur. Quoniam igitur à pituita acida frequentius haec affectio usuuenire consuevit, erit ipsa incidentibus & elidentibus oppugnanda: cuius quidem farinae compressis esse creduntur perquam dulcia, & alia quae cum calfaciendi tum abstergendi facultatem obtinent. Merum itaque sic affectis exhibendum largius quam par sit, calidum atque ardens, cuiusmodi sunt colore uermiculo, sine acerbitate, & absque omni sitipricitate, sed suauius tamen longe potius exhibendum, etiam si nulla siti premantur. Oportet autem ipsis ubi ad statum optimum peruenierint, primo quidem pingui, matura, atque alia etiam omnia oleo permulto condita, nihil austeritatis acerbitatis uel praerentia, offerre. Hec quippe etiam si non palam contra causam exurgant, cibus tamen indita intemperantiae impetum discutiunt. Caeterum horum penuria atque abstinentia, comminuit eius quae in stomacho continetur pituitae crassitudinem & substantiam. Iam & salsamenta ministranda sunt. Post haec uina quorum iampridem meminimus, assatim potent. Hec quisquis rite perpetrauerit, breui insatiabilem illam caninam appetentiam sedabit.

40

Quae

Quæ circa sitim febricitantium pensanda, & quibus sedari possit remedijs. Cap. LIII.

- E**Xiguam, neq; adeò magnæ tyrannidis sitim, propter partium ariditatem siue calorem, oriri putandum est, per quas fertur humiditas ex ore in uentrem. Præsens autem ariditatis remedium somnus est. Caliditatis uero uigilantia. Nonnulli nanq; è uino etiam sitibundi redduntur, esculentorumq; caliditate. Præsidium illis est, gelida potio. Vitiosam uero plerunq; cum cibi tum potus qualitatem afficiunt, quæ proportionem, præpollenti humoris malitiæ, quam *κακοχυσίαν* Græci nuncupant, respondet; unde aliquot tanta siti oppressi sunt, ut inde etiam perierint. Noui aliquando quospiam qui quum dipsadas serpentes deuorassent, & uino sese ueteri plus nimio ad temulentiam usq; inuitassent, quorum quicumq; aqua in nauigio deficiente, maris aquam bibere non dubitauerunt, ad unum omnes occubuerunt. Sed quæ in febribus nascitur sitis, consolari atq; curari naturæ aptitudine potest, embrocha capitis ex gelidissimo olco, aut rosaceo cum crunismo (hoc est torrentis modo cum strepitu & murmure demanante) facta. Nigræ porro lactucæ semen mansum optime ac salubriter siti succurrit. Prodest consimiliter & quæ glycyrrhiza appellatur, & cucumeris semen in ore domat. Dato præterea hoc, quod sitim in primis extinguit & obrepere prohibet, pharmacum *κατασπαστικόν*. Fita autem hoc modo: Cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthæ drachmæ quatuor, dissolue tragacanthan ouorum crudorum recentium albore, & ubi dissolutum fuerit, inijce trita semini cucumeris friato, quibus scite subactis globolos conformato, deinde in umbra siccat. Atq; unum modò sub lingua sitibundus premat & cōtineat, atq; inibi dissolutum humidum deglutiat. Postremo dilutum (quod Græci *ἀντὶσπαστικόν*, uulgò infusionem dicunt) absorbendum exhibe, quod ex illis constituitur, malis cydoneis, radice syluestri, (sic enim Romani apion herbam nominant) caereolis uitis, aut mali punici cremore.

- De lingua scabra & aspera. Cap. LIIII.

- S**ALEBRIS linguâ infestantibus, oportebit ante omnia scabredinem eius humectare. Continere igitur oportet in ore laborantes lini seminis decoctum. Melius autem et efficacius operatur myxium unâ cum semine lini elixum, digito in eo iure infecto, linguaq; eo confricata aqua munda abluatur, aut sponsia tractetur, dein de rosaceo illiniatur. Caterum rosaceum, melle temperatum, efficacius & meliore fide agit. Succus item portulacæ ore cōtentus. Et rhun qui in obsonijs usum habet, mulso tēperatus, pulchre salebrose linguæ succurrit. Et damascena, & mysedion, hoc est mucus ossa complectens, & linguæ circumuoluitus. Facit idem portulacæ cauliculus. Archigenes aut & sal Indicum huic usui adhibuit: quod sanè colore & substantia nihil à cōmuni sale diffidet, sapore uero meliteum est: lentis uero eius salis magnitudo, uel ad summum sabæ quantitas comesta, affatim atque profuse humectare potest.

Supius cubatio
fit.

Porro quibus lingua salebrosa est, ij frequenter in latus decumbant, quoniam supina cubatio arefacit admodum atque exiecat. Neque sint ore hiantes & aperto. Hiatus enim & oris apertio exuccum reddit. Sternutationes denique accommodatae linguas humectant.

De irrito ad uomitiones conatu, quam Graeci *moriam*, Romani
nauseam dicunt. Cap. LV.



Vando citra euidentem occasionem aegrotantem irritus ad uomitum conatus torquet, coniectari (id quod uel caeco, ut reor, liquidò constat) prauos humores male uentriculum afficere, oportet. Quidam lancinantur quidem, sed euomunt nihil, in ipsius tunicis uentriculi relicto humore. Quod si itaque pituitosi existunt humores, coquendi sunt, in tranquillitate hominem seruantes, inedia, & somnis. Ceterum tenuiores, uomitus eijcit, nonnunquam pituitae cremore excitatus aut mulsio. Qui uero glutinosi & crassi sunt humores, tenuibus, attenuandi uirtutem habentibus, indigent: cuius generis est oxymel, & consilia. Humiditate uero praua in tunicis remissa, quae ex aloë componitur, praecura accommodata ac utilis est. Adstringentia uero nocent impendio. Quam admodum rursus humoris permulta copia citra malitiam occupante, acerbata constipantiaque tanquam primam habent bonitatis aestimationem. Atqui aloës medicamentum marasmodum inducit. Quod si frigiditas humiditate copuletur, miscenda sunt acerbis quoque calorifica. Sed frigidae constitutionis, item & eius temperaturae affectus, summum argumentum ac testimonium est, nihil sitire, neque calorem ullum sensu percipere.

Aloe marasmodum
inducit.

De uomitione biliosa, quam cholemasiam dicunt. Cap. LVI.



Is qui uomitu bilem eijciunt, cataplasma diaphcenicon corticum malorum granatorum imponendum, & ut res & usus postulat applicandum. Gallegem item, & coctorum in uino, aut posca maceratorum panium. Sed ex acatia quoque & hypocistide et balauftio & rhubarbariorum, coccinno cataplasmate utendum. Et cucurbitula apposita magnifice iuuat cum flamma multa. Cibum uero saepenumero sensim & paulatim exhibebimus. Sed bilem atramentibus et stomacho inflatis, spongiis aceto acerrimo calidoque irrigatas impone. Ad haec hederæ folijs in uino elixis, cataplasmatibus instar, aduersus cholemasiam utiliter adglutinabis.

De singultu. Cap. LVII.



Ingultuum alius repletionem, alius exinanitionem, alius erosum ab acrioribus humoribus stomacho prouenit, quibus uomentibus sedatur. Plures uero diatrionpipercon, quae confectio ex tribus piperum generibus constat, tantummodo pituitantes aut assumentes, si protinus uinum superpotarint, singultire consueuerunt. Quod uero nonnulli corrupto in stomacho cibo, (nam id quibusdam soleniter accidit) singultunt, ex his quae neminem fugiunt est. Neque desunt, qui in algoribus cum tremore singultunt. Vomitus igitur satis accommodum, ijs qui singultu propter stomachi saburram, uel erosionem torquentur,

tur, est præsidium. Calfactio, ijs qui propter frigiditatem. Quando uero ex plenitate humorū prouenit singultus, uiolēta opus habet euacuatione: huius uero sternutatio causā est. Sed in euacuatione singultibus nō medetur sternutamentum. Exhibenda est præterea singultientibus ruta cum uino aut nitro in mulso, aut fefeli, aut daucū, aut cyminum, aut zinggiber, aut nepeta, aut nardum Gallicum. Hæc quippe quum in corruptione ciborum, tum plenitatibus denicq̃ sunt auxilia. Sed qui singultum multitudini frigidorum ac uiscosorum humorū acceptum referunt, his castoreum trium obulorū pondere ex posca propinandum: sed illud cuti quoq̃ unā cum oleo sicyonio applicatum cōducit. Ex re quoq̃ & usu fuerit in singultu acetum scylliticum, aut oxymeli haustum. Detentio postremo spiritus, magnificam præsentissimamq̃ aliquando opem præstitit.

Quæ in febribus circa aluū duram uel lubricā obseruanda. Cap. LVIII.



Væ aluum siccam excitent, libro primo quantum res postulare uidebatur memoratū est. Quoniam aut & humectari hanc in febribus subinde usuuenire conspiciamus, de ea quoq̃ re in præsentī differendum arbitror. Bona quippe hominū pars nō febris ratione, sed hoc duntaxat symptumate corrupta misere torquetur. Principio igitur sunt ea quæ deducunt & quodāmodo efferunt assumen-
 20 da, nihil resistentes aut recalcitrantes ijs quæ citra cruditatē & corruptionem offerunt. Cæterum ultra naturę modum euacuatione facta, cohibere expedit. Atq̃ si aciora quidem egeruntur, oportet alimenta quę offeruntur boni quodāmodo succi, & aliās crassiora esse: ē quorum sanē numero sunt chondri, hoc est alicæ & ptisanæ sorbitiones. Lauacra quoq̃ in hac constitutione post morbi concoctionem non sunt aliena. Quando uero pituitosiora & ualde fluida aluus deſcit, diuerso cibi aridiores & calidiores sunt, quantum loci eorum febres admittunt: Eius generis sunt suspensurum aut compositarū rerum (sic enim *συσπνύτρων* red do) calorificarū condita. Ab balneis uero illis est abstinendum, nisi quid aliud cogar. Debilita-
 30 ta uero facultate coctrice, acerbis et styptantibus escis, alijsq̃ auxilijs utendum: Escis quidem, cuiusmodi maxime sunt mala punica, mala, apia pira, aut mespila, uel illis ipsis per se, uel cum uino tenui fragrāte, adstringente: Auxilijs uero, puta cataplasmatīs ex polentis & palmulis, absinthio, rosīs, myrtis, & alia eiufdem farinæ materia. Considerandum autem quibus ac qualibus nam potissimum locis adhibenda sint cataplasmata. Loquor autem hic de his, quæ ad stomachum uel inferiorem uentrem attinent. Nonnunquam sanē & lumbis imponimus. Cruentas porro deiectiones compescunt medicamenta ē thure, siccant etenim: Aut tenuissimus farinæ flos aut pollen, uel thure uel manna uel uino macerata, atque etiam
 40 pistā, aut posca. Acriorem uero humiditatem, & in sanguine, dulcem red-
 dito, quandoq̃ aqua quidem, quandoq̃ ptisanæ cremore, aut chondri, aut oryza, aut trago herba, nō semel quidem, sed identidem ac sæpius. In postero uero rosæ quoq̃ aridæ, aut myrta applicanda sunt. Nonnunq̃

galle, ouorū item unā cum rosaceo aut uino tenuē adstringente, aut rosarū elixatione infusum, uel sedī modō impositū, auxilio fuit: quandoquidē obātundit excernendi promptitudinē: frequenti enim facta assellatione, agathium conformatum sedī imposito.

De stillicidio sanguinis, & eruptione sanguinis narium. Cap. LIX.



Voniam stillicidium sanguinis in uniuerso corpore, uel capite modō, ex compressu elisionē ue, aut maligna cutis densitudine proueniens, multitudinē quidē significat, sed plurima excretio ad deprimentā atq; diminuendam multitudinem satis est, consonum omnino neq; à ratione alienū, inde ipsum præcipue oriri, unde prorumpit. Hæc accurata mecū perensione reuoluens, in quartanarū destillationū cōstitutione nō dubitauī uasa in naribus de more aperire et sanciare: neq; tamen exiguo sanguinis effluxu cōtentos esse oportet, sed usq; ad uirium, ne dicā ad animi usq; defectionē auferendū. Spontaneas uero in febris nariū sanguinis profusiones, decretorie quidē factas, boni cōsulito, sed immodice permanentem sanguinē cohibere tentato. Constringito itaq; ante omnia acriter & enixe extremas corporis partes, & sublato in altum laborantis capite, scite disponito. Videtur præterea & mentulae cutis, siue mauiis præputij, affectio peculiariter sanguinis eruptionē compescere: Ceterum noli uel emūgere, uel locum irritare. Sinīto aut in globulos seu grumos (quos *σπίπτες* græce dicunt) sanguinem coalescere & conglutinari: spongia uero nares detergentur in posca bullita, siue irrigata: cuneolum ex panno, medicamentis sanguinis compescendi uim habentibus illitū, naribus stillantibus inserito. Sed harū rerum materiā, & aliam quoq; medelā, in sequenti uolumine de locis affectis affatim ponemus.

De animi defectione. Cap. LX.



Vi acutissimo malo, quo cum multo fluxu tam per inferna quam superna bilis desicitur, & alui fluoribus alijsq; quum permultis tum immodicis euacuationibus animo deficiunt, egelida aqua aspergendi, naribus apprehendendi, os præterea uentris perscrinandum, uomitum ad hæc præcipere, stomachum deniq; talium lancia re, expedit, non sanē digitorū pennarūue appositum tantum, sed Herculanis etiam (ut sic interim loquar) nodis, ea dispositione constituti ligandi sunt: facta euacuatione per inferna, manibus: per superna, cruribus. Animum præterea attendere oportet in sanguinis eruptione affectis, arrectus ne uultus citra dolorem sit. Ad hæc cucurbitulae, cōtrarijs eis quæ euacuantur partibus sunt opponendæ. Medetur & uinū aqua dilutū animi deliquijs, quæ immodicā euacuationē sequunt, nisi phlegmone uiscerum, aut capitis dolor uehemens, aut obrepēs atq; uacillans quædā affectio, aut febris adurēs in morbo crudo, prohibeat. Nam qui in eiusmodi affectibus sunt cōstituti, his uinū plurima & ingentia nocumēta affert. Quod si estas fuerit, & tēperatura calida, & gelida bibo languens, frigida exhibenda est: Sin cōtraria, calida. Porro propter sudoris nimietatem animo defici-

- deficientibus, cutem, ueluti antea mihi dictū, denſare oportet, neq; ſpirituū aliquem frigidū, prouidentia quadā, ad interna admittere. Cæterū deſu-
xionibus in uentrē nihil horū congruit, ſed uentris ipſius, ſtomachiq; im-
becillitatē roborare, et ſic affectos lauare, expedit: quoniam hiſ qui in uen-
erem ſeſe recipiūt fluoribus lauacra ut omniū ſunt accōmodatiſſima, ita &
ſanguinis eruptiones atq; ſudores ubertim proritant. Porro quicūq; præ
multitudine animi deliquio corripiunt, uino ciboq; abſtineant, & lauacris
ſi febricitēt. Muſſum aut potioniſ loco propina, in quo aut thymus, aut ori-
ganum, aut pulegium, aut hyſſopū elixa ſint. Expedit præterea oxymeli.
- 10 Quod ſi ex prauis humoribus in ſtomacho contentiſ animæ deliquiū inci-
derit, hydrelæo uel digito uel pennula admoto, uomitiōē elicerē impera.
Quod ſi etiam tum nequeunt euomere, oleum quodq; præſtantiſſimū po-
tū exhibendum eſt, quod equidem aluum quoq; inferiorē ſæpenumero
euacuat. Abſinthium porro animo deficientibus ſuccurit. Deinde ſi qui
propter ſtomachi imbecillitatē deſiciunt, roborandī ſtomachum uirtute
prædiſ utendū, quemadmodū iam pridem mihi in capite ſtomacho dedi-
cato, prodiſ eſt. Ad hæc extremas partes cōſtricare, & incaleſcentes qui
dem lauare expedit. Perfrigeratiſ uero diatrion piperæon, uel ipſum piper
ſine appēdice, exhibendū. Iam uero immodico calore, ſiue aduſtione, ſiue
20 diuturniore balneorū mora, animo deſicientibus, primo aqua e gelida aſper-
ſa medendū: mox uentis exponendi: deinde fricandus ſtomachus: ab hoc
cum uinū tum epulæ præſtanda ſunt. At ſi quis ob uafitātē phlegmoneſ,
aut malam febris affectionē, animo fatiſcit, et perfrigerat, artus acriter ua-
lida frictiōe fricato, ſoueto atq; uincito, uigiliis cibiq; abſtinentiam indi-
cito: hæc quippe in paroxyſmo ſunt exequenda. Accidit ad hæc animi
aliquando deſectus ex ariditate, quibus utiq; duabus aut tribus horis ante
acceſſionem alimentum exhibendū eſt, aut chondri cremor, aut panis ex
aqua, unā cum mali punici granis, aut mala, aut apia pira. Quod ſi ingētis
admodū diſcriminis periculū timeat, uinū etiā miniſtrandū eſt. Sed hæc
30 iſ qui ſubito in animæ deſectionē incurrunt, in primis agenda ſunt. Cæ-
terū undiq; oportet cauſſam deliquiſ ſedula perpentione reputare, & ad
hanc unice incūbere. Nonnunq; uero & ſymptomatiſ maior habenda eſt
ratio, quod ſanē aliāſ periculum, aliāſ mortē quoq; pro foribus minitatur.

Animi deli-
quium à mul-
titudine.

Ab humoribus
ſtomachi.

Deſectus ani-
mi ex ariditate

Curatio eius quæ os ſacrum infeſtat exulceratio. Cap. Lxi.



Ebribus quoq; præſertim diutinis, exulceratio deſquamatioq;
oſſis ſacri ideo plerūq; accedit, quod longo tempore ægrotus
decubuit. Quū igitur locus incipit rubeſcere, orbē rotæ inſtar
egregie magnū fabricantē, loco exulcerationiſ ſuſſulciemus.

- Post hæc cerata uel myrtea, uel ex ſpuma argenti concinnata, aut pſimy-
40 chio, imponamus. Phlegmone aut oborta, panē cum ſtrychno, aut poly-
gano, aut plantagine, aut braſſica tenella, emplaſtri modo adplicabimus.
Quod ſi exulceratio ab ægris partibus ad eas quæ integre ſunt depaſcēdo
ſerpat, lenticulā cum mali granati cortice cataplaſmatiſ more imponito.

In hoc uolumine uniuersi operis tertio, de morbis secundū locos affectos sermo instituitur, auspicians quidem à summo capitis uertice, ne dicam & capillis, at deinceps singulas corporis particulas percurrens, ad infimū pedis calcaneum receptus canit.

CAPITA LIBRI TERTII.

De aloperia, ophiassi, & caluitio. Cap. I	De dysenteria.	XLII
Densatio atq; tinctura pilorum. II	De colicis.	XLIII
De his quæ capitis curæ insciūt malis. III	De ileo.	XLIII
De cephalalgia. IIII	De passionibus renum & uesicæ.	XLV
De cephalæa & hemicrania. V	De hepatis passionibus.	XLVI
De phrenitide. VI	De cachexia.	XLVII
De phlegmone cerebri. VII	De intercute.	XLVIII
De erysipellate ipsius cerebri. VIII	De splene.	XLIX
De ueterno lethargō ue. IX	De morbo regio.	L
De catotocho & uigilante comate. X	De accidentibus umbilico.	LI
De memoriæ & ratiocinationis iactura, & Caro, & Morosi. XI	Vt aliquis diu maneat impubis: de conseruatione pudendorum: item de pili- toria.	LII
De uertiginosis, scotomaticis ue. XII	De bubonocœla, enterocœla, & hydro- cœla.	LIII
De morbo comitali. XIII	De inflammatione testiculorum & sacculi eorundē, alijsq; passionibus.	LIII
De melancholia, mania, & numine affla- tis. XIIIII	De gonorrhœa & onorogmo.	LV
De ephialte, siue incubo. XV	De satyriasi.	LVI
De Lycaone, uel lycanthropo. XVI	De priapismo.	LVII
De ijs qui amore insaniant. XVII	De infœcundis genitalibus.	LVIII
De apoplexia, & hemiplexia, atq; para- lysi. XVIIII	De h ulceribus pudendorū & anæ.	LIX
De conuulsionibus seu spasms. XIX	De passionibus uulvæ & menstruorum purgatione.	LX
De Tetano, & differentijs eius. XX	De retentione menstruorum.	LXI
De tremoribus. XXI	De nimia purgatione & fluxu sanguinis per uuluum.	LXII
Ophthalmiæ, id est lippitudines. XXII	De muliebri fluxu.	LXIII
Quæ ad aures pertinent. XXIII	De inflammatione & declinatione uulvæ.	LXIV
De passionibus nasi ac narum. XXIIII	De apostemate uulvæ. LXV (LXIIII)	
Aduersus ea quæ uultui accidunt. XXV	De h ulceratione uulvæ.	LXVI
De passionibus oris. XXVI	De cancro.	LXVII
De angina & accidentibus eius: item de ijs qui angina, aut alia quauis ratione strangulantur. XXVII	De duritie & indurationibus.	LXVIII
De grauedine, destillatione, rauedine, & tussi. XXVIII	De mola matricis.	LXIX
De difficultate spirandi & dispnoea. XXIX	De inflammatione.	LXX
De morbo pulmonis. XXX	De matricis suffocatione.	LXXI
De spūto sanguinis. XXXI	De procidentia matricis.	LXXII
De suppuratione & phthisi. XXXII	De præclusionē matricis.	LXXIII
De morbo laterali. XXXIII	Sterilitatis curatio.	LXXIIII
De cordis passionibus. XXXIIII	De rhagadibus & condylomatibus ac hæ- morrhoidibus.	LXXV
Quæ ad mamillas pertinent. XXXV	De pariendi difficultate.	LXXVI
De axillarū sxtore ac sudore. XXXVI	De ischiade.	LXXVII (LXXVIII)
De morbis qui insistant stomachū, præ- cordia & uentrem. XXXVII	De podagra & morbo articulari.	
De uentris inflatione. XXXVIII	De h ulcerosis affectibus in plantis & cal- caneis.	LXXIX
De cholera & diarrhœa. XXXIX	De callo ac tubere.	LXXX
De lienteria & cœliaca affectione. XL	De uitijs unguium.	LXXXI
De Tinasmo. XLI		

PAVLI AEGINETAE¹⁰¹

MEDICI PRAESTANTISSIMI, DE ARTE

MEDENDI LIBER TERTIVS,

ALB. TOR. INTERP.

Supercis quæ capillos intentant vitijis, deçp Alopecia, Ophiasis, & glabritate, caluitie ue. Cap. 1.



Veniamodum plantarum, aliæ quidem deficiente penitus humore, deciduis folijs arescunt & emoriunt: nonnullæ uero aduentitijs ac cōtrarijs humoribus idem patiuntur: Ita & in hominis cæsarie usu subinde uenire conspiciamus: deficiente enim humore, glabreta ac areg: ascititio uero et deprauato, Alopecia, tum Ophiasis, deciduo capillitio, solo schemate dissidentes, cōsurgunt. Hæc enim tortuosis & obliquis spacijs, ad instar anguis, locum deglabrat, comamq; uario colore tinctam ostendit: Alopecia uero à uulpibus, (quas ἀλπίνας Græci nuncupant) quod eo plerumq; id animantis malo corripiatur, nomen est indiū. E cutis igitur calore redundantē, unde uitium prouenit, humorē cōiecta euacuatione primitus, quæ medicamentis purgātibus fit, deinde localibus præsidijis utiliter utemur. Proinde ubi ad nigrorē admodū aut candorem plurimum calor uergerit, cum hieræ antidoto, non tam pituitā quam melancholicū quoq; humorem uacuare potente, expurgemus. Si uero pallori propius accesserit, ei quæ ex aloë conficiunt, globuli exhibendi sunt. Quorum uniuscuiusq; descriptionē in compositorū medicamentorum uolumine comperies. Cæterū post uniuerſi (quæ præmitti perpetuò debet) corporis euacuationē, apophlegmatismo, non semel modo, sed identidē ex aceto, sinapi, melleq; composito, utendū. Conducibilis uero multo, si aceto organū quoq; aut pulegium, aut thymus, hyssopus ue maceretur. Atqui in cæteris etiam quæ caput infestare solent affectionibus, eadem methodo utendū. Ante omnia tamen superabundantē (ut dixi) succum, uel purgandi facultate præditis medicaminibus, uel sectioni uenæ euacuantes, si modò sanguinis plenitas non desit. Sic deinceps ad localem deniq; medendi rationem est procedendum.

De Alopecia.

Postquam caput nitro laueris, & linteo aspero magis etiā ac uehementius lana exteſeris, atq; ad ruborē deniq; confricaueris, uerbenaca in sole cum aceto friata atq; cōtrita perunge: aut halcyonij perexiguum cremans & liquefaciens cum oleo ex lucerna obline: aut arundinis radicē aut corticem amygdalæ amaræ adurēs, cum oleo seu adipe sufficiente sumpta illine. Mediocriā quidē hæc, efficiaciora uero quæ euphorbio aut thapsia, aut adarce, oleo laurino liquefactis constituunt, aut liquida pice. Aliud: Erinaceorum marinorū testas combustas cum adipe sufficiente sumito, & locū antea nitro elotum, perungito. Aliud: Accipe piperis, stercoris ouilli aridi, nasturtij agrestis, seminis eruce, singulorū drachmas quatuor,

Ophiasis.

Alopecia.

Methodus euacuationis est, totopictis nō nisi totine corpis euacuatione præmissa, uti.

ueratri candidi drachmas tres, murium oletuli drachmam unam, quæ quædem contusa, bile taurina, aut hircina, uel subula, cogantur.

Aliud aduersus Alopeciam, experientia comprobatum.

SVmito mandragoræ, radicis aristolochiæ, radicis ari, ceræ, picis liquida, choas octo, axungiae suillæ ieiunæ, rhododaphnes, herbæ cordis exigui, coquito axungiam & rhododaphnen donec herba liquefiat, deinde de glomeratâ herbâ abijce, cætera axungiae confundito, & elixa: postea cerâ ac liquidâ picem adijce, mox audacter utere in sole: quumq; iam huiusmodi pilos prodixerint, caput uulpis combure, & folia halyconij confusa ungento insperge, quo renascant in capite pili. Aliud: Habet, canis ca¹⁰ pitis ceratiū unum, testarū marinarum medimnū unum, axungiam porcinam, omnibus in aulula decoctis utere, inspergendo, & ipsdem exiccado.

Medicamentū quod ē thapsia cōcinnatur, ad omnes diutinas affectiones.

Constat ex euphorbij, thapsiæ, laurini, uniuscuiusq; uncia una, sulphuris uiui (quod Græci *ἀργός*, quia ignem expertū non est, dicūt) uncia semis, ueratri tantundem, ceræ uncij sex, olei laurini aut rhicinini ueteris quod satis est. In robustioribus adijcitur & cardamomi uncia una, halyconij combusti uncia una. Nec hoc medicamentum ad alopeciam tantūmodo, uerum ad quancunque etiam noxam ab extrinseco frigore sine febre contractam confert. Vbiq; uero & sine discrimine in alopecijs omnibus²⁰ ante lotionem & frictionē utendum: & continue exiccent: cōplures equidem noui qui sola frictione & assidua exiccatione capillos plantabant.

Ad grabreia, & capillorū augmenta, ex cōmentarijs Critonis.

Erinaciorū uentres quinq; aridos accurate in uase testaceo torrefacio, quibus adijce tertiam partem uirgultorū myrthi, acatiæ fructus, acatiæ cremoris, cynosbati, adianti, pari pondere uncias tres, his omnibus in farinâ contulis, attamina tenui cribro, deinde adijciens adipis sufficientis libras quatuor, phocæ uituli marini tantundē, cōtunde, & in pyxidē plumbeam reconde. Sed ad usum, quacuncq; uidetur confectione liquefacito.

Quibus conferuentur capilli.

Capilli Veneris medimnū unum, ladani medimnos duos, uino oleoq; myrteo confunde, atq; utere. Aliud: Anemones florē tritum cum oleo illinito. Sed hoc quoq; nigrorē inducit. Aliud: Verbenacam rectam (quā Romani cristam quoq; gallinaceā, Græci *ῥοσπύρα* nuncupant) cum radice exiccata & cōtusam, exilibus foraminibus cribro attamina, & admixta tanta olei quantitate, quanta ad lubricam atq; lentam obesitatem seu crassitudinem inducendam satis est: in uas æreum repone, & quū liquefactum fuerit, utere pro oleo similiter.

Aqua quæ capillos tum auctiores tum nigriores reddit.

Acipe aque pluuiæ xestas sex, rhu Alexandri xestas tres, capilli Veneris uncias quatuor, ladani unciam unā, myrrhæ unciam unam, cucurbitæ aridæ tantundē, macerato in uase uitreo per dies uiginti, moue bis in die spatha tedeā, sed postera die immergens⁴⁰ *ἀπὸ τῆς ὁδοῦ*, singulatim utere quolibet

quolibet die. Semen quoque altheę in balneo illitū capillos nō tam cōseruat quā augmentat. Pari modo & oleum illitū, in quo uidelicet elixū & sim-
plicit̃er impositū sit semen altheę. Ex tenuantia comas.

Fici foliorum, uitis syluestris albę corticem, pumicis, testarū intectarū, crete cimoleę, singulorū minā unā, omnia aululę cibo inani impone, & luto circūliniens coque in uase fictili, & tere, spumę nitri adiiciens minā di-
midiam, gallas immaturas triginta, quibus liquefactis eximito & utere.

Aliud: Fit aliud in hunc usum hoc modo: Spumę nitri minas septē, pumi-
cis minas quatuor, aluminis scissilis, iridos aridę, myrti atrę, comę bryo-
niae radices, unuscuiusq; drachmas quatuor, lupinorū crudorum choas
quartā partē, utere in illinitionibus. Ad profluium capillorū.

Aloen cum uino nigro, austero illine, aut purpurę pocula cum oleo
cocta, & myrtum & ladanum cum uino aut oleo myrteo, aut spyras-
thos, comburens in testa polita, cum oleo inunge, capite iam antea raso.

Densitatem inducentia, & tincturę capillorū, ex Cleopatře de
comarum densitate, commentarijs. Cap. 11.

ANte omnia capite purgato atq; absterfo, radice uerticillaris her-
bę (quā rutinalem Romani, Gręci *αρροδνλιον* dicunt) capillos
mero oblinito. **Aliud:** Raso atq; purgato capite, accipe pi-
neę nucis nucleū recentē, in cinerē usq; combustū, quē pilę in-
ditum conterito, admiscens ungentū myrteū, ad mellis usq; crassitudinē,
atq; sic tandem obline caput. **Aliud:** Myrtorū quoq; & betę pari pon-
dere, utere cum oleo. **Aliud:** Gallas uiginti, adiantī uncias duas, inunge
aqua marina usq; ad mellis densitudinē, detergens aut capillos lotio aut li-
xinio, calcē ue, quibus deinde dilutis et irrigatis calida aqua, pilos hoc me-
dicamine biduum perungito, tertio die ablue, atque exiccatū oleo myrteo
perline. Hoc quippe delicatā, & densam, atq; nigrā reddit cęsariē. Den-
siores aut erunt capilli, si nō nisi prius capite derafo, hoc unguine utare.

**De pręcautione & curatione canorum, deq; alijs quibus-
dam nigrorem inducentibus.**

Olei omphacini xestas treis, spicę nardi drachmā unam, conchulę
Indicę odoratę drachmas quatuor, iunci odorati floris drach. qua-
tuor, coquito in oleo, atq; seponito, acatię cremoris uncia unam, uino dis-
solue & accurate macerato: quando uero olei tertia pars relicta fuerit, hoc
instillabis, & confundens acatię exime in sitellam, atq; inungens capiti
utere quotidie. **Aliud:** Nucum uiridiū corticis uncias tres, radices pri-
ni fruticis uncias tres, uini nigri xestas tres, coque ad partē usq; tertiam,
& residuū expressum tēperato cum oleo myrtei xesta una: utendum eo est
quotidie.

Aqua nigrorem inducens capillis.

Allę xesta una, rhu excoariarę, myrtorū nigrorū, foliorum cypri,
uniuscuiusq; xestas duas, cinarę quantū manu comprehendī potest,
fuliginū papaueris æqualē mensurā, aquę putealis xestas duodecim, plu-
ribus antē diebus maceratas coque ad tertias, deinde illine. Deterfis de-

nūo & exiccatis crinibus, cretæ cimolix oxybapho, id est quarta parte co-
tylæ, & calcis uiuæ æquali mensura infice, atq; illine. Cæterum succo beta-
rum elixatarū his omnibus dissolutis deniq; utendū, mox deinde betæ so-
lia operculi caussa superimponito, & ubi interposito tempore quantū satis
est sic perennauerit, in lauacro lotionē expurgato.

Quomodo capilli fuluo flauoq; colore tingi possint.

Quisquis cæsariem fuluo flauoq; colore fucare expetit, myrti medi-
umnum unum accipiat, salis floris tantundem, quibus accurate friatis
mollitisq; et inducto strigmentorū balnearū crasso lentore, hoc, absterfo
prius capite, medicamēto capillos inūge, atq; sic inherere diemq; nocteq;
finito, deinde uero abluere & expurgare deniq; præcipito. Aliud:
Lupini crudi cum aqua, in hunc quoq; usum illiniendi sunt. Aliud: Ex
spumæ argēti drachma una, Criticæ terræ drachmis quatuor, calcis uiuæ
drachma una, aqua balnei strigmentorū lentam crassitudinē cōficiens, ca-
pillos perunge, atq; betæ insuper folijs biduum aut triduum uniuersum
operculatum, tandem lotionē expurgari iubeto.

Quemadmodū atrum capillitū flauum reddere queas.

Si nigro capillamento flauū colorē inducere gestis, fecem uini, strigmen-
tumq; balnei accipito, & cerotæ crassitudine inducta, capillitio illinito,
idq; quum dormiturus sero, tum matutino diluculo simul atq; surrexisti, sa-
cito. Aliud: Giluum quoq; colorē induces, si cyperi folijs in cremore
struthij maceratis, eo iure atq; diluto diligenter utare.

Tinctura auro similis.

Auri instar colorē faciūt, aluminis drachmæ sex, sandaraches drach-
mæ sex, croci drach. duæ, thapsi quatuor tinctores utuntur (quam Romani her-
bam Rubiam nūcupant) drach. octo, calcis figulinæ & argillofæ drach.
quatuor. Coquito aut calcem & thapsum in partes dissectū, & dimidiata
parte consumpta, exprime liquidū, in quo alumen & sandarachā & cro-
cum dissolue, mox inijce uasi uitreo, atq; in necessitate ac usu, deterfo prius
capite, oblinito. Quum aut imbibitum fuerit, caput antea unctum sceno-
græci, & hordei, & cymini aqua tepida abluere, inijciens & saponis quan-
tum satis est. Aliud: Fece uini combusta, & oleo balanino simul con-
fusa, capilli inungantur. Aliud: Sapone quoq; abstergendæ sunt singu-
lis balneis comæ. Aliud impendio utile: Rhu erythri, hoc est rubentis
xestam unā, gallarū sesquialibrā, celydrii uncias duas, herba aurefcentis
(quam Romani Rubiam dicunt) uncias duas, capilli Veneris fasciculos
duos, absinthij fasciculū unū. Lupinorū pelle exutorū cyathos duos, aque
libras octo, in uase uitreo excipe, finitoq; nouē integris diebus macerari,
mouens bis quotidie. In usu uero, siccabis plurimū. In hoc spongiā intin-
gens capillos perfrica, & humores finito imbibere. Vbi uero aruerit, sapo-
ne calida aqua liquata abluere. Quibus capillitium candidū reddatur.

Verbasci albi florē crema, & aceto irriga, et cōfunde smegmati. Aliud:
Verbenaci seminis drachmas duas, aluminis drachmā unā, raphano-
rum

rum corticis unam, frustulatim incide, & taurinū glutinum quatuor drachmarum pondere, commisceto.

De his quæ cutem capitis inficiunt & deturpant malis. Cap. III.

De pityriasi, hoc est porrigine.



Orrigo (quam *arrivlosay* Græci dicunt) est tenuium furfuracearumque squamularū ex capitis ac reliqui corporis superficie, nulla relicta exulceratione, decidentia. Prouenit uero id uitij subeuntibus in caput prauo corporis humore, salſa ue piniua, aut biliolo et atribiliario ſanguine. Euacuato itaque prius uniuerso, ceu pro-

ditū est, corpore, ſubſcriptis facultatibus utendū: Cretam cūm oliam aqua maceratam betæ cremori confundito, atque furfurationi illinito, & donec aruerit illitū adherere permittito, deinde loco infecto abluto, thure cum uino & oleo trito denuo perunge. Postera uero die staphida syluestrē, hoc est herbam pedicularē, cum oleo huic uitio illinito. Aliud: Nitri, spheceles, id est fecis uſtæ, myrobalanorū, uniuſcuiuſque librā unam, herbæ pedicularis libram unā & dimidiam, caput absterge uino. Quod si alia corporis pars prurigine infecta sit ſicca, quemadmodū humidiores capitis furfurationes ſalſugine ablue, aut lupinorum apozemate, uel ut latine loquamur, decocto. Huius equidem ſummum habeo experimentum.

Furfuratio nō
in ſolo capite.

20. Pſydracia & exanthemata, id est, eruptiones piniuæ, aut papulæ capitis.

PSydracia exiles sunt excreſcentiæ puſtulis ſimiles, in ſumma cutis ſuperficie erūpentes. Exanthemata uero, id est papulæ, in ſumma cute puſtulæ ſunt & exulcerationes, perruſæ atque ſalebrosæ. Vtriſque tamen malis iuxta his quæ deinceps ſubordinantur potentijs, magno effectu ſuccurritur. Spumæ argenti, ceruſſæ, ſingulorū drachmis quatuor, aluminis drachmis duabus, ſoliorū rutę uiridiū totidē, aceto myrteoque oleo maceratis, cum pſydracia tum papulas perunge. Aliud: Ruta & alumine melle liquefactis, deaſo capiti cōtra hæc cutis uitia illinito. Si uero abſceſſibus capitis cuticula infeſteſcit, oliuæ folia cum melle elixa cataplaſmatis modo impone. Aliud: Spumæ argenti, ceruſſæ, ſingulorū uncias duodecim, ſulphuris ignē nō experti drachmas octo, cerota myrtea excipe. Contra hulcuſcula quę in capite prorūpunt, multorū generū, crebra, ruſo colore tincta, perexiguīs admodū papillis aſſimilia, e quibus aquoſi ſanguinis humores (quos *ixapæ* Græci dicunt) profluūt, deaſis antè capitis crinibus, & tumaqua tum nitro antea deterſo, ſulphure uiuo cum lotio humano diluto et macerato, utendū. Vel melanteria cum aceto capiti illinienda.

De manantibus capite hulceribus, quæ Græci *ixapæ* dicunt; &

ſauis, quæ *noſæ* eadem gens appellat.

40. **V**Na quædam in capitis cute affectio conſurgit, quæ *ixapæ* nūcupatur, tenuiſſimis foraminibus cutem perforans, e quibus glutinoſus cruor excernit. Haud ſanè diſpar huic figura & aſpectu malum eſt, quod *noſay* hoc eſt ſauū dicit, quoniā foraminibus peramplis terebratū, mellis inſtar humore continet, perinde atque in apum ſauis liquidō datur cernere. Cæte

rum originē ad nitrosam falamq; pituitam referunt. Hos igitur ut melioris succi cibō uesci, ita modis omnibus acri, acerbōq; abstinere conuenit, praesertim ubi inflāmata fuerit affectio. Et post eam quæ febricitanti congruit euacuationē, derafo prius capillamento, bis aut ter aut multo saepius aqua calida foue, in qua elixata sit myrtus, aut rubus, aut lens, aut amari lupini, aut asparagi radix, atq; si multa ui ichores excernantur, illinito, cum folijs salicis cum aqua aut lenticula syluestri. Illinitiones autē creta ci molia, aut Critica, aut rubrica Samia, aut pompholyx, aut spodiū, aut spuma argenti, aut cadmia, aut charta combusta, cōstituant, aut quæ ex charta concinnatur compositio xerion, omnia cum aceto admixto. Smegmatis¹⁰ præterea in eiusmodi ulcerationibus usus probatur. Item sulphuris, herbae perdicis, saponis, æquali mensura.

Composita ad achoras & cerea, medicamenta hæc sunt.

Spumæ argenti drachmas sedecim, foliorū rutæ drachmæ octo, herbe pedicularis syluestris drachmæ quatuor, atramenti sutorij drachmæ duæ, cum aceto & myrteo redigant in uiscositatē ac gluten, & illiniantur. Aliud: Sandicis ad hæc drachmæ quatuor, sulphuris uiui drachmas duas, mannae drachmas quatuor, cum oleo ueteri contra capitis manantia huiuscula illinito.

Ad achoras, manantia capitis hulnera.

Aliud ad achoras & humiditas pforas. Accipe rosarū rododaphnes¹¹ uncias quatuor, sulphuris uiui tantundē, picis liquidæ, picis aridæ, singulorū uncias tres, ceræ uncias sex, olei myrtini quantū satis est, redige in linimentum. In puerorum uero achoris, ea in lacte dissoluta illiniantur.

De sicubus,

Ficus nūcupantur germina hulcerosa, rotūda, acuminata, subdura, subrufa, quæ comitat etiam dolor. Oriuntur uero hæc magna quidem ex parte in capite, sed & reliquo itidem corpore. Prestantissimū ad hoc remedium alumen scissile, & flos æris afflatus, et taurocolla, quod est glutinū ex taurorū auribus genitalibusq; contextū, æquali pondere, cum æris squamula duplo pondere: liquefacta uero cum aceto illinito. Optimarum præterea halecularū (quas *μυρίδες* Græci nuncupant) capita cremata, bulbi itidem elixi, & cinis deniq; temperata cum aceto, sicubus medentur.

Contra ea quæ cum capiti tum mento nascuntur sicosa exanthemata, Xeraphion.

Misys drachma una & dimidia, chalcitidis drachmæ duæ & semis, squamulæ æris drachma una, alumini scissilis drachma una, sumpta; loto xerion prolixè imposito, & finito: deinde uero cum denuo lotum ex terferis, iterū impone, decidunt enim ramenta densissima, et rursus paucis diebus sequentibus absq; ullo cicatricis uestigio sanatur. Neq; enim mediocriter hoc medicamentum committit & conglutinat.

Ad pediculationem capitis, quam *φασίαν* Græci dicunt.

Qui pediculantur in capite, lupinorū aqua decoctorū diluto abstergi, medico præcipiente, expedit: Aut herbam pedicularem, (quam

σαφιδά αγγίων Græci dicunt: Aut sandaracham, siue utranq; maceratam cum oleo uetere aceto ue illinito: Aut piperis perexiguū (ne exulceratio nem inducat) cum oleo, aut hederæ cremorem cum melle, aut synopidem cum aceto: Aut cedrinū liquorem, aut picem cum alumine, aut baccarum lauri elixationē, succum ue expressum, siue oleum deniq; raphaninū pro amuleto adglutinamus, aut alia quacunq; ratione applicamus. Cæterum nos syluestrem herbam Pedicularem aceto & oleo maceratam illinientes, nunquam non quod uolebamus assequuti sumus.

De dolore capitis, quam *κεφαλαλγία* Græci nominant. Cap. IIII.

Labor capitis quam cephalalgiam nūcupant, omnium sanè molestissimis immensęq; difficultatis calibus obnoxia est. Interdū nanq; ex solo malo corporis temperamēto, interdum succorū quoq; nimietate, nō nunq; ex utriusq; culpa iuxta cōsurgit. Sed & occasionibus quandoq; euidentibus & foris accidentibus (quas *πρόκα πηγυνὰς* dicunt) id mali scaturit: uerbi causa, qui foris accidit quacunq; occasione, nimio æstu, frigore, temulentia, ictu, iniuriā ue quacunq; alia capiti illata. Grauiissimi igitur capitis dolores ē præpotentibus qualitatibus proficiuntur, maxime uero præcalida. Quæ uero ariditatem sequuntur capitis affectiones, non tanta uiolentia sæuiunt. Humida uero qualitas tantum non omni, quantum in semetipsa, dolore uacat, nisi cum calore, aut frigore, aut humorū plenitate coniuncta sit. Cæterum febricitantes dolor capitis subinde infestat, qua de re in superiore quidē uolumine, cui *πρόκα πυρετός*, quod de febribus sonat, est inscriptio, disseruimus, proinde in præsens ad quædam alia accingamur.

De dolore capitis qui ex ardore seu adustione gignitur.

Dolorum capitis, ex immodico seruore, inditium ē laborantium cute attactu calida, & aridiorē statim elucet, primo protinus obiecta cūlo & accessione prima. Sic præterea affecti rubris admodum sunt oculis. Hi utiq; quemadmodum gelidis tum haustorijs, tum unctionibus mirifice gaudent, ita maximū inde quoq; profectum sentiunt. Verum illis eadem quidē, qua de supra in caput ex febre dolentibus memorauimus, medela affare quadrat. Diutule aut̄ perseverante cephalalgia, subscriptis utendum cataplasmatibus est, quæ quidē fronti & tēporibus cōmodissime applicanda sunt. Panis quo uescūtur, posca, aut rosaceo, aliquādo cum amygdala, aut rosis, uel aridis uel tenellis uiridibus ue, aut cum mēta, pulegioq; maceratus esto, aut pane cum persici folijs. Ocimū porrō liquefactū cum aceto & rosaceo, aut hederæ corymbi, quod est pampini in aceto elixi, cōducunt. Conducit etiam subacta rosaceo, aut serpylli aqueo decocto fricta farina. Cardamomū quoq; in sartagine frictum, acetoq; & rosaceo maditatum, eam affectionem emendat: Aut fermentum cum rosaceo, aut iris arida cum aceto. Iugiter ac frequenter uero unū quoduis horū mutato: Nam si diutius quā conueniat singula immorentur ac perseuerent, efficaciam suam amittunt, & omnino ignaua redduntur.

Orbiculi qui ὀφθαλμοὶ græce dicuntur, aduersus cephalalgiam ē calida intemperie.

ACcipe croci drachmas quinque, chalcanthi drachmas decē, aluminis drachmas sedecim, myrrhæ drachmas septem, omphacij drachmas treis, chalcitidos drachmas treis, comeos drachmas totidem, uini austeri quantū opus: utere cum posca. Quod si uigiliæ quoque his accedant, tum somnificorū quippiam iamiam enumeratis applicato atque contextito.

De dolentibus capite ex gelida intemperie.

Qui frigida distemperantia capitis dolore impetuntur, diuersa planē his qui præcalido corporis temperamēto eadem affectione correpti sunt, inditia præferunt: ab accidentibus enim uero, quæ græce συμπτώματα dicuntur, alienum atque perpallidum obtinent uultum. Frigidis sic oppressi neque delectantur, neque quicquam adiuuantur, imò altius radices ex his morbus aget, ac sese firmitus stabilibit: atque uictus etiam ratio, & cætera eiusdem fortis atque cognata. Vnctio itaque sit rutacea, oleum laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut balsami denique succus, maxime si quū crassiora, tum uiscosiora fuerint redundantia retrimenta. Ad hunc præterea modum affectū, frontetenus ungendum censeo, & hoc & quæcunque tam ex pipere quàm euphorbio concinnantur. Porro uinum non nisi tenuium partium exhibendum est. Post hæc motui quoque indulgendū esse præcipe, & lauacris nonnunquam calidis. Aliquādo, quæ raphanis cietur, uomitione utendū, edoce. In quibus uero qualitas est absque plenitudine perferens & diuturnior, utitur & illo medicamento: Accipe piperis candidi drachmas duas, crocomagmatis drachmas totidē, euphorbij recentis drachmas octo cum dimidia, stercoris colubini drachmā unā et dimidiā, aceti acerrimi quantū satis est: affectam partem, confricato antea loco, illinito.

De his qui dolore capitis, ex biliosis humoribus orto, oppressi sunt.

Signa quibus ē bile cephalalgia scaturire deprehendimus, consentanea somnino & consimilia habentur signa, quæ eundem affectum ē seruire natum portendunt. Accedit autē ipsis rosio interim maior & multo uiolentior, pallor item faciei, & nonnunquam oris etiam amaritudo. Consuevit autē hæccine affectio ætates potissimū in uigore consistentes, temperamenta calidiora, & uitam solitudinibus obnoxia, & bilem efficientibus flauam, inuadere. In horū propterea curatione, lauacris exacte temperatis, unctio nibus item, & dilutis aquosisque potionibus utendum: Et uniuersa semel uictus ratio, non humidior modo, sed boni etiam succi, accipiat. Euacuare præterea biliosum humorem absinthij diluto oportet, siue cum aloë, & ipsius picræ antidoto, per se, aut cum exiguo scāmoniae confectis ex aloë globulis. Inungenda etiam frons uel croceo orbiculo, uel triangulari, uel id genus alijs quibusdam eius factionis.

De cephalalgia per consensum.

Quod si uniuerso corpori caput per consensum cōpatiatur, tum induria quadam prospiciendū cum ad distemperamentū, tum ad exuperantem

Qui cephalalgia biliosa obnoxij.

rantē quoq; materiā oculos cōiicientes, atq; instantes. Quod si fuerit plenitudo & præcipue in uenis, diminuemus per incisionē uenę sanguinem. Quod si modum qualitas potius transierit, purgatorio utamur medicamento. Si per consensum membro cōpatiatur caput, uerbi causa iocinori, aut uentri, aut stomacho, hisce succurrendum medicaminibus: Calida quidem si subit intemperies, panem ē uino diluto suppeditantes, aut quæ chondro, id est alica, constituuntur forbitiones: ad hæc extrinsecus modice in frigidantibus, roborantibusq; embrochas, ueluti antea demonstratū est. Sed quum propter uiscidos ac crassos humores in stomacho retentos
 10 quem cephalalgia corripit, & illos cōmouebimus oxymel potui miscentes, tum simplex, tum Iulianium, & ex hyssopo, & origano. Et hic præterea non tam maiore efficaciorēq; calfaciendi, quā & incidendi, ui præditis: tum quæ cum raphanis elicitur uomitione: neq; embrochis modò calidioribus, uerum cataplasmatibus quoq; utendum.

De cephalalgia quæ ebrietati succedit.

Si à remulencia uino adhuc crudo cephalalgia infestet, aqua tepida sumpta uomere præcipito. At si post concoctionē quoq; ipsam eo malo uenerit, in frigidandi & expellendi facultate præditis utendū: cuiusmodi est rhodinū tum per se, tum unā cum aceto, aut cremore hederæ seu brassicę.
 20 Iam eius herbæ quoq; folia calido bullita infusa ue, capitiq; tum imposita, tum circūligata, naturæ aptitudine opponunt & resistūt ebrietati. Quin edenda quoq; est brassica elixa. Lens insuper sumpta, ad hūc modum affectis opitulabit, potissime humido uentre præditis. Huc pertinent & alica, & mala punica, & mala, & apia pira, si comedant, et aqua interim potens.

De cephalalgia ex ictu, aliā ue quouis iniuria proveniente.

Cephalalgia ex ictu, aliā ue eiusmodi iniuria laborantibus, nisi in summa modo cutis superficie læsi uideantur, continuo uenam secabimus, & accōmodis embrochis capiti infundendo utemur, olcoq; dulci irrigantes, & caput lanis cooperientes: à uino super hæc & solidioribus cibis abducetes, præcipue si febris comitetur: & omnia breuiter, ut ad phlegmonen neruolarū partium, & in primis panniculorū cerebri, cōmode aptemus. Porro ubi uulnus illatum ex plaga fuerit, & huic conuenienti medicamento suppetias dispiciemus.

Malagma ad cephalalgiam.

Accipe ceræ drachmas septem, olei amygdalini uncias tres, terebinthinæ drachmas octo, rubiginis sabuli cretæ cimoliæ, (sic enim
 30 s̄ interpretor) chalcitidos, singulorum drachmas quatuor, pumicis drachmas treis, æris adusti, squamæ stomæmatis, uniuscuiusque drachmas duas. Verum ubi uehementioris duritiei illud esse uidebitur, oleo amygdalino remolliendum est.

De cephalata & hemicrania. Cap. v.



Trisq; his affectibus cōstanter grauis inhæret capitis dolor, tum strepitu, tum clamoribus, tum clara luce, tum uini potione, tum o-

Hemicrania.

mnibus deniq; caput implentibus saburrantibusq; concitatus. Alij quidem fragrantibus odoramentis totum caput percuti autumant: alij uero in alterâ modò capitis partem, quos hemicraniacos uulgo nominant. Et quibus inter cranium affectus consistit, dolor intensus usq; in oculorû radicibus sese insinuat. Quibus uero extrâ malum continet, hos circa caluam dolor impetit. Cum grauedine itaq; stupores ac uehementiæ, plenitudinem portendit: cum erosione uero & punctione, nunc humorû, nunc uaporû asperam tyrânidem: cum pulsibus aut, phlegmonen: sed cum extensione, siquidē sine grauitate percussuq; spiritus tenuis & uentosi copiam: si uero pulsus tensioni copuletur, phlegmonen pelliculosi corporis insinuat. Quod si cum pondere tensio molestat, plenitudinē intra pelliculas cōprehensam declarat. Cæterû si quando marcidus ac putris humor calore incenditur, unâ cum febre cephalalgiam patiuntur. Febricitant aut omnino etiam illi, qui ob phlegmonen dolore afficiunt. Corpore igitur uniuerso humoribus & succis redundante, uenâ aperiri, æstimata scilicet languentis uirtute, & clysteribus acrioribus uti expedit. Quin si sanguis iustum naturæ modum transiluisse uideatur, præcipuum est narium uena aperta tantisper euacuare, dum satis sanguinis effusum uideatur: proximum, hieram acutam exhibere: ab hoc utendum est apophlegmatismis: deinde & per nares euacuationes probantur, per ea quidem quæ nares expurgant, cuiusmodi est elaterij succus cum lacte infusus, siue in farinam friatum elaterium, naribus inflatum, & cyclaminis cremor marrubijq;. Hactenus quidem simplicia, composita uero sunt quæ sequuntur.

*Omnis phlegmonæ cum febre.**Sanguine redūdante quid expectat.*

Ἐξωπ, non ad diuturnam modo cephalalgiam, sed ad ophthalmiam etiam, & comitali oppressos.

MElanthij drachmas octo, salis ammoniaci drachmas quatuor, elaterij drachmas totidem, tritas oleo sicyonio, aut irino, aut cyprino excipe, atque ad ceratæ crassitudinem misce, & prehendido tangitoq; hoc medicamine nares.

Ἐξωπ insufflabile.

ACcipe rapi seu tuberis terræ aridæ drachmas octo, nitri rubicundi drach. quatuor: sed si nitri loco elaterium iniicias, multo præstantius erit: naribus flatu per arundinē inferere. Vtere præterea & epithematis capiti applicatis, & unctionibus in diuturnioribus maxime sequentibus.

Epithema ad cephalalgiam.

ACcipe ungenti irini, peucedani, castorij, singulorû drachmā unam, baccharum lauri drachmas duas, uirgultorû rutæ drachmas quatuor, concinna cum cerota rosacea, dera soq; capiti impone uniuersum. Mulier præterea quædam in hemicranicis sequenti usâ medicamento, omnium ferè per ora uolitans, probum sibi nomen parauit. Radicem ea cucumeris syluestris uiridem in tenues portiones dissecans, pariter & absinthium in hydrelæo (hoc est oleo diluto) coxit usq; ad liquefactionem atque ceratum, & hydrelæum quidem calidum mediocriter parti affectæ applicuit: cæterum

Historia de quodâ muliere, cuius morbo medicamento omnibus succurre.

cæterum radicem & absinthium terens, & mollificata emplastri more im-
posuit: quo solo medicaminis præsidio, quotquot hemicrania corripiebantur,
sive absq; febre sive cum febre, curauit. Quod si aut exacerbatio adeo
magna superuenerit, ut nequeat languens tolerare dolorē, utendū fuerit
his quæ solari, lenire, & excernere possunt. Cuius generis fuerit illud:

Vnguentum pro cephalæa.

A Ccipe succi peucedani drachmas sedecim, succi papaueris, anisi, hyos-
cyami, croci, myrrhæ, scammonia, singulorū drachmas duas, aceto
excipe, & redige in trochiscos. Cæterū cum uti uoueris, a ceto aut posca
peruge crassis humoribus aut flatuosis spiritibus affectos. Et dropace cō-
similiter unguento, & sinapismo utendum, quicq; ē thapsia cōstituitur orbi-
culo. Atramentum præterea scriptoriū in hac causā peradmirandū habe-
tur amuletū: quo quidē in hac affectione constitutis utendū, quemadmo-
dum infra de cōpositis diceſ. Sed & illud admiratione dignū est medica-
mentū, illis qui dimidia capitis parte propter crassum & uiscidū humorē
dolitant: Euphorbij medimnū unū, & castorij tantundē aquæ inferito, &
in aurē affectę partis indito: ad hæc balneū quoq; ingredi præcipito, neq;
adeo longa in eo mora facta, sic ipsum sumito, & solito more lauato: eo
quippe modo nō semel probatum experientia est. Neq; tamen alienū sit,
& in oleum eadem misſa auribus instillare: & quæ in ischiadicis scripta
sunt, etiā diurnæ cephalalgia & hemicrania succurrunt.

Ad Hemicraniam diurnam.

S Vmantur alij drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, a dipis ueteris
drachmæ duæ, cantharidum totidem, & uesperii emplastri more im-
posita per noctem finito, manē uero aperi ac disrumpe uesiculam, & perhu-
midis medetor. Aliud: Accipe baccarum lauri cortice exutarum dra-
chmas duas, foliorū rutæ tantundem, sinapis drachmam unam, aqua ma-
cerās cataplasmatibus modo illinito. A frigidis uero caussis, dimidij capitis
dolore perturbatis, tam utilissimū est præsidium, ut sæpenumero semel mo-
do inunctū sub balneū, confestim medeatur affectui, ita quidem ut à laua-
cro integræ sospitati restituat. Fit aut hoc modo: Accipe olei sabini librā
unam, ceræ uncias tres, euphorbij uncia unam, quo dimidiatā frontis par-
tem, secundū tempus uidelicet musculorū, illinito. In quibus uero nō mul-
ta frigiditas exuperat, gallæ & crocomagmatis æquales mensuræ partes
uino maceratas inunge. Sed quibus calidi uapores, aut gelidi humores ca-
pitis dolorem inferūt, caue quicq; medicamentorū ex euphorbio offeras.

Apophlegmatismus cephalæa.

S Vmito sinapis tritæ ac macerati aceto & melle uncias quatuordecim,
S herbę pedicularis syluestris drachmas quatuor, pyrethri tantundē, in-
cisa, cribrata, tersa in sole, conchylis reconde. Quod si ex bilioso humore
aut intemperie quadam capitis dolor (quam cephalæam dicunt) diutius
perennauerit, ijs quæ mox de cephalalgia præscripsimus, utendum. Si
uero dolor ne his quidem peractis cedat, cucurbitulis hirudinibusq; relia-

Amuletum ces-
phalæe suspi-
ciendum.

Si hemicrania
ē gelida causa

Euphorbium
nocet calido ua-
pore, nec frigi-
do humore cau-
put dolentib;.

Si ex bile cau-
put afficitur.

ctis, confecta per arterias egestione, non absurdū fuerit etiam post aures sectione arteriarum uti. In humidioribus uero, balnea quoq; naturalia, & sua sponte scaturientia, magna utilitate adhibentur.

De agitatione mentis, siue phrenitide. Cap. vi.



Accillatio mentis (quæ græce *φρενιτις* dicitur) est panniculorū cerebri inflammatio, nunc quidem ipso cerebro pariter inflam-
mato, nunc uero præter naturam caliditatis abscessu, incidens.
Trahit autem morbus originem, aut ex sanguinis redundan-
tis copia, aut immodico flauæ bilis humore, aut flaua etiam bile nimia as-
sata & torrefacta, iamq; in nigriorem tendens, unde uehementior grauissi-
maq; dementia oritur. Nonnunquam & per consensum hæc quoq; passio
occurrit, cum uidelicet cerebrum syncipiti compatitur, propter dissemina-
tos hinc inde in ipso neruos. Si uero per summos urentissimarū febrium
uigores, non propria cerebri affectione, sed per consensum mentis aliena-
tio accidit, nō phrenitis, sed delirium modo (quā *ῥαψορῶν* nominant)
est. Comitatur autem peculiariter phreneticos magna quidem parte per-
uigilium: nōnunquam tamen inquietus & turbulentus quidam somnus,
ita ut subinde exurgāt, exilient, & ceu cestro agitati uociferentur: alij qui-
dem ob sanguineū humorē præpollentem, cum risu: alij uero propter fla-
uam bilem cum temeritate & cōsidentia. Quemadmodū igitur ij qui atra
bile uexantur, sic etiam qui mentis uacillatione laborant, cum desipientia
& incohibiliter obliuiscuntur nō solum eorum quæ à seipsis dicuntur, sed
etiam perpetrantur, oculosq; sanguinolentos præferūt & lancinant, nunc
quidem squallescentes, nunc uero illachrymantes, & inedia patientes.
Redditur præterea lingua eorum asperior, & ex naribus sanguinis pro-
fluvia oriuntur, & floccos auellunt, & sarmenta stipulasq; legunt, & per
omne morbi tempus grauius februnt, febre in profunditate maligne la-
tentæ: pulsus ad hæc paruus & obscurus habent, cum quadam etiam duri-
tie cōiunctos: accedit respiratio magna & rara, cerebro primogenia affec-
tione laborante. Si uero per consensum mentium uacillatio oriatur, respi-
ratio erit inordinata, conuelluntur præcordia, & caloris satis habent. Qui
rursus propter cerebrū apud se non sunt, calores in uultu, sanguinē & re-
fertas uenas præferūt. Quod si bili pituitosus humor copulet, ut causam
mixtā id malum, sic et appellationē habet cōpositam, uigilem enim somnū
(quod *καῦμα* Græci dicūt) appellant. In uniuersum quidem, bilioso præpol-
lente humore, uigil phrenitis fit: insaniūt enim eiulmodi uigilantes. Pitui-
toso contrā superante, grauioris somni modo sopiunt: ipsumq; hoc malū
antiquiores Galeno medici, uno ore Catochoni ap pellauerunt.

Curatio amentiae phrenitidis ue.

Si per languētis uirtutē tutum fuerit uenā in cubito incidere, mature &
sæpe frequenter detrahare expedit. Quod si sic affectus delirās, manus ex-
hibere detrectet, aut licet eam exerat, periculū timorq; sit, ne post euacua-
tionē sanguinis, lancinata sæpe numero manu, ex eo furenter perturbetur
laborans,

Paraphrosi

Note phre-
nitidos.

come.

Catoches.

laborans, uenā in fronte secantes rectam, semel quod satis est, auferemus, clysteribusq; utemur, & quæ ex oleo uel rosaceo cum cremore ptisanæ constant enematis. Peruigilio uero superante, rosaceo aut oxyrhodino etiā caput inungemus. Nōnunq; etiā uigiliā prius aqua calida elicientes, medicamentū ex papauerū capitibus compositū propinabimus, nisi imbecilla corporis uirtus inhibeat. Reliqua uero quæ uigiliās abigunt, ex superiori bus huc transferenda sunt. Decūbat aut languēs in loco tum luce tum tem perie mediocriter disposito, & diuersis imaginū picturis distincto, in quē nō nisi intimi quidā et acceptissimi necessarij ingrediant, qui laborantē nō importune interpellent, sed nōnunq; leniter & mansuete consolent, nonnunq; uero austeriuscule deterreat. Præcipuū aut alimentū, mulsū est: mox deinde cremor ptisanæ, et ex alica forbitiones cum suaui aliquo potu, uerbi causa, ex melle, aut aqua rosacea, aut rhodomalo, aut dulci hydro malo: Nam hydromalū quod ex Cebyra exiguis uasculis importatur uiuifacium, uitandū est, in huiusmodi plus nocumenti quā uinum efficiens, & maxime in his quæ circa caput, & ante concoctionem. Lotum aqua panem exhibeamus. Intyba item, & lactucas elixas. Quod si immensus infestit feruor, hæc cruda sunt applicanda, cucumeris medulla, & peponis, & consimilium. Aqua uero gelida sic affectis abstinentum est, potissime si non primigenius affectus, sed per consensum mentium affectionis causamprehendamus. Deinde si lotium ipsis, ut solet per dementia, retineatur, facientes teporem calido hydrelæo, circa pectinem atq; uescicam, deinde & impositione digitorum manus secundum loca prementes, excitemus urinæ profluuium. Calido præterea oleo reliquam corporis molem decubentibus ipsis perungemus: & ne sursum uersus agitent, pro uirili ca uendū est: si quidē opulenti fuerint amētes, ministrorū custodia obseruentur: sin aut inopes, uinculis constringant. Inordinatus quippe motus uirtutē debilitat. Alia quoq; ratione exantlati, uinculis pedes ligent, & antispasmi causa cōtrecent. Si aut lōgior ac difficilis solutionis fuerit affectio, ab illis quæ capiti officiūt summopere abstineant. Applicanda sunt aut embrochis quæ capiti adhibent diaphoretica, cuius farinae est succus mentæ, aut serpylli, aut nepetæ, aut rutæ. *Egras* præterea tunc utendū: sed post septimanā, si uiscera inflāmata fuerint, ex semine lini, & hordeacea farina, cū oleo formato cataplasmate, mitigemus. Ad hæc præterea cucurbitulas leues, & sine scarificatione, aut etiā concisa antē scalpello cute ipsi imponamus, & ceruici ac spinæ. Quod si corpus uehementer siccū & ardens uidebitur, & si adhuc febricitet, balneis quoq; ex aqua potabili & unctione largiori utendū: & uinū tenue nullarū ferme uirium, id quod aqueū dicit, ad recuperationē uirium exhibendū est, nihil morantes ex ipso orituram (ut solet) mentis alienationem: aut enim uigore existente omnino non fit, aut iam facta facile desistit, aut procedēte declinatione *caput*, et decenti cōmeatu utendū est. Ceterū mēte captorū unctiones iteradg sunt: prohibēdi item a temulētia, ira, ciborū corruptela, atq; præ alijs omnibus gestu solis.

Viciis mente captorū.

Inapte motio nes aires desiciunt.



Antea saepe numero inflammatione cerebrum opprimitur, atque in tumorem etiam adeo attollitur, ut testae commissurae in capite distendantur dispalenturque, qui dolor omnium ferme grauissimus est & diuturnus, quem in gēis quoddam fastidium comitatur, rubor multus in uultu cum tumore elucet, oculi proterui & exerti redduntur, caput ipsum denique in molem sese attollens intumescit.

Curatio phlegmones cerebri.

Vena sic affectis principio statim incidenda, uasa euacuanda, in naribus & uasis sub lingua positis sanguis exhauriendus. Vtere praeterea aduersus id genus inflammationes capitis, embrochis cum cataplasmatibus, tum humectandi tum maturandi facultatem habentibus.

De ignitis rubedinibus cum inflammatione (quod Erysipelas dicunt) cerebri. Cap. VIII.

Ignis sacer.



Ritur in cerebro quoque erysipelas, quae nostri ignem sacrum interpretantur: cui malo obnoxius patitur eiusmodi: Afficitur caput uniuersum, uidetur flamma occupare totum, uultus uero in hac affectione constitutus gelidus et subpallidus est, arescit omnino os.

Curatio erysipelatis cerebri

Ad hunc igitur modum habenti, ante omnia sanguinis detractio, maxime uero de his quae sub lingua sunt uenis, conducit, quoniam malum multo leuius reddit. Quaecumque praeterea frigorificae facultatis sunt, cumprimis & intrepide exhibere conuenit, & quorum in alijs pariter ignitis cum inflammatione rubedinibus, non est incommodus usus.

De ueterno, qui *νεύρηνος* Graecis dicitur. Cap. IX.



Rosundus quoque & inexpugnabilis sopor, quae ueternum dicunt, eius partis quaedam noxa est, in qua ratiocinalis collocatur potentia: eundem quippe quae phrenitis locum, cerebrum inquam, occupat: sed contrariam omnino illa inexcitabilis dormiendi necessitas causam habet & materiam, pituitam scilicet, humidum & frigidum humorem cerebrum irrigantem, & in somnum cogentem. Comitatur autem ueteranos lenta quaedam & ignaua febricula, non admodum mordax cum delatione in somnum profunda, quam *καταφραγία* Graeci uocant. Pulsus porro illorum cum magni, tum rari, tum ramosi: respiratio uero nimis angusta et imbecilla: somnolentique perpetuo sunt, desidiosi, ignaui, egre interrogantibus respondentes, obliuiosi, dementes, oscitantque cerebro, & aliquandiu ore aperto manent, quasi id claudere obliti. Denique autem per alium plures quidem humidiora, quibusdam uero contrario modo uenter arescit. Lotium praeterea iumentorum instar meiere consueuerunt. Nonnulli porro tremunt & undique sudant. Ceterum caros ex eadem lethargi materia proueniens, eo tantum ab illo diffidet, quod in caro praecedat febris uehementior, in lethargo lenta quaedam & ignauior sequitur: quodque carus alijs aliquot symptomatis superuenit, febrium puta exacerbationibus plerumque, & comitialibus, & coarctationibus cerebri, nunc quidem fracta caluaria, nunc uero pellicula anteriore cerebri partem seruante. Verum lethargus peculiariter quandam habet constitutionem.

Curatio

Cari & ueterani discrimen.

Curatio lethargi.

P Rincipio uiribus ægri permittentibus, uena incidenda est: non concedentibus aut, acrimonia nō uulgari clysteribus utemur. Hoc malo correptū, in ædibus amplis, & mediocrē lucis (splendorē obtinentibus, decūbere mandabimus: ad hæc caput ipsius, oleo adiecto, interim & castorio, embrocha irroremus. Neq; defunt qui olei loco oxyrhodinū cum castorio usurpant, roborātes & calfacientes per hoc caput: reliquā uero uniuerſam corporis molem, & maxime extrema, oleo ueteri illiniētes, cum nitro cocto, aut pyrethro, aut pipere, aut grano Gnidio detergunt. Potest uero
 10 quis & cerota ex illis unā cum castorio facta uti. Odoramēta præterea offeremus, thymū, aut origanū, aut pulegium, aceto macerantes. Os porro ipsum, & partes circa cœlū, hoc est palatū, illinito, sinapiq; trito cum exiguo mellis, tentatum, glomeratā digitis eijcito pituitā. Quod si assumpserint, & apophlegmatismo utitor, oxymelite cum hyssopo, pulegio aut origano, aut ipso etiā sinapi. Propinabis deinceps nōnihil eorū quę ocyslime penetrāt, præfertim diospolitici quantū capit cocleariū unum, cum posca. Porro in diuturnis tremoribus exhibendū est castoriū scrupulorū duorū aut triū pondere. Vbi uero humorū exiterit nimietas, neq; quicq; aliud prohibet, scammoniā unius scrupuli pōdere castorio applicabimus. Per
 20 seuerante uero etiamdū affectione, salibus, milijs, & cōsimilibus lineo sacculo inditis, deraſum caput calido fomento fouere expedit. Ad hoc et sinapismis secundū caput & sternutamentis utendū: deinde cucurbitulæ ceruici sunt admouēdę, aliquādo leues cum multa flāma, quādoq; uero incisa scalpello cute. Naturaliū interim excretionū nunq; obliuisci cōuenit, cum earū quę per sanguinē, tum quę eiendo lociū fiunt. Irrigato aut pectinem oleo rutæ, aut Sicyonio, cum exiguo castorio. Crebrius uero & accuratius memoriæ suggerēda est portio, calidę aque cōfundentes quippiā suauium potionū, præcipue ex melle bombiliorū. Et sicubi in medio quoq; quædā extiterit phlegmone, & huic sanē embrochis & cataplasmatibus
 30 mendū. Cæterū in hoc etiā naribus sinapi aceto liquefactū, aut castorium combustū, admoueto. Præsanę præterea cremore, aut bromi aut alicæ, cum aceto mulso, aut sale aut pulegio alantur, nōnunq; quidē quotidie, interdū uero alternis diebus: sed post alimentū puincendi sunt, siue partes extremæ quamplurimū percellendæ: pungenda item crura, pili nōnunq; euellendi, uiolentius excitādi gratia. Atqui rubores fœmorū, crurū, brachiorum, sæpenumero præsidio sunt. Declinante uero iam affectione, alterna subleuatione reclinatioeq; utendū, atq; in balneū ducēdi, & refectrix deniq; educatio cōuenienter assumenda est. De catocho & peruigili comate,
 40 **A** mpridem sanē in capite de phrenitide huius morbi rationē perstrinximus. Cæterū notas quidem in uniuerſum dicendo habet cum phrenitide ac lethargo aliquo modo communes, sed ex ea quę præpollet materia uariantes. Priuatim uero has notas catochon habet: Corripitur laborans repēte supinus, expansus, et aliquādo quidē subturnidū et mediocris

Excremento-
rū semper has
benda est ratio

ter pallidum habet uultum, lethargicis per similem : quandoq; uero & rubor in ipforum uultu efflorescit, tunc sanè sursum uersus palpebra ipforum cõuelli uidetur, & extare ita, ut nequeant conuenire oculi: neutiq; uero uidetur respirans, sed tanquã extinctus iacet, porro paruum atq; obscurum retinet arteriarũ pulsus, & uehementer densus: urinæ quoq; & aluus cohibentur, uel exigue feruntur. Alij quidem mediocriter habentes, liquore quopiã infuso absorbent: alij uero malo succubentes, reijciunt per nares. Hos igitur qui pituita superante bilem coaugmentat, à lethargicis separamus, quod neq; intumescunt, neq; liuido corpore, quemadmodũ lethargici, sunt, nisi parumper: sudant item modice. Molestiores uero longe deprehendunt, quos uigilia multa infestat, & lotia nõ procedunt, & suspiriũ interruptũ intendit, atq; sudor erumpit: quibusdã potus in nares ebullit. Quod si mulier eo malo correpta deprehendit, discernet ab obnoxia uterina suffocatione, qđ secundũ naturã uidetur iacere, ac ea quæ dicuntur percipere, & nũc exurgere, nunc denuo recubere. Ad hæc alium quoq; ac diuersum catochon à uigili sopore ac comate tradunt, nõ compositã, sed simplicem quandã causã habentẽ, frigidiorẽ quippe & aridiorem materiã, quæ oppleto & obturato posteriore cerebri sinu, affectionẽ hanc efficit, in qua subito deprehensus obrutusq; laboras protinus in eadẽ forma permanet, in qua correptus est: uerbi causa, stans, aut sedens, aut cõnuentibus ac clausis oculis, aut respiciens: quapropter uetustiores Græcorũ Medici, *ἐπὶ τῷ κατόχῳ*, (qđ est detineri & occupari) catochon, & in eo malo cõstitutos *καταχόμενος*; nuncupauerũt. Recentiores uero sceminino genere, sed nõ dissimili significato, *καταχῶν*, & *κατάληψις*, quasi detentionem & deprehensionem dicat aliquis, nominauerũt. Curatio cuius per similis quidem prædictis est, sed symptoma tũ differentijs ab ipsẽdem dirimit ac discrepat.

Curatio catochi.

IN præsentĩ igitur malo phlebotomiam, quod est uenæ sectionem agere, ingredi in primis expedit, potissimũ in quibus facies rubicundior existit, uirtute corporis permittente: proinde clysteribus utendũ, nunc quidem pituitam, modum naturæ excedentem suscitantibus, nunc uero bilem redundantẽ placantibus. Pari modo aliorũ quoq; præsidiorũ ratione utendum, eodemq; pacto nutrire cõuenit: aliquãdo quidẽ quotidie, aliquando uero alternis diebus. Quandoq; uero ualde periculosus est affectus, si modo per aliquod cibi aut potus delictũ fiat, in quibus uomitus quamprimũ uel ui quapiã prouocandus est, & circa confidentiam, quã systolen dicũt, obseruandũ: aluus quoq; excitanda: uiscera item embrocha cymini aut rutæ irroranda. Cæterum qui ob temulentiam ea affectione corripiuntur, si simul atq; uinolentia discussa fuerit, humidiori alimento medendum est, cuius generis ptisanæ succus censetur: ad hæc caput quoq; ipsum mutuis illinitionibus humectandum: si quidem æstas fuerit, frigorificis: sin uero hyems, tepidis. Atqui si crapula minime soluatur, neq; ad sobrietatem reuertantur, his tanquam deploratis manus medicus non adhibeat.

De me

Catochis uide
nomini habeat

Catochi &
Catolepsi.

Si Catochus
ex temulentia.

49

De memoriae iactura, & ratiocinationis labe, & Caro, quod est sopore:

& Morosi, hoc est sanitate. Cap. XI.



It quandoque memoriae labe iacturaque per se conestitur illi non nunquam etiam quaedam ratiocinationis & mentis labecula. Dico autem ratiocinationis & mentis, eam intelligens hominis partem, in qua uis ratiocinandi (quam λογιστικὴ dicunt) consistit. Labe autem ipsa, primo per se solaque contingit: Deinde comitem habet memoriae iactura, appellaturque id malum *μνήμη ἀπόλη*, quod est memoriae interitus. *μνήμη ἀπόλη*
Verum utraque, mentis scilicet & memoriae, parte male affecta, Morosis, id est
10 est sanitas, est. Sortiuntur uero haec omnia capitis incommoda ex malo temperamento illic herente, causas. Quod si uinum modum fuerit, tum mentis, tum memoriae afflictione, & hebetudines, torporesque (quas *καθρέματα* Graeci dicunt) & grauiore somni impetus atque accessus, (quas *καταφορέ* idem appellant) & alios denique prolixos somnos inducit. At si humori frigus quoque accesserit, non tam caros, id est sopores, quam lethargum, hoc est ueternum. Non dissimili etiam modo cum sola affuerit ariditas, uigilias tantum: si uero ariditati accesserit feruor, deliria & phrenitides conciliat. Caeterum mala haec temperamenta nunc quidem in humoribus, nunc uero in cerebri cauernis, aut finitimis uasis, aut in conuellente humiditate, aut in ipso cerebro corpore, aut temporum denique musculis quippiam horum patientibus, consistit. Si quando uero humores inter se commiscantur, eiusmodi quoque affectionem afferunt: sed simplex ne an commixtum efficiens temperamentum sit, ex eorum quae egerunt specie facile deprehendes. Caeterum memoriae & ratiocinationis iactura frigoris esse prolem non ignoramus. Si insuper cum humiditate & ariditate hoc contigerit, id quidem tum ex egestionibus, tum ex laborantis habitu, tum temperamento, tum uictus ratione, tempore item ac regione denique liquidum datur cognoscere. *Curatio.*

Si gelida quaequam fuerit interperies, calfacienda est contrariis medelis
Scontinuo: sed si humiditas accesserit, etiam siccanda: si contra ariditas con-
30 iuncta sit, humectare pariter & calfacere conuenit. Eodem praeterea modo ubi calida distemperatura affuerit, refrigerandum: si uero & ariditas accesserit, humectandum: si autem frigiditati humor accesserit, tam refrigerare, quam arefacere conducit. In quibus uero sanguinem plus iusto abundare conperies, uenam incidere, uel clysteribus acerbis uti, deinde hiera propinare, tum apoplegmatismos usurpare, oportet. Circulinationes porro capitis, oleo, calorificis & siccantibus rebus adiectis, exhibeto: rosas inquam, myrrha, lentisco, & huius faring caeteris. Ad haec uniuerso etiam corpori accurate prouideto. Quod si insuper ex feruore et labore id mali scaturit, embrocha ex aceto rosaceo, caput de more perfundito. Et reliqua uiuendi ratio
40 in frigidandi humectandi que naturam habeat, & in alijs quum esculentis tum poculentis eadem uis contineatur. Quinetiam si Carus, Morosi aut obliuioni superuenerit, tunc quoque prospiciendum, quemadmodum paulo ante de lethargicis tradidimus, ubi eorum etiam discrimen ob oculos posuimus,

Contrariis contrariorum sunt medicamenta.

De uertiginosis, quos Graeci *συνεμαλυνόμενοι* dicunt. Cap. XII.

It affectio uertiginosa magna ex parte, cum cerebrū gelidi glutinosiſq; humores occupauerūt: quapropter ea correpti, quantūuis leui de cauſſa facile concidunt, ut ſi quando uiderint extrinſecus circumagi aliqua, uerbi gratia rotas, uortices, turbinaſue: uel ſi ipſi quoq; circūagantur: interdum uero quum capite feruent, cōmotiſ in eo humoribus, aut etiam ſpiritu, ſeu flatibus. Nōnunquā uero coarctatiſ in anguſtum anterioribus cerebri cauernuliſ, ſecundū foramina cranij rupti, ex quibus ſanē uehementiſſimi dolores oriūtur. Præcedit aut in primigenia affectione capitiſ dolor uiolentus, & caros, ſonores & ſibila auriū. Læduntur etiam nōnulli odoratu: nec deſunt quorū offendiſ guſtus: quōſdā uero per cōſenſum oſtij uētriculi ſequitur cardiogmus: cōmitantur etiam nō raro nauſeæ. Curatio.

Vertiginosi qui ſunt in augmento affectioniſ cōſtituti, concinnis odoramentis, frictionibus, ac conſimilibus excitandi ſunt. In relaxatione uero, ad reſutandā affectionē ſanguis ante omnia detrahendus, deinde purgandū hierapicra. Affectione aut in ſtatu exiſtente, clyſtere acriori utendum, centaurij aut colocynthidos, id eſt cucurbitulæ, decocto. Præmiſſiſ hiſce uniuerſi corporiſ euacuationibus, capiti topica, hoc eſt localia remedia ſunt adhibenda, puta cucurbitulæ circa ceruicem ſcarificatā: poſt hæc apophlegmatiſmiſ & ſternutationibus utendū. Quos uero calor capitiſ et auriū tinnituſ moleſtat, ueluti quū uapores calidi per arteriaſ aſcendūt, etiam arteriaſ poſt aures incidiſ adhibenda eſt, ut de Chirurgicis dicet.

De morbo comitali. Cap. XIII.



Comitaliſ, quā *ἀνελκία* Graeci uocant, cum totiſ corporiſ conuulſio ſit, nō ſine documento principum effectuum, quandoq; in ipſo quidem cerebro conſiſtentem habet cauſſam: nōnunq; uero in cerebri cauerniſ omnibus. Morbi autē huiuſ cauſſa eſt, ſæpe quidem numero pituitoſuſ, ſæpiuſ item melancholicuſ humor. Cæterum nō primigenio ſemper affectu, ſed & per conſenſum, quā *συνεμαλυνόμενοι* Graeci uocāt, puta oſtiū uentriculi, quē ſtomachuſ dicimus, accidit, quædamodū in Colicis, ceu in illorū ſermone explicabimus. Nōnunq; certe ex ſuppeditatione aliaſū corporiſ partium, aura quadā frigida ad cerebrū ueniente: interdum quippe à cruribus ſeu brachijs: interdum uero ab ipſiſ manuſ digituliſ. Viſa eſt nōnunq; & à locelliſ in quadam muliercula, eo puta tempore, quo uterū gerebat, proueniſſe: cæterum ei à partu illico ualedixit. Accidit porrò huiuſmodi affectuſ præcipue pueriſ, & longe frequentiuſ recet̃er in lucē editiſ: poſt hoſ adoleſcentibuſ, & adultiſ qui ſunt in ætatiſ flore: minime uero ſenibuſ & decrepitiſ. Præcedit in ſuper epilepticoſ quū corporiſ tum animæ ſeditio quædam inuoluntaria, & mœſtitia, & eorū quę perceperūt obliuiuſ, & inſomniorū uiſiones turbulente, dolor capitiſ, et cōtinua eiſdē ſaburratio, ſubiracundia maxime: pallor item faciei, & linguæ inordinatuſ motuſ: nec deſunt qui eam mordēt. Quibuſdā uero

Cauſſa comitaliſ.

Hiſtoria.

Comitaliſ quorū inſeſtat poſſiſſimuſ.

uero à stomacho, & tremor oris stomachi præcedit, & turbatio, & erosio: & in ieiunijs, aut diutina abstinencia ingruit: sed imminente iam sympto-
mate subito concidunt, conuellunt, anxietate quadam graui tantū nō exa-
nimantur, & uociferantur interdum. Præcipuū uero ac maximū eius mali
inditium est, oris spuma, quū cætera cōmunia quodāmodo sint & in alijs
morbis. Quibusdā uero ex illis nolentibus uolentibus cum lotiū tum ole-
tulum egeritur. Neq; defunt quibus genitale semen effundit. In quibusdā
itaq; grauissima existente affectione, protinus interficit cōtinuitate exacer-
bationū, & sympto-
10 matis uehementia. Cæterū magna ex parte is morbus
longus est, ita ut si non in pubertate, aut in uuluerū expurgationum, aut con-
cubitus tēpore cessauerit, aut si post hoc tēpus permanferit, plerunq; usq;
ad mortis diem comitatur, nisi per accommodata remedia sustulerint. Arguit
autē comitali correptos, ex asphalto, aut gagate lapide, aut cornu caprino
fussius: comestum item iecur hircinum, aut odor cocti iocinoris.

Curatio morbi comitalis.

Quod si comitali correptus fuerit etiam dum infans, nullo planè me-
dicamine studebimus neq; succurrere neq; satagere: etatis namq; mu-
tatione in biliosius & aridius, & dietę in tēperantius ac frugalius, sua spon-
te plerunq; isthæc affectio cessat. Oportet autē circa infantes & lactentes
20 præcipue uictus rationē obseruare. Porro qui post primā pueritię ætatem
incidunt in epilepsiam, eorū conuulsas corporis partes irrigare, cōtinere,
& in ordinem quendam redigere oportebit, deinde aperto ori, digitiū aut
pennam oleo irino perunctam ad mouere, ad extrahendam pituitam. Ad
hæc odoramentis sensus excitandus est: uerbi causa, peucedano, cyrenaico
succo, asphalto, pice cedrina. Post accessiones uero (nisi quid prohibeat)
sanguis e cubito mittendus est. Accessione uero nihil remittente, extremis
corporis partibus sinapismū adhibe, cucurbitulamq; præcordijs applica.
Quod si hæc omnia nullæ sequantur seriæ neq; induciæ, exigua spes dein-
ceps habenda est. Confidenter autem medicus castorium ori laborantis
30 infundat, & liquorem cyrenaicum, cum melle & aceto: per sedem immitti-
to decoctum centaurej uel colocynthidos. Exurgentes uero à comitali pa-
roxysmo, post refocillationē purgatione hieræ euacuari debent, que utiq;
recentis et acutę comitalis præiens medela est: deinceps uero quæcunq;
ad arcendum & destruendum diutinū morbū faciunt, exhibeamus. Affe-
cti uero potatione aquæ quamdiutissime continendi sunt. Exorsi cura-
tionem à sectione uenarum, si nihil aliud dehorretur: deinde relictis qua-
tuor aut quinque diebus, reficiendum est corpusculum, ac tum deniq; me-
dicamento purgante euacuandū, maxime autem ueratro nigro, aut colo-
cynthide: sin uero minus, scāmonia. Conuenit autē ueratū absq; medulla
40 incisum et maceratū inspargere mulsi cyathis quinq; aut sex, uel melle de-
cocto reficere cum exiguo pipere, colocynthida uero semine eius abiecto,
medulla autē seruata, passo implere decet, & sinere solidā noctē, matutino
uero passum miscentē in potu præbere, aut candidi ueratū medicamentū

Epileptici uero
abstineant.

purgans usurpandum. Est aut id cuiusmodi: Baccarū lauri purgatarū, pi-
peris albi, alypiadis, ueratri albi, uniuscuiusq; drachmas octo, hæc quidem
exhibebis in una dosi cum dulcore qui est in colocynthide, pulchre qui-
dem purgat per uomitū. Vbi uero quantum res postulat expurgatū est,
lauandi sunt: tertio uero die cucurbitulę præcordijs & scapulis, cōcisa scal-
pello cute, sunt imponendæ. Post hæc superfedentes aliquot dies, & cor-
pusculum refocillantes, hiera quæ ē colocynthide conficitur, cōmouendi
sunt. Quibus peractis, deinde sanguis per cucurbitulas ē capite & ceruice
detrahendus est. Sequentibus uero diebus, laboranti panis in mulso de-
coctus, cataplasmatīs instar applicandus, mollificatus & contritus amy-
gdalis amaris, aut serpyllo, aut menta, siue nepeta, rutha ue. Cæterum
id per dies tres agendum. Postea aridum quidem caput peucedani cremo-
re cum aceto mixto, in quo spondylium sit elixum, perungito: rursus tum
spacio interposito & corpore resecto, ministra quod ē colocynthide con-
stat antidoti obulos nouem in aqua mulsa, & interpollatis diebus iterum
exhibe antidoti obulos tres, mox inde sternutamentis utere. Post uero
quinque aut decem dies, castoreum in mulso propina. Quiete tum de-
nuo intercalata, lauabis clystere qui centaurio & colocynthide constat:
rursus deinde hieram suppedita, & apophlegmatismis deinceps utere,
& purgantibus nares. Ad hæc sinapismo capitis & drimyphagijs, hoc
est cibus acrioribus, ciendę uomitioni natis, tempestiue & in loco utendū.
Confert illis quoq; oxymel scylliticum quotidie epotum: atq; mel in quo
scylla sit liquefacta, mensura cochlearij. Victus porrò ratio illis expedit
quæ incidendi extenuandiq; facultatem habet: Proinde & capparis assi-
due commansa, & fassamentum, conducunt. Abstineant uero a carnibus,
leguminibus, & uino immodico. Albidine item immoderata, balneisq;
& sinapi, potatione confestim à balneo, potissimum meri. Utantur uero
exercitationibus fricationibusq;: post omnium partium corporis frictio-
nem, caput quoq; confricandum est.

De malis à stomacho prouenientibus.

Quod si præcipuus in stomacho sit dolor, ægrotum restituendæ di-
gestionī intentum esse oportet, circiter tertiam horam panem accu-
rate præparatum assumere, ex uino diluto modice astringente, & albo.
Exhibebimus uero ijs medicamentum ex aloë, bis aut ter quolibet anno.
Noui quandoq; puerum (inquit Galenus) nunquam sanè comitali mor-
bo correptum, quandiu radicem glycydis, quam pœoniam nuncupant,
magnam & recētem suspensam collo ferret. Præterea & agarico, eo mor-
bo oppressis, succurrūt. Sefeliq; ac spondylj tum semen tum etiam radix.
Necnō & aristolochia rotūda cum aqua sumpta. Opitulatur aut magnifi-
ce ijs scarificatio crurū sine intermissione iugiter facta.

De comitalibus ab aliqua corporis particula prouenientibus.

Immimente iam symptōmate, quum laborat aliqua particula, siue pes uel
imanus sit, oportet laqueo brachiū aut tibiā fortiter ligare. Sed in quietis
& res

Radix pœonia
alligata collo
comitalē arret

& relaxationis tempore remedia adhibere, adurentiū quippiam medicamentorum (quæ *κυσιν* à dicuntur) affectæ parti admouentes, cuius farinae lepidium est, aut quod ex cantharidibus confarcinatur, & id genus consimilia. Iulianium porro oxymel in ea affectione constitutis præsentissimam opem adferre consuevit, particulatim cōmouens materiā. Post omnia aut quæ recensuimus, ferina quoq; & naturalia sponteq; sua emergentia laucra locū habent. In uniuersum uero uitæ suæ tempus, caueant summopere à cruditate, neq; cibum unquam ante digestionem capiant, crassi item humoris edulia, diutinam cibi intermissione, cōmotionem turbulentam, multam uinositatē, & potionē (ut diximus) confestim à balneo, præcipue merum, uina perantiqua & crassa, acria odoramenta, & quæcunq; deniq; caput lædūt & infarciūt, uitent cane peius & angue. Fixis præterea oculis ex alto nunquam prospiciant, diuturnam in balneo moram manibus pedibusq; fugiant, & capitis tandem exæstuationem.

Oxymel Iulianum.

Quæ nitenda epilepticis.

De melancholia, mania, infantia ue, & enthesiasticis, quod est, quasi numine, non secus quàm uates afflatis. Cap. XIII.

Melancholia, id est atræ bilis agitatio, alienationis quædā mentis species est sine febre, quæ occupante cerebrum intellectus sedem melancholico humore, magna semper ex parte prouenit, nonnunq; ipso met affecto cerebro, interdum uero uniuerso corpori affecto cōsentiente. Sed et tertia quædā melancholiæ species est, quā flatuosam & turgidā hypochondriacamq; nominant, in phlegmone præcordiorum circa partes ad stomachū attinentes consistens, quæ nunc quidem auras quaspiā uitiosas, nunc uero essentia humoris partem ad caput sursum mittunt. Cæterum eadem communesq; pariter omnium sunt notæ, metus, mœstitia profunda, hominū odium & auersio. Sunt qui sese animantia quidem aloga, id est bruta & rationis exortia esse autument, & æmulantur uoces eorum: alij uero uasa testacea, & omnes strepitus, ne muscas etiā præteruolitantes dicam, expauescere & horrere consueuerunt: alij mortis desiderio tenentur: quidam contrā mortis metu atque fuga torquent. In aliquibus risum perpetuū, & in alijs luctum cernere est. Sæpius usu uenit, ut nonnulli in ea affectione constituti, incitari maiore quodā numine uideantur. Vaticinantur interdum futura, haud aliter quàm diuina culi et numine afflati, quos *ισχυρισμός* Græci priuatim, quasi deo plenos appellitant. Peculiares nunc melancholiæ notas assignabimus.

Tres melancholiæ species.

Signa affectio nis huius com muniæ.

Signa melancholiæ priuata & peculiaria.

Sed priuatim ea quoq; eorum quæ per consensum totius corporis melancholici sunt, argumenta censentur: Gracilitas corporis, nigredo, densitas, & nihil aliud esse q; melancholicum, siue natura, siue ex aduentitio fuerit, puta propter quasdā solitudines, uel uigilias, uel uitiosi succi eduliorū assumptionē, uel hæmorrhoidū, uel muliebrū deniq; mensiū retentionē. Sed qui in eam affectionē præcordiorū uitio incidunt, eos sanè cruditates, acidæ ructationes, seruor, hypochondrij ponderositas, arguunt; hypochon

drium quoq; cōuellit, & nōnunq; phlegmone incendit, idq; potissimū cī ca mali exordiū. Deinde ubi in maius malū accreuerit, atræ bilis comitantē symptamata, quæ utiq; cōcoctionibus, aut separationibus, aut flatibus multīs, aut uomitionibus, aut ructibus leuant. Nullo uero horū aut paucissimis ex illis usu uenientibus, melancholica quæ apparent signa, cerebrum per se atræ bilis humore affici insinuāt. Si quando uero præassata plus æquo flaua bile, in atram facta iam fuerit permutatio, ^{uulsiu} inferre assolet, in qua ferocius q̄ in melancholia desipiūt, adeo ut si qui incautius circa eos uersentur, maletractentur, & uapulent.

Curatio melancholice.

Qui igit primigenius cerebri affectu melancholici sunt, eos lauacris cōs¹⁰ tinuis, uictuq; boni succi & humectante, opportuna animi uoluptate medetor, citra alterius præsidij ullius opem, quum nondū diurnitate humor molestans euacuationi resistit. Sæpe uehementiora, magisq; diuersa adhibere oportet. Purgandi itaq; sunt principio epithymo, aut aloë. Horū quippe si uel exiguū unaquaq; die sumatur, plurimū adiuuat, clementerq; alui subducit. Postq; purgauit igit laborans, ablinthiū præbeto, nūc herbā macerans in aqua, & elixans mensura duorū cyathorū, nunc uero cremorē dimidiati oboli pondere liquefaciens aqua. Acetum præterea q̄acertimū iamā dormituri sorbeāt, ex quo obsonia manducent. Satius uero fuerit acetum scyllam permiscere & poliū & aristolochiā in principio morbi. In uig¹¹ re summo a sanguinis detractione auspicandū. A uenæ uero incisione, quæ per inferna fit purgatio, ex sicyonia scilicet aut helleboro nigro cōcinnata, expedit. Ora præterea hemorrhoidū aperire, et muliebres expurgationes ciere, si propter harum retentionem affectio conflata fuerit. Probantur & ea quæ cum lotium tum sudores proritant. At si ē præcordiorū malitia hæc passio cōstituerit, fouenda eadem ipsa tum rutæ, tum anethi iure et ablinthij, pulegij, seminis uiticis, & baccarū lauri: nam hæc nō tam laborē solantur, quàm flatus quoq; cōminuūt. Coquant aut in oleo, & cataplasmatīs modo imponantur: sed horum cataplasmata, ea quæ ad flatus spectant, selinū aut anisum aut cymīnum habeant: neq; bonitatis honore his cedunt, cyperus, ³⁰ iris, libanotis, si cataplasmatīs inijcianē. Vbi uero detraxeris, aliud aliquid uelamen applica, lanam latiorē. Cucurbitulis porrō oportet, ad discutendos spiritus, leuibus uti. Aduersus uero dolores & inflammationes, cutem scarificato: Si cum medicina, noli sinapis obliuisci. Vtere adhæc acribus, incidendi facultate præditis, dropace, dorso tenus inter scapulas et uentrē. Sed in his quæ diu durauerūt, præsentissimū præsidīū, & quæ ueratro per uomitiones fit purgatio. Victus insuper cunctis boni succi conuenit, & mo dice humectans, uitantibus ipsis carnes bubulas, atque ceruinās, lentes & brassicas, cochleas, uināq; crassa & nigra, & quęcūq; atram bilem parit.

Curatio manie siue furoris.

MAnia quoq; laborantibus haud aliter ferē quàm melancholicis succurrimus. Priuatim uero horū capiti rosaceum & acetum rosaceum adhibeantur, & picræ antidoto, incisa prius uena, purgenē. Utendū præterea

*Vi scalpello,
ita & medica-
mentis cutis in-
ciditur.*

hirudinibus circa caput. Potissimū autē adiuuat erratici sceniculi radix: semen item ex aqua epotū: & bryoniæ radices drachma una, cū aqua quoti-
die sumpta. Quod si medicamenta purgandi uim habentia tantopere hor-
reant, ut nequeant ad sumendū induci mentis inopes, miscenda sunt ea la-
tenter ac clanculū, partim sanè ferculis ipsorum, uerbī causa bucellis, aut
caricis, aut palmulis, phœnicibus uē, partim etiā poculentis. Ante omnia
uero uel nodis etiā ac uinculis quibuscūq; in culcitra uincendi sunt maniati,
ne male aut semetip sos, aut familiares sese obseruātes, afficiāt: aut mouean-
tur hinc inde in lecticulo in penetralibus, gyrgatho (hoc est lecto in quo
mente capti ac dæmoniāci uincti iactant sese) ex alto seorsim suspenso.

De Phaunorum, incuborumq; ludibrijs & oppressionibus, quod genus morbi.
Græci ἐφιάλτης & ὕπνολω nuncupant. Cap. xv.

Ephialten, quē nostri incubonē dicūt, alij quidem ab huius no-
minis uiro nomen duxisse autumāt, aut à phantasia qua patien-
tes afficiunt, imaginatur etenim in eo malo cōstitutus, aggre-
di sese ab aliquo, quoniam ἐφιάλτης insilire alteri est, irruere atque
inuadere. Themison uero in decimo epistolarum uolumine, à suffocando
παρὰ λήθη, pari ratione, quod ægrotantes præfocet, appellauit. Carte-
rum potissime crapula & iugi stomachi cruditate uexatos afficit. Comita-
tur ista affectione possessos, corporis tardissimus motus, atque torpor,
& per somnium maxime pressura, torpidaq; sensatio, ac præfocationis in
mente obuersio, et uelut ingruētis alicuius occupatio siue deprehensio,
quā mali specię κατὰ λήθη Græci nomināt. Accedit his nō tam uociferatio
nis quā uocis etiā irritus conātus, aut quū in uerba erumpunt, inarticula-
tus & cōfusus sermo. Quidā ita inanibus afficiuntur uisus, ut eos qui in se
irruerūt, oculis haurire et auribus accipere credant, & ab eis usum turpis-
simæ libidinis exigere: mox uero si digitis apprehendere nixi fuerint, in
pedes illico sese cōjicere existiment. Non negligenda igitur sunt remedia
malo incipiente. Perseuerās nanq; multo tempore, iugiterq; per quietem
noctu incidens atq; perturbans, grauius aliquod denunciat malū: uerbī
caussa, morbum Attonitiū, (quā ἀπρονεψία Græci nominant) furorē quam
maniam dicunt, & morbū comitalem, quando uidelicet primū in caput
huius morbi uiolentia, causaq; ferri coeperit. Quæcunq; enim Epileptici
interdiū & uigilia, eadem noctu & per quietē Ephialtici patiunt. Expe-
dit igitur secta uena, purgationibus uniuersum laborantis corpus euacua-
re. In primis autē & egregie præter cætera in hoc malo constitutis subue-
nit ater helleborus drachmæ unius pondere. Si quando scammonizæ admi-
sueris obulos treis, atq; bene fragrantium odoramentorum aliquid, anisum
nempe, daucum, petroselinum. Quæ ex sicyonia existit hiera, efficacius &
magnificentius succurrit. Refertur autē hoc quicquid est medicamentū ad
Ruphum. Victus sic affectorum ratio tenuis esto, & quæ flatu cōciliant ca-
uenda sunt. Præsidio item haud mediocri fuerit ista passio possessis se-
men pæoniæ, præstat autē quindecim nigra grana in farinā trita cum aqua
iugiter potui dare.

Themison.

Κατὰ λήθη.

Epileptici.
Ephialtici.



Signu Lycan-
thropia.

Curatio.

Vilycanthropia, id est hominis in lupū, quem Græci λύκων πο-
minant, conuersione correpti sunt, per noctem domo egressi
lupos per omnia imitantur, et quoad illucescat, circa defuncto-
rum monumenta plerumque errant. Notis uero sequentibus eo
morbo oppressum deprehendes: Perpallidi sunt, cernunt imbecilliter, &
obtuse, oculos habent aridos, & linguam aridissimā, neque saliuā expuunt.
Sed miris modis siti excruciant. Tibiarū exulcerationes sæpenumero ha-
bent, id quo crebre per noctem eius partis attritioni & offensionī acceptū
referendū est. Hactenus huius uitij indicia. Neque tamen interim quēvis
fugiat, lycanthropiam melancholiæ quandam esse speciem. Cui certe pro
opportunitate & occasione notarū medendum est, incisione uenarū, san-
guinis euacuatione ad animi deliquium usque, educatione laborantis, boni
succī alimentis. Utendum præterea lauacris dulcibus: deinde sero lactis
per triduū, & purgatione hieræ & colocynthide confarcinata, idque bis aut
etiam ter. A purgationibus uero, ea quæ ex serpentibus, uiperisque consti-
tuitur (unde appellationem habet) theriaca: neque alijs interim quæ in me-
lancholiæ agitatione enumerata sunt, omittis. Superueniente uero atque
illabante iam malo, somnificis circa synciput utitor. Opio uero & alijs in
somnia uertentibus nares obliniantur.

De ijs qui amore insanunt. Cap. xvii.



Vum amores solitudinibus quibusdam consent, neutiq; me
absurdum facturū putauī, si eos cerebri affectionibus adnecte-
rem. Cæterum solitudo, curā ue, animæ quædam est affectio,
in motu uehementi & laborioso constituta ratiocinatione. Co-
mites autem huius affectionis habentur oculi cōcaui, lachrymas nullas ef-
fundunt, sed uoluptate quasi perpetua perfusi apparent: agitantur & sub-
siliunt identidem palpebræ. Et alijs corporis partibus nulla calamitate af-
fectis, & consistentibus, soli illi amoribus cōcidunt. Pulsus uero proprius
nullus est, quemadmodū autumauerunt quidam Medici, sed qualis est eo-
rum qui solitudinibus multis sunt impliciti. Cæterum quum iam recor-
dantur rei amatae, siue auribus hauriant, uel oculis usurpent, præcipue su-
bito & ex improviso tum accidit, ut pulsus anima tumultuante commute-
tur, neque æquabilitatem, neque naturę ordinem incolumem seruet. Illos igitur
mœstos & peruiigiles, quū quidam non fatis pernossent Medici, tum
quiete, tum tenui quoque uictus ratione colliquefaciebant. Ex quibus cor-
dationes, deprehensio amante, in lauacra, et comessatum, & gestationes, et
spectacula, & cantiones auscultationes uel animū atque cogitationem abdu-
cunt. Quibusdā uero terrorem incutere conuenit. Illi uero usque dicto ino-
bedientes, amorique uacantes, malum habent quo non facile destituuntur.
Oportet igitur ad subueniendum illis contentiones proponere quasdam
eius generis quod prosequutus est antea quisque, prorsusque in alias solitudi-
nes hominis uertere mentem.

Demorbo Attonitio, quam *απρονδυσίαν* Græci: & diminuta apoplexia, quam *ήμισπλην*: & resolutione, quam Paralyfin eadem gens appellat. Cap. XVIII.



Vando cōmunis omnium neruorum origo atq; principiū afficitur ac leditur, atq; inde ex eo uniuersæ corporis partes sensu simul & motu spoliantur, morbus emergit, quem nostri nunc

Attonitum, nunc Syderationem, Græci *απρονδυσίαν* nominant, qui sanè omnibus principalibus actionibus noxā inferre cōsuevit. Quod

si in altera hominis parte, puta dextra uel sinistra obstructio fiat, hemiplegiam, quod est dimidiatā apoplexiam; atq; Paralyfin, hoc est resolutio-

Hemiplegia.

nem nuncupant. Quod si etiam in alterius partis aliquam particulam, ceu

brachium aut pedem eadem ingruat uiolentia, eius tantūmodo partis affectio dicitur. Crus itaq; hominis Hippocrates aliquādo apoplecton, pro

Crus resolutū.

eo quod erat resolutū, perhibuit. Quocirca seruatur in Attonitis, siue ma-

uis apoplecticis, exigua quædam respiratio, quæ si quidem plurimum naturalē actionem ordinēq; egreditur, summam adducet affectionem.

Si uero paululum admodum impediementi est, exiguam noxam inferet.

Sanè omnium pessima spiratio censenda est, quæ & intermittitur, & magna cum uiolentia trahitur. Fit autem apoplexiæ affectio, gelida pituita,

confertim ipsissimos cerebri sinus saburrante et infartiente. Si quādo uniuersum spinæ dorsiq; principiū dicto modo afficitur, omnes corporis par-

tes quæ sub facie constitutę sunt resoluebuntur, seruatis faciei partibus illis,

eo quod cum sensum tum motum inde à cerebro acceptum referant.

Atqui ubi dimidiam corporis partem, Paraplegia fit illarum partium.

Vbi uero olfaciendi facultas impetitur oblæditurq; uel anteriorum cere-

De olfactu.

bri uentriculorū, quum intemperie quadam afficiunt, uel eorum meatuū,

qui *ήμισπλην* (hoc est cola) dicuntur, quū scilicet obturantur, noxa est. Apoplecti igitur iacent sine uoce, sine motu, ut stipites, citra sensum, & absq;

Prospexio siue
re apoplexia.

febze. Præcedit uero eam affectionem capitis confertus & acutus dolor,

& iugularium uenarum suspensio heparmā ue, & uertigo, quū uidelicet

tenebricosa lucis obscuritas oculis obuersatur: & oculorum incerti & dis-

currētes lucis splendores, quas *μαρμαρυγας* Græci uocant, & infrigidatio

temeraria extimarum partium, uniuersiq; corporis tremores, difficilis motio, densū stridores in somno, locum emittūt rubiginosum, atrum, paucū,

cum laminosa hypostasi, quod est sedimento. Corripit eadem affectio circa senium maxime pituitosioris temperaturæ homines, & eiusdem farinæ

Quos tentat
apoplexia.

uictus ratione utentes. Quod si quem in iuuentute atque æstiuo tempore

opprefferit, uehementissimam necessitatem portendit.

Apoplexiæ, & hemiplexiæ paralysie ue, curatio.

MOrbus quem Apoplexiam uocant, partim omnino nullam, partim

difficilem et cum sudore multo, admittit curationem. Mortem quippe minatur imminentem. Si quo uero modo dissolui cōtingit, cum paraly-

Apoplexia siue
nit in paraly
sim.

si plerunq; alicuius partis ipsius corporis discedit. In quibus itaq; ulla salutis spes est, ijs uena quamprimum incidenda est: & sicubi relaxationem

quandā adipiscantur, ipso statim primo die, siue sequente auferendū est. Alius quoq; acri clystere subducenda, salsugine mellē ue iniecto. Deinde ungatur oleo copioso perodorato uniuersum corpus. Caput uero ipsum chamæmelino, uel anethino oleo, in quo scilicet spondyliū aut nepeta sue rint elixa. Mulsum præterea instillato, & quæ ingentē odoris fluxū emittunt adijcito. Opopanaca aut sagapenū, galbanū item & castoriū. Oportet autōs quoq; uiolenter aperientes, cōponere, digitū aut pennā oleo madidū in hoc inferere: illinire quoq; sedem illis quæ flatus subducūt & discutunt. Potui deniq; aquā mullam, siue oxymel exhibere cōuenit. Vtemur etiā si res postulet apophlegmatismis, ē thymo scilicet origanō ue in aceto 19 elixis: ubi uero remittit malum & laborans habet meliuscule, sumito mollem & facili digestionis & succosum cibū: Mutitate uero permanente, si per uirtutem integrum fuerit, cucurbitulam cum scarificatione ceruici applicemus. Quod si liceat, præcordijs etiam imposito: deinde gestentur biga, sedē ue, aut uehiculo, aut pensili culcitra. Vsurpanda sunt & ea quæ sternutamentum proliciunt crebrius, neq; his etiam minus apophlegmatismi. Post decimū uero ac quartū diem ad reliquas gestationes perducemus. Sermocinationis præterea curam habere oportet, & peruetustum apomeli ministrabimus cum micis & alica: post hæc exhibenda est hieræ quamminimū: à uicesimo primo die in balneū ducemus: & uinum quoq; 20 tenerū atq; delicacius etiam potui exhibere possumus: calidatq; aqua perfundentes, & deinceps per balnea atq; illinitiones refocillare & uires restituere studebimus. Perducantur uero, si fieri potest, in loca maritima.

Languoris tabisq; quam *πάθος* Græci nuncupant, curatio.

Quod si cum uirium tum corporis, ne & animi quoq; dicam, (nam id *πάθος* græce est) defectio, ac tabes aliqua, absq; liquefactione labefactioneq; principaliū actionū oriatur, siue omniū siue quarundā modò partium, euacuare perturbantē & cōmouentem humorē qualis qualis fuerit, expedit. Mox deinde hierā, quæ castorij partem admixtā habeat, offerret: à dimidio quidem drachmæ incipientes, cum exiguo melle & calida aqua 30 resolutā, uel per se uel cum piperis dimidiato scrupulo adhibebimus: post hæc uictus rationē diebus quatuor præscribētes, integrā drachmā exhibebimus: ab hoc sesqui drach. postremo duas ac tres, atq; tum rursus totidem diebus intercalatis quatuor drachmæ sunt offerendæ (si modo hoc per languentē liceat) adiecto mellis cochleario uno. Mēbro uero medicamenta quæ discutiendi facultatē habeant imponenda, quæq; ruborē inducere possunt applicanda, quibus cum castoriū, aut piper, aut pyrethrū, aut hordeū, aut euphorbiū cōmiscbimus. Super hæc uero omnia utendū fuerit embrochis quæ oleo rutaceo, aut sicyonio, aut alioqui peruetusto, constant. Esculenta cōueniunt frumentacea, & quæ forberi cōmode possunt, 40 aut aliās nō difficilis decoctionis, et superuacaneis retrimētis exortia. Cui curbitulæ partibus languore affectis imponant, siquidem hoc mali in plusculas corporis particulas occuparit, diuisim: si uero paucas, confertim sy-

citæ adhæreant. Post cucurbitularū aut usum, cataplasma inftar unguen-
tum ex pice aut resina aut manna cōstante, illinito. Ex re aut & usu in pri-
mis ferè fuerit artemisia elixa cum nepeta, conyza, & nitro, aquæ exiguo
admixto, quæ quidē elixando confumet. Aluus denuo subducatur, uel cum
aloë, uel polypedio, uel scammonia, uel pulte colocynthidos. Vngenta
item eius generis cū oleo ueteri illita, in quo scilla cōdita & liquefacta dies
sit xij. sub sole. Quod si hoc ad manū non sit, scillam in unchs duabus olei
coquito, atq; circūlinito: aut hordeū consimiliter præparatū: admiscenda
uero ceræ est uncia una. Quod si galbani quoq; & castorij & euphorbij,
10 adarces item atq; nitri singulorū semiunciā assumpseris, multo efficacius
in medēdo fuerit. Profuerit porro planeq; quadrabit & batrachiū herba
oleo elixa, & in sole siccata, atq; cōdita. Conducūt insup portiones castorij
drachmæ unius pondere, & opopanax fabæ instar, epotæ. Mirum sanè
quantū in hac affectione opis adferat etiā sagapenū, orobi magnitudine in
mulso potui datū: castoriū pariter cum opopanace, succoq; cyrenaico mi-
lij quantitate sumptum. Necq; uero his omnibus minus præsidij tulerit ea
quæ è tribus piperū generibus cōstat antidotus. Quin & calorificis aco-
pis, apophlegmatismisq; utemur. Post decimū uero et quartū diē, plenius
ac solidius agemus. Plufculo uero iam auxiliij conciliato, in balneū ducebimur,
20 mus. Iam uero post tricesimū diem dropace quoq; ungento utendū cen-
seo, atq; lauandū, deinde sinapi emplastri modo illiniendum, præsertim in
quibus motus atq; sensus perierat, propterea quod nihil sentiant, nisi affa-
tim perurantur. Cæterū qui sensu minime destituunt, rubrificationes dun-
taxat assumant: post uero tumefactionem, in balneū deducito, & cerotis
mollibus medeto. A somno insup uomitione, uel radícula (si aliter nequit)
citata, utant. Gestationibus deniq; subleuationibusq; & reclinationibus
per uices, uel sellæ, uel plaustris manualis suppetijs, aut rheda. Reliquo ue-
ro tēpore in thermas naturalia lauacra deducant. Magna postremo cum
utilitate uictus ratio arida, portionis frugalitas, atq; fricatio deniq; adhibet.
30 Sicca igitur deglutienda sunt, ita tamen ut sitis magna pro uirili deuite.

De ijs qui parsi secundum laxationem aut extensionem tenentur.

Quoniam aut artus dissoluti uel cōuelluntur & contrahuntur, uel rela-
xantur ac pensiles fiunt, idq; interdum plenitate, interdum uero ua-
cuitate, rursus attendendum est, ubi in eiusmodi affectionibus sanguis
detrahendus, ubi uero minime. Deinde in membris quæ contabescunt
languescunt, relaxantibus ea quæ constringendi uim obtinent misceto, &
frictionē extētiā adhibeto. Verū in contrarijs, relaxantibus solū utendū,
cum perfrictione molli. Complectatur aut oleum quod ea calamitate affe-
ctis adhibet, paululū nitri cōtriti, et mollificati. Perfundant aut ac foueant
40 potius percalida admodū aqua, præcipue marina, in qua elixentur lauri,
germina agni, aut sampsychnū, uel aliud eiusmodi. Aestiuo uero tēpore in
mari lauant. Cæterum phoenigmi in hac solutione constitutis uel in pri-
mis conferunt. Vapulent itaq; partes afflicte ferulis aut ramulis urticæ, phoenigmi.

si his perpetratis nihil profecerimus, paralytisq; perseveret, oportet conuulsis flaccescentem carnem inter articulos comburere, transigentes causticis exilibus & tenuibus: sed concretis fractis uel partibus iniicere iugiter dropacem expedit.

De ea quæ in unoquoque membro consistit paresi.

Singule partes singulis partibus instrumentis possunt.

Spasmus cynicæ.

Inguinis conuulsio.

Linguae paresis.

Vocalium instrumentorum paresis.

Vesica.

Quæ dissectis omnino nervis accidit paresis, nullo medicamine uinci potest. Sed quam intemperantia, aut humor aliquis conciliauit, huic in genere quidem facultatibus prædictis succurritur. Neque uero peculiares quædam singulis ferè corporis partibus pareses defunt, quas serie deinceps subnectemus. In his etenim quæ cynico spasmo, hoc est canina conuulsione raptû uel (quod mali genus torturam oris esse autumant) impetuntur, sanguinis ex inferioribus linguae uasis detractio cõpetit, quæ fit per phorceam instrumentum quod uocant, planèq; in diuersum reducit partes. Cucurbitulæ item circa primam dorsii uertebam, atq; apophlegmatismi, & quæ per effusionem narium fiunt purgationes. Sciendum igitur est, non eam quæ uidetur diuicasse & intumuisse buccam paralytim habere, sed oppositâ. Ingluie uero uulsa paresi, cucurbitulæ mento sunt applicandæ. Vngendû præterea quæ castorio & sagapeno & succo Parthico cõstant, illinitionibus: summopere autem confert anaconchylismus gargarismus uel ex rebus acribus. Lingua porro paresi laborante, uenæ ipsius secandæ sunt, cucurbitulæ mento apponendæ, utendû apophlegmatismis qui cõstent sinapi: exercitationibus quoq; linguae. Iam uero uocalibus instrumentis paresi affectis, thoraci afferenda sunt præsidia. Quod si spiratio detineatur, exclamatione utendû: superciliorû insuper & palpebrarû inunctiones pariter conducunt: prodest etiam consuetio. Vesica autem eiuscemodi languore uexata, siue lotiû sistatur, siue ægre reddatur, summi atq; omento medicamenta adhibenda sunt. Sedi uero oleum rutaceum, aut sicyonium, adiecto butyro & castorio aut galbano aut opopanace, aut cremore balsami (quod σιλαιον Græci dicunt) immittendû est: quæ quidè per colem atq; ceruicem immissa, uesicæ quoq; plurimum opis conferunt, aut sola etiam sufficiunt. E centauro præterea & colocynthide clysmata, quod est ablutiones, intestini cum sicyonio non inutiles sunt. Prosumt item summopere quæ lotium proritandi facultatem obtinent epora: & castorium consimiliter: sed ante omnia succurrendum est ijs, & καθενεασιον, qui nihil omnino lotij emittunt: balneis uero ac fomentis insidendum, & emplastris relaxandi remittendiq; facultatem habentibus, quæ græce χαλασιν dicuntur, utendum est. Qui uero præter uoluntatem egerunt, adstringentibus agendum, per roborantia præsidia, alimenta arida & potus gelidos usurpandum: sed in recreationibus, & φωνημοις, id est rubrificationibus, & naturalibus balneis frigidis, utantur. Cæterû spinæ uulnus, aut casus, & lapsus uertebrae, letalibus syndromis cõsuentibus, nullo medicamine uinciur. Quod si ceruix paresi infestè, iisdem quæ ad uesicam pertinent utendum, & in iisdem partibus, atq; lumbis: præterea autè & intensius

utemur:

utemur. Improbatur lac et caseus & reliqua bellaria, lactuca cum cæteris
oleribus. Recto autem intestino paresi affecto, in quo quãdoq; ab inuitis
etiam oletulum egeritur, quandoq; uero retinetur, eisdem utendum, aliàs
quidem immittendo per clysterem, aliàs uero per constringentia: uerbi
caussa, elixationē cupressi, lentisci, rubi: aliquãdo uero per remittentia, cu
iusmodi sunt adeps suillus, aut anserinus, & oleum hibiscinum: nonnunq;
uero & per ea quæ mordent, ueluti salugo, aut colocynthidos, aut similiū
decoctum: neq; enim quicquã motiones alui tantum promouet, quantum
ipsa agitatio. Si autem frigoris copia siue recuperatio adsit, acopum ex eu
phorbio cum oleo remissio immittito. Membra postremo in hac affectio
ne constituta, cõmuni cura flectito, perfricato, & extendito, quemadmo
dum prædiximus, summa nanq; spes in frictione sita est.

Recti intestini
paresis.

De paresi quæ colicum morbum sequitur.

Colica quædã affectio nostra ætate homines uexauit, quam (& præ
cipue eos qui euasuri erant malum) motionis exacta quædã membro
rum orbitas comitatur, sed sensus tactus, incolumis atq; illæsus conserua
tur, tanquã iudicatorio aliquo transitu ex corporis profunditate in extre
mas particulas facto: proinde citra quoq; medicamentorū subsidiū ultro
plerisq; tempore facili deo, motus postliminio reuertitur: alios uero diffi
cilius curationis etiã simpliciora ex prædictis unctionibus sanauerunt.
Præcipua uero his & selecta inuēta sunt, tum id quod ē populo, tum quod
ex abiete concinnatur acopon. Plures uero medicamenta quæ robur in se
runt, Græci πωκὰ dicunt, et mediocriter frigorigica magnifice iuuerunt.

De conuulsione, quem ἀσπασμὸς græce uocant. Cap. XIX.

Postquam de paralyti omnium ferè modorum docuimus, haud
alienum puto fuerit, si nunc sermonem quoq; de spasmo. quod
est conuulsione, seremus, quoniam illi congener, & utraq; ner
uorum est affectio. Cuius rei quoq; gratia hoc capite absoluto
de tremoribus sequenter subnectemus. Quandocunq; igitur circa morbi
statim exordium, uel haud longe ab initio cõuulsiones orsi persistunt atq;
perennant, à plenitate dubio procul habent originem. Quum uero post
plurimos corporis sudores, aut uomitiones, aut excrementorū alui deie
ctiones, aut hæmorrhagias, aut immodicas uigilias, aut famē, aut permul
tas deniq; atq; uehementes cõmotiones, sequuntur, tum à uacuitate oriri
consentaneū est. Atqui ubi aliqua sospitū partiū subito conuellitur, à ple
nitudine fieri malum necessariū est. Verum si ex febribus adurentibus to
tius corporis moles areseat, et nerui pariter aruerint, ex illaq; ariditate cõ
uulsio ortū habet, certe id exitiosissimū, & tantū non immedicabile malū
est. Primū igitur membra, quæ naturæ quadã aptitudine cõtrahi nata ui
dentur, uincenda ac superanda sunt, inordinatisq; motibus occurrendū.
Confricent itaq; in hūc usum oleo rutaceo aut sicyonio, aut ueteri, aut hu
ius farinæ quopiã alio. Propinandum est sedulo mulsum. Cæterū qui ex
inanitione conuulsione uexant, oleo, aut certe hydrelæo calido exantlan

Signa spasmi
ex plenitudine
uacuitate.

Curatio.

diac perfundendi sunt. In lauacrū quoq; nisi quid prohibeat, ducemus; temperatoq; omnino ingressu utemur, cum oleo ac frictione lenissima. Nutriemus aut sic affectos, quę ex chondro & alica fiunt sorbitionibus, et uinum tenue facilisq; digestionis dilutum, ne aqueū dicam, exhibebimus, nisi infestet febris, tum enim ptisanæ cremore utamur & somno, uacabimus. Sed quę ex plenitudine aut phlegmone conuulsa oriuntur, plenitatis euacuatione eximie curantur, phlegmonem peculiaribus suis præsidijis medendo. Fiunt præterea cōuulsa nonnunq; quū lancinantur uehementius uomentes. Succurrit uero cōuulsis & acanthij radix, & acanthes albæ semen in potu sumptū. Aegyptiæ quoq; acanthæ, & centaurij præterea tenuis succū nōnulli cōuulsis potui ministrāt, quū uidelicet ex plenitudine ortum habent spasmata. Neq; tamen ad bibendum modō porrigito, sed & foris quoq; cuti castoriū unā cum sicyonio illinito. Quod si his perperatis non cessauerit interim conuulsio, cucurbitulas, cute scalpello circumcisa, imponito. Cruribus quidem cōtractis, coxendicibus & extremitatibus uertebrae: manibus uero conuulsis, dorso, & primæ ipsius uertebrae, partiq; humero superiacenti, confertim sanē, toto corpore integro et affectione carente. Si cōtrahatur labium aut supercilium siue lingua, arduum certe atq; molestum putandū est symptōma, magnos secum terrores apportans. Si exiles etiam corporis partes affectæ uidentur, in his & à ceruice & primis uertebriis fiat sanguinis detractio.

De rigore & differentijs eius. Cap. xxx.



Rigor, quem *τίτanos* Græci nuncupant, & ipse conuulsio quædā existens, fit ceu gelu concretis corporis præsertim spinæ musculis, frigido humore foris & intus adstringente, unde in ea affectione cōstituti, neq; seipso flectere possunt. Cæterū cum in pectus caput, ceruix, & reliquum corpus rigent & inflectuntur, appellauerunt Græci *ἰκτανισμὸν*, nos rigorem in pectus haud temere appellauerimus hoc malum. Quando uero caput scapulis ueluti adnectitur, uocatur à Græcis *ὀπτανισμὸν*, Romanis fortasse non absurde rigor in scapulas. Quando aut rursus ceruix cum reliquo corpore ueluti immobilis, inflexa in neutram partem priuatim, sed iuxta in utranq; rectā intenditur, *τίτanos* ab illa, rigor simpliciter ab hac gente nō incite mea sententia appellatur. Verum Pelops affectiones has musculorū neruorumq; ceruicis extensionem cōtensionemq; esse tradidit, ideo neq; in anteriore, neq; in posteriore partem, neq; quoq; aliās ceruix flecti uertiq; potest. Atqui si in posteriores musculos colli adstringat ac rigeat, *ὀπτανισμὸν* ex accidente: si uero in anteriores partes, *ἰκτανισμὸν*: sin rectā in utranq; *τίτanos* nuncupatur. Causam huius mali asserit repletionē musculorū per spiritum & aerem crassum ac nebulosum quodāmodo. Affirmat etiā eundem supra modum frigidū & concretū esse, ac ideo difficulter mobilem & inflexibilem: unde fit ut sic affectis fomenta sicca magis cōueniant quā humida. Et he quidem tetani sunt differentiæ, sed omnes eadem ratione curantur. Præsentissimū

ἰκτανισμὸν uoc.

ὀπτανισμὸν

τίτanos.

Pelops de rigore sententia.

sentissimum uero omnium est praesidiū superueniens febris, modò non sit à principio. Arguit uero has angusta respiratio, pulsus rarus & paruus, nonnunq̃ risus etiā Sardonius eos inuadit ac corripit, et rubor faciei, et oculi intumescere magis uidentur, & uel neq̃ omnino meium, uel instar aquae lotium emittunt, uel cruentū, habens quasdam ampullas: alius uero excitatur: uigilijs magis infestant, et saepenumero cōuulsionibus ita periclitantur, ut de lecto decidunt: quādoq̃ singultire incipiunt & dolore laborāt, alij quidem capite, alij uero utriq̃ humeris & lumbis, nonnulli uero ipso rum subtremiti fiunt. Facit autem affectionē hanc saepius etiam labor, hu
 10 mi dormitio, ponderis eleuatio, casus, uulnus, ictus, plaga, & alia quēcūq̃ neruis iacturam inferre possunt. Medendum autem his quemadmodum & illis qui ex inanitione conuelluntur.

Tetanorum curatio.

Cum rigore cōuulsis, à morbi statim primordio sanguis mittendus est, clancis cooperiendi: partes eorum oleo Sicyonio, aut castorio cum ueteri oleo irrorandae sunt: aut uestica quoq̃ laxior calido oleo referta, cōuulsis est imponēda. Cōcisa deinde scalpello cutē, cucurbitulis detrahendus est sanguis: leues enim laedunt. Applicentur autē cucurbitulae interdū ceruici ab utraq̃ scapularū parte, & lacertosioribus pectoris locis atq̃ praecordijs, nonnunq̃ uero regioni uesticae atq̃ renū. Nihil uero parcedū detractioni, neq̃ tamen cumulatim interim, sed sensim atq̃ pedetentim auferendum. Sudores porrò lanis oleo madefactis detergendi sunt, ne perfrigeratio occultet et exarescat. Quod si tetanos perennauerit, in oleum bis in die descendere iubeas, et haud diu in ipso morā trahere, nihil enim tam uirtutem languidā ac solutā reddit, atq̃ olei infessus. Bibendū praeterea est hydromel opimū ad dimidiā usq̃ partem decoctū. Adhuc panacis succi drachmam unam robusti hauriant, imbecilliores autē hemidrachmiū (sic enim interpretor *ἡμιβολον*) aut ad minimū unum obolum, quod est dimidiatum scrupulū: uideri aut possit cuipiā hoc officere stomacho. Exhibendū etiā
 30 ammoniacū: aut succi Cyrenaeici quantitas orobi, obducta crudo melle deglutiat: laserpitij radice cochlearia duo, mulsi cyathis tribus, aut elixationi eius indita, potui exhibeantur, uel myrrhae drach. una, aqua mulsa hyssopoq̃ decocta. Omnium uero multo inculpatissimū expeditissimūq̃, castorij exhibere cochlearia duo aut tria, modò distribuatur quis eius multitudinē, nihil officiet, neq̃ si post cibum ex ipso dederit. Reliqua uero cuncta, & ipsa quoq̃ potio aliquandiu uacationem habeat, atq̃ interposita mora sumatur, difficulter enim & egre potantibus in nares potus rebullit, unde uehementer lancinati ad conuulsionem iritantur. Illinienda uero est sedes oleo ruta
 40 ceo, cum opopanace, immittantq̃ ipsis: frigidae porrò offusio (quemadmodum Hippocrates asserit) absurdissima maximeq̃ temeraria est, & ob hoc à recentioribus (ut arbitror) reprehensa, etiā nos ipsi deuitemus. Vnguentum probatur quod accipit nardi pondo xestam unam, ceræ uncias duas, folij anomi, styracis, mastiches, uniuscuiusq̃ unciam unam, castorij, adar-

ces, euphorbii, piperis, singulorū unciam, spicæ nardi, cremoris balsami, singulorum unciam unam.

Opisthotonicis potio.

Potio quæ opisthotonicis confert, ex his constat, Panacis radice, pipere albo, costo, myrrha, succo papaueris, pari pondere, quam quidē potio nem culcitra petentibus exhibebis. Conducit autem eadem & orthopnoicis, hoc est nō nisi recta ceruice spirantibus. Esto præterea in hac affectio ne constitutis uictus ratio extenuans, quam *λεπτωτική* græce dicunt, scite disposita & minime gentiū immoderata.

De tremoribus. Cap. XXI.



Mnis tremor generatim ex infirmitate nervorum causam habet, cuius locupletissimus testis senectus est. Priuatim uero plures & diuersæ causæ tremorem efficiunt, uidelicet frigidius naturæ temperamentū, frigida aquæ nimius & importunus potus, præsertim in febribus, præterea gelidi & glutinosi humoris abundantia, atq; immodicus etiam uini usus. Qui igitur ex delicto aliquo aperte tremunt, à nociuis deinceps abstineant. Perseuerantibus uero etiam dum factis ex febrili affectione tremoribus, principio quidem uniuersum corpus oleo Sabino, sed in relaxationibus accessionum febrilium per uetusto aut Si cyonio irrigato, extimas uero corporis partes illitas mollibus lanis cooperito. Deinde cucurbitulae à prima spinæ uertebra usque ad scapulas & lumbos apponendæ, membris ante atq; præcordijs cataplasmate ex hordeacea polenta illitis. Protegito autē eadem hæc membra lanis oleo ueteri aut Si cyonio infectis: quod si febris perennauerit, descendendū alternis diebus uel in oleum, uel hydrelæum (quod est, aquam magna olei parte temperatam.) Frictionibus adhæc mollibus utendū. Si uero quid cunctetur frigoris, quod subesse uidetur, affectio, propinandum mulsum est & castorium. Calidis pariter locis gestationem fieri conuenit. Opportunum atq; bene dispositum cibum exhibebimus: primo quidem loco sorbilem, secundo uero alitum, atq; pisciū mollem carnem habentium. Desinentibus autem febribus, lauandi sunt, abstinentes à gelido lauacro, & uini potione. Quod si multitudo fuerit crassorum & glutinosorum humorum, incidentibus & extenuantibus utendum: cuius generis est illud: Accipe ramusculū rutæ, spondylii quantum tribus digitis capi potest, castorii, nitri, uniuersuiusq; obolos duos, dato quotidie cochlearium unū cum oxymelite, per uniuersum triduum ieiuno: Aut panacis & piperis grana quinque propinato in mulsi cyatho uno. Sed & simplicia ante potata trementibus succurrūt: uerbi causa, castorium, leporis in cibo cerebrum, althææ radice elixatio, damasonii foliorum drachmæ quatuor in mulso, eupatoriū cum aqua. Frigore autem modum excedente, & Zodimi unguento, ac ijs quæ cōtra parestim scripta sunt acopis & ungentis & phoenigmis, hoc est rubrificationibus, utantur, & exercitationibus perfricationibusq;. Cæterum ob remulentiā trementibus abstinentium à uino, donec exacte à malo liberentur.

Medicamentū
crassos & visci
dos humores
extenuans.

Ophthalmia, hoc est lippitudines, & primo de dolore, ex decretis Galeni decrepta. Cap. XXII.



Vando acerbiores dolores oculos infestant, considerato quonā ex affectu oculorū dolor in inflammationibus proueniat: Aut eū propter rosionē uehementē ex dira in oculos promanantiū humorum asperitate, uel ob tensionē fartarū tunicarū, aut propter renitentia quorundā crassorū humorū, aut spiritūū flatuosorū, uehementes oculorū dolores proficiscunt. Rosionibus quidē purgātibus euacuātes opitulabimur, & oui alborem infundentes, consumpta & maturata phlegmo-

Rosionibus qui succurrendum.

ne, & corpore iam excrementis uacante: quibus per Iouem nullū inuenias neq; cōmodius neq; præsentiū amuletum q̄ sint lauacra. Sed ijs quæ primam scauriginē suā ad plenitatē referūt inflammationibus, quas φλεγμονὰς Græci nominant, euacuatione sanguinis, subductione uentris, & infernarum partium frictionibus, mederi cōpetit: sed euacuato prius statim in primordio toto corpore, et humoribus ab ea parte quō uergebant, ad ima de tractis: Deinceps uero topicis, quæ localia uocant, discutendi uim habentibus, οφθαλμικὰ græce appellant, medendum est. Fouendi igitur sunt illi, & scœnogræci infundenda est decoctio. Cæterū in quibus crassi sanguinis est intensio in oculorum uenis, sine reliqui corporis succorum redundantia, ui-

Si ex plenitudine lippitudo.

Si crassus sanguis intenditur

no in potu calorisifico, euacuandi ac obturandi uim habente.

De lucis oculorum perturbatione, & priuatim de Ophthalmia.

Uicis perturbatio (quam τάρσις Græci uocant) humiditas oculi est, si mulq; cum rubore præter naturam calor, non ex internis ipsius corporis caussis factus, sed foris aliqua occasione adueniente: uerbi causa, sole, fumo, puluere, oleo: proinde cognita ac separata causa, facillime discutitur luminis illa perturbatio. In genere perturbationis huius etiā ophthalmia censetur, perturbatio quædam non modo forissecus ingruens, uerū citra euidentem quoq; causam proueniens, & ad tertium, quartū aut quintū diem plerunq; permanens. Medetur ei citra negotiū, præcautione omnium quæ foris luci iniuriam inferre possunt, mensa (ut ita dicam) Pythagorica, & cœna canina, aut alui deiectione.

Τάρσις.

De phlegmone oculorum.

Qum oculi phlegmone, hoc est inflammatione, post totius corporis purgationem corripiunt, illinitionibus utendum eiusmodi, quæ eam oculorum affectionem (quam Græci οφθαλμὸν, nos oculorum inflammationem haud temere appellamus) possint discutere, & irritationem mitigare: uerbi causa, Nilei diarodon, aut etiam mediacū & nardinū. Partibus uero propinquis inflammatione correptis, utemur unguentis μασσαίς, oui albore suffusis: posttridie uero eadem, nisi phlegmone intendat, partes oleo nardino illiniendæ sunt. Fomentis aut elixationis meliloti, & scœnogræci, utendum. Quod si ex crasso humore ophthalmia proueniat, medicamentis quæ neque obstruendi meatus cutis, & corporis, neque humoris incrassandi, sed quæ diffundendi, humectandi, & excernendi facultatem habent, utemur:

cuius generis est chiaton. Quod si circa caput obstruant partes humide, cui curbitulam ceruici impone, uel scarifica, uel hirudines fronti iuxta affectū oculū admoue, aut cataplasmate ex pane syncero aqua macerato cura, cum exiguo rosaceo, aut polentis coctis, aut papaueris decocto. Vehementiore præterea non absimili modo utendum est cataplasmate, è croco constante & meliloto & palmularū carnibus, & tenerioribus coriandri folijs, ouisq; & tritico assatis, & micis in decoctum inspersis, & exiguo rosaceo, capitibusq; papauerū decocto solutis. Semen quoq; papauerū quandoq; misceatur, mitigandi doloris gratia. Quod si dolor uehemens fuerit, miscendū succi papaueris, quod opiū dicunt, q̄minimū: sin aut leuis dolor infestat, deuitanda sunt narcotica: at si mediocris phlegmone fuerit, aloē in eam ipsam immittens, aut aqua aut oui albore illinito. Sed ut promptius ac presentius fiat auxilium, adhuc croci drachmas sex, aloēs drachmas sedecim, comeos drachmas nouē, aqua pluuiali excipe, atq; penicillos cōcinna: sed et *διὰ πινος*, hoc est, quæ è croco cōficiuntur remedia, ab ophthalmiæ principio peraccommoda habentur. Quos uero tumida quoq; & peracandida circa palpebras et adiacentes partes inflatio seu tumor, absq; tunicarum incōmodo infestat, his q̄ plurimum opis afferent liquida collyria, *ὕψος δὲ οὐκ* græce appellata. E croco itē ac atramento futorio, melleq; cōtexta. Illud uero omnī saluberrimum utilissimumq; fuerit:

Liquidum collyrium indolorium.

Metallici atramenti, (quam Latini pariter & Græci melanteriam nuncupant) mellis Attici, cremoris scæno-græci, pares portiones elixa, donec mellis habeant crassitudinem, deinde nucleo meles instrumenti chirurgici utrunq; hircum tangito.

Ad Epiphoram, id est, tumorem oculorum ex destillatione cum phlegmone.

Ad inflammationes autē (quas epiphoras Græci dicunt) destillationū, in principio quidem haud mediocriter congruit inedia, aquæ potatio, & omnī multo maxime coitus abstinentia. Adhæc aluū quoq; subducito, & aceto mulso diluto faciem inundato, præcipue si feruens fuerit destillatio: sin minus, atramento futorio cum melle frontē atq; palpebras oblinito. Nōnulli uero atramentū futoriū aqua macerantes, ad proluendū exhibent. Sed in illis qui citra inflammationē destillationē afficiunt, aut etiā cum inflammatione quidem, sed super scyphiū cataſceue existente, anacollematis quæ cōglutinandi uim habent, circa frontem utendū: uerbi gratia, Simplicibus quidē, uirentibus uitis folijs, aut rubi cremore, aut portulacæ, aut cotoneorum cum tenui farina, aut galla trita cū uino, et tenuissimo faringē, aut cicutę, aut pulicaris herbe cum aqua, aut solano, aut cochleis cum testis tritis ac maceratis, instar cataplasmatibus à tempore ad tempus impositis: & ut summatim perstringam, adstringentibus atq; frigoricis. Compositis uero quorū in hac affectione usus est, sic utitor: Pollen triticeū, aut myrrham, aut thus, cum oui albore illinito: aut Samiam terrā, cum myrrha & manna, similiter cum albo oui. Porro in frigidioribus destillationibus, sulphuris uiui, bitu-

Vehementi dolori anodina adhibenda.

Simplicia.

Composita.

minis, picis, colophonix, uniuscuiusque drachmas duas, pariter etiam trochiscus & aster & consimilia, pulchre discutunt. Theriaca præterea uino adstringente rigata, fronti illita, frigidos fluxus compescit ac sistit. Hæc ipsa in potu quidem sumpta, magnifice hac passione possessis succurrit. Ipsi uero oculo, cum lanam tum panniculū linteolum uel tenue, albore oui infecta, imposito. Caseus adhuc recens pari modo oculo insertus, asperas maxime & acutas fluxiones cohibet. Collyria item cognomento *πικλά*, cum illita tum instillata aqueo, idem præstant. Si uero propter profunditatem & hypophthalmum humidum existens, longo tempore perennauerit, post uniuersales euacuationes tum medicamentis quæ per nares repurgant, tum apophlegmatismis utendum. Detonsioni item & rubrificationibus, quos *φαιγγμα* uocant, capitis. Cæterum in his operationes etiam manuum (Græci *χαρρυγας*) in capite accersunt: uerbi causa, angiologiam, & arteriarum sectionem (quam *ἀρτηριοτομή* Græci nominant) tum hypophthalmismum, tum periphthalmismum, atque combustionem circa uerticem usque ad os. Cucurbitulæ autem circa ceruicis partes cum scarificatione imponantur, hæc inquam reuellere & diuertere fluxum possunt. Signa porro floris extra scyphium, intensiones uasorum circa frontem atque tempora, & ucluti uinculum nodus uel capitis, & quæ siccandi uim habent ad glutinatiua, *ἀναισθηµατα* Græcis appellata, auxilia.

20 Quod si horum nihil adsit, influentia perennante, & sternutamentis interim perturbantibus, hypophthalmum putandum est esse humidius.

De ocellorum Chemosi.

Quum sub uehementiore oculi inflammatione utraq; palpebræ ita detorquentur atque peruertuntur, ut egerrime subiacentes oculos uelent, atque uix etiam conuiuere liceat, albumque ipsius sublimius nigro fit, ac rubescit, sparsimque nigredinem excipit, Chemosis à Græcorum medicis appellatur. Subuenit huic malo sanguinis per uenam detractio. Catharticum quoque, quod est, expurgandi potentia præditum, & diarhodum collyrium, candidum et cineritium, quod spodiaceum dicunt, cum lacte aut oui albore: quo quidem illiniendæ sunt palpebræ, tempora, atque frons. Fomentis præterea & cataplasmatibus quæ leniendi facultatem obtinent, utendum. Vbi uero phlegmone accedat, acrioribus subungendum censeo: è quorum numero habetur diarhodum recens ac uiride.

De hypophthalmis, id est, uenarum ruptionibus, ex ictu plagæ uel, & oculorum tumoribus, quæ Græci *ιμφοθµατα* appellant.

Hypophthagma, ruptio quedam eius uenæ, quæ ante fuit coalita, est, in manu aut pede, ex ictu seu uerbere plerumque ortum habens. Sanguine igitur palumbi aut columbæ, aut calido lacte muliebri perfundito, paulo post thure absterges. Vel murrinam instillato, maxime uero salis Cappadocij. Vt autem item fons seu balneo ex hyssopi decocto. Conducit uero tumoribus qui oculis ex plaga proueniunt, fons quam *πρωλειν* Græci dicunt, è posca continuus. Et sponsia itidem posca infecta. Spheclarion præterea, combustum, et stercus columbinum, pari pondere, uino aut aceto liquefacta inungito, catapla-

Collyria fluida.

Indicia

Indicia

smatis uero instar caseū recentē, aut radiculae corticē, aut uuā passam absq̃ acinis, singula in posca aut mulso applica. Ceterū hāc quoq̃ cōtra oculorū ciliorūq̃ excreſcentias, quae grāce *ιμφορθημια* dicuntur, pulchre faciunt.

Ad Emphysemata pruriginosa, & oculorum scabredinem.

Emphysema.

Pforophthalmia.

EMphysema quidem, excreſcentia quādam ciliorum est, tumori similis. Pforophthalmia uero, pruriginosa palpebrarum pſorialis est, quam scabiem uel scabrū appellamus, ex falso nitrosoq̃ humore ducens originem. Aduersus quae sanē ocellorum uitia cōmode satis expedit cum posca, tum lentium dilutum, tum rosarum fomentatio, tum illud deniq̃ hygrocollyniū, quod est liquidū penicillū, aeris drachmas sex, misyos assati, myrrhē, unius cuiusq̃ drachmas tres, croci drachmā unam & semissem, piperis drachmā unam, uini Chij, & passi Cretici, singulorū sesquicyathum, coquito ad mellis usq̃ spissitudinem. Ipsa uero hāc est, quam omnium utilissimā esse credit Erasistratus, & ad anginam quoq̃, & oris hulculcula, & uerendorū, & aurium dolores. Illiniantur autem & oleo supercilia, iamiam dormitiū euntibus. Vitentur uero acria, ceu acetosa, salſa, & acuta seu aspera.

De Sclerophthalmia, hoc est, duritie, qua palpebrae a somno aegre aperiantur, cum suis hırquorū lemis: & Xerophthalmia, id est, oculorū arida lipitudine & scabie.

Morbus quidem oculi, quem *σκληροφθalmia* grāce nuncupant, durities quādam & difficilis admodum oculi, palpebrarūq̃ pigrior est comotio, cum dolore ac rubedine, absq̃ humore. Quocirca spongij aqua calida tinctis eos identidem fouere, & palpebris euntibus cubiti, ouum cum rosaceo, aut adipe anserino imponere expedit, fugientes frigida, quaeq̃ duritiem conciliant. Caput autem operculo muniatur, & pinguedine obducatur. Aluus quoque omnino subduci debet. *Ξεροφθalmia* uero, pruritui similis oculorum est affectio, sine rheumate. Medendū huic lauacris & inunctionibus, et boni succi nutritatu. Non mediocri uero utriusq̃ iuxta fuerint praesidio medicamenta tam acria, ut lachrymas eliciant ac prouocent, propter quae durities de suo rigore remitteſ, & ariditas humescet. Huiusmodi quippe est & Erasistrati, ab exuberanti usu *πυρρως*, & quod appellatur dicen teton, & id quoq̃ cui cognomenū est *πραλυντιον*, quali dicas militare.

De Ectropijs, hoc est, palpebrarum ad inferna conuersione.

ECtrophe, ciliorū quādam est affectio, uel ad cicatricem, uel ad carnis excreſcentiam referens originem. In ijs ergo, quae excreſcentiā carniū diutius remorantur, rasilem eruginem torrefactam terito & admoeto, aut plumbo cremato cum sulphure ignem non experto, & loto, aut amobus æquis partibus, tum rubigine, tum plumbo, utitor: nam quod a cicatrice sit ectropion, si quidem curationem admittit aliquam, chirurgica eget manu.

361

De Aegilope & Anchilope, oculorum abſceſſibus.

Αιγίλωρ.

Αγχίλωρ.

AEgilops, abſceſſus est, qui inter maiorem oculi angulū et nares fit, qui ruptus si negligatur, usq̃ ad os fistulam aperit. Idem priuſq̃ disruptū exulceretur apostema, Anchilops appellatur. Aduersus quod mali genus haud mediocriter conducit glauciū, & crocus, unā cum succo perdicidis appli

applicata: iugiter uero permutari debent, & neq; pati dum mutantur ipsa. Aliud: Halica (sic enim *ἡλικά* reddimus) in aceto elixa, et scite friata atq; cōtrita, nō modo incipiētibus, sed et in suppurationē atq; pus cōuersis, succurrit, & ruptis usq; ad os descēdit. Hoc si quis utatur, non Aegilopas solum, uerū Anchilopas etiā medebit. Aliud: Ruta satiuā cum suo succo trita, decocta & imposita, abscessus qui in maiore oculi hīrquo ad nares sunt, scite admodū ac graphice instaurat, & usq; ad os descēdit. Intra initia mordax quidem est, sed ocysissime mitescit. Atq; suspiciendū interim, quod nūllam post se turpem atq; inhonestā cicatricem relinquat. Aliud: Cochlēas cum testis tritas imponito. Nonnunquam uero & aloē quoque, aut myrrha huic confusa & immixta, in pus iam ante conuersum suppuratūq; cum eruptione exiccat.

De Trachomate, id est, scabritate.

TRachoma quidem internarū palpebrarū partiū scabrics quædam est. Illarum porrò extensio rigida, quæ eò peruat ut fissuras obtineat, Sycolis uocatur: quod si inueterauerit & occalluerit, Tylosis appellabit. Collyrijs igitur utendum, tum illo quod ē uino, tum eo quod ē duobus lapidibus cōstituitur. Necnon & ipso hematite lapillo aqua eloto, secundū subiectionem adurenda est palpebra. Atq; armation cum exiguo cygnario, aut diacroco, non tam ad hæc, quā ad psorophthalmiam sine exulceratione congruit ac conducit, turgenti cilio illitum. At si callus durior extiterit, fricabimus cum pumice, uel cum testa sepię, uel folijs ficulneis, aut instrumento deniq; quod uulgo uocant Blepharoxyston.

De Chalazijs, oculorum tuberculis.

Chalazium, palpebrarum album est ex humore concreto tuberculum: cui medendo ammoniacum aceto liquatum cum galbano illinito. Opitulatur uero huic quoq; uitio, unā cum cerota excepta terebinthina.

De Crithē, seu hordeolo.

Hordeolū, quod *κρίθων* Græci nominant, tuberculum est, quod in palpebra hordei longiusculi similitudine, super pilorū tarso nascit. Oportet itaq; in eius curatione cera candida fouere, aut muscæ capite amputato, reliquo corpore perfricare, aut cum hordeorum elixatione perfundere.

De pediculatione palpebrarum.

Expurgantes ante omnia pedunculos, aqua marina tepida abluere palpebras expedit: mox medicamentum quod iam subscribam, tarso applicare. Accipe aluminis scissilis medimnos duos, staphidis syluestris medimnum unum, quibus tritis ac dissolutis utere.

De Madarosi, siue Milphosi, quod est palpebrarum defluuijs.

Madarosis oculorū morbus est, quo palpebrarū pili defluunt. Post uniuersis igitur corporis diligentem curationem, sine gmatiss quæ cognomento *καλλυψία* (hoc est, quæ uenustatis palpebrarū gratiā lenociniumq; inducunt) nuncupantur, ad profligandum illud oculorum uitium utamur. Accipe terræ Ampelidis (quam pleriq; Pharmacitim nominant) croci,

nardi Celticae, ladani, æquales partes tritas ului adhibe. Aliud: Stimmeos affati colluti drachmā unā, plumbi ceratia octoginta & drachmas quatuor, croci drachmas quatuor, nardi Indici drachmas treis, unā cōtere, atq; utere. Aliud: Palmularū ossium crematorum drachmas treis, nardi Gallice drachmas duas, ubi triueris in farinā & preparaueris, utere. Cæterum hoc medicamentum scabiosis quoq; cum prurigine oculi succurrit.

Medela Neapolytæ, ad palpebrarū defluuia, & diuturnos elisorū affectus.

Stimmeos, cadmias, chalcitidis, misyos, æquas partes in crassa frusta incidide, mellisq; cōfundens, coquito, ubiq; liquefeceris, aduersus Melphosim adhibe.

De Pilloso.

Pilloso palpebrarū quædam est in callum indurata crassities, rubens, quam magna ex parte capillorum defluuium comitatur. In eius igitur curatione, muscerdam deustam & melle leuigatam illinito.

Ad superciliorum Madarosim, & glabreta.

Oleo, seu seuo anserino infectis digitis plumbum contere, atq; eo obline. Aliud: Hoc præterq; quod glabricitati superciliorū medetur, non nihil nigroris quoq; inducit: Nuces ponticas crematas cōtere cum adipe caprino aut agnino. Aliud: Id quidem ad barbæ alopecia plusculum tulerit præsidij: Herbæ Apollinaris drachmas duas, muscerdarum drachmam unam, capilli Veneris tantundem, unguenti irini cochlearia quatuor, ubi triueris perq; accurate, unguentum admisceto, & antea fouens illinito. Quod si quis ante totonderit, multo efficacius erit.

Ad Trichiasim, quod est densitatem palpebrarum.

Vbi iam antea uitiatos palpebrarum pilos euulseris, locum confestim sanguine ranæ sine additamento inungito, uel cinere chameleontis nui adiecto, aut sanguen pupillarū, aut fumi in hordeolis prognati succum cum cōmeos, aut tellinā falfarū, earundemq; crematarū cinis ex cedrino liquore inperfus, aut loti crematæ cineris, aut alumen, aut crotonos à cane sanguis admodum confert.

Trichocollia.

Reconglutinatio ad euulsos pilos: Asphaltus, mastiche, coma cochlij

limacis, conglutinandi uim habent.

De Encauthidibus & Rhyadibus.

Ey-lauvis.

Pvris.

Encauthis oculorum labes est, quā canthi maioris caruncula plus æque naturalem in magnitudine habitum excessit, & ad nares protuberat. Rhyas uero econtra eiusdē anguli carnis est consumptio. Encauthides igitur tum ipsdē medicaminibus, quæ de Ectropio memorauimus, tum similibus etiā rebus adurentibus, tum ijs quæ uim habent erodendi, cōminues: sed ne quid nimis: periculum enim est, ne si totas omnino expungas Rhyadas, diuersum planē malū inducatur: sed ad naturalem illum ac iustum magnitudinis habitum. Sed Rhyades, prorsus quidem magno angulo siue rudis chirurgici culpa, siue pharmacorū carnem corrodentū perditio, nullo medicamēto uinci possunt: minuta uero duntaxat parte ipsarū, ijs quæ mo dice adstringunt, & carnem inducunt, restituas: cuiusmodi sunt, quæ è cro

eo & glaucio & aloë cōponuntur, & diacroca appellata collyria, Apollinarisq; herba in uino decocta & imposita, & pusillum aluminis cum uino.

De h ulceribus oculorum, & differentijs eorundem.

H ulcerum quæ oculos infestare consueuerūt, genus quidem unum est, sed in plurimas particulatim differentias dirimūtur. Nam quod in cornea quidem tunica cauū, seu curuū hulus fit & angustū atq; purum, Boethrium nuncupatur. Quod uero latius quā hoc & minus profundū, Cœloma appellatur. Argemon autem exulceratio quædam est, quum in circulo iridis undiquaq; id quod foris est subrufum, quod uero intus, albū apparet. Epicauma uero hulus est sordidum, impurū & crustulosum, ex cuius purgatione sæpius humida quæ sunt in oculo, effluūt. Et alia innumera ferme exulcerationū oculi sunt discrimina, de quibus in communi uerba faciemus. Proinde quum exulceratio cum phlegmone forte fortuna confiterit, curatio illis quæ phlegmones leniendę & maturandę potestatem habent, emolienda est, unā cum peculiari h ulceris medela: cuiusmodi collyria quidem sunt & libanum, & cygnus, & quæ pelaria appellantur, & aster, & consimilia: præterea quæcunq; ex malo & terra altere, cerussa q; constant. Certo aut scimus omnium præstantissimum anodynū esse τὸ ἰδαίωμα, cæterum in eius usu perseverandum non est, quoniam uehementissime si quicquam aliud stuporem inducit. Vtilissimū porro τὸ δ' αἰζυμάτωρ, nihil plane habens narcotici. Quod si cū reumate fuerit exulceratio, illorū quodpiam collyriorum adhibebimus: quale est, quod ex hydra componitur, & chianum, anserinum ue, & fuluus cygnus, & breuiter quæcunq; expultriciis, sine rosione ac morfu, facultatis sunt. Aduersus præterea sordida ac putrida ocellorum huluscula, mulso modice diluto, atq; scenogræci decocto utamur, atq; illis quidem tum seorsim per se, tum adiectis etiā quæ ad eam rem facta sunt collyrijs. Acutiora quidem si fuerint h ulcera alba, Seberiano, & quod ex scenogræci succo contextitur. Vbi uero acres exulcerationes minime fuerint, collyrijs quæ myrrham habent, maxime utendū. Cæterum h ulceribus ad unguem expurgatis, Cleon docuit & cicatricem inducere, & eidem similem colorem induere.

De Proptosi, uasito tumore, qui oculum sua sede propellere uidetur.

Proptosis hulus rhagoidis tunice est ex sanguinis profluuiio, quā δ' αἰέω Proptosis, sic dicunt, aut scissura corneæ, caussam ducens & originem, quæ parua quidem adhuc, modis omnibus muscæ caput referens, Myocephalon nuncupatur: aucta uero amplius instar uuæ, Staphyloma dicitur: Vbi uero eò peruenerit ut palpebras feriat, μῆλον: quū deniq; duritie calluerit, Clauus, græce ἄλλε appellatur. Quocirca si mediocriter tantū oculus, ueluti ad muscæ capitis instar (unde nomen sortitur μυοκεφάλου) à suo iusto modo procidit, medicamentis quę expellendī, profligandī & confringendi potentiā obtinent, utendum: uerbi causa, Phæo, Nardino, & Theodotio. Et quod ē Thallia, summo oleæ coliculo, & cōfectione σφακίωτος. Spongia quoque irrigandum est: posca, aut uino adstringente, aut rosarū decocto spon-

giam macerantes, aut spleniū. Cæterū præcipuū bonitatis honorē aduersus proptofes & omnia hulcera habet Olympiacū aut olympus appellatū, cum cremore oleæ aut polygoni, aut polij. Eadem quoq; ipsa & hulceri Clauo cōgruentia sunt, & Staphilomatis, si priusquam albis maculis obducantur uel calluerint, usui adhibeantur. Nam quæ maculas candidas, unde *λευκία* dicuntur, cōtraxerunt, & calli instar obdurerūt, omni medicationi renitentia tanquam insanabilia omnino relinquuntur.

De sugillatis, quæ Græce dicuntur *σπύγγες*.

Hypopyon in cornea oculi membrana quādoq; nascitur, nunc quidem in imo, nunc uero in summo, ungui humano forma non dissimilis super puratio: quæ causa est ut à Græcis *ὄνυξ*, à nostris Unguis oculi etiā hoc malum appelletur. Scopi itaq; curationis huius mali gemini sunt. Primus est, ut suppuratio quæ in tunica coit, per ea quæ nō uiolenter, sed moderate discutiendi potestatem habent, dissipetur: cuius equidē farinae sunt, mulsum, & scæno-græci cremor, & quæ ex eodem cōtexuntur collyria, atq; libaniū, & quicquid ē libano, hoc est thure, concinnatur. Alter est, ut confringatur & expurgetur cum uehementioribus ualentioribusq;: ē quorum numero sunt collyria, quæ myrrham habent, & ob id *μυρρινία* à Græcis appellant, & hygidū. Atqui hypopyis absq; exulceratione medendis, etiam illo utendum est hygrocollyrio, composito ex acanthi, croci, singulorum drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis libra una. Cæterum pustula actumora quam *φλύκταινα* Græcorum medici nominant, abscessus quidam corneae humoris, ad hypopyam curationem refert.

Humida ad hypopya.

SVmito croci, aloës, myrrhæ, uniuscuiusq; uncia unam, uini uncias treis, Smellis optimi uncias sex, teratur & mollescat crocus cū uino exiguo, deinde aloë cum myrrha, & simulatq; crassitudinē præfert, inijcito ipsum mel: quæ quidem iam unita atq; cōmixta, in uase uitreo reponito: bis autē quoties libet die utitor. Verum si moras quis oderit, malitq; maturare atque urgere interim, ter eo medicamento occurrere nitatur. Et quamprimū oculum unā cum carne purgarit, integram ualeitudinem recuperabit.

De cicatricibus & leucomatis.

VLæ, quod est cicatrices ac maculæ, quæ in summa superficie oculis innascunt, à quibusdā modō cicatrices, à nonnullis uero nephelia, quod est caligines, appellantur: quæ quidem altius radices egerunt, leucomata dicuntur. Quorum sanē abstergendi purgandiq; facultate prædita, hæc *σπυγγα* quidem, illa uero *νεφέλη* à Græcis dicta, præsidia sunt. Leuiiores igitur maculas *νεφέλαι* dictæ, anemones succus exterit, atq; minoris centaurij cremor, cum melle. Eas autem quæ longiore temporis spacio perseuerauerunt cicatrices, cedri liquor extenuat ac exterit. Aes item, absque additamento ullo, aqua dissolutum & contritum instar collyrij: & *σφακτικά* collyria, cuius generis ceruini cornu, & rhinarion, hecatombeq;, & similia. Sed leucomata, nitrum cum oleo peruetusto, accurate maceratum et molle factum

factum & scite illitum, tergit & expungit. Idem sepiæ testa cremata, cum melle liquefacta, pulcherrime præstat. Inter collyria aut, hoc quidem haud infcite & clementer extergit: Mamira guttæ ammoniacæ thymiamatis, myrrhæ troglitidos, crocodilorum oletuli, æquis partibus, redige in collyrium, atq; utere: aut compositis ex aqua dissoluto crocodili stercore collyrijs, maculas oblinito. Haud improbe autem feceris, si Cappadocicis salibus aqua dissolutis, collyria natura ad candidas oculi maculas (unde & λευκομαλινὰ græce dicuntur) comparata, guttatim instillaueris.

Vlarum tinctura.

10 **C** Allæ, acaciæ, singulorū pondo libras quatuor, atramenti futorij pondus libras duas. Collyriū præterea illud: Mali Punici flores, cyrinorū, (qui capiti & ambitu pomum intra se quasi foetus claudunt) atramenti futorij, acaciæ, commeos, uniuscuiusq; pondo drachmas quatuor, stammeos, gallæ, singulorum pondo drachmas duas, aqua soluit. Quum autem mali Punici flos ad manum non fuerit, tum acinos huius mali, intra cytinus, quæ instar membranæ sunt, complexos, admisceto.

De Pterygijs.

V Nguis, quod Pterygion uocant, nervosa est circa tuniculam corneam exuperantia, oriens quidem sub angulo, sed ad exteriora per oculum 20 progrediens, quæ ita quandoq; augefcit, ut pupillam operiat. Si magna & inueterata sit, nō nisi chirurgica manu exciditur. Recentior uero & medio cris magnitudinis, præsidijs abstergentibus expugnat: cuius generis sunt quæ Græcorum medici τραχωμαλινὰ ἢ λευκομαλινὰ dicunt, quod nimirum illa trachoma palpebrarum asperitatem, hæc albas oculorum maculas, leucomata appellata, proprie consumunt. Ex incompositis quidem, æs crematū, aut atramentū futorium, cum bile porcina optime conducit. Sed longe efficacius hoc, quum atramenti futorij partem unam, commeos partem semissem emollientes, uel inungimus, uel peniculos conformamus. Nonnulli uero bilem caprinam melli confundunt, atq; inde obliniunt.

30 **A** d Pterygia, Hypopyos, & Amblyopias, Oribasij.

A ccipito lapidis Magnetis, eruginis rasilis, sinapidis, guttæ ammoniacæ thymiamatos, singulorū drach. iij. croci drach. ij. mellis Attici cochleariū & semissem. Plurimū hoc etiam confert in medendis leucomatis.

De Anthracosi, & carcinomatis.

C Arcinoma tuberculum est, quem Cancrum Latini dicunt, in cornea oculi membranula, magni doloris, tunicarū ruborem & dilatationem præferens, qui pungit dolorem, & usq; ad tempora pertinet, potissimumq; si concutiantur: appetitu præterea carent, & ad acriora medicamenta exacerbantur: atq; hoc quoq; immedicabile malum est. Consulendū tamen et 40 illis est, & si fieri potest, succurrendū, potu lactis, frumentaceorū quæ Græci nominant, & aliās probi succi epularū porrectione, exceptis omnibus acribus. Benefacit collyriorum quoq; delicatorū infusio: uerbi causa, Spodiaceū, à cinerula nominatū, Seberianum, atq; id genus quęcunq; alia.

Anthracoſis.

Prænoſſe autem oportet bonū totius corporis temperamentū. Atqui an-
 thracoſis quoq; hulus eſt maleficiū, grande & difficile, quod *ανθραξ* Græ-
 ci dicunt, cruſtuloſumq;, quod nunc quidē bolbo, nūc uero palpebra, quem-
 admodum & in alijs quibuſcunq; humani corporis partibus, fieri poteſt.
 In eius uero anthracoſeos, quæ in bolbo oboritur, curatione, principatum
 tenet, ea quæ ſtatim quidē ab initio fieri debet cū clyſtere euacuatio: dein-
 de lacte crudo moderata expurgatio: mox fotum ſpongia farinā orobinā
 aut triticeā in mulſo elixā, cataplaſmatis modo adglutinare expedit. Non-
 nunquā & irim oculi orbem tenuē opplentem, lacteq; oculū eluere. Quod
 ſi edendo repant exulcerationes, lenticulam cum melle, aut malis cydonijs
 decoctis emplaſtri inſtar imponere. In eo uero quod latius depaſcendo dif-
 funditur hulcere, folijs oliuæ elixis, aut mali granati corticibus, ſiue granis
 in uino cōcoctis cum melle contritis. Sed hulcere ſerpente, quam *οφιδιον* græ-
 ce nuncupant, urgente, & cruſta *εχθρα* appellata decidente impoſitu medi-
 camenti quod dicturus ſum, & quum hulcera fuerint pura, lecinthijs aſſis
 tritis cum croco & melle, cataplaſmatis more illinito, donec cicatrix induca-
 tur. Cæterū medicamentū quo de agimus illud eſt: Spodij drachmas qua-
 tuor, myrrhæ nō admodum aridæ ac torrefactæ drachmas treis, obolos to-
 tidem, in Amineo uino uſq; dum exiccetur macerans, paſſo Cretico ueteri
 commiſceto, quibus mollefactis liquidum in pyxidem fictilem tollito, atq; *23*
 ſublinito. Sed ad anthraces, quos carbunculos dicunt, qui palpebris in-
 naſcuntur, malum punicum acidum totum contundens coquito in aceto,
 ſubaſtumq; ualde in farinam conterens, lintheum oppleto, & utitor, cōmu-
 tans & renouans interdū quidem bis, noctu uero ſemel duntaxat.

De Mydriaſi, nimia dilatatione pupillæ.

MYdriaſis oculorum uitium eſt, quo, colore ne tantillum quidem muta-
 to, pupilla iuſtò longe latior apparet, & nonnunq; uiſoriā facultatem
 prorſus impedit, interdum uero magna ex parte, quo ſit ut uiſa multo mino-
 ra ueris eſſe uideantur, cuius cauſſa eſt *πυδριαſις οφθαλμου*, hoc eſt, redun-
 dans quædā humectatio. Succurrendū eſt itaq; huic uitio, ſanguinis inciſa *33*
 uena cubitus detractiōne, atq; expurgatione: ſi uero non, uenas in hircis
 quos *αυβοι* dicunt, diuidito, deinde cucurbitulam ceruici imponito. Faciem
 item atque oculos aqua marina perfundito: Quod ſi marinæ copia non ſit,
 muria aut poſca. Medicamentis denique iſdem in mydriaſi utendum, quæ
 & in medendis phlietænis expediunt.

De Phthiſi & Atrophia.

PHthiſis, quod eſt oculorū tabes, ſit quando pupilla anguſtior, & hebe-
 rior corrugatorq; ex adfectione quapiam redditur, in qua uiſa maiora
 eſſe apparent quàm ſint. Quæ quidem ex craſſitie & ſpiffitudine, ab aridi-
 tate potiſſimū facta, prouenit. Dirimitur autem phthiſis ab atrophia eodē *40*
 ſcrimine: Phthiſis anguſtiorē facit pupillam, atrophia uero oculum exilio-
 rem & anguſtiorē reddit. Medebimur autem huic adfectioni obnoxijs,
 exercitationibus, cōfricantesq; perquam accurate cum caput, tum uultum,
 tum oculū

*Phthiſis et atro-
 phia diſcrimen*

tum oculos: faciem adhæc aqua perfundentes, & caput ungento aliquo calidissimo circūlinientes. Oculos præterea extenuante & relaxante atq; acriori medicamento sublinito, quale est quod sequitur: Guttæ ammoniacæ drachmam unā, crocomagmatis drach. quatuor, croci drach. duas, rubiginis drach. unam, maceratas in aqua fingito, & utitor.

De Nyctalope, id est, acie uespertina.

Oculorum uitium, quod Græci *νυκταλωπη*, Latini lusciosos & nuscitiosos appellant, uulgo dici consuevit, quoties acciderit, ut interdū quidam iusta acie uideat quis, uespere uero & occidente iam sole, minus atque obtusius cernat, noctu postremo nihil. Eo malo affectis pulchre medebimur, si primo è cubito euacuabimus, secundo hirquos expurgabimus, aut clystere expurgante utemur: tertio loco apophlegmatis pituitā detrahere, aut sternutationes ciere precipiēmus. Potui uero hyslopum, aut rutam ante cibū offerre expedit. Quod si his peractis non ex animi sententia succedat, rursus medicamentū expurgandi facultate præditum, hoc *καθημερινή* græce uocant, ex uehementioribus pūta, scammonia & castorio confectum, medicus exhibeat. Perungito præterea cæcitudine illa nocturna oppressos, melle despumato: oculis cōiuentib. cōpressisq; humida intus cōtinetō, aluminis ceratū siliquā ue medimnos duos, salis fossilis medimnū unum, contrecum melle, atq; sublinito. Aliud: Iecur hircinum afflato, atq; inter aspidandū ichora colligens inungito, ipsum uero hepar edendum exhibeto: decocti uero iocinoris uaporem oculis apertis accipere iubeto.

*Vehementiora
medicamina.*

De glaucomate & hypochymate, ex Rufo.

Glaucoma uero & hypochyma, hoc est, oculorū suffusio, unum idemq; mali genus esse antiqui putauere. Posteriores uero, glaucomata quidē crystallini humoris in oculo uitia, quæ ex humiditate in glaucū colorē transeunt, existimauerūt: Hypochymata uero, humorū suffusione, qui circa pupillam in medio corneæ & crystallinæ speciem lucēq; impediunt. Sunt aut omnia glaucomata ex ijs uitijs, quæ nullo medicamento uincibilia, curationi medicum unguem obijciunt: Hypochymata uero, ut non sunt incurabilia omnino, ita neq; omnia sanant. Verū illis qui eiusmodi oculorū suffusione tentant, antequā morbus cōsistat, sanguinis è cubito detractio, expurgatione, euacuationibusq; acrioribus succuri: uerbi causa, Diacentaurij decocto, aut ficu amara, & alui crebriore solutione, cucurbitulæ in occipite, aut ceruice, quod *βρίση* græce uocant, circūcisa scalpello cute, adglutinatione. Per uniuersam præterea uictus rationē, aquā potus loco sumere, tum ex re, tum ex usu fuerit: alimentis item extenuatibus uti. Cōferent aut temporis progressu & apophlegmatismi per dies aliquot. Quicūq; uero perperā & tanq; conuiuentem quippiā intuent, perinde atq; conopia præferentes, & quod è malo aliquo humore, aut biliosioribus uaporibus sursum halantibus sit, medicamentum ex aloë amarum exhibebimus continuò, aut per illud quoq; purgabimus. Cæterū in oculis itidem medicamentis utendum, primum quidem simplicibus, quemadmodum melle & oleo cum sceniculi

Glaucomata:

Hypochymata

cremore: Secundo uero compositis, cuiusmodi fuerit illud: Sagapeni didrachmum, succi Cyrenaici, ueratri candidi, singulorum drachmas sex, misce mellis heminis octo. Oribasius uero, quemadmodum de se ipsissimus asserit, proxime sequenti usus est: Caucalidis liquoris, chamædryos, coronopi, uniuscuiusque tantundem coterens. Facito uero & collyria ex succo fœniculi. Proteus præterea & Thalasserus, è succo balsami, quē *ἰππεύωντες* uocant, & ex his cōtextis collyrijs quæ naturæ aptitudine opitulari possunt, fœniculi adhæc decocto haulto in principijs, iuuerunt, medicamentoq; ex succis, & opobalsami, melle, & oleo ueteri, & id genus alijs.

De oculorum hebetudine, puta Amaurosi & Amblyopia.

*Αμαύρωσις.
Αμβλυωπία.*

Aμαύρωσις, totius plerūq; lucis uidendiq; usus impedimentū & obex est, absque manifesta causa, integro & incolumi omni oculo. *Αμβλυωπία* uero hebetudo uidendi est, ex aliqua incerta occasione proueniens. Curatio aut̃ ea in uniuersum quidem quadrat, quæ antea in suffusionibus oculorū est explicata: Speciatim uero ex oculorū hircis sanguinis euactatio, hirudinū usus, & circa tempora potissimū earundem adiectio, & infernarū partium frictions. Progressu uero temporis, sternutationem cientibus utendum, & quæ à ieiunis fiunt uomitionibus, illinitionibusq; modicis. Præcipuum quidem habetur, confectio quæ ex mellis & olei æquis partibus con-textitur: Proximū est, ex his quæ sequuntur concinnatū medicamentū. Sumuntur croci oboli duo, bilis suille drach. una, piperis cōmunis grana octo gintaquinq; cremoris fœniculi drach. sedecim, guttæ ammoniacæ thymiamatis drach. una, dissolutis aridis cum liquore succo ue, mellis cochlearia quatuor, reconde, præpara, & tollens in æneam pyxidem, uitor. Antē illinitionem aut̃ foueto pyria, oculos in calidam aquam marinam immergens.

De Strabismo, hoc est, aspectu obliquo.

Distortiones oculorū à generatione, quas Græci *σπασμους* & *σπασμους*, nos strabones dicimus, corriguntur in infantibus, si persona ita capiti imponatur, ut à fronte rectā adspiciant. Strabismus enim cōuulsua musculorum qui bolbum mouent, est affectio, & lucerna è regione posita, nō à latere apparente, emendatur. Sed quādo nares uersum oculi detorquentur, floccos rubro colore suffusos oculorū hircis circa tempora adglutinato, ut ad hos fixis luminibus intuentes, corrigant oculos.

De Epiopsmo.

Ita quandoq; premunt̃ hominis oculi, ut exerti perseuerent, illis quidem Iqui laqueo torquentur ac præfocant̃. Incisio uenæ cubitus, præsidio est. Quod si ex alia quapiam occasione id usu ueniat, ueratro nigro aut scammō niā medendum. Elisiones uero oculorū quæ ex doloribus proueniunt, sæpius enim ex nisu laborantū è dolore partus contingunt, purgationes solent, proinde opitulandū est etiā illis. Viris autē post sanguinis detractiōnem per uenam, si nō cedat, occipiti cucurbitulam adhibeto, lanamq; melle illitam imponito, aut floccos cum aqua & linteo complicato, clementer suspensaq; manu desuper ligato. Expediit præterea ea oculi iniuria uitioq; affectis,

Etis, aqua marina egelida uultui perfusa: Cichorii item cremor, & semina-
lis herba unà cum succo papaueris, *μυκωρύς* appellato, illiū, & alia quęcūq;
contrahendi & congregandi potestatem habent.

De oculi suffusione, quam *ὀφθαλμία* Græci dicunt.

Synchyfes, oculorū profluuiā ex ictu plagā ue oborta, non sanguinis mo-
do, incisa uena cubitus, detractio, sed sanguen etiā nuper perempti, ma-
xime uero turturis, curat & emendat: Sin minus, uniuersum oculū sangui-
ne columbino opplentes, eiusmodi iniurijs occurremus: deinde lanā mol-
lem maceratā in ouo discisso & contuso cum uino & rosaceo imposito, &
10 alligato: sequenti uero die hoc idem faciendum: tertio fouendum, lacte q;
perfundendus oculus, & ex rebus ad eam prouinciam factis & idoneis ca-
taplasma adglutinato: postremo unctulis collyrijs ue, quæ ad ueteres affe-
ctiones faciunt, perungatur: uerbi causa, Chiaco unguento.

De Myopia.

Lvfiosi non nisi contractis palpebris intuentes, quos *μύωπες* græce uo-
cant, ij dicuntur, qui statim ab ortu quidem ipso, oculis propius admota
cernunt, sed longius dissita spectare nequeunt. Insanabilis sanē istiusmodi
affectus est, ob spiritus uisui unde nascitur, debilitatē. His contraria omni
no patiuntur ætate prouectiores & decrepiti, quā ea quæ longius distant,
20 facilius exactiusq;, quā ea quæ admota sunt oculis, aspiciant.

Auricularia, & ante omnia de auriū dolore. Cap. XXIII.



Quia frigida causa auriū dolor suscitāt, siue ex anni tempore,
præcedentē ue uictus ratione, aut laborantis egestionē (si modò
αὐτοπύρωσις sic licet interpretari) percūctationē ue: siquidē ex præi-
torio euidentiq; causarū genere proficiscitur, siue quod in imo
funditus hæreat, absq; grauedine uel lincinatione uel inflammatione de-
prehensus, calorificis curabitur præsidijs, auditili meatui instillantes oleū
rutaceum calidum, aut nardinū, aut laurinū, aut amaracinū, aut phulliatum
aut spicatum, aut cōmune cum euphorbio, aut pipere, aut castorio, aut com-
30 magnum quod uocant unguentum, aut succum balsami. Et oleum præte-
rea in quo elixum sit allium, *σκόρδα* appellatum, aut cepa, instillatum auri-
bus ex frigore languentibus, auxilio est.

Ad dolores auri
nū ex frigore.

Ad languores aurium ex calore.

Dolorem uero auris ex calida intemperaturæ causa, in qua feruorem
quendam sine grauedine aut tensione sentiunt, contrarijs medicamen-
tis curabit medicus, albuginem oui instillans friatū ac colliquatū, perinde
atq; in oculo: & lac muliebre, rosaceo, atq; ipsum quocq; rosaceū, aut oxyrho-
re perdicias cum exiguo rosaceo, atq; ipsum quocq; rosaceū, aut oxyrho-
dinū, aut succum solani, aut coriani, aut asphodeli, aut oleum in quo inter-
40 na terræ, aut oni aselli ue, qui situla decocti: aut oleum amygdalinū per se,
aut uiuentia cerycia, buccina appellata, tria in eo elixans, naturaliter hoc i-
psū efficit.

Ad aurium dolores è crassis humoribus.

CAeterum dolorem ex uiscosis & crassis humoribus factum, cognosce ex capite & eiusdem auditorijs instrumentis, auribus ue mole grauat, atque ex ea quæ præcessit educatione. At si dolor sit absq; ulla grauitate, sola dissentio dissidiumq; auditus, spiritû flatulentû exitu destitui declarat. Utendum itaq; in utrisque, sjs medicaminibus quæ obturationes discutiant atq; interfecât: cuius generis est aphronitrû cum aceto & melle, atq; bilis ouina cum oleo cõmuni, siue amygdalino: necnon & porri atq; cepæ cremor tepidus cum melle, aut organu deniq; cum melle lacteq; muliebri contritum, auribus instillato. Aduersus autẽ uehementiores frigiditates, bilis caprina cum porri succo instilletur. Cæterum quum ingens quem ac multus & diurnus labor infestat, hisce remedijs utendum est: cuiusmodi sunt, dracunculi succus, & ari, & bryonia, & huius farinæ cætera.

Ad dolorem aurium ex flatu suffiaci.

PRiuatim uero eis qui auris cruciatur propter flatulentû spiritû torquentur, cucurbitula, calida prius aqua calfacta, et circa aurẽ imposita magnifice succurrit. Quod si pondus pariter & contentio cum dolore, quem imensus ac multus comitat arteriarû percussus, unâ molestarint, aut febris etiã tentet, inflammari scito auditoriû; atq; ob id quidem ante omnia incisione uenarum utendû, deinde auriculario specillo lana inuoluto, oleo dulci calido frequenter fouere expedit. Adhæc adeps quoq; anserinus meatui instillandus est, aut uulpis, aut Basilicum medicamentum cum rosaceo, aut cyprino, aut irino. Foris porrò cataplasmatibus modò illinienda sunt, ea quæ leniendi dolorem pariter & concoquendi potestatem habent. Sed uiolentius dolore sequente, medicaminibus quæ mediocriter obtundere & stupescere sensum possunt, utemur: haud enim paruum ac contemnendum periculum cerebro, quod auditorio neruo inflammato uicinum est, incumbit. Pulchre igitur hoc remedium succurrit: Succus papaueris (quod opium uocant) partem unam, castorij partes duas cum lacte muliebri, aut albugine oui, aut uino dulci passô ue, tepidû auribus instilla. Cæterû croceus quoq; orbiculus, quẽ *σφοδρος* græce nominât, pariter & aster, & Philonis antidotus, hac affectione afflictos sæpenumero adiuuat. Iam uero aurem assidue uel oleo cõmuni, uel aliquo calido fotu fouere oportet, lanam in eo ipso intinctam auribus imponere, minimeq; gentium cessare quantû fieri potest, membris inflammatione infestatis. Vbi autem dolor inueterarit, & iam in suppurationem conuerti cœperit, medicamento è succo seminis lini utitor, instillans id ipsum dissolutum cum rosaceo, aut chamæmelino.

Ad auris ex aqua languores.

QUando autem aures ex aqua medicaminosa in auditoriû meatum infusa dolent, siquidem plurima fuerit, per os, aut etiã per calceum seu canalem exugendo attrahe aquam: si pauca, ubi exterferis eam lana auriculari specillo imbuta, oleum aliquod tenui partium, aut roseum, aut oui album, aut muliebre lac, instillato. Cuncta autem hæc & singula modice calida

da esse oportet, quæ auribus adhibentur.

Ad aurium hulcera cum phlegmone.

Lycium & meconium, hoc est papaueris succum, pari quantitate cum mel le quassata atq; cōtrita, auribus doloribus & phlegmone oppressis, im-
ponito. Ad maximos auris dolores, & suppurationem, & grauem auditū.

AMygdala dealbata, & spumæ nitri, quod *appūm* uocant, drachmas
Atreis, opij tantundem, croci drachmas quattuor, galbani drach. duas,
myrrhæ drachmam unam, aceto eliquans atque dissoluens, auribus affli-
ctis instillato, dolore quidem infestante rosaceo irrigans: si purulentia ue-
ro adsit, cenomelite aut oxymelite: sin difficultas auditus, aceto. Porro
hulcera recentia, glaucium in aceto dissolutum medetur, & quæ ex illo con-
ficiuntur collyria. Faciunt idem diarhoda, diacroca, & diasmyrna: Quem-
admodum rursus suppurantia citra dolorem, scoria ferri cum aceto in tem-
pore macerata & adhibita.

Ad hulceris fordidi duritiem.

Nitrum aceto maceratum cum aqua dilue, & abstergens instillato irri-
gatum cum rosaceo. Aliud ad sordidum hulus: Cardamomum
& nitrum exiguum cum caricis sicubusue simul contundens atque cogens
absque cechramidibus, & collyria componens, auribus indito, atque per tri-
dum gestato: deducit nanque sordis plurimum, & haud mediocriter le-
uat. Conducit autem & excrefcentijs carniū præter naturam, diutinis do-
loribus, & exulcerationibus. Sumito aloës, thuris, myrrhæ, singulorū
drachmā unā, misyos drachmas quattuor, quibus cum aceto in pastillos co-
actis, ubi utendum fuerit, aceto & rosaceo soluens, infundito, & trochiscū
Andronium, & Eram, & orbiculū Musæ.

Ad inueterata hulcera.

Cedrinum liquorem cum melle confusum, illinito. Aliud: Misy com-
bustum & in farinam tritū, hulusculis insufflato. Sed ad infusiones, au-
res cum clysteridij posca in oxymelite aut cenomelite, aut iure alicuius ex-
pellendi tim habentis, ueluti lentis aut rosarum, inundato.

Ad aures uellicatas.

ABlue auriculam rotundi odorati iunci decocto: seminalis uero cremo-
rem cum q̄minimo aceto instillato, aut lycium, aut amurcam, aut aca-
ciam, aut porri deniq; liquorem.

Ad carniū præter naturam incrementa.

Nitrum aqua inundans calida, unā cum squamula æris, & sandaraches,
næquis partibus: crusta uero obducta, melle repurgatur.

Ad aures uermiculantes.

Perfundant aures absinthij decocto, aut centaurij, aut porri. Instillabis
item foliorum capparis, aut fructus eiusdem cremorem, aut liquorem ce-
driū, aut humanum lotium per uetustum, aut ueratrum album cum melle,
aut nepetæ succum, aut scammoniam cum aceto, aut succum absinthij. Cæ-
terum oleum meatui quoq; instillatum, ex imo ad summam usq; auriculam

efficit. Quam rem egregie quoque acetum oleo temperatum exequitur. Et aduersus animalcula, quae auribus aliquando incidunt, isdem utitur.

De calculis & consimilibus, quae auribus interdum incidunt.

Auricularium specillum (quod *μικροσκόπος* graece nominant) lana inuolutum, terebinthinae, aut gummi, aut alio quopiam glutinoso intingito, atque sic infectum ea tandem ratione extrahere. Quod si renitatur, neque his adhibitis prodeat, oleum calidum assatim meatui instillato: Si quidem efficiatur, aut relinquitur, alia aggrediunda est uia, quemadmodum in uolumine de Chirurgia prosequemur.

De sonoribus ac sibilis aurium.

Quod si aurium tinnitus in febris, aut earundem decretorij proueniunt, nihil obturbato, propediem namque ut plurimum haec murmura cessant. At si post morbum etiamdum torqueant, absinthij decocto fouens, acetum atque rosaceum infunde, aut radicularum cremorem cum rosaceo, aut helilebori nigri cum adiecto aceto. Contra diuturna autem, & quae inueterauerunt aurium murmura, ex crassis & uiscidis humoribus oborta, (deprehendes autem id, quod non uno (ut dicitur) fasce, sed particulatim cogatur, consistatque) aceto & nitro & melle demergito, ac dilue. Aliud profligandis aurium sonitibus: Accipe ueratri candidi drachmas duas, castorij tantumdem, croci drachmas treis, nitri drachmas sedecim, quibus singulis in acetoto liquefactis, redige in rotulas, atque re postulante utitor.

Ad diuturnos aurium tinnitus & sibilos.

Medendis aurium sonoribus atque sibilis, euphorbio cum oleo cyprino mixto & calfacto utendum. Sed his qui propter multam synaesthesiam atque per consensum uaporum in caput ascendentium, aut flatuum hoc mali sentiunt, castoreum, & semen cicutae in aceto dilutum atque contritum, instillato.

De difficili auditu & surditate.

Surditates graece *κωφότης* appellatae, quae primo statim ortu, aut post spatium quidem, sed diuturno iam tempore atque omnino etiam hominem occupauerunt, adeoque altius quoque radices egerunt, curationem nullam admittunt. Quae autem absolutae non sunt, sed diutinae & inueteratae, (hos surdastros, illos surdos dicimus) & ipsae insanabiles plane sunt, aut grauiter egerimeque curantur: nam ex bilioso humore sursum uergente conflatis, non admodum difficulter euacuationibus, quae medicamentis bilem deducentibus, *χολήρυγα* graece appellata, fiunt, succurritur. Nonnullae etiam nulla medela adhibita, ultro afflictione demittunt ac finiunt, bile illis subeunte. Surditates uero uel dysfecioas, id est audiendi difficultates, & crudis & crassis humoribus prognatas, sectione uenae, aut omnino expurgatione cum hiera, curato: apophlegmatismis interim & erinis utens, naturalibusque aut unda etiam marina factis lauacris: sed ea auditorio meatui instillato. Compertunt quidem & ea, quae ad aurium tinnitum bombosue perscripta sunt: peculiariter autem haec, lotium caprinum, & bilem animantis eiusdem, aut solummodo bilem instillato, aut rutae cremorem cum melle, aut castoreum cum oleo

Ad inueterata
aurium tinnitum
murmura.

Χολήρυγα.

oleo anethino, aut hyssopum medicamentum cum unguine nardino, aut bilem capræ cum galbano. Aut etiam illud: Accipe castorij drach. duas, nitri, hellebori candidi, singulorū drachmam unam.

Ad contusionem aurium, quam *ὀλκον* græce nominant.

Hippocrates, nihil aurium impulsionibus thlasis uel conducere admodum. Quoniam autem sæpenumero à laborantibus urgemur impellimurq̃, utendum fuerit utiq̃ myrrha, aloë, thure, acacia: æquas partes cum aceto, aut oui candido tritas, oblinito. Aut panis calidi medulla cum mellē in mortario confusa, cataplasmatīs modo illinito. Vel id quod sequitur:

- 10 Accipe asphalti, (bitumen nostri uocant) thuris, aloës, cochlearum carnis, bulborum spumæ æqualiter, quibus in aceto contritis, imposito. Cæterū si phlegmone accedat, sesamo dissoluens illinito, aut chondro cum aceto elixo. Atqui cataplasmata cuncta in hac affectione leuia sunt, & absq̃ uineulis & ligatura omnino, uel obiter modò ac leuiter uincuntur: lanamq̃ oleo intinctam meatui auris imposito.

De Parotidibus, id est secundum aut post aures abscessibus.

Parotis, abscessus & affectio quædam est, quæ in adenīs sub auribus proiecta materia nascitur, conuersis illuc ex capite densis quandoq̃ humoribus, nonnunq̃ uero ex reliquo corpore decretoriū in febribus ad sa-

Parotis.

- 20 lutem facientibus. Quocirca si etiam dum in profundo latens, non in tumorem assurgit parotis, adiuturabimus naturam, huiusmodi subsidia offerentes, aut cucurbitulā apponentes, aut fomentationibus crebris utentes, ne si in-

imū remeat materia, periculum afflicti non effugiant. Si contrā in uomicam & tumorem quodammodo pyramidalem cum inflammatione attollatur, tum contrarijs omnino cataplasmatīs, mitigandi & maturandi uiribus

Si tumor parotidis inflatus

præditis, utemur: uerbi causa, cataplasmate hordaceo aut frumentaceo, aut e seminis lini farina cum mulso, aut scenogræci, aut altheæ, aut chamæmeli iure decocto, aut quod ex rumice & xungia sine sale constat. Si sanguis

Si ex redūdente sanguis.

- 30 plus iusto naturæ modum excedere uidetur, euacuandus est ante omnia ipse incisione uenarum, si id quidem per uirtutem laborantis integrū sit.

Sed si tumor neq̃ tantillum quidem discutiat, neq̃ quicq̃ resoluitur, medicamentis quæ suppurationem inducunt utendum: cuius generis est farina triticea, cum caricarū decoctione & oleo, atq̃ id quod ē polline, item id

quod ē fermento componitur medicamentū. Commeante uero & mutante sese iam abscessu, uel dissectione purulentia excernamus, uel acri medicine confringamus irriteremusq̃. E quorum certe numero est, quod uulgò

dicunt smilium, & quod ex alijs constituitur. Parotides autem ignauiores & innocentiores, pyria ex calore tantummodo discutit: item id quod apera

Aperum.

- 40 discutit, sed ad hoc etiam omni planè molestia carens, indoloriū præ omnibus fermè alijs est. Cæterū ad inueteratas iam multo temporis spacio parotidas, buccinorū aut purpurarum crematorū cinerē cum melle aut axungia imponamus, aut sicum coctū marina, aut marubiū cum sale. Porro iam

Ad ueteres parotidas.

duritiem præferentes parotidas emollit tum Mnasei confectio, tum Ario barzanios. Præsentissima uero est, quæ fit è succo feminis lini. Ante uero hæc illinito ammoniacum, miscendo cataplasmatibus picem liquidam, aut adipe taurinū, aut bellium, aut styracem, aut medullam deniq; ceruinam.

De nasi odoratusq; seu narium affectionibus.

Cap. XXXIII



Proficiendi uirtute læsa, lingua incolumis seruetur, anteriorum cerebri uentriculorū affectio suspicanda est, qui uel nudi distemperamenti culpa noxam acceperunt, uel prauorū humorū multitudinis. Si uero lingua unā cum odoratu offendatur, laboriosior ac difficilior quodammodo fuerit, propter emphraxim, hoc est obstructionem eorū meatuū, qui ethmoides, id est cola, uocant, malum rursus ex uitiosis humoribus factum putato. Proinde cerebri intemperantiam persēpius iam enumeratam ubi deprehenderis, cōtrarijs utitor adminiculis, caputq; calida marina perfundito: humores uero negotium exhibentes, apophlegmatismis euacuato, maxime uero quæ ualide per nares euacuant eris nis. Odoramenta præterea quæ nō nihil subtiliū partium habent, quemadmodū in destillationibus faucibus impactis, exhibeto. Quod si copia atq; adeo saburra huius mali causa uerſet in uniuerso corpore, hoc totū prius diligenter uel detractione sanguinis per uenam, uel purgatione cum hiera, euacuato. Sic & in Polypo, & Ozæna utitor: tum deniq; his præmissis, topica adhibe auxilia. Theriaca quoq; pota, sæpissime opem præsentissimā attulit. Est aut polypus, tuberculū præter naturā in naribus obortū, referens modis omnibus substantia, polypi animantis carnem. Eiusdē porro naturæ & essentie polypo est sarcoma, hoc est, carnis in naribus præter naturā incrementū. Ozæna uero huiusmodi est cariosum ac putridum, ex acerrimis ad nares confluentibus humoribus, & acrimonia sua exedentibus, natū.

Polypus.

Sarcoma.

Ozæna.

Ad Polypos & Sarcomata.

Sumito squamulæ aeris drachmas octo, atramenti futorii drachmas sex, sandarachæ drachmas quatuor, ueratri nigri drachmas duas, quibus in farinā tritis, naribus statu indito, et utere perinde atq; præstantissimo, nam in tredecim sanē diebus perspicuam atq; euidentem præbet cōmoditatē. Conducit & atramentum futoriū per se cum aceto adhibitum. Aliud: Corticum mali granati drachmas duodecim, atramenti futorii drachmam unam, chalciteos drachmas octo, bilis taurinæ, amomi, myrrhæ, nepetæ, marrubij, singulorū drachmas quatuor, croci drachmas duas, ueratri candidi drachmas quatuor unā siccato atq; utere. Aliud: Diaphryge leuigato attingito, & penicillo uulnerario (quod est linamentū id, quod uulneribus inditur) scirpeo, oleo circumfuso, uel ex funiculo oleo illito, quali utuntur uulgo in lucernis: dirimit enim nares.

Ad Ozanas.

Sumito misyos, chalcitidis, myrrhæ, uniuscuiusq; drachmas septē, atramenti futorii drachmas sex, aluminis fissilis, gallæ, squamulæ aeris, singulorum drachmas quatuor, aluminis rotundi drachmas duas, thuris drachmam

chmam unam, aceti xestam unā, hæc simul omnia in uase æreo elixato. Melle autem illito utere linamento. Aliud: Erugo item & squamula pariter arida, ozænis conferunt.

Ad narium graues scetores.

MYrrhæ, acaciæ, amomi, singulorum drachmam unam melle despumato contusam cogens, summæ extremitati narium diaphragmatis, hoc est intersepti, adglutinare mandato.

Aliud in eundem usum:

Amomi, myrrhæ, rosarum siccarum, æquali pondere, simul unguento nardino excipiens, illinito. Conducit etiam graueolentiæ nariū malagma Dychoi cum uino usurpatum.

Ad hulcera quæ naribus insident.

Accipito certussæ librā unam, spumæ argenti uncias treis, scorix plumbei uncias treis, uel plumbi cremati: cæterum singula probe lota, uino oleoq; myrteo excipe.

Ad ea narium hulcera, quæ Glycea dicuntur.

Accipiantur spumæ argenti drachmæ pondo duæ, rutæ recentis drachmæ pondo quatuor, aluminis scissilis drachmæ pondo duæ, quæ ad unum omnia oleo myrteo atque aceto contusa coganitur.

Sternutationes prolicientia, græce *στέγνωσις* appellata.

Sternutamentum prouocat helleborus albus, aut castorium, aut piper, Saut struthion, aut uno fasce omnia: neque tamen ea inflare expedit, sed harundine aut digitulo ad intimam nasi partem inserere. Sternutamento autem plus æquo citato, & supra modū infestante ex medicamine sumpto, nardinū, aut rosaceum, aut glycelæum, ad sedandam sternutationem infunduntur. Odoramenta porro consistendi sternutamenti munere funguntur, anisum, ocimi palea tusa. Super hæc uero omnia caput smegmatis ex nitro & pumice exiccandum, aut eo quod Asclepiū cognomentū habet, & Constantini sapone, & Cappadocico sale, atq; alijs id genus utendum.

De narium hæmorrhagiā, id est sanguinis profluuio.

Super grandi sanguinis ex naribus effusione, quam hæmorrhagiam uocant, quæ febricitates infestat, libro secūdo qui de febribus agit, recensui mus: de quacūq; uero sanguinis nariū eruptione simpliciter, quæ ægre cōpesci possit, in præsentia agemus. Chalcitum in farinā tritā, ellychnio aqua deliburo, aut priapisco excipe, & foraminibus nasi indito: aut oui testā crematam ipsi confundito, & gallæ dimidiū: aut onida cremans cinerē in spirato: aut succū eius eliciū instillato: aut molaris (quæ *μολις* græce dicūt) lapidis extincti aceto, uaporē odorato: aut inductorio eius more emplastri utitur. Mannæ, thuris, partem unā, aloës semissem, oui candido excipe, & utere per ellychnium, foris leporis pilos unctulo adiiciens: aut naribus florem quam Græci Lychnidam uocant, Romani genicularem bellariam ut dicunt, indito: aut cucurbitulam leuem recto tramite hypochondrio naris unde sanguinis eruptio fit, bene magnam & solitariam applicato: uel aures rigidius atq; solidius obturato: frontem adhæc spongij gelida aqua intin-

ētis irrigato, uel si id minus probatur, syciam cum sanguinis detractioe occipiti adglutinato. Quandoq; uenam secare, nisi quid renitatur & interdicitur, & extremas partes ligare expedit, præcipue uero brachia atque crura, quemadmodū & in ipsi ipsi quoq; uenam aperire cum primis cōpetit. Ad hæc agitare easdem particulas imperato, manus quidem perfricando, pedes uero obambulando, nam uenis harum partiū sanguine fartis, adiacentes naribus locos sanguinolentos efficiunt. Spongia porro subinde in gelda posca imbuta, & foris manātib; sanguine naribus applicata, cum cōstrictione obturatione uel opportune iuuat. Satius autem si antē naribus cu neolus prælongus inferatur.

Aduersus ea quæ hominis uultui accidunt uitia, & antidotum quo faciei constitutio conseruetur. Cap. xxv



Rosfigandis faciei uitij; sumantur, thuris drachmæ quatuor, phyci drachmæ tres, spumę argenti, piperis, uniuscuiusq; drachmæ octo, omnibus hisce dissolutis ichthyocollæ, id est, pisco si glutini decocto, rotulisq; conformatis utendum. Aliud: Accipe ramenti elephantis drachmas octo, thus masculū, ichthyocollam, parī pondere, utere quemadmodum memoratum est iampridem.

Ad uultus nigrores.

Reos aut ptisanæ singulorū xestam unam & semissem, salis ammoniaci, cornu ceruini cremati, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusq; uncias duas aqua dissoluens redige in orbiculos atq; pastillos, rursusq; aqua diluens ante balneum illinito. Aliud: Ptisana, orobi, thuris, illyridis, spumę nitrī, singulorū choenices quatuor, costi, amygdalarū amararū uniuscuiusq; drachmas uiginti, ouorū candido & lacte asinino excipito, atq; eo quod diximus modo utere. Ex re item atq; usu fuerit peponatis pastillus.

Ad asperam & disciorem ceu à sole cutem, & lentigines.

Aduersus ephelides atq; lentigines utiliter adhibetur id, quod constat Alex cretæ cimoliæ exiccatae seu torrefactæ chalci semisse, spumę nitrī afflati drachmis octo, orobini lecithi drachmis quatuor, scobis taurinæ bilis drachmis octo, cōtritīs omnibus simul, frueri. Aliud: Accipe trogos drachmas decem, eregmi drach. decem, ueratri candidi drach. quinq;. spumę nitrī drach. decē, halcyonij tantundē, conteras & liquefacias, et utere.

Curandis liuoribus qui sub oculis ceu percussionum uestigia cernuntur, Græci *κοιμήματα* appellant.

Medendis sugillatis quæ sub oculis apparent, principio quidē decoctum scœnogræci, deinde uero & meliloti (quam fertulam campanam Latini dicunt) fomentationibus utere. Niliq; diarhodon collyrium a qua intinctum circumlinito: post hæc dialmyrnū. Quod si nihil profeceris, medicamentum ex sandyce crematū inunge, aut hyssopum cum aqua impone, uel iniecto hyssopo in panniculum, & calida cum aqua immergens, liuores foueto, aut muria acri consimiliter. Præterea corticem radiculae cum melle triam applicato, & hoc inueteratos etiam sub oculo liuores exterit.

Ad diu

Ad diuturna Hypopia & Peliomata.

Cæterū ad expungenda inueterata iam longo temporis spacio fugilla-
ta, & uibices, cōferet illud: Accipe tordyli partes duas, rubricę Samiæ
partem unam, quæ quidem melle emollita imponito, aduertens interim ani-
mum, ne exulcerationē inducat. Aliud: Apopsectrum, hyssopi, tha-
piæ, casiæ, singulorum drachmas duas, terebinthinæ drachmam unam,
adglutinato. Cauendū tamen peraccurate ne locū exulceret, & ob id qui-
dem identidem tollendum. Aliud: Carcei uiridis corticem emolliens,
atq; ius ipsorum sumens, myrrham, alumenq; scissile in ipsum iniice, & con-
10 quassans omnia, misce in usu & necessitate, atq; gingiuis, ea uidelicet parte
qua dens afficitur insertum, erit remedio. Aliud: Allium, & piper, &
syluestrem staphida trita, & in uinculo laneo cōficiens combia exigua, atq;
identidem permutans, purgabis humiditatem capitis, atq; dentibus affli-
ctis præsidium attuleris.

Ad ionthos.

Sunt autem uari, quos Greci *ἰόνθοι* dicunt, calli ac tumores exiles, duricę Vari.
Sin cute faciei, quas acmas quidam nominant, quibus oxymeli circūlini-
to, interens: aut spumam argenti cum terebinthina & pusillo olei albi tri-
tam inunge, similiter infricās: aut fissilem schistam ue cum terebinthina aut
20 amygdala amara emolliens aceto, contere. Sed in callum duratos ionthos,
saponis Gallici drachmas quatuor, thuris, guttæ ammoniacæ, uniuscuiusq;
drachmam unam, aqua macerans illinito, & hora transacta abluito.

Ad ionthos & pilos & aspredines uultus.

Ceræ drachmas decem, terebinthinæ drachmam unam, uisci drachmas
duas, colliquefacito in oleo infundens, atq; eo medicamine uultū con-
spergito, tollit enim ea faciei uitia radicitus. Aliud: Papaue r, quem *μῆνα*
nuncupant, madidatum & emollitum, aut pulegium unā cum sale atq; ace-
to, cataplasmatīs modo circumlinito.

Cerota Thaidis, ad rubicundum uultum faciendum.

Roci coloris ruffi & coccinei, radicis fuci, libani, myrrhæ, singulorum
drachmas duas excipe adipe uitulino, & oleo mastichino, deinde illini-
to, interualloq; temporis impolito, spongia calida absterge. Illud sanē me-
dicamentum cum faciei, tum uniuerso quoque corpori congruit, colorisq;
gratiam inducit.

De affectionibus quæ circa os, & primo circa dentes grassantur. Cap. XXVI.



Qui dolore dentium absq; gingiuarū phlegmone cruciantur, in-
terdum quidem in reliquo corpore dolor, nōnunq; uero in ner-
uo qui ad dentes descēdit, fieri assolet. Validissimis igitur opus
habet remedijs, quocirca plerūq; aceto eadē acerrimo condium
40 tur. Quum uero gingiue propter phlegmonem dolore infestantur, omniū
præstantissimum medicamentū est oleū lentiscinū, medijs ad unguē tempe-
ramenti. Cæterū oleum illud recens esto atq; nouum, quoniā scilicet uetus
tantum bonitate recenti cedit, quantum diuturnitate uetustateq; superat.

Communis autem & impresentiarum obseruetur medendi ratio, quod ante omnia, toto corpore plus iusto naturae modum excedentem humorem, euacuare operae omnino precium est.

Ad phlegmonem, id est inflammationem dentium.

Quod si propter phlegmonē dentes hominem torquent & excruciant, colluantur aceto, in quo elixa sit galla, aut alicacabi radix, aut herbae apollinaris semen, aut eius folia, aut pulegium, aut solani cremor, aut capparis radix, aut myrti folia, aut polium, aut cucumeris sylvestris radix, aut folia rutae cum oxymelite, aut cornu ceruinum, aut acetum quoque scilliticū, aut pyrethrum denique cum hyssopo. In exesam uero dentis concauitatem sty-
 rax cum succo papaueris, quod *στυραξ* uocant, utiliter inditur, aut galbanus: aut sulphur apyron, hoc est ignem non expertū uiuūque cum lycio, aut herbae apollinaris semine, fornacula adoleto. Praeterea Philonis quoque antidotus cataplasmatibus modo illita, denti indolentiā conciliat. Vbi ex fluxu autem dentes dolore instantur, tum myrti & lentisci & gallae decocto, aut rhus Syriaci, aut florum agrestis puniceae, aut malicoriorum iure colluito. Ad haec praeterea contra eundem dentium dolorem illinito medicamen, quod componitur ex salis medimni duobus, aluminis ceratio, & extincti aceto emollitiq; medimno uno, postea uino perfundito, colluitōue. Quū porro gingivae admodum cruentae fuerint, tenue alumen inspergito, aut aloē ui-
 no colluito, aut rubi radix, aut rhus Syriacus uino elixet. Gingiuas uero cū sanguine tum reumate iuxta perfusas, balsamenti crudi in aula prorsus destituti, cinere attingito. Porro aloē dentes cōcussos iam atque labefactos, si inspergatur, instaurat, erigit ac firmat. Rhus item Syriacus, aut fissilis galla, aut rubi radix, tum sine additamento per se, tum in uino elixa.

Aduersus quassatos dentes, & contra gingiuas fluxibus obrutas, & ad unumquoduis pascendo serpens in ore hulus.

Sumito chalcitidos assis drachmas duodecim, cadmiæ drachmas octo, Sutare arido, adiecto aceto. At sine molestia omniq; labore dentes tollere uolens, farinam unā cum liquore tithymalli, dentibus afflictis indito, atque hoc super folium hederæ serito, ita per solidā horam permittatur, sua namque sponte dens perforabitur.

Dentis *μύγαν*, & ad parulidas gingiuarum tubercula.

Accepe aluminis plinthitidos, salis ammoniaci, singulorum uncias quatuor, myrrhæ, costi, pyrethri, uniuscuiusque drachmas quatuor, piperis grana octoginta, atque ad dentium megma parulidasque utere.

Ad parulidas.

Sumantur sulphuris ignem non experti uiuique, piperis, aluminis fissilis, *Parulis.* Sæquales partes. Cæterum Parulis inflammatio est, in aliqua gingiuarū parte orta, quæ nisi dissoluatur, suppurat: quum uero suppurauerit, scalpel-
Epulis. lo dissecta, linamentis insertis panditur. Epulis uero, carnis quædā excre-
 scencia est, quæ ab inflammatione exurgit, ad intimum molarem, cum febre & dolore nonnunquam. Opus itaque habet medicamentis reprimentibus
 tum entia

Erosi dentis
medela.

Dolori dentium
ex fluxu.

tumentia, proinde rasili ferrugine per se, aut cum eiusdem ponderis galla, utendū. Aut Sory ceratio, aut aluminis cuiuscq; ceratio, aut galla per se, aut squamula æris cum aceto emollita complurimis diebus & arefacta.

tMegma dentium.

*1 floris suecina
aut pſeigna.*

ACcipe aristolochiæ radicis ceratium, cornu ceruini cyathum cum paulo xillo mastiches, sal album melle subactum & conspersum, quæ folijs sic circumuoluta, cremantur donec in carbones uertantur. Aliud: Bucina sale impleta & deusta, cochleæ item terrestres, cremata cum melle, lana succida pondo ceratiū cum exiguo sale: singulis autem horum fragrantia causa ad miscero florem lentisci, aut spicæ nardi, aut folium malabathri, aut cypirum, aut irida deniq;.

Dentes dealbans, & gingiua restituens, & odorem emendans.

PVmicis, salis assii, iridos, singulorum drachmas quatuor, cyperi drachmæ quinque, spicæ nardi drachmam unam, piperis drachmas sex, cōteras, atque dealbandis dentibus, gingiuis corrigendis, & ad sua uolentia gratiam conciliandam utere.

Ad dentium stuporem, quam Hæmodiam dicunt.

Hæmodijs portulaca manducata succurrit, aut oleum ex nondum maturis oliuis expressum, Græci *ἡμοδία* uocant, applicatum. Idem facit amurca, oleo in æneo uase, usque ad mellis constitutionem siue crassitudinem decocta, si inueterata illiniatur.

Aduersus dentes attritos.

Dentibus attritis bacce lauri, alumen fissile, aristolochia longa (quæ Clematitis quasi sarmentaria uocatur) pari pondere, subueniunt.

Contra gingiua exesas.

SVmantur florum rosarum drachmæ octo, gallarum drachmæ quatuor, Smyrrhæ drachmæ duæ. Gingiuarū præterea anabroses & humores in gingiuis existentes medentur, lac asininū collutū, oliuæ foliorū decoctum, acetum scilliticū. Quod si sicca adhibere mauis, ualebit erugo ferri, cytini. Cæterum ad tumores & carnis excrescentias, portulacæ succus efferuefactus & sumptus, adiumentū est. Muria conditarum oliuarum (quas Græci *οὐλκῆρας* dicunt) leuigatarū, oleum calidum ex oliuis nondū maturis, aut lentiscinū, aut melinū: amurca item, aridaq; erugo ferri, aut æris, radix aristolochiæ, plantaginis semen bis phryctum, atramentū sutorium coctum, atque cytini, hæc singula quidem ad rem plurimum faciunt.

Ad ea quæ pectus iuerunt labra.

ADuersus labia affecta, amurcæ elixam, aut illud, inungito: Sumito adiapem anserinum cum melle terebinthinaq; pari pondere, floris rosarū, hyssopi, rosacei singulorum perexiguum.

ADuersus tumorem sub lingua, quem appellant Batrachum.

Batrachus, tumor est cum inflammatione sub lingua, maxime pueros infestans: in cuius curatione adhibendæ sunt pertrictiones quæ fiunt cum misy, erugine rasili æquis portionibus siccis. Mento autem applicabis eam

cōpositionē quā Græci *αἰδουρὸν* nominant, aut sphæriū, aut parygrū ex ouis cōcinnatū. Venam postremo sub lingua secare expedit. Aliud: Alterū ad aphthas quoq; facit: habet id quidē ferruginis rasilis, gallæ, chalcitidis pares partes: cū passo uero est diaclysmā, quod est ablutio. Aliud: Tertium ex his constat: Orofino antea cū melle absterfum, galla leuigata cum melle circumlinito, aut rosarū flores similiter, uel iure foliorū oliuæ abluio.

Ad Paristhmiorum phlegmonem.

Quod si in febris paristhmia, id est, glandulæ & columella inflantur, gargarisationes cum furfurum, aut rosarum, aut palmularū, aut myxarum, aut lentiū decocto, cōpetunt. Sed remittente phlegmone, aut in summo uigore, mel quoq; iam dictis commiscendum est, quod ab initio nequaq; conueniebat facere, neq; etiam in eius mali augmento, ne acuminē fluxum cieat & attrahat. At si ad suppurationē iam perducta disrumptur, mulso gargarissandū est, aut cum lenticulæ aut rosarum elixatione: perseuerare, atq; per plures dies idem fieri, usq; ad numeris omnibus exactam solutionem, oportet: aut stomaticam, hoc est ori inseruientem ablutio nem gargarissandam dare expedit. Vbi uero pestiferæ exulcerationes tonsillares, quæ *παιδίδια* Græci appellant, occuparint, utendū quidem præscriptis: priuatim uero adiicienda est ea quæ ex moris conficitur, *ἡ μίση* appellata confectio, unā cum aqua calida, aut hydromel cōplectens florem rosarū funiculo traiectarū, aut costum, aut rhum obsoniorū, uel arida uel elixa, uel glauci deniq; foliorū aridorū decoctū. Est quidem illud peramarū, sed optime cōducit, si succū, quod in collyrijs solemus, mulso solutas: ipsius uero fruticuli aridi inflati cōmodissimus est usus, aut dactylo attacti. Danda autē est opera, ne aut omnino manibus attingant, aut permolliter admodum atq; suspensa, ut aiunt, manu demulceantur. Auxilio præterea sæpe numero fuit Andronii trochiscus. Atqui post istas irritationes, gargarisationes cum iure glycyrrhizæ facito, aut *ἡ σκευήλητα*, & croco, & chia, & myrrha: postremo uero amylo, et tragachanta. Irroborata uero noma, cōfectione lactis *ἡ γάλακτος* appellata, & Samia creta gargarissandū. Aliud: Malum punicū dulce cum testis incidatur, succiq; expressi partes sex, cum mellis una confusæ, donec crassitudinem habeant mellis spissi, decoquantur, & sic denique inungantur. Aliud: Constat ex gallæ immaturæ uncijis duabus, aluminis fissilis uncia una, salis ammoniaci assati uncia una, his aridis leniter attinge. Aliud: Recipit illud gallæ drachmas octo, misyos drachmas duas, salis assati drachmas quinque, eo medicamento arido utere. Est porro et Antias *ἡ παιδίδια*, hoc est, tonsillarū durus tumor.

Antias.

De oris columella.

Oris columella, quā uam uulgò nuncupāt, phlegmone infectata, gargarisationibus quarum in tonsillarū inflammatione usus est, medicocriter item stipatibus, utendū: cuiusmodi est, succus mali Punici, cochleario aut instrumento quod Staphylepartum nomināt suppositus, idēq; tum per se, tum adiecto melle, quantum satis est decocto, aut dulci radice permixta

mali

Si noma tonsillar occupet, quid sciendū.

malī Punici liquori. Benefacit in uuæ quoq; inflammatione, dulcis radi-
cis cremor cum melle, si indatur. Reprimit præterea & refrenat eius ma-
li impetum Hæmatites lapis, necnō & Phrygius pondo ceratium, & age-
ratum, & *ἀσθὶ λίθου φρυγίου* ædœicum, hoc est, confectio ex Phrygio lapide pu-
dendis factum, & terra Samia, & eretria, & rubrica sinopis, & rubrica Le-
monia, & omphaciū, qui ex uuis acerbis expressus succus est, per se, & cum
horum aliquo: & acanthes Aegyptiæ fructus, & alumen scissile, rosæ cum
semen tum folia, mitius & blandius operantur. Adhuc etiam mansuetius
gummi tragacantha, sarcocolla, amyllum, efficaciam suam exerunt, quibus
10 utiq; potissimum utendum, si quid in corpore torqueatur oppressumq; fue-
rit, incitatum ab astringentibus. Sed equaliter crassa quum ipsa existat, quā
ἀσθὶ, hoc est columnam appellant, gargarismatis fidendum, & confectio-
nibus *ἀσθὶ σμύρνης*, croci & cyperei. Cæterum circumfissiones corraiones uel
columelle uel omnino uitato, uel cum solitudine obseruato, atq; penna po-
tius circūlinito. Hactenus quidem incomposita: permixtum uero medica-
mentum hoc est. Recipit autem rhoos Syriaci drachmas octo, croci drach-
quatuor, costi drachmas octo, seminis rosarum drachmas quatuor. Cæte-
rum gingiuis conducit linamentū ē purpura marina, circūpositum collo ui-
peræ, atq; ubi id suffocauerit ipsam, deinde applicatū. Mirum certe quan-
20 tum hoc opis cum ad tonsillas, tum ad quæcunq; colli uitia conferat, cuius
rei testis locupletissimus Galenus est.

Ad sanguinis eruptiones ex ore.

Sanguinis eruptiones ex ore cōpescas, si porri folia incisa quassataue im-
Sposueris, aut si spongiam inanem concisam, in picem crudam cōcrema-
ueris, & leuigans utare. Vtilissima uero sunt diaclysmata, hoc est collutio-
nes, puta rosarum aridarum seu uiridium, decoctio frigida aut capreolo-
rum rubi, aut lentisci foliorū, aut rubi, aut malorū cotoniorū, aut rosarum,
aut acinorū (quæ *γίγαντες* græce dicunt) aut lenticularū deniq; elixatio.

De angina, atq; cognatis & adiacentibus huic uitij, inibiq; de strangulatis,
aut alijs quodammodo suffocatis dicitur. Cap. XXXVII

30



Inflammatis faucium interioribus musculis, ea oris affectio fit,
quæ Græcis *σπαστική*, Romanis angina dicitur: exterioribus aut
phlegmone infestatis, ea quæ *σπασματική*. Pari quoq; modo &
in gutture, cuius inflammatis interioribus quidem musculis

σπαστική,
σπασματι-
κή,
κωστική,
σπασμα-
τική.

exterioribus uero *σπασματική* nascitur. Omnium ferme eadem euenta
sunt: uerbi causa, non nisi recta ceruice spiratio, quæ *ἐσθέρπνοα* dicitur, & do-
lor, cum difficultate respiratio, quam *δυσπνοα* græce nuncupant: in nōnul-
lis etiā febris, ruborq; cum uultus tum & colli, atq; tumor quoq; in quibus-
dam: tum sanē os perpetuō hians atq; diductū habent, & deglutire omni-
40 nō nequeūt. Cæterum qui cynanche impetuntur, eos nonnunquam suffo-
catio comitatur. Torquentur autem ea affectione potissimū pulsiones, quū
uertebꝛæ colli dolent, qua sunt rarissimæ. E cataplasmi eiusmodi prouenit af-
fectio, Cæterū his tanq; deploratis & incurabilibus, manus admouenda

non est: cæteris uero confestim uena cubitus aperienda est, & euacuandū quidem non affatim cumulatimq̃, sed sensim & pedetentim, in futurū tempus subinde partem bene magnam reiicientes administrātes: ue: nam quū prae uiolenta & immodica inanitione in animi deliquium cadunt, suffocationis periculum superuenit, confluyente ubertim in affectam partem materia. Non intumentibus uero propter hæc, uenæ quoque sub lingua secandæ sunt: aut lingua etiam ipsa, si exerta magis aut infrenatior uideatur, incidenda est. Aluus deinde acriore clysmate ducenda: pedes adhæc perfundendi aqua calida, extremæq̃ corporis partes ualide ligandæ sunt. Lanis item succidis collum protegere, aut irrigationibus olei, & cum hordeacea polenta cataplasma imponere, expedit. Porro ab initio statim, si idem quidem rebus quæ de phlegmone tonsillarū memorata sunt, synanchicis quoque gargarizandū, aut simplici saltem diamoro, cum elixatione rhoos. Nobilius aut fuerit quod ex syluestribus moris institutum est, diamoron. Post hæc uero & composito diamoro, aut compositione ex carycis, *ἢ νάρκυσσος* appellata, circumliniantur. Morbo uero in summo incremento uigente, niri quoque pusillum admiscendum est, aut sulphuris etiam ignem non experti, quod *ἔρυσις* uocāt, nisi calamitas aliqua prohibeat. Oletū præterea caninū aridum, sectum & contritū, cumq̃ melle illitum, presentissimū censetur medicamentū, atq̃ ex hoc candidum præcipue: & syluestriū hirundinū cinis steracus ue haud dissimiliter prodest. Perseuerante uero diutius ea affectione, illinitio quæ ex besasa constituit, utendū est. Interdū quidē eius potentia aliorū medicaminū cōmixtione resoluentes, nōnunq̃ uero denuo intendentes. Probat in angina quoque curatione, cucurbitularū & hirudinum admissio, quæ cum mento tum collo sunt applicanda: atqui si qui laborat, robustior est, anagargarismatis quæ cōstant iride, hyssopo, melanchio, abrotono, glycyrrhiza, carycis, in mulso decoctis, aut rutæ cremore cū lacte, aut sinapi cum oxymelite, utendum. Si qua autem asperitas inde nascitur, exhibendū est illis oleum: perq̃ utilissimū uero calidū, aut rosaceū per se, aut cum liquore pisanæ, aut scenogræci, ad gargarizandum. Cæterum alimentum eorundem mulsum esto, usque ad diem tertium, à quo cremor pisanæ cum potione aliqua suauis propinandus est, deinde & ouorum uitella perliquida. Vtus item sorbitionum ex chondro cōmendatur. Porro conuenientibus uirtuti languentis edulijs iugiter utendum. Malo autem remittente, & in morbi declinationibus, quum ad inambulationem tum in lauacrum perducemus. Sedes porro cerota ex oleo rutaceo confecta integamus, & reliquo cōuenienter nutritu educationeq̃ uirium focillatrice utamur. Nemini in super suspendio strangulorum aut præfocatorū nondum moruorum, quibus spuma circa os fuerit, manus admouēda est, suadente Hippocrate. Alij uero uitæ restituunt ac conualescunt, si acetum infundas, atq̃ piper, aut urticæ semen in aceto acerrimo contritū: sed aut respuunt omnino, aut ægre admodum suscipiunt: cogendū ergo ad hoc sunt. Verum ruboribus qui collum occupauerant dissolutis remissisq̃, statim oculos attolunt,

Stercus ca
pinum.

Cibus angina
laborantium.

lunt redeuntq; ac liberantur. Consimiliter autem & in naufragis & penitus suffocatis, excitatur enim his recreaturq; caliditas.

De Coryza, id est grauedine: & catarrho, quod est desillatione: & arteriacis, quod sonat rauca: ac tussis deniq; Cap. XXXVIII



Omnis quidem coryzae, catarrho, raucedini, tussiq; est excrementosi à capite humoris in subiectas partes descensus: qui si in nares destillando ingruit, & easdem aggrauat, Coryza ma-

Coryza.
Catarrhus.

lo nomen est: Si uero per palatū in fauces influat, Catarrhus simpliciter appellatur: Sin autem idem humoris descensus in guttur & asperā
 10 arteriam deferatur, atq; interiorē eius membranā salebrosā reddiderit, tum uox rauca comitatur, appellantq; Branchum siue arteriacū malum. Branchus.
 Nec tantū hoc modo, ē capite scilicet eadente catarrho, raucedo p̄rouenit, sed ex uehementiore quoq; & altiore uociferationis conatu, et egelidi aëris spiritus ue ingressu pariter sentitur, cum inflāatione. Perseueranteq; diutius malo, fluxuq; hoc in pectus pulmonesq; descendente, malefica ac periculosa sequuntur tussēs. Cæterum ex alijs quoq; occasionibus tussis fit, sæpius quidem ex distemperantia, quandoq; uidelicet calidiore, ceu in febribus, nonnunq; frigidiore, quemadmodū in tempestatibus Aquilonijs, quæ aridior plerunq; est. Quin & tussis aliorum sæpenumero morborum
 20 symptōma fit: uerbi causa, morbi lateralis, quem *πλευριτις* uocant, iocinosorum, item & phthisicorū tabidorū ue, morborūq; pulmonis. Proinde Galenus inter diuturnas tussēs recenset *χαλασμός*, id est grandinū quarundam reiectionē à thorace fieri. Alexander uero lapidem quendā ponderosum, uelut in ureticis frequenter fieri solet, in diuturnitate tussis redditum perhibet, in quibus cessasse tussim asserit. Nos aut in uomitu sanguinis, lapidum excretionē uidimus, tanq; illic essent nati. Sed pressius & exactius historiam memorabimus. Quicumq; igitur ex aestu, coryza aut catarrho uexantur, circa partes affectas caloris nōnihil sentiunt: fluxio quædam acriū humorū ac tenuium cum per nares tum per os defluit: rubor partes faciei
 30 nariumq; inficit. Quibus cōtrā ex frigore, partiū circa caput & frontem fit distentio, meatuumq; qui à percolandi adminiculo isthmoides uocant obstruatio, ita ut resonare uox deorsum per nares nequeat, longiore illis tempore permanent & accidunt tussēs, pituitæq; excretio, nunc quidē crudæ, nunc uero liquidæ, interdū autem uiridis. Nonnullis uero febris oboritur: eos quidem qui ex aestu impetuntur, nihil adiuuans: sed qui ex algore instantur, concoctionis quoq; functionē promouet.

Branchus.

Tussis.

Grandis lapis
tussis celsus.

Signa Coryzae
ex aestu.

Note ex frigore.

Curatio catarrhi atque coryzae.

Quum igitur distemperamentū caloris naturæ modum plus iusto exuperat, cuncta conueniet adhibere præsidia, quæ ex eadem occasione
 40 caput dolentibus competūt. Lauacris tamen præter ea utendū: caput item permulta calida conspergendū. Alimenta adhuc ea in hac affectione constitutis quadrant, quæ sorberi commodissime queunt, & ob id sorbitiones uocantur, ouaq; sorbilia, & amydon, placenta quæ ex melle & sesamo con-

Calidi catarrhi curatio.

ficiuntur, & sesama. Eiusdem farinae sunt & amygdala, & coni fructus, & quaecūq; ex lacte cōcinnantur secundae mensae seu cupediae, quae graece *πικρατα* nuncupant. Ex uinis uero, dulcia, nō perantiqua: eōs capitū papaueris linctus, quod medicamentū *ικλυβρ* uocat, & quae adhuc cōposita sunt praesidia. Quod si ex gelida fuerint intemperie nata haec mala, et morbus sitis solubilis, permodico contentū esse oportet nutritu, quā *δυσενσίου* Graeci nominant. Confert item capitis, ē calidis & subtiliū partiū rebus, nardino, rutaq; constituta circūlinidio. Irinum uero nō illiniendum solum, sed & naribus instillandū. Perungendae quoq; sunt intus eadem thure & myrrha adiecto oleo, maxime uero eorum, qui ex frigida causa coryza, hoc est gra¹⁰ uedine, affliguntur. Nonnullis uero & odoramenta per reijculam (quod est tenuius & longo usu attritū uestium fragmentum) melanchij cremati, aut cymini, non tam deusta in quā, quā indita & illigata lacerato (ut dixerimus) panniculo, praesenti fuerunt auxilio: & ea aromatu atq; incensi, quae Aegyptij sacerdotes oblectantur, cōcinnatio, Cyphi ab illis appellata. Sec¹⁵ linia cum autem, id est lunare, Cyphi hic loci exigo, quae quidem odoribus & incensis excipiantur, & fronti undique circumliniantur, in quam unum ex emplastris citra ardorem adglutinato: ē quorū numero est Icesios, emplastrum uel Icesij, aut oxera, aut Barbarū, aut Athena. Ceterum aduersus quoq; catarrhū frigidū, Cyphi in potu sumere expedit. Secundū uero pe²⁰ ctus balsami succus in lana succida illiniendus est: fouendū etiam ab omni parte ipsum cum styrace, & irino, & anethino, alimentis praecalidioribus, & concoctioni nihil renitentibus, utendū. Iam uero materia catarrhi cōcocta, apophlegmatismus sic habentibus cōueniet, et sine gmata capitis: uerbi causa, sapo Constantini, & eiusdem farinae facultatisq; cetera.

Raucedinis, Arteriacorum uel curatio.

AT qui Arteriaci Branchiā uulgò dicuntur, istis quidē, cum eis quae mox recensuimus, tum uero priuatim, si pituitosa arteriam ac guttur occupauerit affectio, ab initio statim quae emplastri modo illiniuntur, suppetijs utendum praecipio, tantisper dum phlegmone mediocrior reddat: cuius³⁰ generis omnino sunt passii Cretici, & tragacanthae, & cōmeos, & amyli, & tenellarum palmularum denique decoctum, & dulcis radicis cum *σπις*, ad mellis spissi crassitudinē. Probatur etiam usus hypoglottidū, sic, quod sub lingua teneant, appellatarū. Sed ante omnia à uini potu abstinentū raucis est: suae autem uinum siue passum, inflammatione moderata existente, potui detur: forbitionibusq; ex melle & lacte cum amylo, aut pane siligineo, atq; ex amygdalis utatur: butyrum assumatur. Qui uero humiditas aliqua artus occupat, ea quae maxime abstergunt medicamenta aggredi oportet, qualia sunt fabulum elixum, & cum melle confecta, & brasicae, & scite elixum porrū. Pharmaca porro magis calorifica, & quae ad *πύρεσιν* faciunt,⁴⁰ Adhaec praeterea ē cariarum sirao, & thure, & iride, & terebinthina, styra ceq; & galbano, pipere, cinamomo, cassia, & his non dissimilibus.

De tussi.

Cæterum tussibus parī eademq; methodo medendum est: illud duntaxat absq; perpendione prætereundum nō est, per consensum ne (quā *συνέκλειον* græce uocant) cæterorum membrorum quis tussiat: uerbi causa, gurgulione uuaue instillante, aut capite, & an morborū aliorū symptōma sit. Cæterum his quantum fieri potest, & secundum quem iam pridem diximus, & mox enumerabimus modum, prospiciendum & consulendū est. Composita uero eius mali præsidia, deinceps serie quadam exponam.

Catapotia, id est globuli medendo catarrho ac tussi.

- 10 **C**atapotia quę utiliter contra destillationē tussimq; sumuntur, recipiunt hæc: styracis, myrrhæ, opij, hoc est succi papaueris, parem uniuscuiusque portionē excipiens, aut singula per se in mortario contundens, conformato orobizæ coccia, id est, erui instar granula, quas uulgò pilulas nominant, quorū exhibe lectū petenti tria aut quatuor, aut quinq; passumq; forbeat. Hæc quippe ad acrem & subtilem faciūt fluxionē. Aliud: Alterū hæc habet: herbæ apollinaris seminis drachmæ duodecim, strobiliorū drachmæ sex, croci drachmę duæ, elixatione aut passo excipiant atq; utantur.

Eligma seu linctus.

- 20 **A**ccipe mellis unciā unam, butyri semunciā, omnia simul coquantur & exhibeantur. Hyssopi præterea & ficuum, & nucleorum pineorum, & iridos decoctum, ea affectione afflictus sorbeat.

Catapotia pro ijs qui diutino malo uexantur.

Svmto styracis drachmas sex, myrrhæ drachmas duas & semissem, terebinthinæ, galbani, opopanax, ireos, singulorū drachmas duas, piperis albi, nitri, seminis herbæ apollinaris quem *ύερωνύαμιν* dicunt, succi papaueris uniuscuiusq; drachmam unam, his simul absq; ullo humore in pila contusis, catapotia effingito, atque eo quo docuimus modo, utitor.

Arcendis salebris branchi seu gutturis, tussi, cruentisq; sputis.

- 30 **A**duersus raucedinem, tussim, spuitionesq; cruentas, efficax satis medicamentū est, quod accipit, amygdala amara dealbata uiginti quinque, seminis lini torrefacti drachmas quatuor, tragacanthi drachmas duas, nucleipinei, quod *σπείδιον* dicunt, grana triginta, oui in adipe assati putamen: Ipsa tragacantha in aqua irrigatur, totum uero uno fæce passo excipitur. Quod si fractæ quoque uocis sonus edatur, passi loco mellis aliquid cōfundito, & præsertim in quibus nonnihil sursum ferri & ejci expedit.

Arteriaca hypoglossis, uoce interceptis, & branchicis.

- 40 **T**ragacanthæ drachmæ sex, commeos drachmæ totidem, thuris drachma una & semis, piperis candidi grana uiginti, croci drachma una, succi glycyrrhizæ drachmæ sex, phcenicobalanorum numero tres, caroglyceos Cretici quantum satis est. Cæterum solus ipse tragacanthæ succus linguae suppositus, pro cremore glycyrrhizæ, dilutumq; ipsius ad crassitudinem usque elixum, impendio confert. Ipsa porro qua de agitur decoctio quadruplum abijcit.

Ad amissum sonum & interceptum, extremamq; rauedinem,
Phonascicis quoque congruens.

Retusæ uoci curandæ, porra sex ad defecationem seu aporritosim usque decoquito, & ipsas quidem feces porricito: liquorem uero alicæ cum melle aquæ cōmisceto, & ouorum antea elixatorum putamina tria unā decoquito, commouens subinde anetho clonio.

Bechicum tussientibus utile.

Accipe pulegij uncias duas, nucleorum pineæ, feminis cnici, feminis liani, uniuscuiusq; unciam unam, piperis cocti uncias quatuor: quæ simul in melle despumato excipito, elixatoue. Aliud: Hyssopi, pulegij, piperis, singulorum uncia una, petroselinum uncia semis, mellis hemina excepta, eis qui tussi uexantur plurimum auxiliij conferunt.

Maturatuum in ueterrate tussis.

Vbi mellis drachmæ sedecim, terebinthinæ drachmæ duæ, galbani drachmæ quatuordecim unā coxerint, in formulas digerito, quæ fabæ magnitudinem æquent, & instar nucis ponticæ, à Latinis auellanae nuncupatæ, & hæc ore uolutando sugendoq; absumat. Aliud: Tussi aridæ arte riaca medentur, & urcei aquæ interdum forbillatio: sputum enim propter crassitudinem pituitæ non reiicientes, liquidis aliquantulum adiuuabunt. Accōmodatissimum præterea hac passione affectis, tum hyssopi, tumiri: dos, tum nucis pineæ decoctum.

Trochiscus, cuius fumus aduersus tussim continuam præsentaneum est remedium.

Styracis, piperis, mastiches, petroselinum, singulorum unciam unam, sandarachæ diobolos sex, coccodaphna duo melle excipiens fumigato, potens in carbones ita, ut ex fornace fumus tulle laborantē petat & aspiret. Prodest illud uero & quocunq; modo perfrigeratis.

De Orthopnoea, Asthmate, id est anhelatione, &

Dyspnoea. Cap. XXXIX

Hos qui sine febre crebra respiratione, tanquam à citatiore cursu afficiantur, ab eo qui comitatur & præstō est confestim anhelitu & suspirio, asthmaticos nuncupant: eosdemq; propterea quod strangulari formidantes, ad respirationem recta ceruice, rectoq; toto pectore nituntur, orthopnoicos dicunt. Oritur aut eadem affectio, crassis & glutinosis humoribus oppletis fistulosis pulmonum cōcauitatibus. Dyspnoea uero, hoc est, spiritus & animæ difficultas, cōmune est symptoma, cum hæc tum alia plurima mala comitant. Porro asthmaticorū (hoc est suspirioforū) medendi scopus est, dissipatio consumptioq; uiscidi crassiq; humoris, id quod haud inefficaciter medicamentis attenuantibus & abstergentibus consequimur: Proinde acetum scilliticum hoc malo opto pressis accōmodatissimum est: necnon & inde confectum oxymel in potu sumptum: atq; ipsa quoq; scilla cocta, cum melle cōtrita: & ex antidotis hiera. Necq; aliena fuerit continua uehementium pharmacorum expurgatio: & cum

& cum raphanis citati uomitus. Eandem quoque functionem obit aristolo-
chia rotunda dum bibi, centaurij maioris radix, spondylii tum semen tum
radix, hyssopū, iris, & melanthiū deniq: Asellorū item sub situlis xestam
uasi insiciens fictili, super carbonibus torrefacito: ubi uero alborem quen-
dam induere coeperint, conterito, atq; in melle despumato excipiens, my-
strum tam prima mensa quā secunda, cum ante tum post aliū cibum por-
rigo. Quod si usus & necessitas expetatur et urgeat, ante omnia uenam ape-
rito, & secundum laborantis uires euacuato: aluus item clysmis irritanda
est: foris autem pectori ficus, & lolij farinam & hordeaceam cataplasma-
tis modo imposito, resinam interim habens ceram atque mel. Inspargatur
autem illi iris mannaq;. Non alienum quoque fuerit farinam hordeaceam,
quam ἰσχυρὸν λόνιον Græci uocant, cum rhelina, cera, iride, mannaq; empla-
stri more adglutinare. Circumlinationibus præterea utendum admodum
calorificis, irino uidelicet oleo, anethino item, & rutaceo. Multo autem se-
cretius illud est, quod hæc quidem accipit: Pumicis medimnū unum, sphe-
des (quæ est fex uini) medimnos quatuor, spumæ nitri ceratium, hæc o-
mnia cōtusa & cribrata inunctione excipito, & cum hoc partes ad pectus
attinentes perfricato: Postremo malagmatum quoque usus cōmendatur,
eorum potissimum, quæ sanies & aquosos sanguinis humores, quos ἰχθυῖες
græcenuncupant, extrahendi potestatem obtinent.

Pro suspiriosis potio.

A Schmaticis & anhelis hæc potio confert, quæ habet polij, abrotoni, ca-
stori, chamæpityos (quæ Aiuga, coactaq; breuitatis ad terram picea
Romanis dicit) guttæ ammoniacæ thymiamatos tantundē melle cōspersa
exhibeto. Aliter: Sunt nonnulli qui spumæ nitri cochlearium tribus
aquæ mulsæ cyathis mixtum propinant. Aliud: Spumæ nitri drach-
mæ nouem, piperis drach. una, laserpitij drachma semis, cochleario aquæ
potui dentur. Aliud: Castori, guttæ ammoniacæ thymiamatis, singu-
lorum drachmæ sex, piperis grana quadraginta passo excipiantur, & fabe
magnitudinē cum mulso exhibeto. Aliud: Sinapeos drachma una, spu-
mæ nitri triobolum, elaterij dichalcū, quod est hemiocholū, totum hoc in or-
biculos (quos προχόνος græce, pastillos latine nominant) octo cōformato,
in singulos dies duos modò deglutandos exhibeto: purgant namq; per su-
perna sine dolore & molestia. Cæterum in his qui ueluti obtorto collo tan-
tum non suffocantur, dato spumæ nitri drachmas treis, cum hydromelitis
cyathis tribus, atque cum cardamomo nōnunquam, & confestim opitula-
tur. Verum hoc plurimum quoque ischiadicis, hoc est coxendice laboran-
tibus adiumenti confert.

De peripneumonia, pulmonaria inflammatione. Cap. xxx

Pulmonaria, quam πνευμονία Græci appellant, pulmonis in-
flammatio est, quæ ex ualentiore à capite in eam partem destilla-
tione, aut angina, quam σπασγίαν, aut suspirio, quod ἰσχυρία, aut

dolore laterali, quem *πλευρικός* græce indigitant, aut alijs ex malis, magna ex parte ortum habent. Nonnunquā uero affectionis huius caput sola est inflammatio, comitaturq; eam *δύσπνοια*, hoc est, spiritus ac animæ angustia: febris cum acuta tum adurens: grauitas item, & pectoris distentio, tumor, & permulta plenitudo faciei, quæ sursum uergere facit impetum materię instar ignis. Rubescunt præterea his qui hoc malo tentantur eminentiores sub oculis partes, quas Græci *μύλα* nuncupant: inflantur pariter oculi ipsi, & feruntur supercilia deorsum, & corneæ oculi tunicæ *κριαβισθός* à Græcis nuncupatę, pinguiusculę esse seu pleniores uidentur. Porro indicium eorū qui in ardentiozem declinant febriculam, ignita rubedo cum inflammatio- 10 ne (quod græce *ὑποπύλινος* dicitur) pulmonis coniectanda est. In his igitur qui ex morbis alijs in hoc reciderūt, uenę incisio petenda est: maxime uero si diutius durauerit malum, aut ab initio sanguinē per uenam detrahete superfederint. Aluus insuper dura & quæ difficulter deſcīt, lauaminibus quos clysteres uocāt, in relaxationibus abluenda est. Aut cucurbitulę persingentes cōpluresq; circūcisā scāpello cute, pectori si nihil obſtet, adglutinandę sunt, & lateribus cōsimiliter. Quod si peripneumonię cōfestim ab initio fuit affectio, cōcedentibus quidem in hoc numeris, uena secanda est: sin aut minus, cucurbitulę imponendę sunt, sanguinē pro uiribus laborantis euacuantēs. Ad hæc sorbitiones quoq; cremoris ptisanę, chondri, cum 20 melle assumantur, aut ex amygdalis amaris cum siligine, similauę, quā *σφιμακλή* Græci nominant, aut chondro, confusis pariter potionibus aliq̃t suauibus, hydromalo (quæ est ex aqua & malomelle confectio) aut ex melle, aut hydrosolato deniq; cōfecta sorbillamenta. Vtile fuerit impendio quocūque butyrum, quantū capiunt cochlearia tria. Bibendum autem est in hac affectione constitutis prius ius ficuum cum elixatione hyssopi, aut ireos in mulso percoctū, aut iridōs leuigatę tritęq; mensura duūm cochleariorum, quę melicrato conspersa sint: hoc sanē & per inferna expurgat. Cæterum quantum ad uirium custodiam attinet, crebrius illis melicrati potio sine additamento per se repētendā est, uel cum fructibus pinus, seu piceis, quę græce *πινύδες* dicuntur, & cucumere. Vniuerso præterea thoraci, atque lateribus ipsis cerota cyprina, quæ irim admixtam habeat: aut cerota ex oleo rutaceo & iride arida confecta: aut ea quæ ē cera & resina, & medulla, & butyro, & hyssopo, & iride, in farinam trita, & unguine nardino instituatur, imponenda est.

De sanguinis sputatione. Cap. XXXI



Vod si sanguinis reiectio, ruptis uiolenter uenarū uasculis, sanguine inde in asperam arteriam manante, per os fit, affatim euacuabitur, & quandoque quidem ex euidenti aliqua occasione: uerbi causa, si accadat ex clamore, & id genus alijs. Nonnūq̃ 44 uero abdita quapiā causa, puta plenitate aut frigiditate nimīū iustū naturę modū transgrediunte: frigus nanq; intensius uenas, testante Hippocrate, rumpit.

rumpt. Si uero eadem sanguinis sputatio ad uenarum erosionem retulerit
 originem, nō acruatim, sed sensim pedetentimq; sanguinem excreatur: acris
 quædam & praua edulia præcesserunt: aut cibi abstinentia, quam
 Græci nominant: aut destillatio à capite in pectus, acrimoniam præferens.
 Vbi autem uasorū sanguinis apertione, quam ἀσθμασίου græce appellant,
 sputum eius humoris efficitur, nihil quidem eorum, quæ hætenus enume-
 rauimus, accidit, quoniam nulla unquam satietas aut plenitudo præcessit,
 sed uictus ratio humidior atque calidior, lauacrorumq; intemperatorū u-
 sus: & nimium calidis locis situm domiciliū, ijs mali causa esse apparet: Et
 neq; in inflammationibus, neq; in febribus, neq; in doloribus fiunt, quem-
 admodum ijs, qui ex erosione in hunc affectum incidunt. Contrā uero to-
 lerabilius habebunt, ut uerisimile est, euacuati. Quum porro hæmorrhoi-
 des, purgationes uel muliebres retentæ atque impeditæ fuerint, etiam peri-
 culis hæc liberabunt. Eadem accidit cōmoditas ijs, qui ob redundantiam
 sanguinem erumpunt, nisi propter hunc, aut immodicam inanitionem læ-
 dantur. Iam uero secundum erosionem sanguinis euacuatio, nunquam be-
 ne cedit. Atqui si per uomitionem sursum fertur & efficitur, confessum est,
 quod ex partibus quæ ad stomachum aut uentrem attinent, effertur, in qui-
 bus quod per secessum defecit, aliquando euacuatur: sin autem cum tussi, à
 spiritalibus. At si spumofum fuerit sputum atq; subcandidum, & ex inter-
 uallo absq; ullo dolore angustiaq; extrahitur, è pulmone id latū arguitur,
 que declarat. In quibus temporis progressu & febris cōtinua sequitur, præ-
 cipue quibus propter erosionem, aliquid substantiæ pulmonis, aut guttur,
 aut uena redditur. Nouimus uero quempiam sanguinem è pulmone sputo
 efficientem, procedente tempore cum maxima tussi & sanguine copioso la-
 pides expuisse quatuor aut quinque asperos, ceu pumicatos, magnitudo ue-
 ro ceratiorū trium aut quatuor, & continuo quidem leuatus meliuscule ha-
 buit: haud multo uero post in tabem incidit, atq; fato functus est. Si quan-
 do uero & pituitosa excreantur cum leuiore tussicula, aut screatione quoq;
 tum spumofum tum leue quod effertur fuerit, ex trachea, hoc est, aspera ar-
 teria reijci cognoscito. Quod si sanguis ater fuerit, atque in exigua frustula
 & quasi minimos globulos concretus & densatus, doloremq; loci præfe-
 rat, à pectore efferrī portenditur per pulmonem siue guttur, facta transum-
 ptione. Quæ uero sursum uersus cum screatu fit latio, ex partibus ad gut-
 tur attinentibus, per palatum efficitur. Si quando autem à capite destillaue-
 rit, cum irritatione quadam & tussi redditur, defluente eo, quicquid id est,
 in guttur fauces uel, quem λάρυγξ græce cognominant, & rursus regurgi-
 tante. Hæc autem acer magna ex parte catarrhus, aut capitis dolor, aut graue
 do præcedit. Nōnunq; autem per palatum sanguinis fit euacuatio, idq; ap-
 posita hirudine tum exugente tum affixa alicui partium. Cæterum in com-
 mentariolo de letalibus uenenis super hac re fusius prosequemur.

Sanguinis spu-
 ti ex diabrofi
 nota.

Note ex ana-
 stomofis.

Lapides è pul-
 mone eieffi.

Curatio.

Qui catarrho afflicti sanguinem expuunt, ijs mox uenā aperire: si ingenti

*visus coram
qui sanguinem
ob catarrham
expuunt.*

acrimonia, ea à capite in pectus destillatio uacet: Et symmetron, hoc est, intra omnē excessum, habita diligenti uirū perpenſione, detrahère cōuenit. Extremæ adhæc partes uinciendæ, cumq; oleo ueteri calido aut sicyonio perfricandæ, excepto capite. Alantur esculentis quæ succum aliquem aut sterum commixtum habeant, cuiusmodi est malorum Punicorum, apiorū, aut eadem ipsa unà decoquito. Eunt uero iam iam dormitum, trochiscos ex electro cōcinnatos exhibeto. Tercio quoque die, mellis despumati, nō crudi pusillum linctui præbeto. Si hæc à morbo obstinate permanente uincantur, tum detonso capiti sterus syluestrium columbarū confecto medicamine imposito, et post treis horas tollens medicamentū, in balneolum perdū cito, neutiq; tamen perungens caput: deinde sorbilationibus enutrens, lectum petenti theriacā antidotū dato: rursusq; postridie eadem præstans, parī modo corpus uniuersum perfricato, dempto (ut dixi) capite, cui utiq; cerota è thapsia imponenda est, aut quedam alia, rursusq; sorbitiones repetendæ. Quibus rite perpetratis, si malū persistat, cucurbitulæ occipiti utiliter adglutinent. Atqui si acutus fuerit ille catarrhus destillatio uel sanguis per uenam omnino detrahendus est. Alimentis præterea, alijsq; prædictis, quorum per cōmodum usum esse profligando catarrho suprà peculiari, & huic rei dedicato sermone docuimus, utendum est, atq; his etiā quæ nuper

*Cura sanguinis
ob frigus ex
putatione.*

enumerauimus cibus. Porro qui propter frigus sanguinē expuunt, ijs sanè rebus quæ etiā exiccant, pectus calcaciendum est: cōfectioq; id est è duobus piperum generibus, suppeditanda, unà cum eo, qui ex electro constituitur, pastillo. Iam uero ab respirationis & animæ instrumentis, propter rupturam aut uasculorū sanguinis apertionem, sanguinem reſcientibus, uenā sine mora secato, nisi magna sanguinis uis erumpat et esse ratur. Omnes uero decumbant facito, in locis uento expositis, in lecto, qui neq; sursum neq; deorsum, nec etiā ultro citroq; moueatur, immobili situ, cauentes ne uehementer uel respirent, uel eloquant. Conspargendæ autē afflicte partes sunt; spongijs posca tepida imbutis. Post septimanā uero, lanis succidis cum rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino: nōnunq; quidem cum aceto, interdū uero cum uino adstringente acerboue. Plurima autē existente abundantia impetuq; multo, pollinem & mannam adiecto etiam aceto imponamus, aut alumen & acaciam, aut malicoria, aut gallam seu cecidia cum aceto, aut palmulas cum farina aut malis cotonijs coctas in uino austero. Post hæc uero et ex salicibus confectum, imponendū emplastrū est, & præcipue si mediocris fuerit eruptio ac copia. Per os autē hæc conferunt: Portulaca commanducata, bene admodum facit: efficacior uero multo succus eius imbibitus, balauſtiū, rubi cum fructus tum flos, quercus membrana ceum, & nucleus sub putamine glandis, potissime uero ipsis elixis utantur: phygi item priniq; fruticis maior efficacia & strenuitas est. Samius aster, ad omnem sanguinis reiectionem facit: Lemniū item sigillū, lapis hæmatites leuigatissimus cum succo mali Punici, aut herbæ sanguinalis. Lapidis uero sit quantitas scrupuli unius. Hactenus simplicia: composita uero quæ præsidio

præsidio esse possunt in hac affectione constitutis, sunt, orbiculus ex ele-
 ctro, & *ἡλεκτρον*, qui è corallio conficitur, & qui ex Aegypcia acantha, &
 Xeriu compositū, èq̃ terra astere & Lemnio sigillo, corallioq̃ & symphy-
 to, amyloq̃, singulorū æquilibrium. Sed qui hoc malum erosioni, quam *ἡ-
 ῥοσις* dicunt, acceptū referunt, has compositiones adhibeant, maxime si ca-
 tarrhus præcesserit, opij medimnū semissem misceamus: Et quod accipit sa-
 mij asteris, agerati lapidis, Lemnij sigilli, æquale pondus: utile est tantū in
 potu sumere, quantū capiunt cochlearia duo, in binis cremoris amoglossæ
 cyathis. Aliud: Accipe Lemnij sigilli drachmas sedecim, Samij asteris
 10 drachmas duodeuiginti, amyli drach. octo, sarcocollæ drachmas quatuor,
 cōmeos drachmas duas, xerij cochleariū unum, unā cum decocti palmula-
 rum cyathis duobus. Sorbeatur præterea posca egelida: aut palmularum,
 aut malorum, aut pirorum, aut capreolorū uitis elixatio. Quod si robur ad-
 mittat & impellat, alantur circa horam secundam aut tertiā: sin minus, cir-
 ca quartā. Esto autem sic habentiū panis lotus gelida, aut halica, aut chon-
 drus cum succo quodam frigoris, uerbi gratia, mali Punici, aut myrto-
 rum, aut omphacomellis (id est acerbæ uuæ succo, quem omphacium no-
 minant) confectus, aut oua sorbilia, aut bellariorū quiddā quod è lacte con-
 ficitur, cum aliquo uim astringendi possidente. Ex oleribus autem, inty-
 20 bum, cichoriū, plantago. Elixia sint autem hæc singula oleo crudo, hoc est,
 ex immaturis oliuis, atq̃ aceto. Ex pomis autem, mala, pira, mespila, mala
 Punica, corni arboris fructus. Potio autem his qui non febriunt, uinum dis-
 lutum perexiguū esto: febricitantium autem potus sit, aliquid memorato-
 rum poculentorū, aut cibyraticum hydromalum. Sed eis qui sanguinē re-
 ſiciunt, illis ipsis agendū: cauendum modò ne frequens nimisq̃ cibi porri-
 gatur, hisce nanq̃ perfacile medicinis succurritur, quoniā præpota iam pri-
 dem subsidia, planè cum ipsis sanguine manantibus membris familiaritatē
 habent. Vbi aut sanguis uentre globulatim cōcrescit, coagulum bibendū
 est, maxime uero leporinum, aut sicynum lixiuium cum aqua, aut thymum,
 30 aut thymba cū aceto: Aut certe lacte fissili eos aut aloë euacuare oportet.
 In his præterea qui à palato per screationem despuunt, gargarismis in spīs
 sandi uim habentibus utendum, & fronti & capiti adhibenda ea quæ dari
 solent ijs, qui sanguinē è naribus reddunt. Hæc ipsa hæmoptoicorū est cu-
 ratio, quā studiosè exequi expedit, eo quod magnum laborantibus ex im-
 moderata euacuatione discrimen proueniat. Multitudo nanque euacuati,
 quemadmodum in iugulatis, breuem ac subitam mortem inferet. Cæterū
 affectionis huius diutina assiduitas & perseverantia, in tabem quam *phthisis*
 græce nominant, mutationem minatur. Omnibus igitur secundum ratio-
 nem perpetratis, & cessante iam sanguinis eiectione, medendi & recrean-
 40 di & tanq̃ in pristinum statum referendi sunt, piscem esui præbentes, &
 iuuenum porcorū cum pedes tum cerebra: & ipsum corpus usq̃ refricare
 præcipientes, lauacrorumq̃ frequentem usum, potationem uini, ex cande-
 scentiam & rem Veneream cauentes & effugientes.

Cibus corū qui
 sanguinem ex-
 punit.

Potus.

Certe euacuan-
 dum.

De his qui suppuratione instantur, quos *ἰκάρυες* Græci dicunt: & tabe, quam eadem gens *φθίσις* nuncupat. Cap. XXXII



Empyema, hoc est, purulenta exputio, & collectum in thorace pus, per uacua thoracis, siue succinctum uertitur, quādoq; quidam sanguinis reiectione facto hulcere, neq; ad cicatricem perducto, procedens: hinc confestim sequi phthisis consuevit, si ex pulmone fiat excreatio. Nōnunq; uero quum existat ibidem inflammatio, deinde ex disrupto quoq; abscessu sentitur, ut in laterali dolore, quē *πλευρίτις* græce nominant, aliquādo accidit, aut fluxu deniq; ex capite proueniēte. Signa itaq; coacti iam empyematis sunt, grauitas thoracis, tussis breuis & sicca doloribus admixta. Interdum uero humiditas quēdam accedit, qua leuari nonnihil uidentur, febriculaq; intra initia statim debilis & ignaua, errans absq; ordine statō, & difficilis decretorij iudicationis ue. Quum uero ruptura abscessus iam appetit, uehementius febriūt, cum horrore aliquo, inq; sermone spiritu turbati precipitant. Rupto uero abscessu, pus reijcitur, quandoq; sanē purum, nonnunq; uero feculentum: atq; interdū quidam per superna eliditur prorumpitq; abscessus, unde certe maius metuentum est periculum, interdum uero per inferna: atque id quidem partim in uentrem & intestinum recipitur, transumiturq;: partim uero in uescicam, facta per uascula quēdā transumptione. Febriunt autē modis omnibus febre hectica usq; ad repurgationem, quæ nisi accurate bonaq; fide procuretur, confestim collectum illud in pectore pus, in tabem quā Græci phthisim dicunt, transit, pulmone exulcerationem sustinente, in qua iam cōstitutione genæ pallefcunt, & circa frontē atq; collum undiq; sudores profluunt, carnes contabescunt, ungues incuruantur, & pingues, candidi aut pallidi apparent. Malo autem superante, uenter conturbatur, & hypochondriū conuellitur, sitisq; sic affectos ut plurimum corripit, & anorexia, id est ciborū auersio. Reiectum porrō ingentem grauissimi odoris fluxum emittit.

Curatio.

In empyematis itaq; curatione, ante omnia quidem manibus pedibusq; machinanda est puris in pectore collecti maturatio, idq; tum spongiarū fori, tum cataplasmatīs modo farinæ hordeaceæ coctæ applicatione, & resina exigua, et stercore columbarū, nitroq; & ebisco additis. Salutare quoque est rupturæ auxiliū, in latus incolume decubitus. Sorbeat præterea ex interuallo mulsum, & succus ptisanæ admixto melle: sed quibus plus roboris inest, ius hyssopi & thymi melle adiecto bibant. Suppetias item plurimas ruptioni adfert tarichophagia, id est salamentorum esus, & catapotia hieræ ex colocynthide cōsarcinatæ, in cubilis ingressu sumpta. Ceterū quū pus iam primū excerni cœperit, tum denuo hyssopi & iridos atq; glycyrrhizæ decoctū repete. Sed elixa sint hæc in aqua multa. Vel glycyrrhizæ cum sesamo tritam, exhibe: aut pollinem in mulso & oleo percoctum, cataplasmatīs modo illinito. Quum autem exulceratio expurgationi renitens ægerrime expugnatur, ad compositorum usum recurrendum est: uerbi causa

Suppurationis
in pectore col-
lectæ indicia.

19

21

48

caussa, *ἡ δὲ πρῶτη*, hoc est, quod magna parte ex marrubio constat, tum simplex tum compositum: Et *ἡ δὲ δευτέρα*, quod est medicamentum eruorum, & quod ab ingredientium numero græce dicitur *δυσκράσις*: Et ea quæ ab autore Philoxeni nomenclaturâ sortita est confectio. Porro qui in tabem quam Græci *phthisis* uocant, incidunt, his porra capitata liquefacta cum sorbilationibus chondri ac ptisanæ dato. Iam uero & hæc per se bis decocta exhibenda ducito. Cæterum id quod potius loco sumendum est, aqua pluuialis esto, & ex eo melicratum, quod uulgò mulsum dicimus. Circa initia uero relaxationum, cataplasmatibus instar imponantur medicamina de semine lini & polline, rite confecta: elixatione item scenogræci, aut maluæ, oleoq; & melle, folijsq; altheæ. Temporis uero progressu ad cerotas transeundum, quæ constituantur ex butyro, oleo cyprino, laurino, & iride: Et Temnassij item emplastro utiliter utendum. Fluxu autem noxijs humoris in pectus destillante, cerota *ἡ δὲ τρίτη* dicta, quod salices contineat, imponenda est. Propinanda insuper ipsis ea quæ iam pridem in saniosis enumerata sunt simplicia, atque ex compositis nonnulla. Cæterum si tussis non sine molestia graui dominatur, thymum & hyssopum cum succo glycyrrhizæ melle de spumato excipiens, & inabilem formam constringens, ut sub lingua contineat exhibeto. Conuenit amplius in hac affectione constitutis ex temporis interuallo præstita Michridati antidotus, atq; ea quæ *ἡ δὲ τέταρτη*, id est ex uiperis conficitur, quam theriacâ uulgò dictitant. Nobilissimum uero utilissimumq; illis qui ita tentant fuerit auxilium bolus Armenius in potu haustus: Hædræq; antidotus ne tantillum quidē minus q̃ prædicta, salutare adfert præsidium.

De dolore laterali pleuritide. Cap. xxxiii

Dolor lateritius, quem græce pleuritim dicunt, proprie & exquise lateralis membranæ costas succingentis inflammatio est, cui adherent anhelitus difficultas, tussis, febris continua: dolor modò ad iugulum, modò ad præcordia pertingens, & omnino ut uidetur perueniens. Discerni autem pleuritidis ab inflammatione iocinoris potest, quoniâ in illa omnia hæc apparent: Pleuriticus quidem dolor cōpunctuosus, quasi scilicet locus pungatur, infestat: & tussis nōnunq̃ arida sine sputis, quod morbum incoctum portendit, & ob id crudam pleuritim nominant: Quandoq; uero & sputum tussiendo eijciunt, id quod humorem plane inflammationis præ se fert autorem. Rubrum etenim & sanguinolentum, sanguinem naturæ modum exuperantem subducit & propellit: flauum uero & subflauum, flauam bilem reijci portendit: quemadmodum rursus albicans & subspumosum, pituitam. In melancholico uero humore, nigrius reijcitur sputum. Pulsus adhæc durus ac asper, & *ἡ δὲ πέμπτη*, id est, ueluti scalpens existit. In inflammatione uero hepatis, nullus dolor pungitius est, neq; duritiem ullam refert pulsus, sed arida tussis molestat, & nullū reddit sputum: facies uel buxo, ut ita dicam, pallidior. Porro quæcunq; laterum cōpunctiones externorum musculorum inflammatione fiunt, hæc quidem nō ex quilibet, sed improprie sunt pleuritides; neq; tussis ulla, neq; ullum eijcitur

De pleuritide
notata.

sputum, neq; duritiem pulsus praefert. Si quis manu locum affectum palpi-
tet, dolent: & si quidem suppurata uomica seu tumor distrahatur, secta fo-
ris perferitur: Quoniam illa quae ab inflammatione sub membranula pelli-
culaq; costas succingente, pleuritis fit, huc neque feratur neque uergat: illa
nanq; nisi uel foris uel intus suppuratio, quod empyema dicunt, expurge-
tur, multo ante ocyslimeq; in peripneumoniã, hoc est, pulmonariam inflam-
mationem transit.

Curatio Pleuritidis.

Quod si igitur ad iugulum usq; dolor protendatur, uena incidenda est:
si uero ad praecordia usq; perueniat, purgandum est per inferna. Re-
centiores autẽ omnibus sanguinem secta uena detrahunt, formidantes (ni
fallor) purgationũ turbationem & molestiam. Reclamantibus autem uiri-
bus, neq; aliud quicquã faciendum: lotionibus quos Graeci *κλύσμεν* dicunt
acrioribus utendum. Quod si dolor mediocris fuerit, post lotionem quod
κλύσμα appellatur exhibendum est mulsum, ptisanq; aut chondri cremor.
In decremento autem & decessione morbi, cremoribus porrum adijci-
dum est: aut nepeta, aut pulegij & urticae (quae cnide dicitur) semen, facto
cum melle linctũ, sumetur. Si dolores uehementer affligũt post euacuatio-
nem, demulcendi & permitigandi sunt lanę calidae uel sulphuratae applica-
tione, aut fomentis cum milio, & furfuribus in sacculo lineo positis, aut cali-
da aqua, seu oleo in uesica excepto. Lanam praeterea succidam cum oleo, ui-
noq; marina aqua infecto dilutoue, siue salia insternenda, aut diaspermato
cataplasmatism modo imponendum, decoctioq; chamæmelorum & althæae,
aut sicuum aridarum quas Graeci *ἰζίδαι* nuncupant, & ireos, & absinthij,
mellisq; parum cum oleo nardino. Circa uero quantum diem sorbitionibus
nutrito, adiecto melle perexiguo. Septem autem diebus lapsis, edigma
(ea est confectio quae lingitur magis quàm deuoratur) ex amygdalis se-
mineq; urticae (quam nunc acalyphen, nunc cniden nominat) in melle con-
tritris, confectum offeremus: aut *ἡ δυνάμις* nominatum edigma unũ cum
butyro melleq; decoctum: Et hypoglottide (quod medicamenti genus lin-
guae subditum, paulatim tabescit) ex melle elixo despumatoq; utendum.
Epithematis porro, tum uidelicet quod quia foetet *ἀνοσμία* appellatur, tum
eo quod fit ex sampsycho, unde & *ἡ ἀμψύχη* dicitur, & peganero empla-
stro, secundum affectos utamur locos. Et bulbi praeterea cum axungia ap-
positi, saepenumero satis praesidij tulerunt. Adhibendũ insuper eo morbo
oppressis *ἡ δυνάμις*, id est ex butyro medicamentum, & terebinthinæ. Cæ-
terum omnium efficacissimum eclegma est, quod *ἡ πινυδία*, quia e pinu fit,
appellatur: item quod ex amygdali amari, & feminis lini, & nuclei pinci,
quod Strobilon nuncupant, & amyli æquilibrium cum melle fit, exhibebi-
mus. Quos autem uigiliae quoq; torquent, eos medicamentũ quod e papa
uerum capitibus constitutum, *ἡ καλὴ* dicitur, lingere competit: Ex anti-
dotisq; achanasia, & quibuscunq; ad hanc prouinciam medicamenti com-
positis utamur. Post decimum uero & quartum diem, si malum nõ cesserit,
cucur;

cucurbitulæ ipsiſ imponendæ ſunt, et in tenuiore omnino uictus ratione af-
 ſiſti obſeruandi. Deinde ubi morbus remittitur (quod tempus Græci *ῥῆμα παρὰ*
μὲν, Latini uulgò declinationem ac decrementum appellant) in lauacrum
 ducendi, euitantes frigidum: educatio interim ſolidior adhibenda. Quod
 ſi autem inflammatio ſuccingentiſ tunicæ, neq; diſſipata neque diſcuſſa in-
 pus conuertatur, iam antea memoratiſ utendum eſt remedijs.

Ad lateriſ ſine febre languoreſ.

L Ateriſ doloriſ ſine febre bdellium ſuccurrit & coſtuſ, braſſicę cau-
 lium deuſtorum cineri & adipi admixta: ualidum quidem illud eſt dia-
 10 phoreticum, hoc eſt diſcutiendi uim habens medicamentum. *Diaphoreticū*

De affectioniſ cordiſ. Cap. XXXIII

P ſum quidem hominiſ cor primaria affectione per ſe afflictuſ,
 ocuſ præſentaneum multumq; medicorum exigiti præſidium,
 utpote acerbam & præcipitem inferenſ mortem. In inflamma-
 tionibuſ quidẽ ipſiſ, pariter et ignitiſ rubedinibuſ, quæ eryſi-
 pelata dicuntur, uehementibuſq; intemperantiſ in acutiſſimiſ febribuſ, ſan-
 guiniſ eruptio, quã *αιμασφαιαν* uocant, uulnerata leua potiſſimũ parte uen-
 triculi, prodeſt. Si autẽ per conſenſum, quã *συμπάσαν* nuncupant, dolore
 afficiatur, tum in cerebro, tum in cinore, tum ore uentriculi, moeſtitia item la-
 20 borẽ ue, atq; metu, alijsq; compluribuſ ſyncopã quã uocant, inferet: quæ *Syncope.*
 conferta quædam eſt uiriũ calamitaſ, quã dicunt illi *καρδιασπασμ*, ex ſolutio-
 nibuſ & animi deliquiſ, tenui ac debili uenarum motione, extremarumq;
 partium perfrictionibuſ, & undique promanantiſ ſudoribuſ ſignifica-
 ta. Hæc fortior exiſtentiſ, & ipſa earum ægri tudinũ fuerit una, quibuſ nul-
 liſ ſuppetiſ ſuccurri poteſt. Adhuc uero aliquantulum conſtante uirtute,
 nonnunq; ſubuenire pulcherrime datur. Adhæc uero cordiſ quoq; ualidi
 ſubinde tremoreſ oboriuntur, præ multitudine aut ſeruore ſanguiniſ, qui
 in ipſo cõtinetur. Cor uero ipſum ſuper exaſtactuſ, magnam quidem &
 frequentem inducit reſpirationem: Refrigeratum autem exiguam atque ra-
 30 ram reſpirationem efficit. Secundo igitur qui de febribuſ inſcribitur libro, o-
 mnem cardiacarum ſyncoparum emendationem recenſuimus: tantum in-
 terim hic loci mea quidem ſententiã apponendum, quemadmodũ uincente
 ac præpollente ſymptõmate, poſt extimarũ partium tum perfrictioneſ tum
 circumlinitioneſ, purificationeſ item pauimentũ, et aliam quancunq; animi
 oblectationem amoenitateſq;, cataplaſmatiſ modo ſint ſudore manantiſ
 buſ corporiſ partibuſ imponenda (quiue parteſ eadẽ obſtruendæ) myr-
 tuſ leuigata, aut creta cimolia, aut electrum, aut malicoria cum manna, aut
 terra Samia, adiecta parte cõmeoſ. Artuſ item extremi uſque ad pubem &
 alaſ perfricati, cataplaſmatiſ inſtar illiniendi ſunt ſinapi, aut pyrethro, aut
 40 adarce. Alimentũ eſto panis ex aqua ſeu uino frigido permixto, pedes ſuil-
 li, ancyle, curuatura cubituſ, roſtrum, uolantilia omnia frigida. Cæterum ca-
 put & frontem illinito omphacio, quod eſt, oleo ex uuiſ immaturiſ, aut ali-
 quo ſtypico cum cõmeoſ aut decoctione roſarum. Cataplaſma autem præ

*Cordiſ nimũ
 calidiſti refrige-
 ratiſ ſigna.*

cordis stomachoq; ex palmulis, quæ *φαικός* dicuntur, rosīs, cenanthe, acacia, hypocyfide, & alumine confectum, impone.

De palpitatione cordis.

NOui quempiā, inquit Galenus, quotannis uerno tempore palpitationis cordis symptōmate uexatum: qui quū per integrum triennium se à sanguinis detractione secta uena adiutū intelligeret, anno quarto priusq; accidens illud denuo ipsum inuaderet, sanguinis missionem repetiuit, & haud amplius eidem malo obnoxius fuit: atq; sic pluribus deinceps annis faciendo, idoneam quoq; post sanguinis detractionem, uictus rationem ac medicamenta adhibuit: Sed nihilominus is etiam ante senium morte præuentus est, quemadmodū & reliquorum pleriq; omnes, quorum nonnulli quidem in acutis febribus affatim syncopa intercepti, pari quoq; modo ante senectutem interierunt. Quidam autem ipsorum citra syncopam apoplexiæ modo, hoc est tanquam syderati, subito uitam in mortem cōmutarunt. Cæterū ita affectorū magna pars ætatem agebat quinquaginta quidam annis inferiorem, sed quæ interim annos quadraginta excederet.

De his quæ mammas infestant. Cap. xxxv.

LAc à partu in caseum sæpenuinero densatum, circa mammas inflammationes quas *φλυκίσεις* græce dicunt, suscitāt. Hiscē itaq; à principio statim utendum: spongia mollis posca tepida madida atq; expressa imponatur, & apposite conformando alligetur: Aut palmulæ cum pane in posca leuigatæ: Aut ouo etiam toto utendū, admixto rosaceo cum cerota perexigua, aut alumine, & pulicari herba, qd Græci *ψύλλιον* nomināt, unā cum coriandro, aut portulaca quæ cataplasmatīs modo illiniuntur uel imponant: aut Pyritem lapidē cum cerota contritū imponens alligato. Cæterum distentione oborta, aut cōcretionē in thrombos globulosq; facta, panē ex hydrelæo, aut cenomelite cataplasmatīs instar applicato: aut panē cum perdicia de uiridi atq; cerota, bis in die: aut fabaceā farinā cum hydromelite aut elixatione. Quod si grauitatē nō ferant, irrigatione olei dulcis & calidi utendū. Fouendæ aut sunt ita affectæ, uapo re aquæ feruidæ, aut scenogræci decocto, aut althææ, aut seminis apij. Cataplasma præterea imponendum factum ē polline & semine lini, aut scenogræco cum hydromelite, aut sesamo cum melle butyrōue contrito. Exuctionē porrò mammarū obseruare expedit, eo quod ablatio maiorē conuulsionē parit in ipsis. Quum aut inflammatio mammarū remittit atq; decrescit, istiusmodi cerotis utendū: Betam elixans oleo, usq; dum cerotæ induat cum formam tum crassitudinem: Ipsa autem abiecta, oleo adijce ceræ symmetrum, hoc est, quantum satis est, atq; utere. Aliud: Ouum crudorum pyrrha seu lutea decem cerotæ commisceto, quæ constet ceræ uncij duabus & semisse, rosaceiq; uncj quatuor, & spathe cultellata, hoc est rude subigens, muria quantum in se suscipere potest inijsce, & rursus rude instrumento subigens, utitor.

Ad mam.

Ad mammarum durities.

CAeterum ad māmārum durities confert id, quod, quia ē melle constat, *σπυλιν* appellatur, medicamentum: atque uno uerbo omnia quæ emolliendi uirtutem obtinent medicamina, uocare quæ malactica, hoc est *Malactica* molliencia, medici solent. Sed ubi tumor in apostasim transit, tum medicamentis quorum capite de parotidibus (quos nos secundum aurem abscessus appellamus) meminimus, & quæ deinceps in sermone apostematum, hoc est abscessuum recensēbimus, sedulò utendum.

Archigenis subsidium aduersus erosiones mamillarum cum cacœthia, id est malignitate, prauœ carcinomate.

Archigenis medicamentum quo usus est uir ille contra mammarum foramina, maligna& earundem hulcera, recipit uini hadriani boni xestas uiginti, fluenti rhois uel coriariorum libram unam, galbulorum cupressi libram unam, gallæ immaturæ atræ uncias sex, cassiæ tantundem: quæ simul confusa, in uino diebus decem macerato, deinde coquantur, commota assidue rude cupressina tantisper dum dimidium ferme absumetur: tum herbas quidem porrice, succus uero elixetur ad mellis usq; spissitudinem, tum deniq; in uase uitreo reponatur. Vtere in his quæ depascendo erodūt, mero. At si crassius fuerit, ad id factum medicamentum uino adiecto, liqui-

10 dius reddatur, adq; eas quæ mammas infestant nomas (sic enim appellant hulcera quæ depascendo serpunt) & aures quæ cū purulentia fluunt, ulasq; & gingiuas labefactas, & dysenterias seu tormina conducet. Consolatur præterea ac mitigat papillarum dolores illitum lac. Et alijs postremo māmārum ex hulcerationibus, haud aliter sanē quā alijs quibuscunq; hulceribus medendum ducito.

Diaphylactica, hoc est præseruatua mamillarum.

Quo mamme à plurimis calamitatibus tueantur, emplastri modo cyminum cum aqua cōtritum eisdem impone: mox extrinsecus spongiā imponens, uinculis ac funiculis pectus constringito: transactis uero tribus

30 dieculis, cymino sublato, mammis florem bulborum cataplasmatīs instar cum melle illinito, & adnectens denuo laqueis per triduum finito, idq; ter in mense studiose facito. Aliud: Cicutam leuigatā ac tritam per dies nouem imposito, & foris spongiā ut dictum est, & aliquot dies relinquito. Hoc idem præstat & naxiæ cotis ramentum, uirginumq; mammas ab ingruentibus malis custodit.

Aduersus alarum graueolentias atque sudores. Cap. xxxvi.

In quo, sudoribusq; sub alis pulchre admodum hæ compositio-
nes subueniūt: Aluminis liquidi medimnos duos, myrrhæ me-
dimnum unum, in uino dissoluens, quum opus fuerit utere.

40 Aliud: Plumbaginē crematā uinoq; fragrantē extinctā, cum uino conterito, myrrhæ pusillum usq; ad strigmenti balneorum crassi

tuādinem adiiciens, utitor. Aliud: Spumæ argenti drachmas sedecim, myrrhæ drachmas duas, amomi drachmā unam, quibus singulis contusis, uino excipe. Aliud: Accipiantur aluminis liquidi drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor, hæc uino dissoluta, ad arcendum grauem hircinumq; foetore, necnon eas quæ turpiter sub alis eueniunt maditates, usui accommodato.

De his quæ præter naturam accidunt stomacho, præcordijs atq; uentri. Cap. XXXVII.

DE appetitus à cibus auersione, quæ febre correptos molestat, & grandi fame, & appetentia canina, debilitateq; stomachi, & animi deliquio, de siti præterea atq; singultu, nausea item ac syncope, inter hæc quæ de febribus eo qui hunc antecedit libro, satis superq; determinatum est. Rursum igitur super hysdem uerba facere, non hercle puto opportunum. Cæterum inflammationes oris uentriculi, atque iocinoris, inter medendum semper opus habent constringentium rerum admixtione. Nam si quis chalaistica modò, id est relaxanti uictus ratione mederi studeat, uitam in discrimē haud leue inducet. Proinde oportet siue oleo foueantur & conspergantur, siue cataplasma applicetur, medicamenti quippiam cui adstringēdi facultas sit, adnectere, uerbi causa, absinthii, aut unguentum nardinum, aut melinum, aut papauerinū, decoquentes. Cetera 30
rota autem qua continuo utendum arbitror, est huiusmodi: Sumito ceræ candidæ unciam unam, æstatis uero tempestate drachmas septem, aloës, mastiches, uniuscuiusq; drachmam unam, olei uuarum nondum maturarū, aut melini & nardini, prout usus & res ipsa exigat, quantū satis est ad concretionē & coagmentū. Quod si adhuc copiosiore stypticitate indiget uenterculus, ut qui alimētis superior esse nō possit, admisceto prædictis quoq; olei omphacini drachmam unam, aut absinthij etiam æquilibrium, ad hæc tertiam partē hypocystidis, & cenanthes, quod est floris labruscæ, & cremoris rhu. Addere autē & in medium deducere oportet cerotæ copiam, numero alijs medicaminibus proportionē respondens.

Ad stomachi, præcordiorumq; & uentris diutinas inflammationes.

QUOD si præterea inflammatio diutule perseveret, atq; indurescat, iam sanè medicamēta diuersi magis generis sunt adhibenda, quæ aromaticum nonnihil emolliendiq; & dissijciendi potestatem habeant. Cuius farinae quidem est id, quod per melilotum confectum est medicamentum, atq; ipsum quoq; Philagrianū, atq; illud quod à fragrantia nimirū Græci *ωιδις*, Latini uero perodoratum nominant, uiridisq; iaspidis funiculus seu catenula collo appensa, ita quidem ut stomachum attingat, magnifice confert. Verum in calidis stomachi intemperiebus & ardentibus, cum solutione, aut aliqua cibi fuga & inappetentia, nulla omnino causa excepta quam febris, aquam gelidam potui dato, cremore uuæ immaturæ adiecto, aut malorum cotoneorum elixationem, aut capreoli uitis, aut seminis cucumeris: uel

uel contere cum frigida. Stomacho præterea uesicâ gelida aqua fartam, aut cucurbitæ strigmenta imposito. Catapotia item (quas uulgus pilulas à rotunditate uocat) quæ extinguendi sitim potentiam habent, *εσθία* appellata, ceu iam pridem in capite de siti memoratum est, exhibita, præsentaneo semper remedio sunt.

Frigorificum & humectiuum flaccidi & cum infirmitate humentis stomachi.

Stomachus uero cum humore flaccescens, languens ac dilabās prope smodum, refrigeratur & humectatur medicamento quod recipit foliorū rosarū uiridium drachmas sex, glycyrrhizæ cremoris drachmas quatuor, quæ uino dulci excipiantur, & hypoglottida (hoc est medicamentorū species quæ linguæ cōmode possunt subdi) cōcinnentur. Sed in affectionibus quæ propter crassitudinē pituitæ calorificis & incidentibus opus habent, unile hoc fuerit atq; accommodatissimum, quod succedit præsidium. Accipe corticis radicis sceniculi uncias duas, aceti xestam unam, aloës uncias tres, mellis libras quatuor: Radices cum aceto elixæ exprimūtur, porriciū turq; mel uero iniectum decoquitur usq; ad crassitudinem et cōcretionem, & tum denique aloë leuigata inditur informaturq;: Exhibe cochliaria tria cum aqua. Nōnulli uero & absq; aloë cōficiunt hoc medicamentum. Et id, quod quia ē nepeta constituitur *σφακαλιμύθος* appellatur, in his qui ita afficiuntur expediens & idoneum est. Cæterum in quibus cibus acescit, seminis coriani aut coriandri drachmam unam polentæ instar subigens, & glutinosum reddens, aqua potui dato: siue mastiches cochliarium unum: siue lactucę candidæ cochliaria duo. Hactenus incomposita. Connexū autē multis illud probatur, quod habet piperis drachmam unam, seminis anethi drachmas treis, cymini drachmas quatuor: quibus contritis exhibebis in lecti, ut uulgò dicunt, ingressu cochliarium unum in uino mixto. In quibus porro atra bilis nascitur, stomachusq; inflatur, in distentionibus & uehementia, spongiæ acerrimo aceto intinctas imposito. Quod si his quoq; accurate transactis omnibus, nihil cesserit malum, alumen cum ære leuigato melle exceptum imposito. Bibat autem in ea passione constitutus intybī succum, aut potioni mentam inferat. Quibus uero stomachus flatulentus atq; distentus est, nepetam decocto miscens, mellis & piperis symmetrum, hoc est, moderatum præbeto. Super hæc autem ad stomachi subuersiones succi acinorum mali Punici acidi medimnos treis, cremoris mentæ medimnum, unum coquito usque ad concretionem & compactionem, atq; ubi opus fuerit, ante cibum mystrum unum potui exhibeto.

Ad Siclissimum stomachi.

Qui stomachū spumofum habet, aceto scillino, aut oliuarū salfarū et cōditarū iure, aut thallix (hoc est summitatis nouæ germinationis oleæ) decocto abluant, aut eius quamminimū bibant: Nihil uero cātopere, quàm aloë aqua irrigata confert. Atqui ad curationē eorū qui cibū cōtinere non possunt, quos ueteres proprie stomachicos nūcupant, scenogræci farinam

Stomachici. melli mixtam, & maluae semen contritum in farinam aridam, cataplasmaticis modo stomacho imposito. Cerota uero quae est caetera constituitur & oleo irino cum iusto pondere, & castorio, bene ad idem facit.

De appetitus à cibis auersione.

*Signa calidae
distemperantiae
stomachi.*

Signa frigidae.

ANorexia inappetentia uel, est à cibis appetitus omnia respuente stomacho auersio: uel à stomachi & circumiacentium partium intemperantia, uel ab exuperanti humorum copia proueniens. Deprehendet autem quispiam haud obscure distemperamentum eius uisceris aestuosum, tum siti, tum nidorosis & fetulentis eructuationibus, si quippiam coacti sumpsent, tum promptiore frigidarum admodum rerum & coctu difficilium coctura. Gelidam est diuerso stomachi intemperiem contrariis omnino conditionibus cognoscere: neque enim sic affecti sitiunt, & à frigidis, quae tolerare nequeunt, offenduntur, & acida interdum subinde eructuant.

De ciborum fastidio ex nimietate humorum.

*Curatio horro-
ris epularum
propter frigus*

CAeterum qui ad humores, ciborum auersionem referunt, hi sane qui propter subtiles atque mordaces succos hoc mali patiuntur, mordentur stomacho, nausea afficiuntur, uehementioresque siti premuntur. Quibus uero putrescunt in uentriculo humores, feбриunt interdum praeter caetera. Qui autem crassis glutinosisque ac tenacibus stomachi humoribus anorexiam acceptam referunt, morsu quidem atque siti omnino carent, sed commune omnibus accidens est nausea. Caeterum si quidem concauitatem ac imum uentriculi, humores occuparint, ab ipsidem euomunt: Sin autem in tunicis ipsius impacti atque impulsu fuerint, nauseant modò, neque quicquam euomunt, praeterquam cibos, si quos sumpserint. Quocirca eis qui ob gelidam distemperantiam cibos horrent, frigidam uictus rationem praeficere, & praecipue ea quae condiantur aceto, panem proinde posca maceratum ita habentibus dare, atque ipsam quoque poscam, lac item acetosum, & eam quam uulgo Romani melcam nominant, potare expedit. Probat praeterea obsonium quoddam, quod, quia est lacte sit, *σπυλάκιον* appellatur, intybaeque & lactuca, & nonnunquam aqua gelida, omniaque mediocriter, secundum eius quae iustum naturae modum excedit temperaturae contrarietatem: quoniam immodicus horum usus non modò non conducit, sed medicamentis omnibus inexpugnabilem reddit affectionem. Qui contra alioquin escas fastidiunt, contrariis omnino medendi sunt: uinumque perantiquum potui, conditum item & hydrogarum, anisi praeterea ac rutae, petroselinique decoctum, exhibendum est. Piper quoque est communi aqua calida, atque ipsum quoque quod à tribus piperum generibus nomen habet *σπυρίον* *πείπερον*, aut quod est nepeta constitutum Graecis *σπυκαλαμίνθος* appellatur, magna cum utilitate offertur. Dabis adhuc & uiperarum theriacam, quae utique etiam his qui ad humorum copiam inappetentiam referunt, aliena non est. Allia quoque in hac affectione constitutis, cum tanquam nutrimentum, tum tanquam medicamentum, accommodatissima censentur.

Quum

- Quum autem ex humorum multitudine, in eiusmodi omnia respuentis stomachi quis inciderit affectionem, tenues quidem atque mordaces humores euacuabis, id quod uel per uomitionem, uel aluum inferiorem: Vomitionibus quidem facile, si temperatam ac tepidam aquam, aut mulsum plurimum admodum aqua dilutum, antea laborans hauriat. Præstantius uero, si ante hæc humectantem exhibeas alimoniam: cuius farinae est ptisanæ cremor, aut ouorum putamina, quas *λευκίος* Græci nuncupant. Qua autem ratione facilem quis uomitum conciliat, uolumine huius operis primo attim prædictum est. At si non nisi ægerrime, magnoque cum discrimine ægro-
 10 tans euomat, præstat medicus materiam in aluum inferiorem dirigat, humectans antea languentes copiosiore & temperato cibo. Sed catharticum, hoc est purgandi facultatem habens medicamentum, uel ex amaritudine aloës, uel ex malis cotoneis conficiatur, quod & scammoniam admixtam habeat, uel è rhodomelite. Quod si absque scammonia fieri possit, aloës maiore copia ipsos euacuare satius est: quoniam scammonia usus stomacho plurimum officit. Qui uero propter crassos & tenaces humores anorexia torquentur, his attenuando & incidendo succurremus, cumque oxymelite, & ex hoc, muriaque compositis, uelut cappari, oleis, sinapi, & consimilibus. Neque uero aliena his sunt ea quoque, quorum in illis qui simili malo præge-
 20 lida intemperie tentantur, meminimus, præcipue uero post euacuationem: euacuabis autem eo quod ad Iulianum refertur, oxymelite. Foris præterea quæ tum calfaciendi tum roborandi stomachum potentiam continent, adhibenda sunt: ungentaque & malagmata, cuiusmodi sunt potissime, id quod *εσπερίδα*, id est, ex uua acerba & immatúra contextitur: & quod *μαρνιαδίον* græco uocabulo appellatur: & quæ solenniter applicantur unguina græce *μυρα* nuncupata. Epithematis porro utendum, tum ea scilicet compositione, cui nomen in dictu Baion est, tum ea quod *ωιδία*, hoc est odoriferum, appellationem obtinuit, atque eius classis cætera. Exercitationes item atque frictiones similiter cum primis adhibeantur. Porro autem eorum cura-
 30 tioni qui male concoquunt, pariterque ea stomachi quæ escas omnes fastidit affectione propter frigidum simul & humidum succum, aut eiusdem qualitatis intemperiem tentantur, medicamenta quæ *εσπερίδα* uel *μαρνιαδίον* uel *ωιδία*, hoc est, è malis cotoneis consistunt, apprimè cōueniunt: dico autem id cui Maloplacuntium cognomentum est, atque id quoque quod è succo malorum constat, necnon & eorundem carnibus, cytrioque malo confectum. Malagmata uero quæ ad rem faciunt, sunt marciatum, & quod ex acerbæ & non maturæ uuæ cremore constitutum, omphacinum uocatur: Baion item & polyarchium, & quæ sunt eiusdem generis cætera. Quod si huiusmodi uel stomachum uel uentrem occupet, ut ab omnibus quidem acribus tum esculentis, tum poculentis, tum medicamentis abstinendum est, ita mansuetis & mitigantibus utendum: Verbi causa, forbitionibus absque oleo, & quæ sunt ex amylo, & terra Samia, ac Lemnio sigillo, lacte item melleque, quamminimo, ita ut sine molestia, & citra morsum perpurget, Epithe-

De anorexia
ex humorum
copia.

Catharticum.

Scammonia no-
cet stomacho.

ma autem functioni huic accommodum est *σφαγιεύς*, & *κυσσινύς* *ἀλάριος*, quod est si interpretare, ex palmulis, cotoneorumq; farina siue polenta con cinnatum. Cerota in hoc malo constitutis congruit ē melino aut rosaceo, cum gutta ammoniaci & thure cōposita: Item epithema Nilei. Emplastro rum insuper usus in cibi auersionis curatione expediunt, tum eius uidelicet quod *σφαγιεύς*, quia salices continet, appellatum est: tum quod ab autore lcession cognomentum habet. Dinoscēs autem hūlceris speciem uel ex san guinis, uel ex puris, uel ex ramentorum deniq; uomitione.

Ad fractum & imbecillum stomachum.

Stomachis fractis & debilibus, & ob id functionem suam in coquendo 10
minime obire potentibus, aut qui cibum assumptum euomunt, meden dis, sumito aloēs, suffitus masucha, mastiches, styraçis singulorum uncias duas, absinthij uncias quatuor, cenanthes uncias treis, confectiois gleuci ni uncias sex, ungenti melini uncias treis, uini quantum satis est, à quibusdā cōfectionis Cyphios rosarumq; uniuscuiusq; unciae duae adijciuntur. Hec omnia pariter leuigata purpura, aut lana excipiunt, stomachoq; imponunt. Nōnulli uero ceræ quoq; uncias sex antea adijcientes, epithema cōcinnāt.

Ad uoluulū stomachi, quas Græci *ιλαρίσας τῶ*

σμάχος *σφαγιεύς* nominant.

Crandis iliosis stomachi affectionibus, quod est uehementibus dolo 20
ribus & plurimum conuellentibus spasmodis uē, nobilissimum utilissi mumq; medicamentū est pastillus Amazonum. Ceterum cum huius, tum aliorum quæ ad stomachum pertinent commixtorum materiam, & in uolu mine quo de cōpositis medicaminibus agitur, absoluto ac profluente ferē sermone descriptam comperies.

De uentris inflatione. Cap. XXXVIII




Latuum in uentre prouentus siue generatio, ex humoribus uel alimentis in uapores præ tepida quadā caliditate resolutis, com mouetur: Frigiditas nanq; eo quod sua natura nequit attenuare atque discutere, nullos producit spiritus, sed uehemens acriorq; 30
caliditas non extenuans solum, sed disijciens etiam penitus, flatus con spirationem prohibet. Minor uero caliditas, alimentū in stomacho liquefacit ac disijcit quidem, et permutat etiā, sed remissius atq; minore id efficacia: inde flatus excitatio omnis procreatur. Attenuare igitur ipsos medicamentis ca lorificis competit, elixantes oleo semen cymini, apij, herbæ rutinalis, quod *αρωδύλιον* græce nuncupant, & dauci deniq; semen. Frigore autem af fectioni accedente, rutam, baccas lauri, nigellam nigrum uē papauer, quod *μυλαρίον* à Græcis dicit, sceniculūq; oleo elixato, bitumenq; cum oleo lauri no admisceto. Si uero inflāmatio cū doloribus copulata sit, pro calfacienti bus chalaistica, hoc est quæ relaxando remittendoq; mitigāt, adhibeas: ane 40
thum uidelicet coquens, & adipem gallinæ & anseris admisce. Perq; utilis præterea flatus in corpore & uentre potissimū excitationibus obnoxijis, po liū fasciculus percoctus habetur: siue decoctum nepetæ admixto mellis exi

Neq; gelu neq;
ardor ingēs fla
tū parens, sed
mediocri calō
ditat.

quo

guo, aut piperis drachma una: hæc quidem dolore acriore infestante, adhibenda sunt: sed in mediocri sufficit. lotus (quæ græce *πρωία* dicitur) milij. Cucurbitula uero amplissima umbilicum uniuersum & cumulatim complectens, sæpenumero liberauit hoc sympt^amate. Remediū quoq; haud mediocri est castorium, cum posca epotum, & foris cum oleo sicyonio impostum: Et si cum tormine doloreq; circa umbilicū, omneq; id spaciū quod in anteriore parte hominis uentriculi ostio, & umbilici partibus interiacet, (quod mali genus Græci *σπρίσπ* nominant) flatuū collectiones contingant, *Σπρίσπ*, medetur. Suillus porro astragalus crematus, & in potu sumptus, cum torminibus qui ab ostio uentriculi usq; ad umbilici partes excruciant, cum flatulentis, quasiq; uentis in interiore parte oppressis, succurrit, aristolochiaq; rotunda. Cæterū doloribus, quibus uenter nonnunq; propter obstructiones torqueē, aut ex crassitudine obortis inflationibus, aut ob frigiditatem, uinū meracius post cibum epotum, præsidio fuit, somnoq; succedente exaeste ipsas uindicauit atque discussit.

De Cholera. Cap. XXXIX

 Holera est immoderata uentris perturbatio, quæ multo bilis fluxu, cum alui deiectione tum uomitu fit, inhærente ciborū in stomacho cruditate: cibos autem non conficiunt, interdum quidē propter multam cibariorum prauitatem, nōnunquam uero ob prauos humores aggestos. Quocirca si quidē fastidiosus & uellicatus fuerit ægrotans, manentibus etiamdum crudis in uentre dapibus, uomitus ciendi gratia aquam tepidam haurire iubebimus, ac digitos insuper aut penas inferere. Opitulandum adhæc & alui quoque excretionē. Post uero superuacaneorū excrementorum euacuationem, cum tranquillitate tum fortu & calfactione circa præcordiorum partes utendum, & dulci præterea oleo, cum uino non multo, aut mastichino, aut nardino etiam, si tempus fuerit brumale. Somnus item inducendus, cui pro arbitrio cuiusque indulgendum. Lauacris præterea post ad unguem factam cōcoctionem, danda est opera, & boni succi alimentis utendum. Atqui cum excessu facta euacuatione, ab initio quidem ea quæ suprâ libro secundo de turbatione uentris memorauimus, satis sufficiunt. Quum uero exitiū permanferit, aliusq; eadem calamitate afficitur, & pulsus minuitur densiorq; euadit, cataplasmatibus modo *ἀλκισκιννα* cum cenanthe, acacia, hypocistidis liquore, & malicorio imposito. Aquæ porro mediocriter frigidæ cyathum ad sorbendum exhibitum. Ius uero rosarum, aut cenanthes, aut rhu, aut capreolorum uitis, utilius fuerit: aut liquor qui ex malo Punico acidæ dulcedinis expressus est, propinandus, pulillo mentæ insparso. Vbi uero quæ excernuntur acriora extiterint, seruiore sitiq; superueniente, cucumeris semen cum aquæ cyathis tribus offerendum est: intybaq; & lactucas in posca elixas, cibi loco sumant. Incoercito autem impetu existente, uinum aliquod austerum. Quos nulla quidem febris infestat, palmatianum, aut aminæum, aut sparhiten, aut omphacomeliten exhibeto; Febricitantibus uero, uinum ex malis granatis,

aut ex myrto, aut cibyriticum hydromalum p oculentum, & cum micis tri-
poliue, aut halica, aut chondro. Quod si esculenta fastidiant, aliquid fru-
ctuum comanducantes, mespilorum, aut pirorū, aut cotoneorum, aut malo-
rum granatorū, carnosum & durum expuent. Porro si cibum assumptum
non cōtineant, cucurbitula quāmaxima levis stomacho est adglutinanda.
Hac autem iam adglutinata, aliquo ex prædictis nutriendi sunt. Cæterum
ad conuulsas titillationes contractiones ue, linteola oleo imbuta musculis
calida circumponito, cerotasq; liquidas castorij quippiam et sicyonij com-
plectentes. Sed priusquā hæc aggrediantur, membra sunt aqua calida per-
fundenda. Si peruigiles reddantur, ijs utiq; remedijs quę uigilijs suo loco
conducere docuimus, utendum: non uero prohibente uirtute, & *ἡ δὲ καὶ αὐτὴν*
confectionem, aut syrupum (ut dicunt) bibant. Decremento autem iam fa-
cto, & ut uulgò aiunt declinatione, in lauacrum ducendi sunt, & recreandi
alilibus, pullis columbarum, aut pedibus suum, aut consimilibus ferculis.
Profusus uero alui fluor, absq; exulceratione inflammationeq; quā grace
διὰ τὴν αἰτίαν uocant, cibos corrumpens, magna quidem parte sua sponte cessat,
nihil alimenti fumentibus ægris usq; ad consummatā tum cocturā tum eu-
cuationem corruptorū nutrimentoꝝ. Permanente autem fluore, iisdem
præsidijs quibus cholerae occurrendum.

De intestinorum leuore lenteriaue, & affectione coeliaca. Cap. XL 20



Vplex leuoris intestinorum (quam Græci *λεντησία* nominant)
genus est: Alterum quidem, quod ex intestinorū exulcerationi-
bus, earumq; cicatricibus oritur: quod mali genus intestinorum
tormina plerūq; sequit̃, aut ex alijs destillationibus rheumatisq;
inducitur: Alterū uero, quod ex infirmitate languoreq; uirium, quę alimen-
ta in stomacho distinent, prouenit. Hanc secundam quidem differentiam
cum coeliaca, ut uocant, dispositione confundi & misceri arbitror. In qua
utiq; languente & imbecilla stomachi uirtute, cibi neq; coquunt̃, neq; perfe-
runtur, concoctiue distrahuntur, sed molles, crudi, perliquidī, imperfectiq;
euadunt, continuo fluxu tentata aluo. Sed in intestinorū leuore celerius q; 30
in coeliacis quæ assumpta sunt alimenta deiciuntur, tamq; graui cruditate,
ut assumpti quoq; nutrimenti genus liquidò inde cognoscatur: Et his qui-
dem coeliacis discernuntur. Semen igitur lini cum palmulis siue dactylis, hac
affectione obnoxijs cataplasmat̃ instar imponatur. Summe uero prodest
& lentiscus & rubus, unā cum oxymelite decocti. Interna uero flatus col-
lectione existente, cyminum quoque & anethum & ruta commiscenda.
Quum autem magis magisque destillatio rheumatismusue increfcit, inferi-
mus mala cydonia, alumen liquidum, acaciam, hypocyftida, gallam, aut ho-
rum nonnulla, aut pariter omnia. Cerotæ præterea ex myrteo & uino quo-
piam astringente ac styptico. Vsi sunt insuper & epithemata calorifica 40
quidem magis, cum id quod (quia è baccis lauri cōstituitur) *ἡ δὲ δακρυδιὰ* ap-
pellatur, tum *ἡ δὲ ἀνισώρις*, hoc est, quod è seminibus cōstat. Vehementius
uero adstringentia quæ styptica uulgò uocantur, tum *ἡ δὲ σιναπίς*, id est con-

Post uigorem
quid agendū.

Ventralis
affectio.

fectio

- fectio quæ ex cenanthe herba floræue labruscæ conficitur, tum compositio ex malorum granatorum acinis cōcinnata, diagigarton appellata: & quæ sit ex amylo. Sed ex erythria compositum admiratione dignum est. Longo uero iam tempore inueterata ægritudine, dropace unguento alius illiniatur, & ex sinapi cerota, necnon & ipso per se sinapi. Potiones porrò quibus in hac affectione utendum, simplices quidē sunt, semē plantaginis, quod *ἀντρογλώσσου* græce nominant, aut semen rumicis lapathiue, aut mali granati cortices, uuæ aridæ, aut omphax aridus ex Aminea uua triboli quantitate. Non febricitantibus cum uini adstringentis austeriorū cyathis sex: 10 Febricitantibus uero cum aqua pluuiæ. Minus uero stomachum succendit gallinarū uētriculus siccus potui insparfus. Adijcienda quoq; sunt quæ cient lotia *διουρητικὰ* appellata: uerbi causa, apiū, adianton, & id genus alia in potu sumpta, translationem efficiunt & subducunt. Cōpositæ uero positiones quarum utilis usus est, sunt tum Polyidi, id est, diuersæ speciei sigillum: tum pastillus ex electro compositus: tum ex Aegyptia acantha & quod elidion appellatur: & confectio ex seminibus dialpermatum nuncupatum. Ceterū hoc primā habet bonitatis æstimationē: Lapathi syluestris seminis unciam unā & semissem, arnoglossi seminis tantū dcm, hypocyti- 20 dos succi drachmas sex, commeos siue acaciæ tantundē, excipe malorū cōtoneorum expressorū elixatione. Aliud: Accipe cymini, piperis, rhois syriaces, floris syluestris Punici, quem balaustium dicūt, singulorū unciam unam & semissem, corticū malorū granatorum unciam unam, la serpentij unciam dimidiā, aut aridi drachmā unam: hæc potioni inferito, aut oxymelite cum mane tum uespere misce. Aliud: Sumito myrtorū nigrorum cochliarium unum & dimidium, anisi, rosarū siccarū, cenanthes, uniuscuiusq; cochliarij semissem, phœnicobalanos uiginti: formentur pastilli, atq; drachmam unam cum aqua potui dato aut cum cramate, hoc est uino plus satis diluto. Cæterū inter omnia præsidia quæ hac affectione oppressis ministra 30 ri possunt, palmā sanē obtinet ea quæ e uiperis concinnatur theriaca. Porro quod ad alimenta attinet, id esto eiusmodi: Vbi quæ egerūtur excrementa odoris grauissimi, ac biliosa fuerint, cibus ē chondro pariter et oriza, alicūq; & consimilibus alantur, concoctis interim unā cum aliquo adstringendi facultate natura prædito, puta piro, fungōue seu apio, malo coroneo, me- 40 spila, & id genus alijs. Lac quoq; excoctū atq; purum salutare ac præstans quidem sic affectis est auxilium. Potus aut esto uinū dilutum & tenue, aut aliqua dulcis potio. At si quæ excernuntur, à leuitate intestinorum affectis, fuerint pituitosiora, diuersam omnino educationē cibumq; præscribendo, in contraria transducemus, semina quædam quæ stomachū adiuuant, admiscentes: uerbi causa, anisum, aut cuminum, aut apij semen. Verum et lens quoq; denuo recocta sæpenumero hac passione oppressis subuenit, cum aceto exiguo manfa, aut oxymelite. Brassicæ etiam ipsæ bis coctæ auxilio sunt. Præstat autem alteram eorundem elixationē in posca fieri. Cæterum uinum uetus aliquod calidumq; bibant.

Diuretica.

Vicus lientericorum.

De Tenesmo, hoc est crebra & inani egerendi uoluntate. Cap. XLII.



Vltus desidendi impetus & cupiditas, paucis admodū sequen-
tibus excremētis (quem *τλυσισμὸς* Græci uocant) quandoq; qui-
dem intestinorum tormina præcedit. Sæpe uero numero solus
ipse per se ortus aliquantulumq; progressus, cōquiescit. Est uero
hic morbus creber et implacabilis ad deiiciendum impetus ac desiderium,
aliud nihil præter exigua cruenta quædam uel mucosa agens, quæ tantum
nō totius mali causam cōstituunt: facta q; in longanone tumida inflāmatiō,
herentiū illic excrementorū opinionē, et excernendi ea cupiditatē inducit.
Galenus uero scribit, à fortī eiusmodi excernendi conatu lapillum quem
piam ex sede deiectum. Plerunq; uero etiam propter tenuis intestini sta-
tum stercore obstructo, tenesmus secutus est. Ex stypticis quidem & pa-
remplasticis obstringentibus ue plusculum adaugetur: ex clysteribus ue-
ro quæ & *κλύσματι* dicuntur acrioribus, uerbi causa, mulso, adiectis inte-
rim salibus, aut aliquibus eorū quæ per os emolliūt, cuiusmodi sunt Dama-
scena, aut ficus aridæ, mercurialis, serum lactis, excreto stercore illico quie-
scit. Quocirca si citra eiusmodi causam prompta hæc egerendi sine affe-
ctu uoluntas atq; conatus usuueniat, consolandi languentes phlegmone
sunt hordeaceis polentis (quas *ὑμλόντες* Græci dicunt) calidis, & asper-
ginibus, quæ *ὑπεροχὰν* appellantur, tum ex uino, tum ex oleo myrteo, aut
rosaceo, aut omphacino confectis, lumbisq; ac pectini applicatis. Cæ-
terum mucosa quæ intestinum rectum opplent atq; obstruunt, nulli quo-
que infusione abstergito. Sed & muria nō raro indita, id quod res ipsa ex-
postulat, perficit. Satis uero sunt salis drachmæ sex, cum aquæ calidæ aceta-
bulo sumptæ. Mitigantur præterea dolores & distentiones encathismatis
quæ ē scenogræco, aut malua, aut semine lini fiunt. Quidam uero sæpius &
hoc usurparūt encathisma: Rubi, myrthi, cytini, lauri & cupressi uiridium
æquales portiones in aqua decoquunt: est aut Marcellium. At si in profun-
do inflammatio & irritationes iniuriæq; existant, frumētacei liquores, unā
cum quibusdam stypticis percoctis infundendi sunt. Oleum uero dulce im-
missum, atq; plurimis horis detentum, dolorem quo affliguntur hoc malo
tentati, discutit atque soluit. Si autem crebro quis ad oletandum exurgat,
glomerem ex stypticis rebus calidis ano inserto: uel furfures calidi in liga-
mento aut spongia, aut aliud quiddam eius generis apponatur.

De Dysenteria quod est intestinorum torminibus. Cap. LXIII.



Dysenteria, quam Romani tormen nuncupant, intestinorum ex-
hulceratio est, nūc quidē ex cessante tenesmo, aut uentris præ-
memorata quapiā fractura perturbationē ue prognata, nunc ue-
ro inde morbus originē habet, ubi magna excrementorū quali-
terna est: Quæ primū quidē biliosa sunt, & uaria, deinde iuxta proportio-
nem cruenta, & postremo purulenta, cuiusmodi ex cadaueribus, effluere
consueuerūt. Sed quæ ad atram bilem ortū refert dysenteria, exitialis est,
cum exhulceratione cancrū insinuans. Quod si igif cum stercore mixta ex
hulce-

bulcerationis signa cum labore & circa umbilicum tormine excernantur, in gracilibus intestinis exulcerationem esse cognoscito. Tum quidem remedia quæ per os sumenda sunt, cum primis expediunt. Sin uero absq; ulius rei communione immixtum oletum egeratur, crassorum intestinorum est, enematis magis obtemperatura: ubi autē plurimus sanguis solus deijci tur, eam affectionem Hæmatirā uocitant dysenteriam. Excernitur quippe aliquando nigrior solito sanguis, iocinore exceptum alimentum non satis cōmode concoquente: & ob contentricis uel alteratricis ipsius facultatis infirmitatem, sæpenumero ē uentre haud absimile quiddā eis, quæ ex ablu-
 10 tis carnibus eijciuntur recētibus, egeritur: Hepaterā aut hanc dysenteriam indigitant, de qua uberius in sermone de iecore dicitur. Comuni itaque curatione, iisdemq; præsidij, quibus in uētralibus cœliacis uel, ac alijs præter naturam excretionibus, utendum est. Propria uero curatione, Lemnia sigillata siue pota siue immissa, cōcinnato prius ex aqua mulsā clystere, de pascēti dysenterix medetur. Deinde muria & portulacæ succus potus, dysentericis peracōmodus est: atq; ipsa etiam per se portulaca in posca elixa mansaq;. Plantago quoq; rubiq; cum fructus tum folia: necnō & althææ radices elixatio conueniunt. Hippuris præterea, hoc est cauda equina ex aqua uel uino pota, eiusq; cremor. Mori item immaturus fructus ubi arue-
 20 ric: adhuc etiam uehementius rubi mora consimiliter arefacta, profunt. Quin & oua quoq; ex aceto tosta & mansa, alui fluores exiccant. Satiùs uero ro fuerit, si his alia quedam quæ ad tormina spectant admixtis, in sartagine torrefacias, atq; esui exhibeas: Præstantissimum uero omnium est omphacium, rhus ruber, atq; cremor eiusdem, malicoria, quod est mali Punici gratiæ cortices, galla, gigarta, mespila, myrta, crania, omnium cochlearum tostarum cinis. Compositum uero illud est: Cochlearū cineris medimnos quatuor, gallæ medimnos duos, piperis partem unam, in puluerem condens, obsonijs immitte: aut in aqua uinōue candido diluto potandum exhibe: egregie iuuat dysentericos quibus nondum hulus contabuit. Et
 30 canum ossa uorantium sterces aridum cum lacte coagulato, & in casēu iam densescēte, per testudinum *uiscerum* haustum mirifice prodest. Composita porrō quorū magna in hoc malo est commoditas, sunt ex Aegyp̄tia acanthi pastillus, atq; Philippi: item qui ē cornu ceruino cōponitur, et qui ex seminibus, unde *σπέρμα πεπρωγ* dictus, & trigonos, catapotiaq; ex macere consarcinata, admirandæ uirtutis sunt. Præstantissimus etiam est, qui hoc modo conficitur: Opj, croci, lycij Indici, acaciæ, rhoos, thuris, gallæ, hypocy-
 stidis, corticum malorum granatorum, myrrhæ, aloës, equis partibus, prebetriobolum. Aliud: Accipe rhoos drachmas octo, gallæ, malicorij, singulorum drachmas quatuor, dato cochliarium unum in uino. Aliud:
 40 Rhōis drachmæ octo, gallæ, acaciæ, cōmeos, uniuscuiusq; drachmæ duæ, opj drachma una, misceantur, & drachma una in uino temperato exhibea-
 tur. Cæterū ecligma quæ dysentericis cōuenit, hoc est: Sumito myrtorum nigrorū xestam unam, rhu Siriaci tantundem, palmularum Thebaicarum

libras duas, carniū malorum cotoneorū libram unam, mali granati acidi unā cum corticibus decem, uini astringentis naturæ xestas duodecim, coquito usque dum tertia modò pars relinquatur: & ubi colaris, infuse mellis libras sex: coctumq; ad crassitudinem mellis spissi, lingendum exhibe. Liquidò uero constat, quod cataplasinata quoque ex astringentibus, quorum materiam habes, usui erunt. Enemata porrò dysentericis propter turbatos ac defatigatos tenesmos competunt, succi oryzae, aut chondri, siue id genus alicuius, cum a dipe caprino, siue hircino, & quaecumque in capite de tenesmo memorata tenentur. Quod si sanguis excernatur, polygoni succus immittendus est, aut plātaginis cum acacia, uel hypocyctidis, uel alius eiusmodi. Quin si urgeat ac molestat, eorū quippiam quæ sanguen attenuant ac comprimunt, *ιχθυου* græce appellata, immittito: uerbi causa, lanæ succidæ ac immundæ cinerem, uel spongiæ inanis pice liquida irrigatæ, seu sanguine bouillo, aut alumine liquido crematæ, aut onidis cremore. Porrò Andronius etiam pastillus præstans medicamentum est, atque ipsius quoq; Musæ, & his non ab similes: Necnō & ea quæ deinceps sequuntur collyria multò efficacissima habentur, præsertim in quibus cum laboribus alui excrementa eijciuntur. Sed huius ne depascendo serpens (quā Græci *ὀφελον* appellant) intestina occupet, deprehendemus graueolentia, & putrefactione retrimentorū, & quod non ab initio statim, sed interposito tandem tempore, ortum sit: clysteribus crustam inducentibus utamur: cuius farinæ sunt pastilli qui Faustiani cognomentum obtinent, & *ὁ δὲ χάρυ*, pastillusq; cognomēto Bithynus & Thronius: *ὁ δὲ τὸ φθίνον* item, hoc est ex subere confectus, cum lentis elixatione, aut astringentium quopiam immissi. Cæterum & hoc sæpius à me expertum est enema, omphacidis crematæ. Est præterea cauium, unde glans quercus enata est, quo utique coriarij utuntur. Auripigmenti, Symphyti, rhu Siriaci, & quas horum concussorum partes, quantum uidelicet duo capiunt cochliaria oryzae succo excipiens, & cremore herbæ anchusæ spinosa grandiaq; & nigra folia habentis, quam chcerosphelethon nuncupant. Quorum item albugini ex æquo pondo uncias duas, aut treis immitte. Epithemata porrò quorū facta est in uentratis mentio, atq; secundum uentrem catachrismata ē materia quæ astringendi arescendiq; potestare habent conflata, cum aliquo glutinū habente, parteq; cōmeos, thuris, glutini taurini, quā taurocolam nominant, pollinis, in id genus cataplasmatibus locum habeant. Alimentum sic habentibus principio esto *ἀγλαα*, mox inde ē frumentaceis forbilationes, cum per se tum unā cum lacte elixa. Sed & lac quoq; modice decoctum præstantissimum est. Cæterum holerum usus neutiquam necessarius: possunt tamen gustari cichorij elixi, & intybi, & plantaginis, & brasicae bis coctæ, & pomorū astringentiū succi, carnes ipsorū expuendo, aut quæ aliās asperiora reddant intestina. Quod si calor in multā uenerit intemperiem, intybū crudum exhibendū erit: aquam egelidam abforbeant: potum alioqui præstet aqua pluuialis: stomacho uero quoq; affecto, etiam uinum.

Dysentericis
que mltis ras
po conueniat.

num: Volucres deniq; aridiores, & quæ concoctioni nihil renituntur, dysenterico morbo oppressi manducet. Lauacris utantur ex aquis dulcibus. At si fluxu etiam noxi alicuius humoris tentetur, prægrandem spongiam, uel micas panis siliginæ irrigans & macerans uino Ascalonite, aut aliquo calido adstringentis naturæ, aluo appone, uinculisq; alligato, atque ita tandem lauari præcipito.

De ægitudine Colica. Cap. XLIII.

- C**olon crassi intestini laxior pars est, à dextris quidem ilibus oriens, in modum zonæ seu cinguli in sinistra excurrit. Dolores in eo pluribus de causis suscitantur immensi: aut enim propter crassum pituitosumq; humorē inibi cōprehensum intra ipsius tuniculas, aut propter spirītū etiam crassum acturgidum inflatumq;, & exitum unde erumpat non habentem, aut propter phlegmonen intestini, aut propter acutos deniq; & uellicantes humores insurgentes. Quibus itaq; crassus pituitosusq; humor ægitudinis huius causā existit, his dolor certe per uniuersum funditus quidem epigastrium, hoc est omnem eam uentris partem quæ umbilico undiq; adiacet, diffunditur, præcipue uero ubi ista coli positio est, tantus quidem ut quasi perforari sentiantur intestina. Strophī hos, hoc est torsiones intestinorum circa umbilicum excruciant: ructus item & nausæ, uomitionesq; uariæ, sed in primis pituitæ: uenter ipsis tam ægre cōtinetur, ut ne flatus quidem euadat: Excretum autem oletulum bubulo stercorei par omnino uidetur, non tam leue, quā inflatione refertum. Hæc uero præcedunt maxime, gelidorum, crassiq; humoris esculentorum iugis admissio, satietas, coctricis facultatis debilitas & prostratio, otium item segnities'ue, & id genus alia. Eis uero qui dolorem suum flatulento spiritui acceptum referunt, extensionis, potius sensus oboritur. Quibus autem ob loci feruoris inflammationē sensus est, & febris uexat insignis, unaq; cum stercore lotium retinetur, & pulsus iuxta uentrem perturbationem commouet, sitis æstusq; hos ac nausæ infestant, & uomitiones bilis potissimum, quæ tamen nihil quicquam malum subleuant. Ea quidem, ut uno uerbo eloquar, omnium infestissima est colicarum ægitudinum affectio, futuram in gracilioris intestini morbum, quem Græci nuncupant, mutationem minitans. His præterea qui propter acres & uellicantes afficiuntur humores, perinde atq; quum subest inflammatio, æstus & sitis & uigilia exurgūt. Febriūt aut modis omnibus minus quā illi, lotiumq; acre emittūt, & biliosum deiciunt, & sæpenumero in alui defectione plurimū torquentur, & si quando edulia calidiora, eiusdemq; qualitatis potiones admiserint, magis magisque irritant. Quocirca medelis succurrentes, ijs qui colicum dolorem ad gelidos, tenaces, & crassos humores referunt, in primis quidem prouidendū ne uehementer calida adhibeamus remedia, nam ab admodum calorificis plurimum liquefiunt, magisque inflant humores huiuscemodi, quos circa morbi statim exordia me-

Epigastrium.

Quæ perniciosa
sistū colica.

dicamentis minime instantibus, attenuatoriae & siccificae naturae, absque immodica calfactione, intersecare & concoquere expedit. Proinde ex aliquo oletum clysteribus huic ægitudini idoneis educentes, iugiter adhibendum est oleum in quo elixum sit cyminum, aut ruta, cum adipe anserino, uel gallinaceo, ex radicibus uel sylvestris cucumeris elixatio, myrrhæque drachma una, cum melle & oleo. Atqui oleo etiam sæpe communi adiecto, pituita uitri formam præferens egeriur, instantemque protinus dolorem mitigat sedatque. Sed si nimio dolore ea affectione oppressi consternantur, enimaque immissum non reddant, balneum eis adhibendum est ex melle, cymino, nitro, rutæ semine, aridæ brassicæ caule, probe seruefacto, & muria irrigato: uel brassicæ cinere melle temperato, aut colocynthide trita cum melle nitroque atque cymino. Cæterum lauacra quibus in hac affectione utendum est, sex dactylorum, altitudine sunt, ut superent et transgédiantur insidentis podicem. Anus præterea cyclamini cremore, & nitro, uel cætaurio cum melle & nitro illiniendus est. Perdurante autem his peractis etiam dum doloris tractu, præmemoratis rebus adiicienda sunt, resinæ terebinthinæ uncia una, siue opopanacis drachma una, aut galbanes drachmæ quatuor, bituminis æqua portio, cum nitri drachma una, aquæ uncia una, & olei rutacei uncis quinque, uel plus: languetiumque partes ex oleo cymini uel anethino uel cucumerino irrigandæ sunt. Cataplasmata insuper diacrispermon, quod est è tribus seminum generibus, cum cymino, baccis lauri, & semine apij, imponantur. Porro epithemata quorum in hac ægitudine usus commendatur, *ἡ ἀπὸ σπέρματος*, hoc est ex seminibus sint, & *ἡ ἀπὸ λαυρίων*, id est è bacis lauri, & *ἡ ἀπὸ μελιλότων*, quod est ex melilotis concinnata, atque Polyarchium. Collocandi item colico morbo possessi in scenogræci, althææ, chamæmelorum, artemisiæ, anethorum, lauri, & id genus aliorum decocto. In oleum insuper calidum uel hydrelæum ijs descendendum iudico. Portiones porro sint absinthium & cyminum æquis portionibus, aut panax cum aqua uel castorij uel anisi, piperisque drachma una cum oxymelite. Quod si dolor nihil remittatur, potionandi sunt confectione, quæ quia è tribus piperis generibus constat, *ἡ ἀπὸ τριῶν πιπέρων* appellatur, uel theriaca. Sinapismo (quo nomine exhulcerationē, quam impolito aliqua corporis parte sinapi efficit, medici significāt) adhæc & dropace unguento in remissionibus utendū, & sua sponte emergentibus naturalibusque lauacris. Cæterum ex aqua potabilis lauacra effugiant, nisi ob doloris afflictionē cogantur. Quo quidem tempore antequam prædicta medicamina adhibeantur, lauacris immittendi sunt, fouerique ac cal fieri in calidis ignitis uel parietibus iubeto, intercalatis ac insertis aliquibus nitrosis smegmatibus. Quod si dolor uehementior exaceruat eo malo possessos, tum mediocriter consolari & reficere potentibus utendum, cuiusmodi censetur è castorio confectus orbiculus pastillus uel cum eliquatus tum in potu sumptus, & huiusmodi medicamenta. Enimvero à narcoticis uehementibus, hoc est quæ stuporem inducunt, summopere cauendum

Sinapismus.

cauendum est, quæ non nihil quidem reficient, sed diuturniorem affectio-
nem reddent, crassiores faciendo materiam, meatusq; in testini reddendo
densiores. Pituita uero attenuata, hiera alata, uel globulis (qui quoniam de-
uorantur, *καταπνίσι* dicuntur) huiusmodi purgare expedit: Accipe aloës,
euphorbij, cocci gnidij puri, scāmonij, æquas partes: exhibendi sunt scru-
puli duo. Adhæc præterea uictus ratio calidior & aridior colica ægrimo-
nia obnoxijis conuenit. A primordio quidem morbi, genius defraudandus
est, inediaq; perferenda, mox inde acriora manducanda: porra itaq; costæ,
eiusmodi afflictioni detentis esui dentur, cum cōdito. Apia quoq; & elium,
asparagus, allia cruda, præcipue eis qui hæc minime fastidiunt, neq; offen-
duntur. Verum cōditum ipsum quoq; potent, panemq; admixtū unā cum
ipso sumant. Escas deniq; etiam reliquas probi & inculpati succi, et conco-
ctioni nihil reniētes, utiliter exhibebimus. Auertēda manibus pedibusq;
est non tam satietas, quā ipsa quoq; cruditas.

Narcotica.

Catapota.

Vitus colicorum.

Curatio colicæ ex uentis natæ.

Vbi uero flatulentus spiritus dolorē suscitauerit, post ea quæ nihil flatus
habent esculenta, poculentaq; cucurbitulæ quoq; perquam ingentes
succensæ inanes adglutinatæ uniuerso uentri, nonnunquā ad placandum
morbum satis adminiculi præstiterunt. Quod si intestinū occupat inflama-
tio, è cubito magna cum utilitate sanguinem detrahemus. Quin si mi-
ctionis difficultas, quæ *Αυροσπία* à Græcis nūcupatur, in hac ægritudine do-
minetur, uenam in malleolis secabimus, atque iam pridem enumeratis ute-
mur adminiculis, exceptis acrimonia præditis & uehementius expurgan-
tibus. Sed lenientia potius mitigantiaq; cataplasmata, & irrigationes usur-
pamus. In oleum quoq; descensus, quā *εμβασις* græce dicunt, cōmendatur.
Cucurbitulas interim istac ægrimonia possessis utiliter adglutinabimus, ce-
rotamq; epigastrio uentriculoue applicabimus, quæ ceræ quidem habeat
uncias quinq;, chamæmeli uncias duas, rosacei uncias totidem, fabacæ fa-
rinæ unciam dimidiam, lutea ouorum quinq;, cremoris seminis lini, uel leui-
gari chymam. Tenuis item & febricitantium, sic habentibus præscribenda
est uictus ratio, absq; inflammationis solutione.

Cura colici affectus ex acutis & mordacibus humoribus.

Quod si acres & uellicantes humores tam mali doloris caussa extite-
rint, immittendi sunt oleo in quo elixa sint fœnogræcum, aut althæa,
cum simplici adipe recentis anseris, siue gallinæ, uel cremore quoq; ptisanæ
cum rosaceo, aut seminis etiam lini liquore ac succo. Potionandi uero sunt
colici antidoto ex aloë amara. Lauacris porro ex aquis dulcibus danda est
opera. Cibis uero utendum qui sorberi commode possint (unde & forbitio-
nes uulgò à medicis uocantur) ex chondro seu ptisana, piscibusq; saxa-
tilibus, & ut rem uniuersam uno uerbo perstringam, omnis uictus ratio
humidior frigidiorq; esto. Cauendum est modis omnibus à cunctis acri-
bus & acutis cum dapibus tum medicamentis, irrigationibusq;, & catapla-

fmatis calentibus, fortius eorum quæ cataplasmatibus modo imponunt, nec, nō & uini potatione, in primis autem perantiqui. Quod si dolor admodū uolentus sit, & quasi tyrannidem in laborantem exerceat, ijs quæ stuporem inducunt, *πρεστυνία* à Græcis appellata, utendum: neq; enim quicquam lædunt in id genus ægritudinibus crassescencia & modice frigorigentia, naves uellicantesq; humores. Cæterum etiam hac nostra ætate, mea quidem sententia, ex talibus humoribus colica interdum ægritudo nascitur. Quum morbus quidem ille cœpisset à finitimis regionibus Italiæ, & per rariq; alia Romani imperij loca, instar pestiferi cuiusdam contagionis peragrasset, unde non paucis quidem in morbum comitalem, alijs uero in membrorum resolutionem, quam græce *ἀλυσίη* nominant, superstitie tamen & incolumi sensu: nonnullis autem in utroq; delapsis, magna pars eorum qui ex hac ægritudine in comitalem morbum ceciderant, uitam in mortem commutabant. Quorum uero morbus in paralytici transierat, pleriq; euaserunt, perinde atq; in decretorio crisiue, transmutatione caussæ. Hoc itaq; modo affectis medicus quidam per Italiam curam adhibuit: suspectam sanè atq; infidelem quandam frigorigentiam commentus & exercens curationis methodū, temerariamq; magis educationē. Lactucas namq; eis crudas refrigerans, intybaq; consimiliter, uel ultra saturitatem etiam comedendū exhibuit, præterea uuas, & mala, duriorisq; carnis pisces, & quæ cunctq; habent cutē crustaceam, quæ Græci *ισοκρίδια* uocant, boum pedes, bulbosq; & id genus quæq; alia, nō modo natura potētiaq;, sed tactu etiam perfrigida. Vinum sanè non nisi rarenter admodum admittebat: aut si interdum, aqua gelida dilutum exhibebat. Aquam item egelidam propinabat, & poscam (quod melicratum græce nominant) frigidā. Ab alimento præterea omni calido, mediæq; temperaturæ, uehementer abstinebat. Atque cōplures aliquot hoc tam temerario absurdoq;, & à morbo sanè præfenti (ut uidetur) alienissimo nutrimentu seruauit, pristinq; salutē ad unguem, ut sic dicam, restituit: quospiam ex illis etiam qui iam iam in Herculeum morbum, quam Græci *ἀνδρομάνη* indigitant, resolutionemq; neruorū labi cœperunt, pulchre auertit & liberauit.

De gracilioris intestini ægritudine, quem ileum dicunt uulgò medicū. Cap. XLIIII.



Cutissimum, & quod implacabiles grauissimosq; dolores facit malum, ileon est, periculo grauius secum ferens symptoma, hoc est casum: miserabili siquidē morte tandem enecatur eo morbo detenti, alui retributa per os reddentes. Constat uero isthac affectio cruditatibus, & obstructo excrementorū exitu, retentis quæ iam corrupta sunt: Cæterū letaliū quoq; uenenorū potu nōnunq; hic morbus oritur, atq; in scortū descendantibus intestinis, intestinorumq; inflammatione, potissimū sub colicæ affectionis exortu. Pueri igitur hoc malo oppressi irrigationib. embrochis ue, cataplasmatibus itē, & clysteribus, balanisq;, atq;

Paradoxa curationis
ratio ægritudinis
colicæ.

40

atq; pyrrijs, quemadmodū in colicis memoratū est, medendi sunt. Adolescentibus autem puberibusq; sanguis secta uena audacter detrahendus est: Sin minus, cucurbitulæ toti uentriculo epigastriūque multæ atq; inanes sunt adglutinandæ, & circa dolentes partes cum scarificatione eadem sunt imponendæ. Membraporrō ipsorum perfricanda atq; constringenda: clysteribusq; & enematis utendum: embasibus item infessuū olei calidi, anidioris, & expurgationibus, & ut uno uerbo expediam, omnibus quorum usus est, in colica ægritudine affectis, exemptis his qui ad acutos & uellientes humores colicum dolorem referunt. Mirifice præterea conducit 10 ipsis si euomuerint, anethum elixum & epotum. Confestim uero à potu pane in calidam aquam immisso manducandam buccam eius calidam ileo sis porrigito. Sed cibum non continentibus, rhun & cyminum terendo in oxymelite, potui præbeto cyathos sex. Porrō eos qui in exitiosum ac letalem inciderūt ileum, aquæ calidæ potu uomere cogito. Cæterū omnium letalium uenenorum sumptorū notificationem ac signum habes uolumine huius operis quinto. Deinde bibendum quoq; oleum calidum, aut ius pinæ, quo denuo ciatur uomitio. Post aliquot dies theriaca in potu fumen- da. Perseuerante autē oppilatione, lacte scisso, cum exigua scammonia, uel aloë, aut purgante aliqua materia aluus euacuanda est. Quod si ob id quod 20 in scrotum descendant intestina, eadem sit affectio, collocantes eos quam- primum supinos, in pubem bubonem uel delapsum intestinū reprimemus, uinculoq; & ligamento illud ne recidat, contineamus.

De renum uesicæq; affectionibus & primitus de calculorum morbo quæ
descriptio nominatur. Cap. XLV.



Orborum germanitas atq; cognatio, ut seriem nostræ doctrinæ prosequar, compellit. Commune quippe colica ægritudine, renumq; calculo laborantiū est, intra primordia statim uentrem cohiberi, grauiq; dolore opprimi, & appetentiam profligari, atque circa umbilicum intestinorū torminibus torqueri. Peculiare ue- 30 ro colicis, in his omnibus longe magis extendi. Nephriticis aut, hoc est do- lentibus ex renibus, minus. Colicos præterea dolor quidem potius in dex- tris ilibus uexat, atq; ad stomachum usque penetrat, iecur item atque lie- nem: oletum omnino nullum redditur, ita ut neq; inflatū euadat, & quan- donecessariò excernatur, flatulentum sit, & nequaquam ab simile stercorei bubulo: Nonnunquam etiam pituita uitrosa desiciatur, lotiq; plus, quod etiam ipsum pituitosum editur. Nephriticis autem in ipsis renibus dolor quasi fixus hæret grauis, instar paxilli perforantis, & ex aduerso testicu- lus dolore afficitur, scemur stupefcit circa lumbos seu ilia, desicietq; excre- 40 mentum sua sponte rariuscule. Cæterum clysteribus omnino aluus inflata, stercus biliosum edit, lotium exiguum ac sabulosum magis redditur, mea- tusq; urinæ constipatur: Hæc habentur in renum calculis indicia, quæ uiris utiq; ipsis, ætatiq; perfectæ potius eueniunt. Atqui in uesica calculorum concretio, puerilem ætatem uexat frequentius. His autem arguuntur notis,

lotium editur crudum & subalbidum continue, cum sabuloso sedimine, contrectant subinde uerenda atq; intendunt, identidemq; in lotium urgentur, & strangulatur urina, quod mali genus *σπυγγώνας* Græci nominant. Materiata itaq; gignēdis calculis occasio est, crassus & humosus terrestris ue humor: effectrix uero, flagrans renū ardor, siue uelicae. Ceterum in renibus quæ calculos comminuunt, atterant, inciduntq; utendum medicamentis est, neq; tamen immodice & excellenter calorificis: cuius farinae utiq; sunt, Basilicorū a sparagorum radices, rubiq; uitrum item cōcrematum, & graminis (quæ agrostis dicitur) radix, & adiantum, bdellium, lauri radicis cortex, althææ semen, cicerum nigrorum ius, spongiarum calculi, scille¹⁰ ticum acetum, mium, asarum, carpilia, farxiphages, sium præterea cum mansum tum potum, scolymiq; radix, irion, prionites: lauacrisq; iugiter utantur, & à lauacro confestim eorum aliquid quæ memorata sunt, potent. Embrochis insuper cataplasmatismisq; & calfactionibus, quas *ωυγίνας* Græci nominant, infessibusq; balneorum: Et his præterea, quæ omnes iam græce uocare chalaistica, hoc est relaxantia solent, atque hīs quæ solatio sunt placantq; utendū, huc ex affectione colica assumendo. Cōpositæ autem potiones, quarū usus in huius morbi curatione probat, hac ratione concinnantur: Rutæ agrestis, & maluæ syluestris, apijq; radices cum uino elixato, liquoremq; expressum aquæ confundens, cochliaria duo exhibeto. Mace²⁰ rato uero hoc in emplastrum: Balsami fructus, calculi qui in spongijis, pulegij aridi, maluæ syluestris seminis, æquas portiones sectas, cochliarium, cum uini diluti cochliarijs duobus propinato: arefactumq; sanguinem hircinū, cicadas aridas demptis alis ac pedibus: Et tecolichi ex cenomelite in lauacri calido folio exhibeantur: & quæ ex illis cōponuntur mixta medicamina, atq; fusca emplastra nephretica, necnon & quæ ad eam functionem comparata sunt condita. Troglodites præterea auis ex his quæ cum primis maximeq; adminiculo sunt, esse censetur. Est autem hæc passerulorum inter omnes auiculas minima, solo eo, cui Basilisci nomen est inditum, dempto: minima nāq; auicula quū sit, hac sola est maior, & colore cō³⁰ par ac similis, inter cineritium & uiridem medio, tenuis paruiq; rostri, parietibus sepimentisq; maxime agens, quæ sale tota condita, & cruda iugiter comesta, concretos iam calculos lotio expellit, atque deinceps neret nascantur, prohibet. Cremata item hæc tota cum alis suis uiua in cinerem, cinis uniuersus cum per se tum adiecto pipere & folio moderato, ex eucratomelite, quasi bene temperato melle dicas, epota, hoc ipsum facere censuerunt. Cæterum ad dolorum acredinem & acerbitatem uigiliamq; tum Sotira, tum Philonis probantur medicamenta. Dolorem præterea saepe numero placauit sanguinis opportuna detractio, ocyslime ad excretionem propellendo calculum.

Prophylactica generationis calculorum.

QUO uero nulli in renibus calculi gignantur, custodia quadam acurata, ut reor, prouidendum est. Ad quam rem optime facit cum primis, ut probi

Troglodites
auis.

probi quidem succi, ita & moderatum alimentum, necnon exercitia, iugis leguminum, omnium frumentaceorumque usus faceffat. Caseus item & lac, quæque inde fiunt obsonia, uinum adhæc atrum & carniū abundantia, & ut semel omnia complectar, cuncta quæ crassum generant succum, quæque admodum calidæ sunt potestatis & acria, hydrogara inquam, atque condita, & id genus alia, hæc cane peius & angue auertenda sunt omnia. Haud enim uero hæc modò nondum natos calculos sisti prohibent, sed iam etiam ortos comminuere, aut excernere possunt. Bibant uero oxymel, adiecto aliquo ex simplicibus quæ lotij proritandi uim obtinent, puta adianti, apij, graminis decocto: Postque balneum ieiuni ante uinum, pulchre temperatam aquam hauriant, & in medio prandio gelidam, nisi quid impediatur, forbeant. Quod si prauorum humorū copiam olfecerint, sensusque perceperint, sanguinis uena secta detractione, aut expurgatione euacuentur. Verum ad custodiendum ne gignantur calculi, primum inter remedia bonitatis honorem meruit, post balneum ante uinum nutrimentumque, puræ aquæ tepidæ potus. Sed in uescicis puerorū calculi, efficacioribus & uehementioribus adminiculis superantur & conficiuntur: quæ quidem prædictis sunt seligenda. Quod si supra modum calculus creuerit, & ceruix uel sic obturata fuerit, per quassationes *κατακρησμοίς*, uel lithotomia, perine-

20 de atque in uolumine de chirurgia dicetur, utendum.

De renum inflammatione.

Quod si inflammationem renum aut uescicæ ex lotij ponderoso seruoque cruciatuque, & ex eo quod febricitant, cespitant, infaniunt uel, & quod biliosa sincera euomunt, & meiere nequeunt, præsertim uescica phlegmone oppressa, deprehendes, sanguinis detractione quamprimū erit occurrendum: & placabilibus, asperginibusque, & cataplasmatibus utendum, ruta, anetho, scenograeco, althææque radice constantibus. Clysteria porro in ea affectione probantur mollia clementiaque, necnon enemata quæ ex oleo, & papauere, & adipe anserina constituuntur. Verum in uescica si fuerit inflammatio, opij quoque obolus semis cum myrrha crocoque ac oleo sedi immitendus: Melicratum ipsis propinandum, abstinentes à ualde lotium cientibus, multaque potione: nisi acris ac biliosus humor naturæ modum nimium excedens abundauerit tum: quippe copiosiori potui indulgendum, & conferatim semel eorum quippiam quæ urinam absque uellicatione morsuque propellunt, hauriendum. Potent præterea semen lini pondo medimnos duos, amyli medimnum unum & coclearium in aqua: Sumatur item cucumeris atque peponis semen. Feruida autē ignitaque planè sensatione renes adiacentesque eorum partes occupante, lintheola quæ græce *πλυντρίδες* dicuntur, uino rosaceo aut aqua rosacea melinodue intincta, inficienda sunt: uel cerota, cera, rosaceaque & chamæmelino oleo constante, siue melino, & ouorum luteis, cum aceto perexiguo: aut feminalis, quod polygonū nominatur, cremore composita. Postremo autē ea quoque quæ ex succis cum chamæmelino concinnatur cōfectione utendū. Sed auertenda sunt nimis calida, propter mutationē

40

in pus, nimirum consimiliter frigorifica, renes nanq; promptissime sub illis obdurefcunt. Abstinentum uero à lauacris est, imminente ac iam auspice phlegmone. Et uictus deniq; ratione, quæ febricitantibus conducit, & ἀφαισμητικῶν appellatur, utendum.

De urinariorum partium abscessu, & exulceratione.

A Postasim renibus subesse portendūt dolores iliorū & lumborū, turba
Atiq; & interpollati horrores, & febres quædā inordinatæ. Abscessum
uero uesicę & finitimorū locorū, præter ea quæ memorauimus signa, dolor
etiam partis insinuat. Renem porro affectum deprehendes ex eo, quod ho
mo in sanum decumbens latus, circa oppositum doloris ueluti suspensio
nis sensum percipiat. In quorum sanè curatione infessibus ex hydrelgo præ
paratis utendum est, cataplasmatiscq; ex polline, & oleo ac resina confectis,
aut farina orobina, melle, aut cardamomo, aut stercore columbino cum cari
cis seu ficibus. Pus uero cum lotio affatim mictū, ruptū abscessum, atq; in
particula hulus esse declarat. Quū uero etiā absq; ullo abscessu, ruptoua
se, uel propter sanguinis profusione, parte acriore materia exesa, aut calcu
lo atterēte exulcerantur urinarij meatus, distinguenda est in renibus exul
ceratio, ab ea quę circa uesicā aut urinarios meatus fit, ad hūc modū. Quan
do renes ex aliqua occasione exulcerant, dolor cum quadā grauitate par
tes circa lūbos creberrime uexat, & citra impedimentū emingūt, atq; cum
lotio pus aliquando excernit, exiguæq; carunculæ cum urina nōnunq; ex
pelli uidentur. At si uesica hulcere intentet, uehemens admodū dolor peñi
nem hypogastriumq; impetit: urina magna cum anxietate redditur, et post
mictionem pus in fundo matulæ subsidet, squamulæq; in ipsa tetri odoris,
aut lamineq; circumferuntur. Furfuræ uero hypostases uesicam scabie labo
rare significant. Quando aut meatus qui ē renibus urinam ferūt, qui græ
ce οὐρητῆρις dicuntur, hylceribus infestantur, tum lotium pus intercalatum
atq; cōmixtum possidet, & capillis quædam persimilia interdum in urinis
apparent, & dolor in loco inter renes atq; uesicam excruciat. Cæterū pus,
aut sanguis etiam nonnunq; solus absq; lotio excernitur, & sine ulla earum
rerum quas hactenus recē suimus: idq; haud obscure in pudendis exulce
rationem consistere indicat. Potionandi sunt itaque secundum ureteras ex
ulcerati, mulso, uel scœnogræci decocto, unā cum melle, aut cucumeris se
mine cum passo. His uero quibus pus lotio excernitur, bolus Armenus ex
hibendus est, uel ferularū crematarum cinis, quantum tribus digitis capi
tur cum passo. Sed & galactoposia, hoc est, lactipotatio magnifice sic affe
ctis opitulata plerunq; est. Hactenus simplicia, mixta aut hæc sunt. Sumi
to seminis lini, seminis cucumeris, tragaantha, singulorū drachmas duas,
ex quibus pastillos conformato. Aliud: Strobili nuclei pinei uiginti,
cucumeris satiui cochliaria quadraginta, seminis uidelicet, amyli drachmā
unam, excipe in heminas duas, elixationis nardi, seminis apij, uniuscuiusq;
pondo drachmarū quinque. Verum Archigenes in epistola quam scribit
ad Atticū, dysuria (inquit) urgente ac infestante, accipito seminis papaueris

*Abscessus uesi
cæ insidit.*

*Note renis
affecti.*

*Inter exulce
rationē renem
& uesicæ dis
crimen.*

*Signa hylceris
quod οὐρητῆρις
occupat.*

albi in cinerem redacti & cōtriti drachmā unam, iunci odorati rotundi, uel calami, aut glycyrrhizæ decocto, inspersam. Exhulceratos aut̃ urinararū partium dolores illud adimit: Semina cucumeris repurgati numero triginta, nucleorum pineorum duodecim, amygdalarum amararum cortice dempto trigintaquinque, croci quantum satis est ad inducendū colorem, utitor ieiunus quotidie cum lacte siue protropo, hoc est uino quod antequā uuæ *πρότροπον* calcetur defluit. Mitius sanè ac blandius omnino fuerit, si loco strobilorū tantundem feminis maluæ accipias. Sanare præterea idem affirmat exhulcerationes uesicæ posse confectionem Cyphi, & cyphoidosas antidotos.

10 Nos uero in uetustioribus hoc usi medicamento, neutiq̃am amplius plurifario neq̃ exquisitiore egebamus: Chamædryos, chamæpityos, singulorum drachmas uiginti quatuor, asari, piperis albi, uniuscuiusq̃ drachmas septem, cinnamomi drachmā unā, q̃ fieri potest leuigatissimi accipimus: huius cōpositionis cochliaria duo exhibemus, cum passo Cretē si: at si febricitent, cum aque cyathis tribus. Quod si morsus hulcerosus ex cruciat, amyli corylas duas, & feminū cucumeris quindecim adiiciētes, uoti usq̃ omnino cōpotes reddimur. Haftenus quidem ex decretis Archigenis. Sed ad inflationes si referuntur dolores, medicamenta, tum quæ ex syluestris maluæ semine constituitur antidotus, tum *σκήπηνομαστον*, hoc est quæ ex bellarijs confit, utilia sunt. Porro in ita habentibus, epithematis quoque circa orron, portionem quæ testiculos interiacet atque fumen, quorum alterum sanè Græci *σπίρατον*, alterum *κίτρον* nuncupant, utendum. Cerotis quidem ex hyssopo & butyro, adipeq̃ anserina, atq̃ styrace. In uesicam uero dysteridio instrumento mullum suauissimū infundentes, seu lac cum perquam exiguo melle, aut cucumeris semine: aut alborem oui cum spodio, quod *πομφόλυξ* appellatur, aut aliorū deniq̃ prædictorū medicaminū aliquo. Atqui hucere pascendo serpente, pastillus ē charta immittendus est, aut Byrhinius. Postremo cataplasmatibus etiam modo imponatur *σκήπηνομαστον*, necnō *σκήπηνομαστον* (quorū illud ē palmulæ dactylis, hoc ex uuis passis, unde &

30 nomina sortiunt̃, confectū est) cum galla, acacia, hypocystide, & alumine.

De eruptione sanguinis renum.

Renes haud raro propter imbecillitatem suam nequeunt lotia cōtinere: sed latiores existentes, ē uenis sanguinis aliquid excernūt, aliasq̃ crassitudines mittunt. Sæpenumero copiosum etiā sanguinē renes effundūt, & id quidem per circuitum, perinde atq̃ ipsæ quoq̃ hæmorrhoides consueuerunt: euacuati uero subleuantur & cōmulcent̃. In quo utiq̃ affectu nihil conestim obturbandum est, rursus sanguine missō siue concreto: Quod si permanet, sanguis ex uena cubiti detrahendus est. Cæterū, ut semel dicam, in renum atq̃ uesicæ profusa sanguinis effusione, iisdem medicamentis utendum, quorū solennis usus est in hæmoptoicis, id est sanguinē screatu efficiētibz, & alijs hæmorrhagijs, quod est sanguinis eruptionibus. Sed in primis symphyti radix, ac tragacātha uino macerata, in eiusmodi afectione constitutis exhibenda est, seminalisq̃ & plantaginis succus, cum

posca, aut amygdala amara cum passo. Aut illud: Aluminis fissilis drachma una, tragacanthæ drachmæ duæ, commeos oboli quinque cum passo. Cata plasmatisque more hordeacea polëta ex posca & rosaceo imponenda est: aut confectio ex palmulis, diaphoenicon appellata, & filigineo, cum acacia aut hypocistide in uino astringente, aut oxycrato elixis. In uesica præterea sanguinis eruptione tentata, cucurbitulæ quoque ilibus, & natibus, coxendicibus uel sunt adglutinandæ. Quod porro membrum sanguinem reddit, loci dolore deprehendes, & excretionem sanguinis lotio commixti, aut non: quemadmodum de pure memoratum est supra. Quum uero sanguis in uesica in grumos uocatos concreuit & conglobatur: deprehendes autem illud non solum, quod post redditum ea parte sanguinem pernitens urina supprimitur, uerum quod etiam color quidam sanguinem præse ferens, ut consentaneum uidetur, prorumpit, aut cruenta quæpiam humiditas: potui decoctionem artemisiæ porrigito, heliochrysi, aut conyzæ, aut raphani semen, aut succum laserpitii, siue cyrenaicum, siue apii cremorem, in aceto mixtis singulis, uel erinacei coagulum, uel hinnuli, uel hœdi in oxymelite: statim uel (quæ myrrhæ expressæ pinguißimus flos & liquor est) cum oleo exhibeto: aut spongiæ foris ex salfore, statim uel calida adhibendæ. Quod si his quoque rite peractis non soluitur, secunda est ea inter testes particula, quem taurum uocant, græce uero perinaeum, perinde atque in his qui laborant calculo. Deriuato autem & exhausto sanguine in frustula conglobato, concinniter, ut expedit, medetor.

De renum duritie.

CAeterum quæcunque durities in renū sedibus suscitantur, dolore quidem Chaud amplius excruciant, sed uidentur ipsis quasi ex ilibus suspensi esse, & stupidi quidē sunt lumbis illis uel, debilesque cruribus: lotij non nisi paululum emittunt, uniuersusque corporis habitus aqua intercute laborantibus similis est. Hos cerotis mollescito, & malagmatis, frictionibus, atque fomentis: adhæc quæciere urinam possunt offerto, uentremque subluito.

De Diabete.

Diplocos.

Diabetes (quod urinæ profluium sonat) pernix assumptorum potuum transitus est, exuperanter redditus omnibus que bibita sunt, nihil à sua qualitate mutatis: quapropter supra modum in ea affectione constituti, sitiunt: unde diplocos quoque eandem ægritudinem appellant: Ad contentricis uirtutis renum imbecillitatē, huius mali causa referenda est: potentia uero attractrice interim robustiore, atque uniuersam quoque corporis molem, propter immodicum calorem exiccante. Huic itaque morbo renitentes, aut pro uirili obistentes, alimenta plura, transmutationisque resistentia, neque admodum humida exhibeamus: puta halicā, quā Græci ἀλικα dicunt, cum rosato, aut rhodomalo, aut hydromalo, aut uino harno, aut quopiam alioqui calido: fortissimus in eum quoque ordinem intyba, cichorium, lactucas, piscesque saxatiles, & suū cum pedes tum uulvas, piraque ἐπίως appellatos, & mala, malaque Punica, & potionē gelidæ. Potionandi præterea sunt diabetici cremore polygoni,

ni, hoc est seminalis, & enula cāpana in uino nigro, palmularū item diluto (quod græce apobregma nuncupat) myrtorumq;. Cataplasmatū insuper modo præcordijs ac renibus applicāda sunt, farina in oxyrhodino, hoc est aceto rosaceo, foliaq; uitis, & umbilici Veneris, & elxines, necnon portulacæ. Adhæc sudores sic affectis ciere ac uomitus: à frigido potu, & omnibus quæ urinam proritant, abstinere expedit. Intra uero initia statim sanguinem detrahare, neq; abhorrens neq; absurdum in ea afflictione fuerit.

De stillicidio urinæ, difficultateq; meiendi, quorum illud quidem græce

σπρυγγολαγ, hoc uero *σποροειν* nominant.

- 10 **Q**uod si neq; phlegmone, neq; calculo, neq; quopiam prædictorū alio præsentē, lotij acrimonia uexet, uniuerfusq; corporis habitus, & reliqua indicia bilem subesse præferāt, ea sanè uel dysuriæ, uel strāguriæ causa consistit: iam tum utiq; cum ijs quæ hanc alterare, tum quæ temperare eandem queunt, uti cōuenit, pitisanæq; cremore, ac piscibus, & balneis, congruaq; uictus ratione: Ab acris uinoq; abstinendū: exercitijs item pariter & ira, & seræ cōcoctionis dapibus. Si uero lotij tenuitas fuerit cum allore cōiuncta, ceteræq; notæ gelidā agant intemperie, uinū calidū cōuenit & cōdita, & quæ urinā proritare possunt medicamenta, & eiusdem facultatis esculenta, in seßusq; calidi. Quod si lotiū appareat cum cādore crassius, 20 phlegmaticū humorē collum uesicæ obstruxisse colligito, atq; ob id quidē oxymelite utitor, elixationibusq; ex hyssopo, & pulegiō, aut origano, aut thymo, uel laſerpitio in aqua mulsa, & irrigationibus calidioribus: At si humor crassius, siue calculus, siue sanguis cōcretus, siue id genus quippiam opipilans impediāt urinæ exitū, purgandi utiq; ei constitutioni obnoxij sunt; nisi inflammatio quoq; membrū occupet atq; infestet. Cæterū si febris difficultati urinæ adlit, huic erit irrigationibus ex rutæ seu anethino, seu per ueteri oleo medendū. Quū uero alius fuerit astricta, scenogræci aut maluæ decoctū iniiciatur: Foueanturq; dicta afflictione oppressi hydrelæo, uel elixatione prædictarū specierū aliqua cum oleo. Cerota uero sic habētibus 30 congruet eiusmodi: Syluestris maluæ radices in cucumerino oleo cum exiguā aqua elixantes donec frigrant: atqui illæ quidem abſciantur, oleo uero cremor rutæ, ex parte quarta, & cerg, & castorij quantum res ipsa uideatur postulare, admiſceatur.

De uesica conuulsa.

Nonnunq; quidm urinæ difficultas, interdum uero lotij inuoluntaria atq; adeò inuita mictio, rationem curationemq; iam pridem de paralyſi memoratam ſequitur.

De meiētib; intro.

- 40 **L**anguor depreſſiōue musculi uesicæ circa collum, eam afflictionē facit, qua afflictī introrſum urinā reddere solēt, quapropter pueris præcipue accidere conſueuit: proinde ijs cōmuniter quæ robur inferūt, quammaxime utendum, puta cenelæo calido, atq; conſimilibus, cauentes quæ ualide refrigerant: fouentes uero undiq; magis, quantum fieri poteſt, calidis.

Nam frigiditas tanquam resolutionis, quam paralyfim dicunt, uim habet. Tu uero isthac physice perpetrato: Galli guttur crematū aqua tepida ieiunā no potui exhibeto: siue leucanthemi flores, modo non absimili: aut erinacei testiculū in uino bene fragranti friatū bibendū porrigere: nepetam item atq; myrrhā sub somnū, aut rutae syluestris semen frictū per triduū propinato. Pudēda deniq; eo malo tētati creta cimolia cū succo perdicia dis circūlinito.

De iocinoris affectibus. Cap. XLVI.



Hepatici.

Ecur uarijs admodū tentat morbis, nam imbecillitate, inflāmatōnibus, & erysipelatibus, hoc est ignitis rubedinibus cum inflāmatione, & scirrhis, & abscessibus corporis quae apostēmata dicunt, h ulceribusq; & oppilationibus deniq; corripit. Super debilitate itaq; ipsius uerba ante omnia sunt faciēda, qua laborātes, hepaticos, hoc est iocinorosos proprie nūcupare assolent. Quod si igi in chylum uersa quidē excrementa euacuat: liquidiora uero transmissione in hepar debilius uel nō omnino peracta, uētre in totū ægritudine uacāte, iocinoris attractricē potentiā infirmā esse ducito. At si ablutioni recētis carnis cōparia uideant retrimenta, cum alteratricem tum sanguinis effectricē debile existima. Vbi aut ad calidā intemperie referenda est infirmitas: primū putrefactiones fiunt humorū, progressu tēporis excrementū feculētius apparet, teterrimiūq; odoris: bilis in oculi pupilla crassa & affluens colore. Iam uero hepati substantia contabefacta, uniuersum etiam cōtabescit corpus, & febriunt afflicti, & cibi appetētia carent, bilem q; euomūt. Sin gelidū distemperamentū fuerit, neq; iuges continuāq; excretiones, neq; cōplures fiunt: per seuerabit malū diutius, diebusq; aliquot cumulatus uenter deficiet, minus uero graueolēs, instar luti sanguinis crassi, atq; bili finitimū. Multi preterea ac uarij colores frigidā declarant intēperie, febrisq; obscura cōparet, & uultus constās calibūs uacat, & cibū magis appetūt. Harū aut omnium distēperantiarū qualis qualis fuerit, si ariditas cōplicat, secessus apparebūt aridiores, & maiore siti premunt. Si humiditas subsit, liquidiora & plura apparent excrementa, ininusq; sunt sitibundi. Inflāmato aut iocinore, communiter quidē omnibus dolor oritur in dextris præcordijs sursum uergēs, & ad iugulū usq; humerūq; eiusdē lateris, quā Græci corporis partē nominant, tendēs: deorsum uero ad lateris usq; nothas costas pertingens. Febris preterea infestat acuta, tussisq; sicca, ac litis, horror item cibi, & dyspnœa, quod est irruptū suspiriū: lingua porro principio rubra, mox uero deinde nigra conspicit, bilem q; euomūt, aluus astringit. Indicia ferme sunt, ijs qui costali morbo laborāt similia: quanto aut discrimine inter se dirimantur, disseruimus. Quū uero erysipelas constiterit in hepate, igneae inflāmationes (quas phlogoses dicunt) intenduntur & æstuant, marasimusq; hoc est flaccitas tabesq; insurgit: proprie uero quae in simis iocinoris partibus eueniunt inflāmationes, nausēā, uomitiones, à cibis appetitus auersiones, & phlogoses inflāmatas maiore uehemētia inducūt, animae item deliquia refrigeraturq; in ea affectione cōstituti sæpiissime, ita ut hinc aqua inter cu-

Erysipelas iocinoris.

tem, hoc est hydropicus morbus auspicetur. Sed quum in gibbis huius uisceris partibus inflammatio oritur, præter ea quæ memorauimus, tumor euidens in liniamento turget, uisus tactusq; sensibus minime obscurus: hæc quippe si grauis ac ingēs infestat inflammatio: At si tenuior quædā & obscurior extiterit, iubebimus languentē summo cōatu magnū ue respirare. Et si in dextro præcordio, quod hypochondrion dicūt, dolor uexet, iecoris mediocrem subesse inflammationē colligendū est: si in iuxta thesīm ac positū subiectorū musculorū pergrādīs ac amplius phlegmones tumor appareat, neque quicquā interīm memoratorū præsto sit, eosdem ipsos inflammari cognoscamus. Quod si pondus seu grauitas cum diatasi, quod est distentione & dolore in dextro hypochondrio absq; tumore ac febre sentiat, uenarū obstructionē præfert, qua parte se cōtingunt hæ, quæ circū caua sunt hepatis, & quæ circa sinus in gibbis. Quī aut in abscessum uertit inflammationē, dolor cum tenore increuit & auget, & temerarij præter rationē oriuntur rigores, atq; in leuū latus inclinari ac decūbere hepate impensius laborantes nequeūt. Disrupto aut abscessu, uel per lotium, uel per uentrē, excrementū perq; purulentū excernit. Quod si in affectionē duram tumor deriderit, dolores quidē cōminuunt, tumor uero euidens est cum duritie, at circumiacentia corpora attenuant. Progressu autem temporis cognitu fuerit difficile, qd a qua inter cutē fieri properet, uniuersumq; hypochondriū sub humore abscondat. Quò calidæ itaq; iocinoris intēperie succurrat, frigorificis, & intestinū mediocriter roborantibus utendū: ē quorū numero est seris & cichorium mansum, nōnunq; crudum, interdum uero cum coriano elixum: eius item elixatio, succusq; quinetiam Aridum posca appositum: Ad calidā uero et frigidā iecoris distemperaturā, cōducit intybū manducatum, & sonchus, & quæ sunt eiusmodi. Prodest præterea huic affectui cremoris citri cyathus in posca sumptus, & filicis succus parī modo haustus: Si aut intēperatura modice obstruet, ex uino quopiā tenui, & cum ijs quæ lotiū proritāt, exhibeant. Catapotiumq; qd sumit cichorij drach. quatuor, chamæpityos radice drach. totidē, in melle decoctas, nucis ponticę quantatē exhibe: & aqua sorbeat calida: ex opij, seminisq; Apollinaris herbæ potione propinandum: & ipsa quoq; Philonis antidotus: Sed in quibus calor intendit, etiā rosaceū, ut presentaneū ipsis, aut melinū potui ministrandū. Alimentū aut succus ptisanæ, uel chondri, cum hydrosolato præbeat, & panis cōsimiliter ex aqua, cum aliquo id genus dulciū potionū: & ut summatim dicā, cibi q mediocriter citra oppilationē in frigidāt, assumantur. A uino prorsus abstinendū, nisi alia obstat causā, puta stomachi debilitas, tum quidē utendū, sed tenui tamen, & nullarū fermē uiriū, aqua probe tēperato, quod genus Græci ἀλεγοφόρον, quasi pauciferū dicas nomināt. Porro iocinoris erysipelati parī propemodū ratione medendum. Gelido uero distemperamento existente per cōtraria eundem est. Panis igitur cum uino exhibēdus est, & bis ter ue cocta brassica: castaneas gustet, uuasq; cum gallinaceis ac pullis quantū satis uidebitur: Vīno minime abstineāt: propi-

Note diuersorum affectionū hepatis.

Rapti apostematis in iocino re indicia.

Iecoris erysipelatis curatio.

nandum tamen ipsis potissimū est eupatoriū, seu asarū, aut quæ contexti ex pipere confectio: atq; in primis quæ antea cœliacis & dysentericis cōgrue re tradidimus, accōmoda sunt: Sed cyphoides appellatæ cōfectiones, ut ad calidas distemperantias nihil omnino cōgruunt, nisi modicus quidā calor cum humiditate copiosiore cōiunctus fuerit, ita gelidis intēperiebus præstantissima ac præsentissima sunt præsidia: præsertim si eiusmodi mala temperatura cum iecoris humiditate & oppilatione copuleſ. Cæterū si obstructio fuerit ex crassis & glutinosis humoribus, myacanthā, atq; eius fructū in primis exhibe, lauricę radice cōtice: eupatoriū item ex oxymelite, amarorum uel lupinorū elixatione, cum ruta, ac pipere: cōfert etiā farina lupinorum pota, & capparis radice medimni duo, costi medimnus unus cum uino: & confectio ex glandibus ad crassorū uiscidorumq; humorū obstructiones, tum iris, tū pistaciorū fructus, tum cortex, marrubiūq; & amygdala amara, et ex iisdem pastillus, dracontij, arię radix, necnō agaricū, et scilicet non tam acetū, q̃ oxymel: lecur uero lupi aridum friatum ac liquefactum, cochliarijque quantitate sumptum, omnibus iocinoris morbis cōgruit & conducit cum uino passo suauiq; atq; Theodoretos insuper antidotus omniū nobilissimū utilissimūq; censetur medicamentū. In iocinoris porro oppilationibus & scirrhis, hoc est duritiēbus, ac inueteratis inflātionibus, inq; morbo colico, atq; etiā regio pariter ex oxymelite picra conuenit. Iam uero cibaria sic affectis exhibenda sunt calidioris potentie, & non oppilantia: uerbi causa. Porra ex oxymelite, & oleū asparagi, & capparis consimiliter, & cætera obsonia cum aliquot calidis & non obstruentibus cōdimentis elixa, uinū tenue ac uetus. Cauēda sunt quę crassum humorem comesta relinquunt, & balnea cōtinua à cibo potissime. Affectione autem inueterata, nō phlebotomiā, quod est sanguinis detractionē modō, uerum purgationem quoq; sumendam, nullo impediēte ducito. Quod si inflāmatum fuerit hepar, uena in dextro cubito indubitanter secta, sanguis auferendus est, & uirtute cōstante atq; sufficiente, affatim sanguinē copiosum detrahito. Porro foris huic uisceri cataplasmatas instar adglutinanda est farina hordeacea, & scœnogræci, aut seminis lini, cum dactylis palmulæ, aut malis cotoneis, & meliloti floribus & absinthio, & chamæmelino: atque in uniuersum, cum emolliētibus cōfundenda sunt adstringētia. Epithemata autē huc faciunt, Nilei, & *ωϊστος*, hoc est odoriferū, item Philagrianum, & Apollophanis, & *ἄρτεμις*, id est medicamentum ex fertula campana confectum, & *κισσός*. Sed ad peringentes inflāmationes, multa admodū experientia cōprobatū est illud præsentaneū esse remediū, comæ absinthij, nardi Gallicę, asari, croci, singulorū uncia una, iris, myrrhæ, styracis, bdellij, guttæ ammoniacæ thymiamatis, uniuscuiusq; uncie duæ, medullæ uisuli uncie quatuor, cerotæ lentiscinæ libræ quatuor. Et oxymel eiusdem exhibendum est, simpliciaq; iuuamina, puta: Asarū, nardus Gallica & Indica, iuncus odoratus rotundus, petroselinū. Alium adhuc ciere expedit cum urtica, herbæ mercuriali, elixis & manducatis. Declinationis uero tem-

Iecoris ex his
moribus oppi-
latis curatio:

Medicamentis he-
paticorum.

pore, epithymus quoque & polypodiū in mulso danda sunt. Clystere etiam alius euacuanda est, ab initio quidem ex mulso, cum sale seu nitro: Facta aut remissione uigoris, misce hyssopū, uel origanū, uel cnicū, uel centauriū, uel colocynthida. Et in summa, si ma hepatis per aluū, gibba uero conuexaue, quæ Græci *σπυρὰ* indigitant, per lotia purgent. Posthæc cibi loco dandus est cremor puſanæ in quo elixum sit apium. Quod si erysipelatosa fuerit inflāmatio, curationē superius edocuimus. Quin si abscessus obortus fuerit, ruptura succurrendum, cataplasmate quidē trispermo cum resina, manna, picæ, althææ radicibus, stercore colūbino, caprarū excrementis, *σπυρὰ* 10 this uel applicato: potando prius polij decoctū, fumaricæq; herbe, & ad tertias decoctā thlipsis elixationē (quam herbam pedē gallinacū quidā latiorum nominant) aut cichorij, & chamædryos radicis decoctum. Quod si fractura præstō iam sit, mulsum, & quæ de renibus exulceratis memorata sunt, exhibe. Extrinsecus autem compositionem *Μναξαι*, & reliqua emolliendi uim habentia, adhæc medicamen hicedion imponendum, aut compositio, quæ, quod salices contineat, *σπυρὰ* nuncupatur. Quod si tumor durus, quem Græci scirrhon uocant constiterit in iocinore, exigua curationis spes est, quum in aquam intercutem deciderit affectio: æque tamē 20 mollientibus admiscenda gutta ammoniaci, bellii, medullæ, & adipes, quæq; eandem uim obtinent. Potanda item sunt quæ oppilationem distentunt, & abstergūt intestinum: Quod genus sunt quæ lotium proritant, & quæ calculos atterunt, cum his quæ paulo ante ad huius uisceris obturationem conferre diximus, atq; alimento uidelicet inuicem congruente.

De Cachexia. Cap. XLVII.

HYDROPICORUM morborum caput dicere Cachexiam consueuimus. Medicamentis tamen huic affectioni succurrendū est: sanguinis scilicet detractione, si nihil prohibeat, diuisim et particulatim ad tertium usque ac quartū diem detractionem facientes. Euacuandi præterea maxime sunt, qui per hæmorrhoidarū aut menstruas 30 lis expurgationis retentionem in hanc affectionē incidunt: Quemadmodum contrā, ijs qui ob plenitudinem in hoc malum inciderint, ab euacuatione per phlebotomiam abstinendū: omnino uero hiera ex colocynthide cōstituta purgandū. Victus ratio in hac affectione cōstitutis tenuis & sicca sit: Vius naturalium aquarum, maxime quæ aluminis & nitri mixtura constant, probatur: deinde quæ sulphuris naturam habent: aliud uero lauacrum nō nisi ex diuturniore temporis intervallo admittatur. Varijs exercitationum generibus exercitentur: sed in primis ijs, quæ iatralipta uocantur. Postremo uero ueratro utantur. Mirifice autem eo malo oppressos iuuat propolisus absinthij, et cottabissimilifus amatorij, & dropaces: Quod 40 si autem æger in aquam intercutem deciderit, tum hydropicorum curatione, eo quem mox perscribemus modo, succurrendum.

σπυρὰ
σπυρὰ

21
22

Dieta Cachexicorum.

De intercute, hoc est morbo hydropico. Cap. XLVIII.

Tympanites
unde.Leucophlegmas
tut et anasarca
ed.

Ydrops protopathia quidē fuscitat, iocinore uehementer frige-
facto, aut inflāmato, aut scirrho obdurato, aut quoquo alio mo-
do languente: Per societate uero aliorū mēbrorū, quū accidit ut
nō procedat sanguificatio: et appellat morbus ille hyderus. In q̄
quādoq; quidē multitudo spiritus cū exiguo aquoso humore, inter perito-
natū & partes ei subiacentes congregat, ita ut si pulsetur uenter inferior, so-
nitū instar tympani propemodū edat: proinde & tympanias hydrops ap-
pellat, ab inflationibus quæ circa stomachū, aluū, & colon intestinū, & in
ueteratis febribus cōsistens: Interdū à duritia peritonæi, aut in mulieribus 10
uulua, aut scirrho: nōnunq; ē cōtrario ingens humoris copia cum petexi-
guo spiritu in eisdem locis coaceruat, perinde atq; in ascite, id est utre quo-
piam cōseruatus: hinc ægritudo ascitis uel ascites, id est ascites humor nomē ha-
bet: qui utiq; etiam ip̄sus ē causis iam pridē enumeratis confici. A duritia
uero ac scirrho magna ex parte, quæ lienē atq; hepar molestat, necnō fluxu
bus circa intestina diuturnis, præ quibus uenter turgere, reliquū corpus
nihil altū eliquari cōsuevit. Quādoq; sanē in uniuersæ corporeæ molis tu-
morē frigidius ac pituitosius sanguen cōtinetur, partim quidem ab hepatis
eiusmodi cōstitutione delatū, partim uero ab uniuersa corporis carne, tanq̄
aqua stillante natū, ut pallidum atq; pituitosum, mortuo compar appareat. 20
Leucophlegmas q̄ hypofarcidis hyderus, aut anasarca nuncupatur, qui
ex longis febribus, & stomachi prauo habitu, retentisq; diutinis hæmor-
rhoïdibus, & fluxu muliebri, & respirationis angustia, uigilijsq; iniquis,
atq; id genus deniq; alijs de causis, constat. Quibus igitur si curationis ma-
num admouere fert animus, cōmuniter ab euacuatione fuerit auspicandū.
Sed in Ascite, atq; Tympanite medicamētis utemur aquagijs. hoc est aqueū
humorē prolicientibus educentibusq;. Verū in Anasarca medebimur san-
guinem detrahendo, maxime si huius mali causa fuerit hæmorrhoidum re-
tentio, aut q̄d menstrui languoris expurgatio hæserit, nisi in praua habitu-
dine antecesserit sanguinis diminutio. Deinde igit quēadmodū in cachexi- 30
eticis, oportet particulatim euacuationē administrare, postea excrementū
bouis armentarij arefactū, accurate eliquatū in posca, aut oxymelite elixa-
ri, & sulphuris quarta parte adiecta, inde emplastrum toti uentri applica-
ri: Aut spyra thū capræ in pueri lotio: uel capræ uiscidam pinguedinē cata-
plasmatis more uentri imposito, hæc uehementer expurgant. Cæterū ex
fermento quoq; sicisq; aridis, & calce, & nitro, & iri, cardamomoq;, ac sul-
phure ignē non experto, & gutta ammoniaci, item baccis lauri, & sylue-
stri staphide, necnō agrestium columbarū stercore, uel uno fæce oīnibus,
uel ex his aliquibus ex aceto mulso utendū cataplasmatibus. Cum fimo capri-
no, spongiū appellatū epithema, miro quodam modo humorē per abditos 40
& incertos meatus, uentrēq; educit. Postremo siccifica imponēda sunt em-
plastra, sive iri, uel Iccium, uel Curcos, uel sive diaconi, uel polyarchium, uel
diaspermaton epithema. Sed & illud mirifice humores exhaurit: Habet
id quē

- id quidē, lapidis pyriti drachmas duodecim, sulphuris uiui tantundē, guttę ammoniacę thymiamatis drachmas duodecim, cymini drachmas sedecim, nitri drachmas duodecim, quę omnia exigua cęra, & terebinthina resina excipito, & in cutem impingēs per uniuersum uentrē explicato. Potio nandi tamen prius sunt radice actę in uino decocta: aut cucumeris syluestris in uino adstringente per dies treis macerati, dato cyathū unum, uno quoque die addēdo ad cyathos usque treis. Fiat præterea mixtura hæc: Balsami, nardi, casię, cymini, glycyrrhizę, hyperici, rotundi iunci odorati, asari, dauci, amomi, myrrhę, petroselinii, calami odorati, piperis, seseleos, spondyli, æquę portiones fumantur. Conducunt hæc singula sine additamento, pariter & quęcunque lotiū proritant. Sed absque grauitate moleque mictionē scilla tosta cum melle eliquata promouet, & eligmatis modo exhibita: Verum potaturis coquat in aqua. Cæterū & illud impendit conferet: Visceris interni scillę libras duas, in uini austeri xestis tribus elixato usque ad tertias, datoque ex uino quotidie, incipiēdo à mystro ad unciam usque unā. Diureticum præterea illud quoque per se præsentaneū est: Aluminis liquidum quantitatē tabę aqua dissoluēs macerāsque, ex linteo potui dato per triduum, alternis uel diebus. Expediit porro ea affectione possessis picra, hoc est amara, ex oxymelite constans, & Theodoretus, atque ex amaris amygdalis pastillus.
- 20 Aquagia uero, hoc est aqueū humorē prolicientia & educētia, sunt prope modū innumera: sed hæc experiētia magis cōprobata: Cocci gnidię quadraginta aut quinquaginta, uel lathyrides uiginti aut triginta, uel euphorbię ceratię quinque aut septem, uel squamę aeris drachmę duę seu tres cum micis sumptę, & in globulos redactę: quę gręcę dicunt *κασσιόπρια*: Aut sambucri radice corticis succus cum condito potus: uel oleaginis foliorum & aeris cremati ceratię quinque, anisi tantundē in aqua administrato, intra primordia quidē drach. unā interposito uero temporis spacio duas, & plures. Atque hæc quoque admiratione digna ac præsentanea sunt catapotia: Aloes, euphorbię, cocci gnidię, singulorū unciam unā, rhei uncie semissem, brassicę cremore excipito, & redige in pilulas, ceratię septē siue nouē exhibe: Atque ipsa quoque ex caryophyllo antidotus miro quodā modo citat. Vinū præterea penetrās aquamque proliciēs atque educens præbendū. Primas aut tenue rit medicamentū illud: Scillę uncie tres, seminis apij, capparis radice corticis, piperis, uniufcuiusque drach. quatuor, cocci gnidię decorticati drach. una, solij drach. una, malabathri pilulę duę, uini quā optimi cotylę duodecim, mellis crudi librę sex, inciduntur, & cribrentur, & in uino macerantur: scillam uero leuigato: Dosis sunt cyathi tres. Cæterum post humoris euacuationem, theriaca quoque utendū: stercoris uero bubuli cōbusti mensura cochliarij ex trino quotidie pota magnifice opitulat. Porro acrioribus quoque clysteribus in hoc morbo uti conuenit, nisi alius sua sponte humectetur, cum quippe exiccanda potius ea quam humectanda fuerit. Atqui in mulieribus hydropē oppressis, pelli quoque huiusmodi usus cum primis cōmendatur: Anisi, cardamomi, cymini, nitri, aristolochię, scenogręci, pule-

Υδρία.

gij, sicuū interanei siue medullæ æque portiones lilino excepte, apponant.
 Post hæc naturalibus aquis constanter utendum, pariter & plammismo,
 alijs uero lauacris abstinendū. Quod si quando lauerint, in lauacro empa-
 smatis ex nitro, sale, sinapi, calce, atq; id genus alijs, utantur. Hæc quidem
 & sine lauacro sunt utilia, aridaq; cum oleo uentri impacta & impressa. In
 anasarca aut & reliquis partibus enudentur, quantumq; fieri potest in sole
 rebus aridis perfricent. Reliqua uictus ratio aridior esto: salsamenta itaq;
 edenda sunt, & sinapi, & allia, & uolucres syluestres & aridæ: Ex holeri-
 bus asparagū comedant, & gingida, porra, sinapi, caucalidas, & cetera syl-
 uestria, & salia *ἡ ὀρεαίων, ἡ ἰαμβλίων* obsonijs admisceantur, uinoq; te-
 10 nui utant uetusto lotium proritāte, si modò ad manū hoc sit: marina quoq;
 aqua admiscenda est. Multa quidē potio auertenda, aquæ uero nihil pror-
 sus gustandū. Quod si cum hydropē febris quoq; infestat, à calidioribus,
 multaq; acredinis esculentis, alijsq; adminiculis abstinendū, mixtimq; eis
 utendū, ad id quod urget instantes. Verū in tympanite, ea quæ purgandi
 uim obtinent, *καθαρτικά* Græcis appellata, & quæ totum corpus eliquant ac
 20 conficiunt, *πυρρηνικά* Græci uocant, eligenda sunt, ex his quibus lotiū cie-
 tur, efficacia: adhæc quæ flatus seu spiritus attenuare atq; dissiccare possunt,
 tam intus quā foris uti expedit. Cucurbitule iugiter inanes uniuerso uen-
 tri imponantur. Qui postremo ascite oppressi tenentur, nisi superioribus 20
 suppetijs manum dederint, in paracentesim, nulli aliæ hydropis speciei con-
 gruā, ducendæ sunt.

*καθαρτικά,
 πυρρηνικά.*

De affectibus lienis. Cap. XLIX.



Quod si lienis (cōparati ab iocinore humorē attrahere atrebila-
 rium, qui sanguinis ueluti fex atq; cœnū est) attrāctrix facultas
 infrigat debiliteturq; aut meatus ille obstruatur per quem me-
 lancholicū humorē attrahebat, ater morbus regius (qui *ἰσχυρὸς*
 à Græcis uocatur) sanguine impuro per uniuersam corporis molem dila-
 bante, suscitā. At si pondus quidē conensioq; seu tenor splenem infestet,
 siue etiam dolor, obturatio significat. Sin aut neq; quicq; horum, attrahens 30
 di uero potentis infirmitas, atræq; bilis uomitio citra febrim ingruat, ac aliā
 cacoëthes qualitatē, lienis amplextricē potestātē debilitari portēdit. Quod
 si expellendi uirium debilitas à cibis appetitus auersionē inducat, neq; de
 more melancholici humoris superfluentis retrimentum ad os uentris defera-
 tur, ut appetitum suscitet atq; extimulet, oppilato in ipso liene atræ bilis
 humore, primū quidem inflāmatio oboritur, cum seruore, tum dolore, tum
 distensione indicata: Posterius aut in scirrhum duritiem non sensilem tran-
 sit, seruore unā cum afflictione placato, tumore autē duritiaq; persistente.
 His nimirū ob id os graueolēs redditur, gingiuaq; abrodunē, & cruribus
 hulcera absq; cicatrice permanēt, in quibus iocinore per consensum simul 40
 languente, intercus (ueluti dictū est) nascitur. Huius uisceris intēperiei per
 inde atq; iocinoris medemur. Phlegmone aut infestante, e uena læui cubiti
 sanguinē detrahe, siue in extrema manu, quò ex eminentiore intercapedi-
 ne

ne fiat conuulsio, diuersiſſimæ, quam Græci nominant *ἀντισπασμ*, uel propter quampiā quæ secundum naturā est germanitatem atq; cognationem. Deinde cataplasmatīs modo applicanda sunt medicamenta, quæ extenuandi uim possident, absq; euidenti ardore uicq; calfaciendi, astringentia quædam ad glutinando. Eiusmodi uero est natura, quod salis flos nuncupatur. Id uero cataplasma admirandæ quoq; in ea re uirtutis est: Accipito fœnograci uncias quatuor, hordeaceæ, cardamomi, uniuscuiusq; uncia unā, ficum pinguiū libram unā, uerbenacæ herbæ aridæ uncia unā: sed ficus irrigadē sunt aceto acerrimo, cumq; alijs iam discissis elixadē. Inde rursum stercus caprinū cum polenta hordeacea coquito in posca, factōq; inde cataplasmate imposito: habeat aut, si uideat, salis quoq; florem præcalfactū. Iis aut quæ cyprino cōstant, cum exiguo aceto in malagmatis utitor: Primitus quidē simplicioribus, cuius farinę censetur illud: Sumito ceræ librā unā & semissem, taurij tantundē, nitri quadrantem, resinæ terebinthinæ, seminis agni, hoc est uiticis, capparis radices corticis, singulorū quincūcem, coquito liquefacta & macerata, inde inspargito arida. Sed Nilēi bonitatis principatū tenet. Ceterū si inflāmatio in duritiē aridā sensuq; nō perceptibilē incidat, uehementioribus maiorūq; uiriū opitulamētis utendū, quo superflicies remollita lanietur: ē quorū numero est, cum *ῥίζα τῆς αουράλου τῆς αἰγύπτου*, hoc est quod ex caprarum oleo constituitur cataplasma, tum ipsum quoq; citrinum. Inter hæc uero sunt, tum Machæronis emplastrū, tum Curei, tum quod ē baccis lauri, tum quod quia ē salicibus fit, *ῥίζα ἰριού* appellat. Hoc uero & a me experientia cōprobatum est: Auri pigmenti, sandaraches, singulorū uncias duas, fauorū terebinthinæ librā unam, picis aridæ tantundem, galbani, opopanax, uniuscuiusq; uncia unā, corticis radices capparis, myrobalani, singulorum uncias quatuor, guttæ ammoniacæ thymiamatis drachmam unā, olei nardini aut cyprini scrupulos duos. Verū gutta ammoniacæ cum aceto illita lienis partibus, sæpenumero præsentaneū fuit auxilium. Atqui potum etiam trium aut quatuor diobolorū pondere, cum grāmate uno castorij, in insidentia balnei, sicū prius aridā mandentibus, & expuentibus mansam: aut guttæ ammoniacæ medimnū unum, castorij tantundem, confundēs dato drachmā unā: hæc duritiē quoq; quæ scirrū dicūt, opitulantur, ueluti & capparis cortex aceto maceratus, & in cataplasma redactus: qui sanē etiam ex aceto haustus, seu oxymelite, crassos ac uiscidos humores exhaurit: quandoq; uero etiam sanguinē euacuat: Necnō & salicis cortex in eundem usum similiter illiniē: cinisq; *χαλκίω* cum farina hordeacea ex oxymelite cōquassatus: Item cētaurij cremor extrinsecus impositus atq; potus, & lupinorū amarorū elixatio cum ruta ac pipere pota, farinaq; ipsorū cataplasmatīs modo impacta. Aqua præterea in qua sæpe candens ferrū extinctū sit, febricitantibus quidē cyathis tribus sola exhibita, nō febricitantibus uero cum uino acetoq; cyathus unus: aut syluestris rumicis (quod lapathum dicunt) radices cum scilla triobolus, aut trixaginis siue serpilli oxybaphū totum, oxymelitis uel anagallidos obscuri colorē florē habentis

Que emolliendo exhalcerat.

fucci diobolū, potui præbeto cum posca: uel acetum scilliticum, aut oxymel exhibeto. Cōposita uero hæc sunt: Panacis radicis, guttæ ammoniacæ thymiamatis, corticis radicis caparis, struthij, scillæ tostæ interaneum, æquis portionibus drachmam unam propinato. Confert etiam hoc suspiriosis, quos asthmaticos dicunt, hydropicisq̃. Aliud: Accipe myricæ fructus drachmas quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmas duas, ammoniaci thymiamatis drachmas totidem, aceto scillitico eliquato: de qua quidem cōpositione drachmā unā in oxymelite, ubi res monet, administrato.

Ad lienem duritiā callatum.

S Vmito cyclamini drachmas uiginti, bryoniæ drachmas treis, dictamni 10
drachmas duas, scillæ tostæ drachmas octo, struthij drachmas sex, caparis radicis tantundem, dato pastillum triobolarem in oxymelite. Sed ex erica quoq̃ factus pastillus accōmodus est. Alimenta porro ita languentibus attenuatorię potestatis, acrida q̃: potus modicus, exercitationesq̃, & frictiones, sinapismi q̃ assumantur. Est etiam quando & cucurbitule cum scarificatione probantur.

De morbo Regio. Cap. L.



A Rquatus quidem (quem *ἰστροσπ* græce appellant) bilis est per uniuerfum corpus suffusio, interdum quidem atre, qua super in lienosis uerba seruiimus, nonnunquā uero etiam flauæ. Harum 20
utiq̃ suffusionum cōpluria habentur discrimina, quarū causæ notæq̃ sunt eadem. Nam si in febrili languore confestim oriatur aurugo, pacauerit febrim. Indicio est, ex profundo in cutis superficiē mutatā seelere cepisse materiā, neq̃ ulla magnopere medicamēta efflagitare, sed lauacris, mediocriq̃ fricatione mox opus habere. Quod si cum febre fellis fiat suffusio, & cum deiectionibus biliosis, grauitate quidē existente in præcordijs dextris, inflammatio feruens iocinoris ostenditur, per quam bilio sus sanguis per uniuerfum corpus transfunditur. Si uero absq̃ grauitate feruor in ipso extiterit, ex sola calida hepatis intemperie constiterit affectio. Quod si citra febrim accidat, eandem corporis deiectionibus, uesicæ flauæ 30
bilis folliculi languorem significat, siue meatuū ipsius, si grauitas fuerit ad præcordia dextra oppilatorū: citra uero hanc, robore imbecillo atq̃ etiam subuulso, siue uirtutem iocinoris attrahentis attrahicem, siue excernendi expellendi q̃, & quasi in intestina detrudentis facultatem mancam. Sanguis nanq̃ nisi purgatus fuerit, quicquid bilis cōplectitur, per uniuerfum corpus spargitur, quemadmodū de atra aurugine prædiximus: ocyus uero his affatim biliosissimū redditur lotium. Nascitur etiam morbus regius ē feruido distemperamento solidorū corporum, id quod alimenti ratione locoq̃ erat exhibitum, in bilem cōmutantium, ueluti in phlegmaticum humorem intercus anasarca, nutrimentū ingestum permutat. Deprehenden 40
dus aut eiufmodi arquatus est, ex eo quod non collectim, uerum particulatim fiat, nullo planē eorum quæ memorauimus præsentē: & ob portionem letalis alicuius medicamenti, necnon propter uirus, foris ab aliquo pestifero

Arquatus
dicitur.

fero iniectum felle, suffusorum constiterit affectio. De calidæ itaq; temperaturæ hepatis, atq; ipsius quoq; inflammationis, potentiæ quoq; infirmitatis curatione, haud multo prius, in sermone huic rei consecrato, peregrinamus, quæ huc nullo discrimine euariante transferenda est, ne eadem subinde iterando bartologifemus. Quod si meatus uesiculæ in qua fel excipitur uterq; aut alter ex his obstruantur, sanguis de cubito dextro detrahendus est. Nonnulli aut regio morbo ob inflammationē hepatis laborantiū, iuxta paruū dextræ manus digitulū secta uena sanguinē detrahunt. Cataplasmatibus præterea feruore destitutis utendū. Cum hiera confectione purgandi sunt. Idonei quoq; habent in eadē hepatis affectione clysteres. Potiones diuerso sunt felle suffusi, apij, seu adianti, seu rumicis, seu serpilli, ad tertias usq; iure decocto: uel absinthiū potui inferre. Summopere autē conducunt radiculae, quæ *scapanis* dicunt, cremoris gemini cyathi, cum uno uini cyathopot: Succi item cichorij cyathi duo aut tres seorsim per se, aut cū uino sumpti. Ob inflammationē porro iocinoris felle suffusos potionato cenomelite, uel elixatione tenuis aristolochiæ, aut hyperici, aut adianti, aut struthij, aut rubiæ satiuæ similiter, aut ramenti cornu cerui drach. una cum uino, aut iure staphylino in uino ad tertias usq; elixo: Vel sulphuris ignem nō expecti drach. una in ouis absorbeat. Hæc & in obturatione iocinoris magnifice

*Auruginis ex
hepatis phle-
gmonis cura.*

opulantur. Seminis adhuc atriplicis dioboli octo cum chrysanthico aut alio quopiam dulci passuæ in balnei infessu poti, quantum satis est exhauriunt. Magna item cum utilitate picra, hoc est amara exhibet, ipsaq; xera, id est arida, & ex oxymelite confectione, necnon Theodoretus, atq; ex amygdalis amaris constitutus pastillus. Cinnamomi insuper quantum tribus digitis comprehendī potest, in cenomelitis cyatho uno, aut aqua diluto exhibeto: Vel myrrham fabæ magnitudine cum piperis granis quinq; & cinnamomitantundem. Eis uero qui ad calidam solidorum membrorum distemperaturam Arquatū referunt, lenes frictiones, exercitationesq; mediocres, illinitiones item, lauacraq; serio præscribenda sunt. Cibo alantur humescante & modice frigorifico, succo ptisanæ, intyborum, seris, cichorij: pisibusq; & uino tenui aqua temperato. Cæterū de his qui pestifera letaliq; potione, aut morfu eorum quæ ictu uenenum relinquunt, in Arquatum incidunt, libro quinto mentionem faciemus. Bile uero partes circa oculos, uultusq; obsidente, naribus in balneo elaterium erui quantitate cum lacte muliebri instillato: quamprimumq; in embasim, hoc est balnei infessum collocandi sunt, præcipiendo ne caput immergant: post ipsum uero laucrum uictus ratio restituendis uiribus apta focillatrixq; præscribenda. Rursus in sole arinum infunde. Confert item cyclamini succus, pariter &

*listeri ex calida
partium in-
temperie cura
tio.*

marrubij, & melanthij. Acetum quoq; acerrimum laborans in lauacri folio constitutus, naribus attrahat, atq; sic aliquandiu pressis naribus contineat, atque suspiciendo quodammodo euacuabitur.

EMinentię procidentis umbilici caussam, chirurgicamq; curationem, in libro de manu medica differemus. Sed quoniam nonnulli ex medicamento quoq; in eam affectionem præter naturā incidunt, de hac in præsentia dicendum est. Aluminis scissilis drachmas quinque, fecis uini drachmas octo, rosacei drachmam unam, gallarum immaturarum drachmas duas uino macerans irrigansq;, & ad mellis redigens crassitudinem, irrigato, & conspergito. Extrinsecus impingens exiguam spongiā oxycrato imbutam, fascia ac ligamento complectere. Aliud: Accipe testarum eregmi, & gallarum, & balauftij, æquas 10 portiones, coquito in aqua: ubi uero dissoluatur, studiose conterens, cum spongia, quæ admodū prædictum est, imposito. Aliud: Scobis plumbi drachmas sedecim, cicutæ, mānæ, cerussæ, hypocyttidos cremoris, singulorū drach. unā uino eliquato, ac dissoluito, atq; eo q̄ dictū est modo, utere.

Ad eos qui longo tempore manent impubes & imberbes, atq; partū & didymorum custodias, inibiq; etiā psilothra. Cap. LIII.

ERetam cimoliam & cerussam æquis portionibus alterci succo excipe, ita ut strigmenti balneorum crassitudinem induat; dein de iniiciens olei lentiscini quantum satis est, contunde & utere. Aliud: Cicutæ succum, solamq;, & herbæ apollinaris, & lupis 20 ni tenellorum foliorum, & psillij, æquas partes conterens, utere: loco prius terfo lotoq;: Oportet uerolaborantem ante dies hydropotam agere.

Psilothrum demoliens pilos.

Accipe oniscorum domiportarum rotundarum didrachmum, sandaraches drachmas duas, calcis uiuæ drachmas octo, aceti ueteris cyathum unum, lixijs cucumerini cyathum unum, quibus in aulula decoctis, in balneo utendū. Aliud: Pulueris seu cineris calcis medimnos duos, auripigmenti tantundē, cretæ cimoliæ medimnū unū, coquito in aqua, ceu proditū est utere. Aliud: Simplex & inodorū, cineris calcis xesta una, sandaraches uncia una elixetur, quemadmodū indicauimus, atq; usui, quō 30 res exiget, adhibea. Ceterū atricha in ophthalmicis memorata sunt supra.

De bubonocele, & enterocele, & hydrocele, herniæ. Cap. LIII.

Quamdiu rupto quidē peritoneo intestina delabuntur, nimium sanè curatu difficiles sunt: quū uero extenso peritoneo laxum redidit intestinum, sanabilius. Puerulis magis tanquam humidis accidunt, & plerumq; absq; manu medica imposito medicamentorum & accommoda ligatione, curantur. Verum suppetijs potestatibusq; subscriptis utendum. Hoc duntaxat neminem lateat, quod huiusmodi affectiones, alioquin cognatæ, solo loco dissident, diuersamq; sortiuntur appellationem: nam si in inguine subsederit malum, *βουλονόλη*, hoc est inguinis 40 raxem: si autem in scrotum iam descenderit, *φάρσινγλη*, id est intestinorū raxem appellabitur. Mali igitur granati corticis drachmas decem, gallæ immaturæ drachmas quinque, coquito in uini austeri cyathis tribus, mollifican-

doq; imponito, confricando prius intestinum, & gelida antea aqua conspergendo, dissolue per dies decem, manente in lecto eo cui medetur diebus triginta, bibatq; cupressi decoctum cum uino, aut galbulorum cupressi triobolum in cramate; hoc est uino plus satis diluto. Hoc uero medicamentum pueris confert. Aliud: Alterum sanè quod imponi potest ex eorum numero est, quæ Græcorum medici *αἰσχυρὰ* uocant. Constat ex symphyti radice, marrubij cremore, amygdalis amaris, cōmeos, æquis portionibus. Aliud: ¹⁰ Accipe terebinthinæ resinæ unciam unam & semissem, ceræ, thuris, myrti, glutini piscium, quæ ichthyocollam dicunt, cochliarū cum testis, singulorū unciam unam: cæterū ichthyocollam in acetoto per triduum macerato. Aliud: Pilularum arboris cupressi unciam unam, gallarum tantundem, corticum mali punici semunciam, glutini taurini (quod *ταυρανθῆα* dicitur) quadrantem, mannæ, thuris, uncia semissem, symphyti tantundem, cochliarum cum testis unciam unam. Galbulos & mali granati cortices uino astringente coquito quamplurimū, & eliquato magis reliqua, & excipiens utere. Aliud: Aloës, corticis mali Punici, thuris, hypocystidis fucci, glutini fabrilis, picis bituminis, singulorum unciam unam & semissem, uini dulcis quantū satis est. Alterum pluribus modis confert etiam absolutis, non tamen inueteratis: habet chrysocolleæ ²⁰ (id est auri glutini) taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocollæ, lapidis gagatis, lapidis hæmatitis, rhu Syriaci coriarij, acaciæ, singulorum unciam unam, lapidis pyritidis, apyri, magnetis, aluminis scissilis, mannæ, thuris uniuscuiusque unciam unam, picis Brytiæ quincuncem, cochliarum cum testis unciam unam, helcymatos uncias quatuor, gallarum unciam unam, squamulæ stomomatis unciam unam, æris tantundem, bituminis uncias sex, myrsinati quantum satis est, uino adstringente arida excipiens & amolynato, utere. Quod si autem decumbere nequeant, triangulari eos fascia ac uinculo crassiore & potente cōstringere atq; coagulare intestinum, absq; periculo ligato. Auertantur nutrimenta quæ flatum inducunt, & uini cō³⁰ pia, perpetuaq; balnea, & motus intensus; uerbi causa, cursus, saltus, uociferatio, atq; id genus pleraq; alia.

De Hydrocele, & quomodo euacuandus sit humor.

Herniæ aquosæ medendæ compositiones quæ sequuntur maxime expediunt. Accipe piperis grana centum, baccarum lauri octoginta, nitri drachmas decem, ceræ drachmas quadraginta, olei cōtylæ semisse excipiens, utere. Alia compositio utilissima: Floris Asij lapidis drachmas sex, quarū passarū ab acinis mundatarū libras duas, cymini Aethiopici drachmas octo, nitri rubei tantundem, trita & leuigata impone, fouens fero ac mane: Non desunt uero qui sulphuris quoque drachmas octo adijciant. ⁴⁰ Alia: Calcema aqua non restinctam strigmento balneorum excipito, atq; cum cerota imponito, & pauculum nitri calci uiuæ misceto. Alia: Radicum brassicæ deustarum cinerem adipe suillo uetere eliquato excipe: dissolue uero cōfectionem tertio quoque die. Cæterum ad non admodum

magnam aquae collectionem, utere malagmate isto: Sumantur ceræ libræ duæ cum semisse, picis unciae quatuor, guttæ ammoniacæ thymianatis unciae totidem, aluminis liquidi sesquiuncia; Cōducit autem & *πικρὴν*, & reliqua quæ cogendi & quasi ex alto in superiorē exteriorē uel partem euellendi & attrahendi potestate regnant.

De inflammatione didymi, & seroti, atq; aliæ quædam eorundem affectiones.

Cap. LIII. *Περὶ τῆς φωνῆς καὶ τῆς ἀφροδισίας.*



Corti quidem (quem *ὄρεον* Græci uocant) inflammationem deprehendes, propterea quod ad primum statim manus attactum dolore languentes afficiuntur, quodq; feruorem ac duritiem intensam præferūt. Didymo uero inflāmato, ad suspensionē manus palpitatiōē minime dolitant; uerum illis impactisq; digitis, & rubor atq; duritia ipsius in superficie minor uidet: durities uero illa allisu innixuq; in imo profundo obuiat, & febris, nō nunq; oboritur. Proinde peculiariter quidem didymorum inflammationibus conuenit sanguinis, secundum malleolos secta uena, detractio: Communiter uero omnibus cataplasmata & cerotæ expediunt. Cataplasmatibus itaq; modo farina fabacea cum uuis passis pinguibus ab acinis purgatis, in uino plus satis aqua temperato (quod *κράμα* Græci uocant) decocta, cymini aut asphodeli radices coctas & eliquatas misce: tenuissimum farinæ pollinem eodem omnino modo emplastrum instar adglutinato: aut semen lini in cramate: aut fenogræcum in aqua mulsa: aut lilij radicem in mulso, aut fece horni seu recentis uini cum tenuissimo farinæ flosculo, quam *πικρίδα* grece nuncupant: aut senecionē (quam Græci *πικρίδα* dicunt) herbam: & corianū uiride cum uuis passis, electis atq; adeo demptis acinis. Quod si ingens fuerit ardor & incendium (quæ *πύρριος* appellatur à Græcis) folia alterci cum farina tritici, aut cicerum cataplasmatibus modo impone: siue calami odorati folia: aut cucurbitam

Si longa ægritudo cum duritia.

(quam *καλοκώδωλον* nominant) crudam. Quod si longa diuturna q; ægritudo constiterit cum duritia, cucumeris syluestris radicem in mulso elixato, atq; eliquatam contritamq; cum lolleacea farina haud aliter quàm cataplasma impone. Verum in illo nihil minus est subsidij, quod accipit uuarum passarum demptis acinis quincuncem, cicerum effertuefactorū sesquiunciam, cymini unciam unam, sulphuris uncias nouem, resinæ uncias treis cum semisse, quibus singulis contritis & eliquatis cum melle & cataplasmate, in hac affectione utere. Cerotæ uero quæ ad rem faciunt eiusmodi sunt: Olei cyathum unum, colophonizæ uncias sex, plumbaginis mymini, uuarum passarum, fabaceæ farinæ, singulorum uncias quatuor, ceræ uncias duas: Plumbaginē cum oleo decoquito usq; ad aliquantulam crassitudinem concretionemq; deinde tandem adijce ceram ac resinam, & tollens ab igne tepidum, uuis passis maceratis, farinæq; infundito. Aliud: Olei anethini & rosacei, ceræ, resinæ picæ, singulorum quincuncem, cymini uncias duas cum semisse, stercoris alinini unciam unam & semissem, contere cum asonide cyminū, & refrigeratam cerotam misce & mollescito, dein

de

de indito in linteolo utere, de super lanam imponēs: Oleo omphacino, siue butyro, & resina æquis portionibus utitor. At si ex sudoribus hulcera in seroto nascantur, gallam maceratam tritam ue aut alumen inferere pinguedini & bili hircinæ, & serotum circumlinito. Cæterum ad accensos didymos cretam cimoliam cum aqua præilliniens, finito areferi, calidâq; aqua abluito, myrtum aridam, smirniq; perexiguum friatum emplastri ritu imponito. Iam uero excreſcentis carnis didymorum uitium (quæ *ἐκτάκτου* dicitur) sanat cinis uitis centurionalis, nitro & aqua maceratus, cataplasmaq; inde factum & applicatum. Quod si prurigo scortum adiacentesq; partes infestat, nitrum, staphidam syluestrem, alumen liquidum aceto eliquato, atque cum rosaceo in balneo illinito: A lotionē postremo oui albore cum melle pruriginosam partem perungito.

Escarosis didymorum cura.

Prurigo scorti

De incontinentia prolifici seminis & libidinosis inſomnijs, quorum alterum quidem uitium *γαστρίτις*, alterum uero *ἀναστροφὴ* græce nuncupant. Cap. LV.

Gonorrhœa est nimia præter uoluntatē genituræ profusio, quæ continuo abſq; pudendorum intensiōe, ex imbecillitate renetricis potentia nascitur: cui sanē obnoxij in quiete seruādi sunt, contendo interim cum lumbos, tum ephebæa, quod est plumbum ac pestinem. Exhibeatur constrictionis gratia uinum, & melinum, & cenanthinum, hoc est ex labrusca: deinde uero fiant cataplasmata diaphœnicon, malorum, cenanthes, acaciæ, hypocystidis, rhois, atq; id genus aliorum. Collocandi sunt insuper in lentisci, rubi, atq; consimilium elixationibus in uino, uel etiam aquis. Alimentis præterea utendum est siccificis. Post prima deinde tempora in exercitatuam institutionem ducantur, quo totum corpus, & languentes partes in sanitatem perducantur. Porro de his quæ ad seminis abundantiam attinent in salubribus, satis primo uolumine disseruimus, ubi & super his quoq; qui in Venerem conſegrediac futuere nequeunt, scriptum est. Cæterum ad Veneris inſomnia, libidinisq; in ſomno imaginationes, quos Græci *ἀναστροφὴς* uocant, contulerit grabatum frigidius, decubitusq; corporis in latus dextrum, siue læuum; profuerint etiam cuncta medicamenta frigorigica lumbis natibus ue subillita: cuius farinae sunt, corianū, & cicuta, & cerussa, quæ pſymmithiū appellatur, necnon portulaca: omnia uero quæ in hunc usum adhibentur, acenum admixtum habeant.

Onirogmia ratio.

De Satyriasi, id est ueretri palpitatione & inflatione. Cap. LVI.

Atyriasis est pudendorum palpitiō, phlegmonosam quandam feminalium uasorum affectionem, arrigente & intendente interim se hominis genitali, sequens: & nili leniatur ac desinat palpitiō illa, in languorem & resolutionem (quam *ἀσπρὴ* dicunt) seminariorū uasculorū euadere & grassari id malū cōsueuit, aut neruorum distentionem spasmus ue inuehere, atq; deinde quamprimum necare, nō sine alui tumore, frigidoq; sudore. Rara uero auis hic morbus est,

Sine Cerere et
Baccho friget
Venus.

& mulieribus precipue. In cuius curatione cōfestim secanda uena est: Edu-
catioq; tenuis, mensaq; ut sic dicam, canina ita languentis esto, & cotidie
quidē minime gentiū ualide, sed quiete agendū. Antecedit utilitate longe
cuncta alia in ueretri inflationis, palmiq; curatione, beta, & malua, & mer-
curialis herbæ pusillū, & ius cochlearū. Probantur etiam simplices dysfe-
res. Ea uero quę lotij ciendi potestatem habent, prohibenda. Prodest item
lumbis natibusq; frigorigica applicare: uerbi causa, solani cremorem, aut
portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Penem præterea adiacētesq; partes blan-
dis admodum refrigerantibus oblinire expedit: puta spuma argenti, creta
cimolia, cerussa, aceto eliquatis in aqua, aut uino dulci, aut siræo. Supinum ¹⁰
quiescere perniciosum est: nymphaeæ radix, & iris, & adiantum, rutæq; cre-
mor, cum ei qui genitali profluvio, tum qui ueretri palpitatione laborant,
potanda sunt. Alimentū in super his parca manu suggerere, sitimq; tolera-
re confert. Perseuerante aut diutius languore, incisa summa prius cute scal-
pello, cucurbitulę sunt adglutinandę. Quod si multitudo exurat, & hirudi-
nibus euacuādi sunt, & alius deniq; cataplasmate farinæ hordei perliniaē.

De Priapismo. Cap. LVII.



Riapismus uitium penis est, quo membrum genitale iugiter in
longitudinem & in gyrum latitudinemue explicatur: Turget
enim nullo ueneriorum stimulante desiderio. Inflatio uero cui ²⁰
dens est, quum uidelicet ea corporis pars spiritu turget. Fit aut
ex humoribus tenacibus crassisq; cum calore mediocri. Perspicuum sanē
est, quod in eo malo membra calfacienda non sunt, sed rebus frigidis appo-
site occurrendum, rosacea nempe cerota cum aqua discissa: & ex chamae-
melo coli quoq; & lumbis epithemata sunt imponenda: medicamenta exte-
nuatoria uirtutis inducenda, absq; calore manifesto: magna item utilitate
adhibentur quę naturaliter operant, sive τὴν φύσιν dicta. Potare nymphaeam
expedit: atq; semē uiticis, rutæq; uiridis obsonijs admiscendū. Hoc tamen
neutiquam exhibendū intra mali statim est primordia, quoniam calfacit ni-
mum: sed posterius post usum aliorū attenuādi potestātē habentium. Eua ³⁰
cuatio uero utendū, eaq; uomitione machinanda: nam per inferiorē uen-
tris stillant sepenumero uicing partes. Exercitationes præterea frictionesq;
sunt eligendę, propter spiritui distractionē. Venus nemini proxime me-
moratis ægritudinibus obnoxio cōgruit, præterq; in quibus propter coi-
tus abstinentiam, seminis redundantiam aliquam coniecturamus.

De ignauis corporis partibus, rebus gerendis ineptis. Cap. LVIII.



Vicinq; hoc morbo oppressi tenentur, nulla libidine, nulloq;
desiderio stimulantur in Venerem, & animo deiecto ob id, tri-
stiq; omnino sunt. Horū aut ratio, partium est ⁴⁰
dissolutio, aut seminis genitalis inopia atq; defectus. De geni-
tura igitur sanorum in primo uolumine qui de tuenda sanitate agit, simpli-
ciq; medicamentorū uirtute eorum, qui impetu quodam feruntur in libidi-
nem, docuimus. Valentiora in præsentia ponenda sunt. Comuni itaque
curatio

curatione, in hoc quoq; affectu iisdem remedijs indolorijs, quæ *ἀνομή* græce dicunt, utendū ducito. Priuata uero curatione & quasi peculiariter huic languori dedicata, stellionē crematū leuigato, deinde oleo adiecto, magnū dextri pedis digitum oblinito, atque tum quidem in Venerem congregiator. Quod si quiescere iam, ac cessare uoluerit, digitum lotionē purgato: sed medicamentum illud ē stellionibus lacertis uel commixtum, ualde efficax habetur. Potionandi uero sunt intensius seu entaticis, cuiusmodi primum fuerit illud: Piperis, coriani, petroselini, ramenti pudendi ceruini, terbinthinæ, æquas portiones melle excipito. Aliud: Accipe cicerum
 10 crudorū conariorū, singulorū uncias duas, erucæ piperis uniuscuiusq; uncia unā, quæ melle excepta, didrachmū cum uino exhibeto. Satyriaca item appellata in hac affectione constitutis cōgruit, & id genus alia innumera. Cōsiderādæ præterea sunt aliæ quoq; lāguoris causæ, & mutuo inter sese inferēda reparatio, quasiq; afflictorū partiū in integrū restitutio erectioq;.

De his quæ pudendis, sedēq; adnascuntur. Cap. LIX.

H Vlcerā quæ genitalibus, sedēq; adnascuntur, si citra inflāmatiōnē fuerint, arefacientibus medicamentis indigent: cuius generis sunt, compositio ex charta combusta, & anethum crematum aridum, & cucurbita (colocynthe appellata) deusta. At si hū
 20 cera arida, & absq; omni humore, recentiaq; extiterint, aloē quoq; præsentis est remedio, arida quidem & puluerulenta cataplasmatismō impācta. Omnium uero maxime indolorium existit, neq; uel tantillum inefficacius medicamentū præstat pompholyx. Quod si humoris plus hūlceribus adsit, piceæ cortex per se, & lapis hæmatites, primas curandi partes obtinent. Si uero quod altius foramen, aut profunditas aliqua cum prædictis copulet, manna utendū. Noma autē infestante, cataplasma fiat ex lenticula cum corticibus mali granatī: coraco præterea ex oxymelite cognominato utendum, necnon bithyno, atq; ipso etiam *σπ. χαρ. το.* Quin si rimæ, quas Græci *ρεγδα* uocant, uel naturalia, uel sedem arent, medebitur illis resina
 30 fricta cum rosaceo cōtrita, ita ut lubricum atq; uiscosum reddatur, admixto oui putamine, & opio: siue hederæ folijs aridis crematis, cinis eliquatus cum rosaceo, in plumbeo mortario, exhibeatur. Adhæc ex cœnolæo constitutus pastillus, necnon lithophrygiū, modis omnibus frugifera atq; peracōmoda putato. Et ad rhagadas quoq; quibus cutis dehiscit, & sordida putridaq; circa ani coronam hūlcera, præsertim quæ detrahi quasiq; desquamari nequeunt.

Alterum simplex, & acutius hebetans & retundens.

A Ccipe cadmig, & piperis uncias duas, rosarū abiectis folijs uncias sex, quorum farinam inferere, abluens prius apio. Cæterum ad condylo
 40 mata quæ in extrema ani corona, aut naturalibus insurgūt, illud conducit: Sumito chalcitim, hyssopū, medullam ceruinam, rubi folia, æquis portionibus cum cerota, & cœnelgo consimiliter. Quod si autem circa colem intra uerendorū foramen abditum hūlcus insurgat, deprehenditur ex puris aut

Rhagadam
 curatio.

sanguinis citra mictionem, euacuatione. Cui malo medendo præcipuum quidem locum habet, si mulso aqueo abluantur: proximum uero si lacte fiat ablutio: ab hoc collyrium asteris lacti utiliter commiscetur, seu albus pastillus: uel *ἀστὴρ λατταρίων* orbiculum in pilam plumbeam mittito: uel pennā etiam intingens perungito: deinde tenuem panem subcineritiū illitum imponito. Omnium autē probatissimū est, qđ cōstat ex galle, & pompholygis, amyliq̃, ac aloēs æquis portionibus, rosacea & arnoglossi cremore eliquatis.

Ad pudendorum dolores.

Thymi huius
cetera.

SI ea humani corporis particula quæ uerecunde nominari non potest afficitur, butyri ac resinæ æquas partes scite subactas liquefactasq̃ emplastro more illinito, aut seminis lini cremore, myrrhæ & resinæ frictæ tantundem macerato, atq̃ imponito. Atqui ad colem uerendū ue turgidum, mollium foliorum uitis drachmam unam, cerussæ drachmas quinque contritas cataplasmatibus modo impone. Vtere præterea conspersione & fotu marinæ gelidæ, atque cessabit dolor, restitueturq̃ in integrum penis. Porro autem thymos hulcuscula verruculas uel in hominis genitalibus & sede nascitur, neq̃ recrescere, neque repullulare quidem sinit cinis pampini, ac uitis, quod græce *κλήμα* nuncupatur, cum aceto cataplasmatibus instar impositus: corticis item salicis deusti cinis. In uniuersum aut (ut paucis expediam) nō tantum thymus q̃ formica, sed & uerruca (quæ *ἀκροχορδα* appellatur) pariter medicamentis quidem ualidæ ac nimium exhulcerantibus cōuelletur, erodentibus uero enecabitur atq̃ arefcet. Priuatim autem elaterium cum salibus impositum id malū compescit: grossi, qui græce *ολυνθι* dicuntur, cum aceto & nitro atq̃ farina: succusq̃ fici illitus: Smaridis item pisciculi caput muria saluæ salsum & cōbustum: Rubigo cum sulphure uiuo ignem nondum experto cremata: tithymalli cremor illitus: ocimi folia cum atramento sutorio: aut heliotropij maioris fructus unā cum uino cataplasmatibus more adglutinati.

Ad inflammationem ani, orbisq̃ eius.

SEdi, quam dactylion dicunt, inflāmatæ ita subueniunt: Cerussæ uncias squatuor, pompholygis unciam unā, aut cadmiæ teneræ, thuris unciam unam, succi fereos cotylam unam, dimitte pusillum, succum injiciens donec consumatur: deinde facta ex ceræ uncis duabus & rosacei libra una cerosa, eradendo cōmisce, acriterq̃ & bonis (ut sic dicam) lateribus subigens ac mollesciens. Immitte autem & *ἀστὴρ πικρὸς*, atq̃ superne illigato. Confert autem istæc compositio non huic modò phlegmonæ, sed rimis quoq̃ in corone ani uerendisq̃ cum inflammatione enatis: necnon cum ignito quasi feruore, aut cum morsu quæ in sede exurgūt hulcerationibus.

Ad ignitos ani rubores, quæ erysipelata dicuntur.

HUlcera sedis quæ super inflāmatōē rubor ambit, hisce curant: Sumi huius cōfectionis ē succis librā unā, rosacei quantū satis est, panis puri lib. unā, croci uncia unā, opij tantundē, cæterū crocus & opiū passō macerent, panis uero aqua irriget: deinde eliquatis iam istis, illa quæ ex succis sit cōpositio

positio *ὑγρόν* appellata immittitur, atq; rosaceum, subigitur item, euaditq; liquidius. Facit autem ad calidas etiam podagras. Aliud: Conducit etiam plurimum ad inflammationem dactylj, cerussa uino & rosaceo in parua pila plumbea, & coleari plumbaceo contrita & illinita: Aut cerussa, & oui albore cum rosaceo in ipso mortario, quoad lentorem induant quassatis, erysipelata quæ in sede & adiacentibus partibus insurgunt, perungito.

Hedricum ad ingentes dolores.

Mollium foliorum alterci, foliorū item tenerorū portulacæ, micarum Min iuno irrigatarum, luteorū ouorum assatorū, æquis portionibus, rosacei quantum satis est, postquam foveris locum affectum rosarum & meliloti decocto, cataplasmate curato.

Hedricum utilissimum credendis dactylj inflammationibus, &

ad eminentias quas *ὑψηλὰς* nūcupant.

Accepe cerussæ, spumæ argenti, guttæ ammoniacæ thymiamatis, bdelij, singulorum diobolos sex, terebinthinæ unciam unam, cere unciam dimidiam: hæc arida contundito, cremoreq; strychni, herbæ apollinaris, aut portulacæ liquefacta, miscens excipe: ubiq; liquidius ac mollius effeceris rosaceo, usui quum res monet, adhibe. Porro Phicotyche medicamentum, & ex lamina plumbea, medendis dactylj inflammationibus factum est: & ipsius quoque *ἡ δὲ λυταέσται*, necnō ex alicaccabo, diarodosq; pastilli admirandam laudem inter hæc, quæ tum sedi affectæ, tum naturalibus adhibentur, meruerunt.

Medendis exochatibus dactylj, id est ani orbisq; eius.

Quod si exochades quidem inflammantur, erit prædictis communiter utendum, priuatim uero hocine pastillo: Cerussæ quadrantem, pompholygis unciam unam, spumæ argenti uncias duas, mastiches scrupulos treis, alterci succo excipito. Si uero absq; inflammatione infestent, cupressi pilularum crematarum cinerem uino antea ablutum, insere: aut aride cucurbitæ corticis deusti, aut ossium dactylorū (qui græce *φολίνες* appellantur) cinerem compari planè ac persimili modo: aut testarum ouorum, foeniculiq; cinerē: aut foliorū mali Punici cremorē æquali uino albo cōfundens, adundato & allue diebus utique septem. Cæterum ad exochias eminentes quæ in callum obduruerunt, calcem & auripigmentum cum acriore acetō dissolue. Magnam quoq; efficaciam habet, si in sole perungas.

De hæmorrhoidibus.

Quod si hæmorrhoides quotidiana destillatione manantes plus quàm par sit euacuent, a quiescere paulatim corporis habitū faciunt, prauetq; atq; maligne etiā sic affecti saginant: nam cibi beneficium nō sentientes tabescunt. Periculū uero atq; noxa plerūq; copiosam sanguinis eruptionē (quæ *αιμαῖς ῥέον* dicūt) sequit, perinde atq; sanguine etiā omnino undiq; coercito maioris mali causam sæpe inducit. Quocirca earū curatio difficilis est ma-

Hæmorrhoides
des cæcæ.

gniꝫ laboris. Proinde plures quā stillicidiꝫ modo fluunt hæmorrhoides, excepta una, cuius sanguis purgationis gratia non coërcetur, reliquas claudere expedit. Nonnullæ uero sunt superiores interiores uel, quā ut oculis appareant, atq; ob id quidem ægerrime curantur, sed cæcæ penitus sunt, neq; ullus quidē sanguis effluit, grauiore uero quā aliæ dolore cruciant: his igitur cyclamini succum inunge, atq; referabuntur. Cæterum illis quæ sine modo nimium exhauriunt, hisce quæ sequuntur succurrendum est. In aquæ cotylis octo acanthes ægyptiæ, foliorū sambuci, artemisię, singulorū uncia quinꝫ elixentur usq; ad medietatis consumptionem, & herbæ sideritidis uncia quatuor: quibus decoctis herbæ porriciunt, aquæ uero Aris¹⁰ dum illud cōmiscet: Accipe metallici atramēti (quā græce melanterian uocant) rotūdi drachmas octo, spumæ argenti drachmas quatuor, gallæ quadrantem, misyos drachmas duas, sereos tantundem: In elixatione soluens Aridum, hæmorrhoides ea septies in die cōspergito. Postera uero die pari eodemq; modo alteram confectionem equalis omnino ponderis inspergito. Tertio item die consimiliter. Quod si etiamdum reliquum quippiam permanferit, quarto die acu compungito, si sentiat, aut sanguinem emittat. Idem facit & ipsa decoctio: cæterum aridi illius semissem admisceto. Vbi autē asperferis, Arido quoq; accendito, quò exacte planeq; deurantur: ob inflammationem uero panem cataplasmatismore imponito. Aliud: ²⁰ Panem purum in garo (quod liquamen ex pisce est) primario, tingens ac macerans, in aulula inani cremato, atque eliquans uino prius ablutum cataplasmatism instar adglutinato, & id quidem ad exochadas quoq; egregie conducet. Aliud: Accipe sereos (quod richorium quidam nominant) drachmas duas, chalcitidis drachmam unam, misyos tantundem, atramenti sutorij drachmas treis, schistes drachmas nouem, æris deusti drachmam unam, melanteriæ drachmam unam, utere arido. Alimenta præterea nimium quidē inanitis, pauca, & ab excrementis aliena cōueniunt, & quæ arefaciendi constringendiq; potestatem continent, e quorum numero est, lotus chondrus ex posca, oryzaq; & halica: atq; ex holeribus intyba, & ci³⁰ choria, & portulaca: ex uinis autem quæ adstringunt & stipant. Porro autem in hæmorrhoidibus excæcatis contraria his congruit educatio: cū primis uero loliginum pisciculorum (qui Græcis *αλλοις* uocantur) & sepiarum, ac polyporum, torpedinisq; & selacharum qui squamis destituuntur, esus, pulchre admodum competit: perturbant etenim hæc ac teritant sanguineum humorem. Et quæ mensium deniq; alliciendi attrahendiq; uim obtinent, cæcis hæmorrhoidibus expediunt.

Ad procidentes anos.

ERices fructus, gallarum, cerussæ, acaciæ, hypocystidis succi, piceæ corticis, thuris, myrrhæ, aminææ, æquis portionibus aridis concinnato cataplasma, abluēs prius uino austero. Aliud: Sume recremēti plumbi, rhu Syriaci, singulorū unc. octo, floris rosarū drac. iij. myrrhæ, amingæ drac. ij. utere

Quæcūq; res
ses prouocant,
hæmorrhoidi-
bus cæcis expe-
diunt.

utere quemadmodum superiore. Aliud: Accipe piceæ corticis, man-
næ, spumæ argenti, uniuscuiusq; drachmas octo, aridorū galbulorum, cu-
pressi, plūbaginis, singulorū drach- duas, utere, ea quę prædicta est ratione:
Lotiū item languētis adhuc calidū cōspersum, procidentiaē sedis opitulat̃.

De his quæ mulierum locellos infestant morbis, & primitus de
menstruorum purgatione.

Plerisq; sanę puellis anno decimoquarto mensium expurgatio primū
incipit: paucis admodū ante annum tertium & decimū, aut duodecimū
muliebria proueniūt: plurimis uero post annum decimūquartum tandem
10 prorūpunt. Tempus aut̃ unicuiq; purgationi statū non est: plerisq; etenim
perbiduū aut triduū: maximæ uero parti quinq; dierū spacio menses ex-
cernuntur: aliæ usq; ad septimū: paucae raræq; sunt, quæ ad duodecimum
usq; diem huic profluuiō iugiter obnoxiaē expurgant̃. Sistuntur aut̃ huius-
modi muliebres deniq; expurgationes, partim quidē anno etatis sue quin-
quagesimo, partim uero, quanq; ea rara sit auis, nō ante annū sexagesimū:
nōnullis à septimo statim ætatis, ut ita dicam, lustro, & potissime bene cura-
ta cute ac præpinguibus, desinere atq; omnino cessare menses cœperunt.
Quando igitur lente egreq; ea purgatio procedit, circa prothefimiā certum
menstruorū terminū, laua, potionatoq; uel sisamo, aut porro capitato, cum
20 pipere, & ruta in hoc ipsum decoctis. Reliquis potus ex passo fiat cretico.
Bibēs aut̃ huius potionis ea affectione oppressa cotylā, deambulādo cōmo-
uebit menstrua. Manducet uero loligines, sepias, polypodas, & quæcunq;
id genus sunt: nam sanguinem turbandi proliciendiq; potentiam habent.

De mensium mora & cessatione. Cap. LXI.



Quæ singulis quibusque mensibus mulieres repetit purgatio,
supprimitur quandoque uniuerso quidem corpore incommo-
da ualitudine affecto, interdum uero locellis modò earundem
priuata ægritudine uexatis, propter loci illius frigiditatem, aut
plagam, aut distemperantiā oborta, uel acquisititiā afflictionē, ut plurimū
30 uero ex abortionibus, & propter principem aliquā corporis partem, pro-
pria passione afflictam: uerbi causa, iecur, aut uentriculum, aut pectus quē
græce *diapana* dicūt, aut aliquid eiusmodi, quæ in diuturno accidūt morbo.
Suppressa uero muliebris ista purgatio, multarū & diuturnarū ægritudinū
caussa fieri consueuit. Quum igitur ob aliquam interaneorū primariā affe-
ctionem abscinditur, aut remoratur muliebris purgatio, nihil neque præ-
stantius neque utilius, quā membrī statim peculiari uitio mederi, atque
posthæc uulū sui muneris admonere. Horum autem notionem in supe-
rioribus recensuimus. At ubi nihil horum quidem adfuerit, perspicuū est
per se, & non per consensum matricem affici. Si itaque neque ætas, neque
40 habitudo corporis, neque aliud id genus prohibuerint, sanguis per uenā
detrahendus est, non ante tamen præscriptum mensium diem. Progres-
su uero temporis adijciantur dies decem. Auferatur uero non plus dua-
bus libris cum dimidiā, neque etiam minus una siue uenam secabimus,

*Uictus mulierum
cum quibus sup
preſſi ſunt men
ſes.*

ſiue hiera quidem ex colocyinthide purgabimus, duarum drachmarū pon
dus in melicrati cyathis ſex potui præbentes : Quod ſi febris pariter infe
ſtet, hiera quidē utendi locus non eſt. Opportunū uero fuerit in primis ſta
tim diebus febris, ſanguinem detrahere : cæterum poſt purgationem re
creandi refocillandiꝫ ſunt ad perpauculos aliquot dies : procedēte autē de in
ceps tempore, eo malo oppreſſa exerceatur deambulationibus, frictioni
busꝫ, atꝫ lauetur. Alimenta porrò congruunt belle inſtructa, riteꝫ diſpo
ſita, & humida holera ac dulcia cuncta, piſces ſaxatiles, aues teneriores, &
laſtipotatio, confectiones ex melle quæ *μυλῆμα* græce dicuntur, uinum
tenue, colore candido, non admodum uetus : Non probantur carnes, neꝫ
legumina, excepta piſana. Vbi autem præſinitū purgationis tempus pro
foribus iam conſtiterit, deſquamatos piſces marinos, & ceu dictū eſt, mol
liores, quæ *μελάχια* uocantur, & quæ cutis modo integitur teſta, unde illis
græce nomen *ἀσπιδόεσμα* eſt inditum, necnon porra capitata, cum ruta ac
pipere elixa ſumant : ius quoꝫ eorundē bibant. Probat item inferiorū cor
poris partium arctior cum ligaminibus, ad treis uel quatuor dies conſtri
ctio : auſpicante uero iam ſtata muliebrīū hora, adimat quidem compedes,
ſed potetur myrrhæ obolus, aut fabæ quantitas : aut caſtorium ex paſſo, uel
melicrato, artemiſiæ uel decoctum : aut ſaluia poſt balneum ex paſſo & ab
ſinthio. Vinum uero abſinthite ad omnem curationē propinetur : Progre
diente uero protheſmia, hoc eſt ſolenni purgationis tempore, ſi ne tantillū
quidem, uel nihil memoratu dignum, operæꝫ precium excretū fuerit, ſub
malleolis ſanguis detrahēdus eſt, auferaturꝫ affatim. Cæterum poſt diem
ſeptimū ſiue octauum, purgatione cum hiera utendum : Et poſt quantum
deinde diem, dropace unguento circa peſtinē, lumbos ac ſcemora egrotis
illiniatur. Aquā uero bibens per tridui, cataplaſmatis modo imponat ſina
pi cum equa portione panis macerati, uſꝫ ad tempus equinoctij : deinde la
uet : mox uero ſequenti menſe ficus arida pro pane admifceant in elixatio
nem ſœnogræci, maluaꝫ & pulegij, rutæ, ac artemiſiæ. In ſinum porrò
ipſum infundatur ſuſinum, aut amaracinum : & peſſus apponat ex medica
mento nouem rebus cōſtante, & ob id *νῑνταφόρμικον* nomen obtinente, aut
olibanīus. Eſt autem peſſulus lana peſcita, & quodcunꝫ aliud teres digi
ti humani ſpeciem præferēs, in quo medicamēta ſuſtinentur. Hæc quidem
curatio plerīꝫ ſatis fuit ad ciendas muliebres purgationes. Verum ſi ualis
diora uehementioraꝫ res ipſa poſtulat remedia, hæc fuerit eorundem ma
teria : Iris Illyrica (quam uulgò Romani gladiolum dicunt) pota cum uino,
cyperi radix, græce cyperis nūcupata, ari radix, & caſia, rotundi odorati
ſunci (quem Græci *χοῖνον* dicunt) flos, nardus, helenijꝫ radicis decoctum,
& myrrhæ fabuli græci magnitudo, cum paſſo in dimidiato cyatho poſce,
& dictamni elixationis cyathi duo, & gutta ammoniaca, & ſaga penū. Cæ
terum quæ nimia anxietate ſtomachi torquentur, opopanacis exiguum in
pilulas redactum, & in cocto melle irrigatum & eliquatū. Sed & conſue
ta quædam nobis ſemina, muliebria ciere nata ſunt. Cæterum inferiora & mi
noris

noris efficaciac sunt: sceniculum, cuminum, apium, daucus Creticus, seseli, anisum, ciceres, & cercides, & omnia quæ ad mingendum cient. Prosthe-
ta præterea (sunt autem ea medicamenta quæ molliore lana excepta, mulie-
rum naturalibus subiiciuntur & condiuntur) quæ menses ciendi munus
subeunt, ex his constant: myrrha, absinthio, aut lupinorū elixatione eliqua-
ta, seu rutæ succo contrita, bdellioq; non absimiliter. Styraç item & sylue-
stris oleæ gūmi, succus uel rutæ cōpari modo, uel aristolochia longa in col-
lyrij, hoc est glandis formam affabre facta & cōcinnata. Cōsimili præterea
eodemq; modo centaurij grandioris radix, aut ueratri, aut liquor scammo-
10 nig, & colocynthidos, medulla per se, & artemisia cataplasmatism modo illi-
ta cum ruta, galbanumq; facta inde suffitu, fotuq;. Quæ utiq; ipsa & foetum
etiam conceptū utero elidere atq; eijcere naturæ suæ aptitudine possunt.

De nimia muliebri expurgatione, & hamorrhagia locellorū. Cap. LXII.



Aeterum immodice & plus iusto expurgantur non raro mulie-
res, interdum quidem mensibus auctis, atq; cumulatius quā
par sit, impetuq; procedentibus: interdum uero in iustæ & inte-
græ ætatis nouæ nuptæ partibus. Nōnullæ magna quidem ex
parte sua quoc; sponte cessant. Cōtinue uero in *μειλίστοις* fortiter sanguinis
fit profluuium, ita quidem ut plerunq; inferat periculū. Primum igitur atq;
20 præcipuum est, ut membra ab alis, & pube cōstringantur. Dandum præ-
terea est potui, oxycratum minime frigidum: fouendæ item conspergen-
dæq; sunt posca: pessi quoc; utiliter, uel plura alioqui uellera locis ipsis ap-
plicantur ex uino, & oleo, siue rosaceo, siue melino, siue myrtino leuigata.
Chondrus porro lotus ē posca, aut oryza, aut halica, cibi loco sunt adhiben-
da. Vino ita habentes abstinere expedit: hydromalum uero austerum, aut
omphacomeli, aut id genus quippiam conceditur. Propinandum insuper
in posca balaustium, siue hypocystidis, acaciæ uel cremor, aut lycium, aut
Sanius aster, aut omphax aridus, aut rheum, quod rha quidā nuncupant,
aut lentis in Italico uase sictili crematæ cinis, aut sesamum in posca macera-
30 num ad mollitiem usq; & teneritatem, manducandum. Pessuli præterea (sic
enim *πρόδινα* interpretor) qui naturalibus sceminarum admouentur, mu-
liebrium sanguinis eruptiones compescunt, ex hypocystidis succo cōcinna-
ti, aut acacia cum manna aceto eliquata. Posthæc opis plurimum, et admira-
tione dignū confert auxilium in eiusmodi profusione, spongia, uino aut li-
quida pice irrigata & apposita: uel deusti ipsius cinis cum aceto, poscæue
applicatus: pari etiam modo corticis suberis (qui græce *φύμας* appellatur)
Italico uase testaceo combusti cinis. Foris autē egregie subueniunt epithe-
mata, quæ astringendi & stipticandi naturā habent, & ex dactylis palmæ,
cotonisq; cataplasmata, quæ malicoria continent, aut prinobalani, aut ru-
40 bi uirgulta, aut folia lentisci, balaustium, acacia, hypocystis, gallæ parum,
alumen: sed omnium maxime illud, taurinū glutinum, quam taurocollam
dicunt, tantisper dum eliquefcet & dissoluatur, posca maceratur, deinde in
lincolum pannum uel alium robustum emplastri more impingitur & illi-

πρόδινα.

*Pessuli compre-
ssæ sanguinæ*

nitur lumbis affectæ. Efficaciter quoque ac strenue admodum ad hoc faciunt emplastra etiam quæ glutinandi uim retinent: uerbi causa, compositio Icesij, Icesios appellata, emplastrum Atheniense, melinum Indicum, atque id genus cætera. Ad sanguinis porrò eruptionem pessis utitur: gallæ interan eum tritum, & thus irrigatum aqua apponito: aut cytinos, aut dulcia mala Punica consimiliter applicato, aut seminalem leuigatam. Cæterum compositionem ad eandem rem peritoneam ita contexere cōuenit: Accipe aluminis fissilis, medullæ gallarum, succi acaciæ, mannæ, singulorū drachmas quatuor, ouorum assatorū putamina quatuor arida friantur, atque eliquefiant in cremore plantaginis, atque tum misceantur. Quum autem ¹⁰ atque res ipsa monet & exigit, pello laneo excipiantur, & intingantur etiam in rosaceum, atque admoueant. Quin & cucurbitulæ inanes spaciosæ plerumque sub mammis adglutinatæ, tantum ut nihil desideres in contraria reuelunt. Encathisma insuper illud his qui sanguinis mensiū eruptiones patiuntur apprime cōducit: Oxyphceni, quod est aceti rotūdi iunci odorati, capit is myrti, foliorum ramni rosarum, uirgultorū rubi tantundem, coquens in aqua, qua insidentibus muliebria loca sceminis utiliter fouentur. Aliud: Sumantur corticis mali Punici dulcis, radicis myrti, corticis cupressi, singulorum medimni tres, gallæ medimnus unus, aquæ quantū satis est. Iam ²⁰ uero & per metranchyton instrumentū ad eam rem factum, locellis succū plantaginis, aut sereos, aut feminalis, aut strychni, aut perdicij, aut psyllij, aut hypocyttidis, aut acaciæ, infundito. Atque hæc eadem per lanam, aut digitum, aut Malam organum, calamus uel in longitudinem formatum, usque ad os uteri indant inferanturque. Et Andronis denique pastillus cum metranchyto infusus cum prædictorum succorum aliquo, aut uino adstringente, efficax & præsentaneum est remedium.

De muliebri profluito. Cap. LXXIII.

Est illatio (quæ ὀστρομετρία Græci nuncupant) est muliebriū locellorum fluxus, uniuersi corporis expurgati. Eiuscemodi uero ideam ac speciem præfert id quod euacuat, cuiusmodi est humor ³⁰ qui in corpore redūdat: aliud rubrū quidē, instar saniei, aquosæ siue sanguinis humoris, quem ἡσπία Græci uocant: alterū uero candidum à pituita proueniens: aliud aut pallidū luridumque, aliud picrocholon, id est amaræ bilis instar: Nōnunquam aqueū denique sanguinē eiciūt, quemadmodū in phlebotomia, id est sanguinis per uenā detractione, aufertur atque procedit. Animaduertere interim accuratissime oportet, ne qua anabrosis, id est erosio in locellis enata constiterit. Notanda autem ac deprehendenda fluxus species est, ex perpetuo locorum madore, dissidentibus colore humoribus. Laborans autem plerumque solet pallefcere, cibum auersari, & incediam sustinere, in deambulationibus quoque spiritus difficultatem sentire, ⁴⁰ oculos insuper habere tumefcentes, interdum quidem cum dolore, interdum uero citra dolorem, & id quidem uel cum exulceratione, uel absque exulceratione, siue uulua inflammāte sordide uel pure. Toti itaque corpori arefacienti

are facientibus medicamentis oportet succurrere, præsertim si morbus fuerit humidior absq̃ euidenti calfactione, frictionibusq̃ corporis uniuersi, & illinitionibus cum melle satís decocto. Tum ea quoq̃ quæ urinã cient porrigito: è quorũ numero habetur aqua, in qua elixa sint asarũ, & apium. Per alium præterea totũ corpus euacuato. Ad hæc portulaca etiam mansa, atq̃ que succus eiusdem herbæ potus, ad hunc modũ affectis subuenit. Balaustrum item, rubiq̃ cum fructus tum flos, & ea quæ inter quercũ & corticem suum interiacent, premni membranofum, & id quod sub exteriori glandis cortice continetur: Hippuris potissime (quæ conus ex cauda equina est) rubeum fluxũ pota ex aqua aut uino, sistit: aut hypocystis, fructusq̃ lentisci frictus in uino & potus: Samius aster, Lemniũ sigillum, coagulũ leporinum, aut hœdinum, aut agninum, aut uitulinum, aut ceruinum: gigarta id est acini, myrta, omphax aridus, piceæ cortex, & quæcunq̃ de locellis sanguinis profluuiũ uexatis iam pridẽ sunt memorata, modo ne sint nimium laboriosa & efficaciora. Quando aut̃ cum labore efferẽ, per metranchytum & clysterẽ succus halicę, aut ptisanę, aut tragi, unã cum anodynīs aliquot remedijs immitendus est, & in paroxysmis quidẽ dolor mitigandus. In defectu uero & interualli spacio, habet enim circuitum nõnuncq̃, sed uolũ utendum fuerit gestationibus præstãtibz diuersiq̃ generis, deambulationibus, uociferationibus, unctionibus, cucurbitulīs, dropace unguento, aut leuigationibus, frictionibus, unguentis depilatorijs quę psilothra dicunt, sine gmate, sinapisimis, uomitibus cum radiculis prouocatis, curatione recreandis defectibus, restituendisq̃ uiribus facta, lauacris, uiniq̃ omnifaria deniq̃ educatione & alimento.

De muliebrium locellorum inflammatione, & eluitione, quam

ἡγῆκλονιρ dicunt. Cap. LXIII.



Phlegmone (quam nos inflammationem interpretamur) uteri, è pluribus sanè causis originem trahit. E plaga nanq̃, ictũ uel ac mensium suppressione, à frigore item, & inflatione, neq̃ minus etiam abortione, pariter & ex partu propter malam foeturam. Comicitur aut̃ locellorũ inflammationem febris acuta, capitis dolor, cum ceruicis, tum basis etiam oculorum, uolæq̃ seu iuncturarum manuum & digitorum, necnon colli conuulsio, & inclinatio in contrariam, affectionesq̃ stomachi quę per consensum excutantur, osculi matricis suffocatio, pulsus parui & densi. Et si quidẽ obscurior fuerit inflammatio, haud ualide sanè, aut crudeli dolore uulua afficit: Sin uero strenue & fortiter inflammetur, tum & ipsa quoq̃ ab omni parte quantaquanta est, pulsatorie dolet. Tota quidem inflammata, per totam pariter ipsam: parte uero modò inflammatione affecta, iuxta hanc potissimũ dolor significatur. Posteriore quippe ipsius partícula phlegmone infestata, dolor circa lumbos excruciat: scybalum, hoc est sterces specie oleti canini, in angustũ redacto, atq̃ oppresso recto intestino, morat̃: partibus uero posterioribus inflamatis, dolor circa pectinẽ, urinæq̃ stillicidium, aut lotij difficultas oritur, stricta atq̃ in arcũ redacta uesica. Si

aut latus locellorū inflammatio tentetur, non tam bubones intendūtur, & crura etiam aggrauantur. Quod si pygma inflammetur, partes umbilico circumiacentes dolore potissimū cum tumore molēue infestantur. Vbi autem circa osculum inflammatio occuparit, graui languentes secundū omnem uentris partem umbilico finitimā, quam epigastrium græce appellant, dolore afficiuntur, digitoq; immisso atq; impresso dure ac grauius subsidet ostium, lum atq; succumbit. In curatione itaq; ante omnia quidem irrigatione ex cœnelæo, siue cœnorhodino sumine tenus & circa ilia seu lūbos utendū, per obstructions ē lana pura absq; illigatione confectas. Adhæc cibi quoq; cōmendatur abstinencia per uniuersum triduū, à qua secta uena cubiti, sanguis (nisi quid impediāt) detrahendus est. Medendum uero chondro ex melicrato, aut pane, aut ouorum sorbitione tertio die: Quinto aut die cataplasma imponat, ex polline, semine lini, scœnogræco, mulso maceratis compositum: capita quoq; papauerū decocta sorbeantur, & ex oleo eadem applicentur. Si aut inflammatio erysipelatoſa existens, calfactiones moleste ferat, illisq; magis irriteretur, fertulam campanam in passo elixans atq; cōterens. adijcito ouorū coctorū putamina cum rosaceo, aut melino, aut croceo, cataplasmatiscq; modo applicato: aut palmularū dactylos uino temperato coquens, cum tenuissimo farinæ polline leuigato, & cum prædicto quopisā unguine, factisq; cataplasmate impone. Malo aut remittente cerota nardina, aut cyprina inferenda & adglutinanda est. Cæterū per omnem medicationem encathismatis quoq; ex decoctione scœnogræci, aut feminis lini, maluæ, artemisiæ, & oleo cōcinnatis, utendū. Atqui in his quæ hæc nō sustinent, ex calida aqua, eiusdem qualitatis rosaceo infuso, fiant. Pessiprætea, enchymatiscq; sumendi sunt, ex hyssope nempe, & butyro, medullaq; ceruina, necnō adipe anserino, & ungento Sulino, & cera Tyrhynica. In his quæ caliditatē ferre nequeunt, aureus etiam quē uocant pessulus cōuenit, & enneapharmacū: Sed quæ ne hæc quidē sustinere possunt, his ex ouo, & rosaceo, adipeq; anserino seu gallinaceo conficiant. Cæterū aduersus at dentiores inflammationes, emplastrū ὀξυχολῶν in diplomate uase cum rosaceo liquefactione cōmisce cremorē plantaginis, aut sercos, aut cichorii, aut intybi. Vel si mauis sequēte utere, constātē adipe anserino suilloue recente pondodrach. quatuor, cerota rosacea aut Sulina pondo unciarū duarū, ouorū assatorum lecythis pondo unciaē unius, croco pondo drachmæ unius, myrrha pondo triobuli, opij obolis duobus, uel opij loco capitū papaueris decocto. Quod si uehementissimus ac nimius infestet dolor, succi papaueris lentis quantitatē, cum lacte muliebri, & succo scœnogræci, ad subiiciendum in uellere pessuli modo porrige. Porrò ad eas quibus duritia ac scirrhus cōiunctus est inflammationes, medicamentū rosaceo dissoluens, uel modo iam dicto subijce, uel infunde. Iam uero declinationib. matricis, quas ὀξυχολῶν uocant, secundū paroxysmos quidē perinde atq; inflammationibus, medelis succurrendū. Verum in quietis tempore & remissionibus morbi uehementioribus mollificatiuis; sed inueteratis, cum his quæ assimilandi uirtutē obtinent,

Aureus pessulus.

Quæ ardentiores inflammationes placent.

Gravissimos dolores lenientia.

De declinatione matricis.

40

ment. Foris aut duritia existente, malagmatis utendum, puta eo quod est ferula campana conficitur, & *ὄξυμελίαν* appellatur, necnō malagmate Mnaſei, & Iceſij, nigro Sarapionis, aut pyrina. Viſtus uero ratio principio quidem tenuis: facta autem morbi relaxatione, pauca. Ducendæ præterea ſunt in lauaera: & exquiſitionis deniq; delicatiorisq; cibi uſus, magnopere in hoc malo commendatur.

De abſceſſu matricis. Cap. LXV.

- P**ostquam inflammatio matricis maturuit, inq; abſceſſum tranſit exitq; intendi ſigna quæ memorauimus uideas, ad hæc indicia quanquam inſtanter cum horrore proferūt ſeſe, principio quidem intenſis cum doloribus. Poſtremo uero ad ſuppurationem perducto apoſtemate, impetus aliquantulum remittitur. Cæterum in eo quo diſrumpitur tempore, cruciatus ſæpenumero acrior ſtimuloſe & quali cum aculeis incidere uidentur, caloresq; uehementiores moleſtant, atq; nōnunquam quidem urina ſupprimitur, interdum uero oletum, facto iuxta affectam uteri partem impedimento: aliquando uero tumor circa pubem apparet, & tanquam clydaſmi ſenſus. Quum abſceſſus grandior fuerit, hoc uero in obuijs, qualiq; ad manus locis dioptriſmo inſtrumento aut digitorum attactu deprehenditur: unde etiam dolores acerbiores infeſtare ob neruoſum ipſius oris conſueuerunt. Quod ſi igitur id quod in fundo atque ſecundum ſinum dolore magis uacat, & digitorum attactu tumor minime ſuccumbit, hoſtiolum uero matricis gracilius uidetur, ei quæ ſtatim aut paulò ante inducta eſt ſuppurationio, cataplaſmatis ex ſcenogræco, ſemine lini, hordeacea aut triticea farina, admixtis interim ipſis ſicibus elixis, opitulandum: aliquando etiam columbæ ſtercore. Encathiſmatis præterea in inflammatione iugiter utendum. Peſſuli item quum ita ſe res languentis habet ex refina terebinthina, myrrha, hyſſopo, atq; butyro concinnati laudantur. Rupto porrò abſceſſu, ſi quidem pus in ueſicam deferatur, lactipotationibus utendum, cucumerisq; ſemen potandum: Sin uero in inteſtinum rectum confringatur, lentium, cor
- Rupto lateri de poſtemate quid faciendum.**
- ticumq; malorum Punicorū elixatione colluendum. At ſi apoſtema ſinum uerſus, quem Græci *κλύπας* nuncupant, ruptum deſſuat, ſi quidem pus immixtum purumq; exiſtat, roſaceum inſundito, aut amygdali cortice exuti atq; dealbati oleum, aut tetrapharmacum regale, aut recens deniq; butyrum. Sed ubi ſanies, aquoſus ue ſanguis, quem græce *ἰκτῆρ* dicunt, eruperit, quemadmodum ex hulcere paſcendo repente noma, maiorem tum conſtringendi ſtiplicandiq; uim immittendum enæma habeat, expedit: id aut fiet, ſi ex myrtis, palmularum dactylis, lenticulaq; componatur. Quod ſi poſt humorum quoq; excretionem adhuc inflammetur, cataplaſmatis tunc encathiſmatisq; inſiſtendum. Quum autem in muliebrium locellorum ore natum apoſtema fuerit, neq; illud confringatur poſtq; extenuaueris circumiacentia puri corpora, ad puris excretionem chirurgica manu utamur, quæadmodū in libro de his, qui manu medicā exercent artē, memorabitur.



Exulceratur subinde uulua mulierum, uel ob difficultatem par-
tus, uel embryulciam, uel corruptionem ex medicamentis acri-
bus, uel ex fluxu, uel ex ruptis deniq; abscessibus. Quapropter
si in promptu quidem & expedita fuerit exulceratio, per diu-
ptisimum deprehenditur: At si ex profunditate, ab excrementis: liquidum
nanq; excernitur & diuersum: inflammato quidem hulcere, exiguum, san-
guinolentū, aut feculentum cum ingenti dolore: Si sordidius fuerit hulus
& ichores, cum minore negotio atq; labore. At si depascendo serpat, teter
rimi odoris fluxum emittit atrumq; nec sine doloribus uehementioribus,
alijsq; quæ inflammationem subesse insinuant indicijs, est. Diarethifmus ad
chalastica medicamenta: sed ad cōtraria, cuphifmus. Mundo aut existente
hulcere, humor exiguus, leuis, & æqualis, insipidus, crassus, albicans, cum
facilitate quadam promanat. Inflammato quidem hulcere, eis quæ superius
ad inflammationem conducere docuimus, remedijs utendum. Quum for-
didum fuerit, ptisanæ cremore, adiecto melle, colluendū, siue tetrapharma-
co, cum Susino, siue mulso in q̄ elixa sint scenogræcū, aut malua, aut fursures,
aut lens deniq; pelle detracta. Cæterum quo exactius ad uiuum, ut aiunt,
expurgetur, etiam marrubiū, aut eruum, siue mel, admixta erui farina, aut
iri, aluminēue rotundo, uel nō absimile quiddā immitte: lisdem porro ipsis
extrinsecus quoq; cataplasmatīs modo hulcera illinito, mulso tuls & mace-
ratis. Peculiaris uero proximū opitulatur medicamentum: Crocus opti-
mus leuigatur lacte muliebri, deinde cerota rosacea excipitur cum adipe an-
serino, floccoq; illinitur. Exquisitius autem fuerit, indurtriumq; magis atq;
ad ingentes dolores cōpetens illud: Capita papaueris in passo diluto irri-
gant per triduū: mox decoquunt usq; ad subactionē: deinde terunt foliorū
rosaceorum drach. quinque, croci drach. tres, admixta capitum papaueris
elixatione: postea macerās perfundito cum rosaceo, ceræq; drach. duabus,
& illiniens rosaceo, in pello subijce. Confert uero & id qd ex ouis, crocoq;
ac rosaceo, adipe anserino, medullaq; ceruina contextit. Necnō Aegyptia
siue rubigine ad uteri hulcera mirifice conducit. Noma uero ubi fuerit, cum
inflammatione quidē panis tepida maceratus & tritus, ex hydromelite, oleo,
althæa, scenogræco, palmularūq; dactylis pinguib; cataplasmatīs modo
illiniendus est: Immitte dū præterea succus plantaginis, strychni, semina-
lis, sereos, primitus quidē per se, deinde uero cum uino austero siue aceto.
Noma uero citra inflammationē urgente, immittenda sunt efficaciora: ex em-
pli gratia, decoctū malicorij, rosarū, thaliæ, cupressi, malorū, coroneorū, ru-
bi, myrtorū, lentisci arboris uirgultorū, rhu q̄ utunt coriarij ē uino stipante:
postremo uero aluminis quoq; & acaciæ, lycij, hypocyttidisq; elixatio. Por-
rō ex iisdem decoctionibus infessus etiā constituat. Quod si nihil proficiat,
primo quidē cōpositionē ē charta immitte: Deinde uero acetū, aut anthe-
ram, aut chalcitā, aut acrementū sutorū, quæ liquoribus dysentericis quoq;
congruunt. Alimenti porro perexiguū ministrato. Expurgato uero iam
hulce

Si noma cum
inflammatione.

Si noma absq;
inflammatione.

hulcere, lauare crebrius, alere item, & uinum præbere, quò incarnatio fiat ocyus, expedit. Foris aut epigastrio atq; coxèdicibus emplastrū nullam cicatricem inducēs imponendū. Quemadmodū enim cataplasmatum, ita & emplastrorū potentia per abditos & obscuros transfertur meatus.

De uterico cancro. Cap. LXVII.



X canceribus quæ in mulierū locellis oboriūtur, partim quidem cum exulceratione, partim uero sine hulcere proueniunt. Quorū circa quæ citra exulcerationē emergūt, in his utiq; tumor circa hystere ostiū durus, uarius, tumenis, colore feculentus, rubicundus, ¹⁰ luscq; deprehendit, interdū uero etiā subliuidus: & pergrauis dolore tentantur secundū inguina, quæ Græci bubonas appellant, & epigastriū, sumenq; & lumbos: stomachanturq; & exacerbant manuū atrectationibus, & uario magis medicamento. At si cum hulcere cancer est, præter dolores, & duritiās, tumoresq;, exesa ac aspera speculantur hulcera, magna ex parte quidē sordida, pōderosa, & albicātia. Quod si labores humore cōcreto turgidos habeant, & quæ oculis usurpantur, pura, feculenta, lutida, rubētia, & cruēta apparent: cōtinue inde ichor tenuis, aquosus, ater, aut pus tetri graueolētisq; odoris excernit: nonnunq; uero etiā sanguis profluit, cæteraq; indicia quæ in sermone de utero inflāmato enumerata sunt. Hic sanè morbus ²⁰ immedicabilis est, ceu alibi ipse quoq; asserit Hippocrates. Placandus tamē ipsarū dolor est, encathismatis quidē ex scenogræco, maluaq; paratis, atq; id genus cataplasmatibus. Cæterum ualde consolantur in exacerbationibus, malua aut althæa in mulso subacta, colliquataq; cum pauco rosaceo, & instar cataplasmatibus adglutinata: necnon compositione ex ficibus aridis, & ferulis cāpanis, ruta, thure, napiq; herba accurate cum oleo contusa. Lenit item cataplasma ex palmularum dactylis in passo decoctis, adiectis ouorum putaminibus, atq; farina, aut ex papauere, cum coriano, aut feminali, aut sereos: hæc quidem in ipso cruciatus tempore. Post hæc uero absterga cerota ex rosaceo, aut myrtino, aut cenanthino, aut melino ³⁰ cum palmulis in passo elixis. Peculiariter uero huic negotio quadrat cataplasma ex fece officinarū fabriliū, quæ assata leuigat, cerotaq; rosacea excipitur, tantisper dum crassitudine emplastro idoneā induat. Hæc quidē extrinsecus adhibent. Interius uero mitigat locos oleum: ubi aut exulcerati reddunt, lac quoq; muliebre infusum, tepidusq; plantaginis cremor. Si sanguine cōspargant, succus seminalis herbæ cum pauco thure cōmulcet: Præterea pessi ē croco, & lacte muliebri, & liquore papaueris, & hyssopo. Omnium uero efficacissime opera, & aduersus etiam sedis affectiones illud, quod accipit spumæ argenti Italicæ lotæ unc. sex, thuris masculi, hyssopi, adipis porcellini nouiti, butyri recentis, cere Tyrrhenicæ, singulorum uncias ij. rosacei unc. iij. spumæ argenti cōtritæ, in cremore sereos liquefactis reliquis inijce. Alimenta porro rite beneq; disposita & inculpati succi, sunt exhibenda: uerbi causa, paucissimum aquosum, fugientes acriores cibos omnes, & cibi satietatem, promptissime nanq; ipsis cibaria corrumpuntur.

Canceris exulcerati signa.

Quæ sitis in cancro adhibentur.

Quibus internis fecus cancro succi currentiani.

De scirrho & scleromate uteri. Cap. LXVIII.

Scleroma.



Bdurefcit uterus, quandoq; sanè derepente nulla perfpicua occafione, plerūq; uero ex inflāmate quæ præceffit, & foluta nō eft neq; diflipata, neq; in abfcelfum permutata. Conforme autē fcirrho eft, qđ appellat ſcleroma, circa uuluae ceruicē magna ex parte confiftēs, tumorē quidē habens eodem pacto, fed minus duru, cum dolore mediocri. Comitatur autē hęc, declinatio ad cōtraria et oppofita, tumor ad magnitudinē morbi fortiter cōtrarius cum grauedine, & difficili motu, non crurum modò, fed uniuerfi corporis, defidiaq; ad exequenda opera. Accidit nō recte tractatis, malus corporis habitus aquofus. Principio igitur in huiufmodi curatione fanguis fecta uena auferendus eft, aut eligenda purgatio, cū Archigenis hiera: deinde cataplafmata ex ficubus aridis, hyffopo, nitro, abſinthio, & cucurbiula cum ſcarificatione: & malagmata, nempe polyarchiū, & diaſpermaton, & diadaphnidon: encathifmata facta ex elixatione ficuū iſchadū, artemiſiæ, pulegij, althææ: peſſuli compoſiti ē refinā terebinthina, galbano, myrrha, iri, hyffopo, dropace. Aquarū ſponte emergentium uſus, quæ uidelicet nitri naturā aut biuminis potentiam præferūt. Si uero corporis robur nō deſit, etiam helleborifmus probatur. Peſſulus emolliendū uim obtinens.

Accipe ceræ ponticæ, unguenti nardini, uniuſcuſq; uncias treis, irinī, 20
agleucini, cyprini, ſingulorū unc. duas, adipis agnini, & anſerini, butyri, hyffopi, medullæ ceruinæ, refinæ terebinthinæ, ſingulorū uncias treis. Aliud: Polij drach. ij. myrrhę drach. iij. cum uino Mendefio cōterens, iri noq; immergēs ad ſubiſciendū exhibe. Aliud: Cere Tyrrhengi, adipis uulini, refinæ terebinthine, medullę ceruine, mellis atticī, olei ueteris, æquis portionib. cum ſyncritico. Et ad inflationes: Vuæ paſſæ candidę dēptis ad nis unc. treis, foliorū uiridis rutæ unc. ij. aque marinæ unc. i. & dimidiā, cymini unc. iij. mellis quantū ſatis eſt. Illiniēs autē peſſum immerge oleo cyprino, atq; ſubiſce. Ceterū aureus peſſulus, atq; libanius, necnō enneapharma cū accōmodata ſunt huic affectioni: uerū peculiarius qđ eſt calce ſit Titianus, 30

De Mola. Cap. LXIX.



Mola quoq; uteri ſcirrhoſus tumor eſt, interdū quidē iuxta loculorū oſtium, quandoq; uero per uniuerſam eorundem molem apparens: à qua lapidoſus tumor cum diuulſione ſuperiacentū particularū, & gracilentia, palloreq; & cibi horrore, menſurētione, & māmārū tumor, tanq; ſuſpicionē cōceptionis in quibuſdā ab initio ſtatim inducūt. Poſtea uero tēpore diſcernunt: nōnullę uero aquæ inter cutis ſuſpicionē præferūt. Ceterū hoc ex tumoris duritia diſcoſcendū, & ex eo qđ ſonitus nō reddit, dum digitis pulſat, quē admodū in intercutibus: in quibuſdam autē re uera in hyderū tranſit: nōnunq; uero incurabilis magna ex parte mōrbus naſciī: quibuſdā ſanè fanguis quoq; effertur. Cōmunis igitur decubitus iſtis in domo minime ampla & opaca confert, & modice refrigerante circa lectum immobilem: ſublīmiora ſint quæ pedes earum in quiete fulciunt: Efficax quippe ad prouocandū omnem fluxum eſt motio. 40

Motus fluxus
prouocat.

Atque tumores quidem, duritiasque ea ratione quam in scirrhis uteri scleromatibus medebimur. Sed aquosas parenchyfes, per ea quæ de hyderis dicta sunt: eruptiones aut sanguinis uulug, perinde atque fluxiones sanguinis alias fluxumque curabimus. Sunt porro qui molam asserant carnem esse informem in ipsis locellorum tunicis consistentem, & quod abortione editur, quem admodum fetus, quæ embrya dicunt. Hæc uero forma est medicationis chalcitice. Adhibenda insuper ea est uictus ratio, ut ocyus excernatur.

De inflatione uteri, quam græce *μπαροπύκνωσις* dicunt. Cap. LXX.

- I** Nflatur uterus frigiditate, aut corruptione, aut incōmodo partu ostiolo conniuyente, sanguineque in exiguos globulos concreto, in eodem cunei modo obstrueto, quandoque sanè in cōcauitate loculamenti sinuosi flatibus relictis, nōnunquam uero in laxationibus totius corporis uulug: Quæ comitatur tumor pectinis, atque uētris circa umbilicū hypogastrij appellati, cum duritia et dolore punctuoso, usque ad septum transuersum, & stomachū, & inguen pertingente ac transeunte: & ad digitorū pulsationē sonitus tympanæ instar editur. Medendū itaque, primo quidem detractione sanguinis, si nihil impedimento sit: mox uero circa paroxysmos inedia & irrigationibus, ex oleo rutaceo factis: encathismatisque ex decocto rutæ, pulegij, artemisiæ, calisæ, & id genus alijs. Cataplasmatibus item quæ è seminibus apio, cymino, fœniculo, aniso, ameos, hordeacea farina cōtexunt. Cucurbitulis quoque leuibus inanibusque, & incisa cute scalpello utere. Inueterata autē affectione picra purgandū, atque hiera dropacibusque & sinapismis utendū, nec non naturalibus aquis. Cæterū obstetrix digitū antea illitū inferens, incūbentē sanguinē in frustula conglobatū si assequat, auferat clementer ipsum resoluens: deinde rursus cataplasmatibus modo imponenda, ficus, nitrum, & absinthiū. Epithemata præterea quæ emollientia potentia regnant, puta Polyarchiū, & diaspermaton, & diadaphnidon applicanda sunt. Pessuli denique ex ruta, melle, nitroque forment. Cū primis aut ille accommodatus est, qui faberrime è ficuum pinguium concussarū drachma una, cymini drachmis duabus, spumæ nitri drachma una concinnatur: sed propter acrimoniam in lacte prius macerent. Pessuli postremo cuncti, qui emolliendi uirtutē habent, ad eam provinciam sunt perque idonei.

De hysterica suffocatione. Cap. LXXI.

- T** rangulatus uteri, in superiore parte ascensus uulue est, in societate afflictionis principes corporis partes ducentis, ueluti carotidas, cor, panniculos cerebri, quos Græci *πλευρῶνες* dicunt. Accidit autē languētibz imminente quidē iam paroxysmo tarditas mentis, segnities, infirmitas crurū, pallor uultus, species luminum percrassa: Instante uero iam strangulatione, in somnū delatio, quam cataphoram uocant, dementia, catalepsis sensuum sedis cum mutitate, crurum cōtractio: deinde incipiunt rubesceri genæ, & uultus uniuersus accenditur. Relaxationis uero tempore promanat quædā è muliebribz, locellis humiditas ad tactū, & borborygmus, hoc est uentris strepitus, & progreditur aliquod intesti-

Mola quidē

Obstetricis manus.

num, & ipsa quoque uulua paululum flaccescit & languescit, tum denique ad se redeunt, sensumque recipiunt. Mouetur porro morbus ille quodam circuitu, quemadmodum & morbus comitialis, facta uidelicet uulua, uel femina, uel alia quapiam materia, aut materia in eadem marcida & putrefacta. Plures quidem relatae & pristinae salubritati restitutae sunt: nonnullae uero in ipso paroxysmo uitae in mortem subito commutarunt: pulsibus quidem crebrescentibus ac densatis, inordinatimque diffusis, deinde & asphyxia (id est nulla uenarum pulsatione) sequuta, exiguo uero humore superficie irrorante, respiratione aut primū quidem ad nihilum redigente & obscurante, postea uero omnino amputante. Caeterum hic languor hyeme atque autumnō ingruit in uenibus, procliuus ad libidinē, sterilibus, & potissime si propter medicationem infecundae fuerint, & alijs refrigeratis. Quocirca in paroxysmis extremas corporis partes uincire oportet, & tota crura fricare, atque uniuersum etiam corpus, perinde atque eos qui animo defecerunt, reducere & resocillare: graueolentiaque odoramenta olfactanda naribus admouere: uerbi causa, elychniū extinctū, castoriū, picem liquidā, cedriā, uellera, & lintea combusta: quidam uero amida quoque adhibuerunt ē lotio ueteri, siue oletulo: Et cucurbitulas inguinibus, & epigastrio, cum plurima flamma, et leues inanes uel, atque cum scarificatione ad glutinare expedit. Accessione autem protracta, & ea quae peditus agunt sunt utilia: cuiusmodi sunt sacculi, dactylis, id est sedi appositi: exempli gratia cymīnū, nitrum cum melle, & sterces cum lotione prolicere ac subducere, ne torqueant in accumulatione sua. Atqui in utrum odoratissima fragrantissimaque uingenta infusa, detrahē uuluum naturae aptitudine possunt: ueluti amaracinum, malabathrinū: Sinapi uero partim quidem naribus obijciat, partim uero pedibus cataplasmatas instar imponatur. Inclamet autem quispiam illis altiore horrendaque uociferatione, atque appellet & accerfet. Porro quae sternutationē proliciunt adhibenda sunt, ē castorio uidelicet, & struthio, lanariaeue, & pipere temperata. Mali uero elapso acumine atque insultu ad uomendū cogito: in abstinentia, aut exigua alimētorum assumptione obseruato. Post septimum autem diem purgandū, quae ē colocynthide cōtexta sit hiera: post tertium uero diem cucurbitulā lumbis applicabimus, & ilibus. Deinde ē castorio potione utamur, quandoque quidem cū decoctione artemisiae, interdū uero cū aqua mulsā: In quibusdam enim expedit illud, atque unicū ad exactā & numeris omnibus absolutā curationē factis est. Encathisma praeterea & pelli emolliendi potestate praediti, in hunc usum accersant. Haec quidem ad morbi impetū cōducunt, atque uigorē, quem graece paroxysmū uocant, expediunt. Caeterum ad uniuersi corporis instaurationem, a detractione sanguinis auspicias, ad expurgationē cum hiera proficiscere. Deinde ex aloē confectā picrā porrigito pondo drach. i. cum mulsā cyathis tribus, idque perpetuū, uel per temporis interualla drach. ij. cū aquae mulsae cyathis sex. Dropacismis porro, & cucurbitulis, & sinapismis utendum, & qui ex euphorbio cōficiuntur acopis. Ab his exercitationibus indulgendū, frictionibusque & uociferationibus. postremo autem naturalium aquarum usus.

De prociis

Graueolentia
odoramenta.

De procidentia uteri. Cap. LXXII.



Rocidit sanè fœminis uulua rarius, sed plures ob causas: autem ex alto delabēt, & in coxendices quasi radices agit, ruptis membranis quæ intestinum continent: aut propter secundæ muliebres locellos ambiētis sibiq; adnatæ extractionem, quem admodum in difficili partu cōtingit: aut propter sterilitatē, aut propter plagam, aut ob animales affectiones, puta amissionē liberorū, tristem scytalem aduersumq; aliquod nunciū, aut hostium insulū, aut ob nauigationem periculosa, aut aliquam id genus aliā causam, omni eo quod cōcretū est loco, collapsa uulua: aut propter paralytim & imbecillitatē partium, quem admodū in senescentibus & deficientibus frequēter accidit. Procidit aut secundū os eius maxime. Nōnulli uero uniuersum uterū procidere affirmāt, qđ sanè ineptū est, ne dicam absurdū. Quo enim pacto reducta in suā sedē collocaret. Oportet itaq; in huiusmodi curatione stercus ante omnia clystere euacuantes, & lotiū excernētes, q̄ undiq; ab omni anxietate libera sit uulua, laborantē supino corpore cōponere, in altū protendentes coxēdices & deustus poplites, cum diuaticatis cruribus. Deinde accipito systremma ex lana, forma & crassitudine sinui muliebri respondēs, sindonēq; illud circūuoluito, & in cremorē acaciæ intingito, aut hypocystidē uino in hunc usum immergito, subijcitoq; uulux, & absq; uiolentia omne id quod procidit sursum torqueto, dum solidus & integer in sinu tumor exciteat. Cooperi præterea extrinsecus sumē spongia in posca macerata & expressa. Decubat aut homo extensa & coaptata apposite habens inuicē crura, ita quidē ut alterū alteri incubat. Posthæc cucurbitulæ sunt adglutinandæ, cum flāma plurimā, umbilico & utrisq; ilijs seu lumbis. Odoramēta item offerēda sunt per odora. Cæterū tertio die lana sinui imposita, mulier in uinū atrū & austerū descendat aliquantulū tepēfactū, siue in decoctionē myrti, aut roſūdi iunci odorati, aut corticū mali Punici. Post hæc aut imposita lana tollatur, & altera imponat eodem madefacta medicamēto. Foris cataplasmata inspergenē circa epigastriū, diaphœnicon scilicet ex farina hordei, aut lente, & corticibus mali granati cum oxymelite, atq; hæc denuo fiant die tertio usq; ad exactam curationē. Quod si progressu tēporis id qđ procidit putrefiat, auferendū est ipsum citra omnē futuri periculi suspicionē: totā etenim uuluam ablata fuisse memorant putrefactam, & superstitem mansisse mulierem.

Totum uterū
procidere quā
dam autemāt.

De muliebrium locorum clausura. Cap. LXXIII.



It angusta quædā interdū circa muliebriū locorū os præclusio, quā *φίμω* appellant, idq; aut propter exulcerationē quæ præcessit, aut duratā inflāmationē. Medendū est igitur encathisma-
tis mollificantibus, quæ constituunt ex hydrelæo & scœnogreci elixatione. Cataplasmata cōsimiliter sunt applicanda: Pessi item qui emolliendi uim habēt, adhibēdi. Quod si inueterauerit id malū, suffimentis uaporibusq; aromatu utendū. Discutit præterea eiusmodi nexū etiā pessulus ex hyssopo, nitro, resinaq; terebinthina contextus, si nihil aliud quā clausura ostij uulux coarctetur.

Curatio sterilitatis partum non concipientium. Cap. LXXIIII.



Neq; pingues
ntq; macilentis
gignendis libe-
ris idonei.

Ine itaq; discrimine utriq; sexui tam mari quàm foeminae con-
gruit, corpus uniuersum in media & inculcata temperie conser-
uare, & sine omni excessu in symmetria laborum, ciborū, lau-
crorum, atque reliquorum omnium. Hoc quippe maximum
neutiquam despiciere, ut praepinguem sibi compareret habitudinem, neque
enim crassi pinguesq; progignendis pueris satis sunt idonei, tum quod ine-
pti sunt pudendis, tum quod eiusmodi pauculū genitalis seminis emittunt;
neque sanè admodum macilenti supraq; modum extenuati, procreandi li-
beros prouinciae sufficiunt. Conferūt opis plurimū ita affectis, cuncta quae
calfaciendi paululumq; insiandi uim obtinēt. Vinū itaq; calide naturę cum
modo, & ne quid nimis accipito, & ex holeribus erucam, et nasturtiū sylue-
stre, quod erysimon græce nominant, & herbam geminalem, & id genus
alia. Ruta uero & nepita manibus pedibusq; quīs alio magis sunt fugien-
da. Quum aut̃ propter malos humores & cacochymiam quandam impediri
conceptio, eisdem expurgare, aut utili uictus ratione temperare expedit.
Priuatim uero mulieribus cōpetit, uulua magna industria consultoq; ag-
gredi, & absq; ullo impedimento moliri euacuationem. Pro foribus igitur
iam existente purgatione, non tam esculentorū quàm poculentorū, quan-
tacunq; fieri potest mediocritate curato: & quippiam eorum, quæ ad pur-
gationem stimulant ac prouocant steriles, sumere neutiquam detrectent
cuius farinae sunt cum holera odorata, tum quæ acrimoniam præferunt,
puta scandix, batis, quod crithmon græce uocant, sceniculum, apium, smyr-
nion. Cæterum prauam uuluae temperiem emendato, atque in uiam, ut ita
dicam, reducito. Frigidiores igitur uteros proprie arguit mensiū retentio.
Victus ratio gelidioris potentiae, & crassi succi, quoniā stuporem inducit,
cum circa fumen seu pectinem, tum lumbos, tum etiam crura. At quædam
sunt ad summum perfrigeratæ, neq; in Venerem admodū procliuēs ferun-
tur, neq; appetunt: expedit igitur cum alia quædam faciendo, tum pyrijs
omnibus, tum ijs quæ e uaporibus fiunt calfactionibus reuocare calorem.
Neq; sanè abominandum huius quoq; rei gratia fuerit castorium potare,
& fragrantia semina, & cyminum, & anisum, & pulegij comam, & iunipe-
rorum baccas seu fructum, unicuiq; interim pipere commixto. Ipsarum ue-
ro uuluarum fatus, partim quidem uapores sedentibus in sede cōstituant,
partim uero calida aqua alluendo fiunt, in qua elixa sint saluia, artemisia,
ruta, cyperum, pulegium, acorum, & quę bonum emittunt odoris fluxum
semina. Cataplasmate mederi expedit harum unicuique pectinem. Con-
ducit nō minus Polyarchium epithema. Frictio porro pectinis atq; coxen-
dicum nulli quouis alij medicamento bonitatis honore & utilitate cedit.
Vitor etiam ad arcendam sterilitatem prosthesis (id est medicaminibus
quæ leonibus mulierum in uellere induntur) cōtextis ē myrrha, & ruta, &
galbano, & castorio fomento prius facto ex aqua mulla, siue marina. Proba-
tur quoq; non uulgariter ad hæc pessus qui appellationem uulgo obtinuit
gena.

Quæ steriliū
purgationem
prouocant.

Frigidioris uul-
uæ gata.

- Genæ. Cæterū calidiores mulierū locellos colligito, ubi corpus uniuersum calidius extiterit, menstruaq; pauca cum labore, ex hūlcerationesq; naturalia mulierū occupant. Succurrito itaq; rebus mediocriter humectantibus & perfrigerantibus: cuius generis sunt olera, lactucae, malua, blitum, co-
 locyntha, id est cucurbita, cucumis, & pepon, atriplexq; portulaca, atq; id
 genus alia esculenta. Vesicæ porro, uentrisq; parti umbilico adiacenti, quā
 epigastrium appellant, atq; lumbis ilibusue adhibenda sunt refrigeria ca-
 taplasmatis modo imposita, & cum succis illita. Quod si autem propter hu-
 miditatem muliebrium locellorū insecundæ partum non concipiant, indi-
 10 cium illud habet, quod in mediæ Venereæ madore perfunduntur admo-
 dum, tenuioresq; & copiosiores defluunt menses. Victus ratio sic habenti-
 bus accommodata est aridior, pariter & labores frictionesq; infernarū par-
 tiū, simul & uomitiones, ariditasq; & frugalitas cibi. Ex re præterea usuq;
 haud mediocriter sanè fuerit, ipsam quoq; uulvam medicaminibus acer bis
 tueri: è quorū numero habet, lentisci elixatio, & myrtorū, & rosarū, & rhu,
 præterea mali Punici floris, & rubi tenellorū, atq; gallæ. Hysteram contra
 aridiore, quæ cum his uel ex diametro pugnant remedijs curato: lauacris
 in quā, & illinitione, & delicijs, humectanteq; & holeraceo nutritu: uino
 præterea mediocri, neq; admodū perueteri. Quod si quæ crassioribus hu-
 20 moribus impeditæ non concipiant, si quis mordax humor infestet, mulierē
 purgare quolibet humore officii faciente, familiare atq; amicū præsidium
 est: maxime uero ex aloë contexta picra, hoc est amara: deinde sero lactis
 uulua eluere: uictusq; rationē exquisitiore & cōmodiorem dispicere. Pitui-
 tosos aut humores, tum laboribus, tum hydroterijs, id est rebus quæ sudo-
 res proliciunt & expellūt, uomitionibusq; siue per inferna euacuare expe-
 dit. Oportet præterea in pharmaco epithymū, euphorbiū, piperis semen,
 dauci semen, & petroselinū, omnia in quā cōtrita & macerata pondo duūm
 drachmarū potui dare. Hoc per uentrem etiam pulcherrime deducit, uul-
 uamq; calfacit, quemadmodū sæpe iam numero menses quoq; dissoluit &
 30 rupit his, quæ nō erant purgatæ. Quando aut emendatio, mensibus cōmo-
 de & suauiter progrediuntibus, perspicua cōspicitur, tum cessante purga-
 tione, in Venerem congregi expedit. Vbi aut flatus ac peditus in utero mu-
 lieris contenta, cōceptioni obstaculo sunt, notas ipsorum ex his, quæ de uul-
 uæ inflationibus prodita sunt, deprehēdes. Medendū uero eidem affectui
 est, primum quidem prætenuem necessitatiq; uix sufficientem præscriben-
 do diætā. Conducunt præterea cyminum, anethū, & apij semen, rutæq;
 & anisi, & esculenta multa assatim exhibita, partim quidē potui, partim ue-
 ro apponenda & pessi modo subiicienda. Conniuentes porro & clau-
 sas mulierū uulvas aperire cōuenit, fragrantibus lauando & fouendo con-
 40 fectionibus ex malua, & semine lini, scenogræci, & oleo, interdum etiam
 melle: Vehementioribus item artemisia, uidelicet monyza, & nepita, & pu-
 legio, & anthemide (quam chamomilā uulgò uocant) ad hæc resina quoq;
 terebinthina, nitro, cucumere syluestri, elaterio, cassia, horopissa. Quibus

Perfidum Genæ.

Calide uulue
curatio.Humidioris
uulue cum noua
te huius cura.Stecioris uteri
medicla.Sterilitatis ex
crassis humo-
ribus cura.Vterus clausus
quibus referat
dicitur.

ostium uteri hiat, his diæta quidem, & fetus, & medicamenta aridiora, & constringentia, cytini malorum Punicorum, & rotundus iuncus odoratus, & rubi radices, & myrta, & breuiter quæcunq; in humidiorē uulua expediunt, accommodatissima censentur. Cæterum contortiones peruersionesq; uuluarum, fomentationibus quas pyrias dicunt, dirigit & corrige, & quæ uim habent emolliendi cathetis. Coitus postremo qui fit à tergo plurimum utilitatis ad partus conceptionem conferre uidetur.

De uuluarum rhagadibus, condylomatibus, & hæmorrhoidibus. Cap. LXXV.



Circa foeminarum naturalium ostium, rimæ (quas Græci *παυδα* uocant) quandoq; ex laborioso & uiolento partu proueniunt: quæ primū quidē recentibus etiā dū ex puerperio doloribus delitescentes fallunt, postea uero paulatim sensu percipiunt, nonnunquam manu etiā admota deprehendunt, interdum uero & in congressu Venereo, dum ex attritu polluantur cruore, arguuntur: Præterea & sinus indicantur stillicidio: rupturæ namq; in corona ostij speculantur: In quibus sane chirurgiæ, & erodendi mordendiq; uirtute prædita medicamina abhorrēda: mitioribus uero & simplicibus epithematis atq; pessis utendū. Per accommodatum porro habetur eisdem scissionibus tetrapharmacū dissolutum. Quod si callosis labris fuerint rimæ, compositione ex charta, cum rosaceo utendum: Quum aut uehementiam eius laborans non tolerat, irim Illyricā resina terebinthina excipiens, imponito. Huiusculis uero pereuntibus euanescentibusq; magno cum emolumento adhibetur medicamentum ē cadmia, aut eorū aliquid qd ad sedis affectus placandos & persanandos est cōpositum, & ob id hedricum appellatū: cuiusmodi est, ea quæ ex spuma argenti contexti confectio. Postq; aut eiusmodi diuisiones in ueterata in callum (quæ condylomata dicunt) transeunt, cōsimilibus atq; eiusdem planē facultatis medicaminibus uti expedit. Callus emollientibus quidem discutiendus, & in cicatricē redigenda sunt cōdylomata. Hæmorrhoides præterea in mulierum naturalium ostio siue ceruice exurgunt: quæ quidem partibus dioptrismo tētatis, ex eo deprehendunt, quia in paroxysmis quidē sanguinolentū, subrubrū, dolorificum quiddā eximie apparet. In relaxationibus uero fluxus dolore uacans subliuidus et strangulosus. In quibus igitur opus est, si quidē fieri potest, in remissione exectione utitor. Mydio apprehendens: Sin uero minus, cum medicamentis ipsas cōstringito: nunc quidem aridis malicorijs, adiecta galla, aut quopiam eiusmodi applicatis: nunc uero his quæ in sanguinis uteri profluuio posita sunt adhibitis: quæq; diarrhis & sanguinis fluxum patientibus congruunt, deprehensis continua uulua ex interuallis cruentatione: neque id quidem in menstrui expurgationis tempore solum, sed aliās etiā iugiter.

De difficultate partus, quam *δυσκολία* uocant. Cap. LXXVI.



Parienti difficultas nascitur, uel culpa parentis, uel culpa foetus, uel chorij uitio (est aut chorion inuolucrum, quo partus in uulua parentis inuoluitur) uel per ea quæ foris accidunt. Gignētis quidem

Rhagades in ueterate condylomata dicuntur.

Hæmorrhoides ostij matris dicuntur.

Chorion.

dem culpa, aut propter crassitiem & pinguetudinē, aut ob arctā & exiguā
 matricē uniuerſam, aut dolorē immenſum, aut dilā hūcus, aut inflāmatiōē
 matricē occupantē, aut aliud membrū, aut quocunq; alio morbo affectam,
 aut ſuapte natura ualitudinariam, uel uiribus deſtitutā, extrudere foetum
 non ualentem, aut ante legitimū parturitiōis punctū parientem. Culpa
 uero ſcetus, uel quū ſupra modum ingēns eſt, aut nimium puſillus, & nec
 magnopere ponderoſus, aut ampliſſimi capitis, aut monſtrū: uerbi cauſa,
 biceps, aut mortuus, aut uiuens quidē, ſed imbecillis, neq; potens in lucem
 progredi, aut quod cōplures partus ſortita ſit: quinq; nanq; ſimul in utero
 10 haberi poſſe aſſerit Herophilus: aut quod nō naturaliter diſpoſitus ſit, neq;
 ad exitum quadrans corporis figura ſeu habitus. Eſt enim uero naturale ſce-
 tus in lucem edendi ſchema: Primū quidem & præcipuū embryi ſchemā in
 caput, manibus in femora diſpoſitis, & ne paululū quidē perperā declinās,
 rectā os uerſum caput porrigēs: Secūda uero ſcetus forma, rectā in pedes,
 ne tantillum quidem ab eo tramite declinans probatur. Præter hæc duo,
 omnia cætera in lucem edendi partus præter naturā, ne monſtroſa dicam,
 exiſtunt ſchemata. Vitio autē membranæ chorij puerperij difficultas ſit,
 uel quum non auellitur propter crassitiem, uel quum antequam conueniat
 auellitur, ob tenuitatem & macilentiam: euacuato nanq; humore, egerri-
 20 me delabetur embryon propter ariditatē. Si quæ extrinſecus occurrant, in
 cauſa ægræ parturitiōis ſunt, ſiue frigore cōdenſante, ſiue calore immo-
 dico diſſiciente ac diſtrahente potentiā, aut alio quopīā euentu incurſante.
 Quod ſi igitur aſtriſtioni aut denſitati quaſiq; cuneationi difficultatis pa-
 riendi culpa imputatur, laxatione primitus ſuccurrito, inſundens iugiter
 oleum dulce, & calidum, & elixationem ſcenogræci, aut maluæ, aut ſemi-
 nis lini, aut etiam oua, laboris mitigandi gratia. Deinde pubem cum epiga-
 ſtrio & lumbis, cataplaſmatis modo illinito cum ſemine lini, aut melicra-
 to, aut hydrelæo, encathifiſmis præterea conſimilibus. A balneis quoque
 chalafmos ſuſcipe, præterquam ſi febris, aut alia quæpiā prohibeat occaſio:
 30 Mouetoq; parientē lectica, ſellæue, in aëre tēperate calido. Nōnulli uero cō-
 cuſſionibus uehementibus ac uiolentis utuntur, ſternutamenta adhibent,
 atq; animo pauido exiſtentē quaſiq; detrectantē, concitant quidē & exhor-
 tantur: ſed inexpertā dolores partus, admonere expedit, ut conſtanter ceu
 operæ præcium ſpiritum cōtineat, & ualidiore niſu cōceptionē ad os uterī
 protrudat. Atqui ſenſum non tentantibus odoramentis animo deficiens re-
 cuperanda & recreanda eſt: Refocillata uero mediocriter, nutrienda eſt ali-
 mento haud multo. Prius in ſella ita collocare oportet, ut contractis ad ſce-
 mora genibus ſit: ſic enim mater uerſus pubem delata, rectā oſtio opponi-
 tur: digitis autem os ipſum uel cerota uel unſtione illitum, placide partum
 40 tranſmittit. Oportet & hæc tum cōſiderare, ſi quis præterea morbus circa
 has partes ſit ſcilicet: Alui excrementum contentum molli clyſtere eijci-
 to, & chorium apertū tollito, aut digitis, aut polycopo ſpathio cōmixto, in
 ipſis leua manu præcedente: & pinguiū nonnihil humorū in ſinuofum uul-

Quomodo
 puerperæ uul-
 tus reddas
 tur difficilis.

Factus qui para-
 tum difficultas
 faciat.

Forma pueri
 ex utero pro-
 deuntis.

Externæ ægri
 partus cauſæ.

uæ loculamentū per clysteridiū immitte. Vbi autē præter naturā conformatum embryon est, schematismū naturālē reddito: nunc quidē impellendo nunc uero adducendo, nūc flectendo, nunc uero dirigēdo: & si quidē manū prætendit aut pedem, noli membro apprehensum arripere: magis nanq; obstruī, aut debilitatis artubus impotēs euadit, aut etiam frangitur inrerdū. Sed digitos ad humerū aut coxendicem foetus trahendo, denno prominentē infantulū in locum suū reducito. Sin unā cum densitate totius embrii fiat cōformatio, rursū ab ore uteri in superiora quāprimū idem attollito: deinde cōprehensum denuo in os ipsum dirigito. Quod si plures uno foetus gestant, sursum eosdem atq; deorsum reducito: uerū cuncta paulatim & ablq; partus ruptura facito, oleo perfundens locos. Opportunum porro tēpus in sedis lecticā est, ubi matricis ostiū apertū subcidit digito, inclinātq; proruptura. At si propterea quod mortuus sit infans in utero, aut ob aliam causam progredi in lucem moratur, in fantem extrahito.

De coxendicis affectibus & curationibus. Cap. LXXVII.



I Schias, hoc est coxendicis morbus de genere arthritidos est, nisi quod inhaeret coxæ, causam cuius retulimus. Illius uero morbi causa est, crassus & pituitosus humor, qui in coxendice cunei instar concretus infedit & articulat. Dolor uero eo malo obnoxios, à sphæromatis bubonisq; loco ad genua usq; infestat, in plerisque aut usq; ad extimū pedis calcaneum atq; summū eius (ut ita dicam) ungiculum peruenit. Circa igitur primordia statim simul atq; languentes dolorem sentiunt, facta alui scyballorū per clysterem euacuatione, ex uena cubiti sanguis detrahendus est: At si inueterauerit, à malleolo affecti cruris detractione probat. Atqui per morbi insultus, quos paroxysmos dicunt, ista irrigatione utendū: sumito cyprini cyathos octo, aceti cyathos quatuor, nitri cyathos duos, hordei cyathū unum, per lanam succidam calida. Postquam quidem embrocham cataplasmata applicentur ex amarorū lupinorum farina, cum oxymelite, farinæ uel lolleacea, cum resina, & cucumeris syluestris radice, & nitro, & nepeta, & hordeo, & baccis lauri. Cæterū nepeta per se sine appendice magna cum utilitate cataplasmatibus modo imponit, cum oxymelite aut mulsio. Emplastro præterea placidi facultate prædito utendū, quidē ex his constat: Ceræ drach. centū, resinæ terebinthinæ drac. uiginti quinq;, eruginis drach. sex, myrrhæ, galbani, ireos, singulorū drach. sex, cedrig drach. quinq;: Cæterū potionandi prius sunt ischiadici, succo cyrenaico erui quātitate: aut castorij drach. una cum opopanacis triobolo. Porro capparis radice cortex potus, & cataplasmatibus immixtus cōfert. Quod si multus immensusq; dolor excruciat, tum anodyna medicamenta locū habent: uerbi causa, confectio Philonis, & quæ contextitur è duobus piperrum generibus. Enemate uero utendū est hoc cine: Mellis cyathus unus & dimidiū, olei sesquicyathus, aquæ cyathi duo, nitri olcæ octo, resinæ terebinthinæ drach. quatuor; hæc calida inquā immissa profunt. Oportet autē his dactylion, hoc est eam partē quæ testiculos septi modo interiacer (quam

Emplastrum
mingant.

taurū uocāt) fouere & calfacere, quo super multū diuq; occupari mucosum
 humorē euacuat, nōnunq; etiā sanguinē, quod sanē plurimū praesidiū con-
 fert. Quod si his actis etiā dū permaneat affectio, quod quidē rarēter usu
 uenit, tum denuo frequentius id ipsum usurpandū, aquae loco cētaurij deco-
 cto admixto. Sanguinē porro exhaurit semen capsellae pedis ue gallinaei *Sanguinem euacuat.*
 infusum: liquor item elaterij, uel id qd ex ipso conficitur, uel quod ē radici-
 bus eius contextū est cucumerinū oleum: Et salforū piscium muria, & oli-
 uarum salzarum utiliter imponat. Cucurbitulae praeterea sunt cum pluri-
 ma flāma & scarificatione coxendici adglutināda: interdū etiam imponen-
 10 dae sunt hirudines. Morante aut diutius hac aegritudine, aggrediunda est
 purgatio ex hiera, aut colocynthide, exhibendo medullā probe leuigatā &
 maceratā pondo drach. unius, in mulsi cyathis duobus, siue nō multo plus
 minusue, prout uires aliusq; languentis sustinere potuerint. In aqua uero
 mulla ruta elixet. Puls item colocynthidos elegāter sic affectos expurgat.
 Vomitus insuper cum radiculis elicitis intra initia morbi quibusdā auxilio
 fuit. Ex interuallis dropace ungeto illiniēdi sunt. Utendū quoq; acopo me-
 dicamine ex euphorbio, praecipue eo quod pceciū, hoc est uariū appellat.
 Adhuc lauacra quoq; naturalia accommodata sunt: si haec ad manū nō sint,
 alijs loti memoratis indolorijs utant: cōpositisq; nitro, asclepio, cōpositione
 20 ex euphorbio, adarce, nigro ueratro, castorio, pyrethro, pipere, et staphide
 syluestri, aquis portionibus. Post lauacrū *omninoque* aridae unc. iij. sulphuris
 uiui unc. ij. calide adhuc cuti languēs inspergat, atq; contegat ipsum char-
 ta. Si haec nihil egerint, siue ex interuallo morbo durante, praestat sina-
 pi cum ficibus aridis cataplasmatibus more imponere, aut tantummodo per
 se. Postremo uero huic affectioni obnoxios iberidis herbae usus emendat,
 quā & lepidiū, nōnulli uero agriocardamū appellant. Quae uero apud nos
 nascit fruticosa est, folia lauri cōparia, & longe maiora possidens, ea multa
 30 experientia sepius probata nō modō in coxēdicis aegritudinibus est, sed in
 alijs etiā diuturnis affectibus. Ceterū efficacius multo estatis tēpore am-
 letū praestat. Quod si nulla detur foliorū eius copia, radicis corticē cum adī-
 pe suillo cōtufum, quō emplastrū cōstituatur, deinde linteolo denso impactū,
 locis maxime dolentibus impone, siue toti uertebrae & coxae, atq; tantisper
 dum nigrorē induat, aut omnino liuescat cutis finito: deinde ipsum demito,
 & ubi laueris cerotā hāccine impingito: Opopanacis unc. iij. aceti cyathis
 duobus dissoluant, & cerota cyprina excipiant. Verum si eiusmodi arden-
 tiū usum aliquid excusarit, deuitandūq; persuaferit, instauratiuis potius em-
 plastris utendum: cuius farinae fuerit illud: Cerāe, resinā piceae, singulorū
 drach. xij. resinā terebinthinā, syluestriū columbarum stercoris sphecles
 recentis uniuscuiusq; drach. sex, galbani drach. i. & dimidiā. Sed & ea quae
 40 Leena appellationē habet, ē numero eorū quae instaurant, à medicis iudi-
 catur. Conferūt item cōfectiones ē stacte & nitro contextae. Sequentibus
 porro nonnulli potionibus per annū usi sunt, ē quibus est medicamentū
 trixaginis libra una, gentianae unc. nouē, aristolochiae rotūdae tan-
 tūde, seminis rutae aridi xesta una, haec cōtusa & cribrata singulis diebus

Confectio
 Leena.

Medicamentū
 diatesaron.

cochliarij quātitate exhibenda sunt:ieiunōq; & ei qui probe cōfecerit cum aque gelidē cyathis duobus, per annū, donec morbus cessauerit: necnō diā hepta cōpositū, & quod Procli cognomentū habet, eadem pollicent. Iam exercitationes quoq; maximæ, quæ inambulando & cōtinuis flexionibus & saltibus, et cursu perficiunt, sunt obeūdæ: Alimētū præterea sit medicocriter attenuans, & qd cōcoctioni minime resistat. Quod si prædictis phar macis coxendix nō obtēperauerit, quandoq; sanē in suppurationē transit, quādoq; uero laxatis neruorū nexibus membrū loco dimouet. Veterascen te igitur ægritudine tribus aut quatuor locis exurendū est, quemadmodū in uolumine de chirurgiā memorabiē, ad cōpluresq; dies hulcera sunt ob, 10 seruanda, ne cicatricem obducant.

Depodagra, & Arthritide. Cap. LXXVIII.



On membrorū debilitas sola podagricam, omnemq; articularū ægritudinē conficit. Nam si ex imbecillitate membrorū tandiu paroxysmus persistet, quandiu imbecillitas in articulis quibusuis debilitatis inest: neq; etiā humor solus, propterea quod non in articulis modò hæret affectio: sed utraq; humor præter naturā redun dans, & corporis partium debilitas, morbū suscitāt. Vbi enim membrorū nutriendi facultas frangit, ob ciborū affluentia inde cruditates, & coquēdi munia inutilia planē reddunt. Superuacuis igitur humor iuncturā articuli 20 feriens quācunq; debilitatū prius & ligamina tendens dolorē facit: Nam is dolor in ipsis neruis, quibus uolūtarius motus cietur, per se nō est, quoniā in medijs articularum locis ipsum oriri necessum est: uerbi causa, cruris bus, aut coxis, aut cubito, aut brachio: afficiuntur itaq; per cōsensum etiam proæretica. Quando igitur pedes infestant, & humor solum perturbat, po dagra morbus nuncupat. Quū aut in omnes corporis articulos penetraue rit causa, iam tum articularis morbus appellari cōsuevit, in q̄ uertebræ spi 30 næ, quæ spondyli dicunt, & scapulæ, & maxillæ, atq; uniuersus proinde arti culus languori subiect. Cæterū nōnullis aures quoq; & dētes, & guttur, & interdū etiā iecur, & lien, articularibus doloribus oblanguent. Quibus 30 nisi præsentaneo amuleto occurrat, laborantibus pro foribus imminet in teritus. Superabundansq; humor, nunc quidē biliosus, nunc uero sangui neus, quādoq; melancholicus, magna uero ex parte pituitosus ac crudus est, ex alimentorū redundante copia, & cruditatibus, & ocio conflāt: mor rans nāq; longiore tēpore in articulis, densescit & glutinescit, ita ut dictas articularū durities perficiat. Nōnunq; uero mixtus, ex pluribusq; cōstat: proinde cognitu curatūq; difficilior est, & tantū non immedicabile malū. In morbi statim exordio plerūq; labor immensus, atq; inambulationes exa cipiūt rigide & uehemētes, iugisq; equitatio, et intēpestiuus Veneris usus, gelidæ potatio insolita, & frigidorū, aut plurium, aut prauorū esulentorū 40 elus, & uini nō parū: In offensionib; præterea quidā, aut pulsationibus, aut luxationibus, aut id genus aliquibus, primam morbi oblaesionē inuenerūt, præcedēte quidē in corpore & quiescente interim materia. Procatactice aut ac euidentē admodū causæ, quæ hunc morbū cōmouent, sunt, mcefti 50 cia,

Podagra.

Arthritid.

Arthritid.

Arthritid.

Arthritid.

Arthritid.

tia, solitudines, uigiliæ, & reliquæ animi affectiones, non solū quodāmodo suscitāt, uerū prauū etiam humorē pariunt, siue id primariæ; siue per accidens. Variæ huius sanæ afflictionis ceu diximus sunt causæ, sed faciles tamen, prout locus sit, humorū negociū facientiū differētiæ sunt, quæ coloribus & symptomatibus indicant: quocirca biliosus fluxus colorē luridū, & rufum, & caloris sensum ingerit, dolorēq; acerbiorē efficit, & protinus ædificat in cutem, citra amplū tumorē: calidarū rerum impositu exacerbat, quemadmodum rursus à frigorificis relaxat: quod quidē cæteris omnibus magna ex parte, plus uero alijs biliosis aduenit. Febris item sæpenumero in accessionū summis uigoribus accidit, quando uidelicet sitibūdī reddunt. Atriorisq; coloris corpus in melancholicis deprehēdas: albi uero & aquosi in pituitosis, & dolorē latentē, & tardius in tumorē uergentē, perinde atq; sanguineū colorē ij præferūt, quibus sanguineus humor in corpore abundat. Sed ad certiorē iudicationē iuuabit te assumpta uictus ratio, & reliqua.

*Initiatrix
causæ pot
degræ.*

*Biliosi fluxus
indicia.*

Atræ bilis, pituitosis, sanguineusq; fluxus notæ.

Curatio eorū qui bilioso humorj hunc fluxum acceptū referunt.

CAput uero curationis ducito, in his qui flaua infestant bile, & potius in qualitate languentiū infestantis humoris, per medicamentā purgantē diuim habentia euacuationē fieri: cuius est modi potissimū ex rosaceo mele contextū pharmacū, & ē malis cotoneis, & ex picra antidoto, & ex aloë præparata catapotia. In accessionibus uero foris rosaceo utamur, cum ouī lecytho, modicoq; uino membrū clementer fricantes: herbas quoq; frigorificas admouebimus: uerbi causa, solanū, portulacā, herbā apollinarem, semperuiuū, ex locis cœnosis importata, serin, papauer, seminalē, rosarū folia, atq; consimilia: Interdū quidem illinientes ipsa, interdū uero cum micis posca irrigando, farinam uel hordei unā cum rosaceo cataplasmatibus modo imponentes. Quū autē erysipelatosā fuerit artū inflāmatio, summopere sanē placat impositu cucurbitæ recentis cortex, & abrasio, peponisq; atq; cucumeris caro, cum per se, tum adiecto pane: perdicij item folia, & hædæra cum pane, aut tenuissimo flore farinæ, atq; psyllium cum farina hordeacea elixum, feruores inflāmatōnū mirifice lenit. Iudem ex rosa cerota cum quopiam liquore frigorifico illita, & ea quæ conficit ex fabacea farina. Constat autem ex his: Cæræ uncij quinque, chamæmelini uncij duabus & dimidia, rosacei uncij duabus & semisse, farinæ fabaceæ uncia dimidia, ouorū lecythis quinq;. Aliud cataplasma: Maluas uirides coctas contere, & psyllium seorsim uiscidum reddens admisce, deinde ouorū lutea applicans, oleū quoq; chamæmelinū cataplasmatibus instar impone. Quod si multus ac intolerabilis fermē dolor excruciat, cōfectione ē croco, & glaucio, & opio utendū, cū posca leuigātes ipsa, siue circūlinientes, aut cū micis cataplasmatibus more impingentes. Cæterū in uehementiore dolore huius cataplasmatibus meminit Galen. succi papaueris drach. iij. croci drach. i. eliquent cum lacte bubulo siue caprino: uel panē immitte, & q̄ mollescat rosaceo calfacito, & facto cataplasmate utere: uel opiū, & crocū cum lacte cōterens, cerota rosacea excipe: cerota uero ex turpēna eandē uirtutē in paroxysmis obtinet, atq; oleū etiā eiisdē. Sed & illud eius generis est, ex micis irrigatis in aqua

*Vehementioris
doloris prodæ
grii lenio.*

& in poscam, & semperuiuæ, uel strichni, uel portulacæ, & dactylorum carniū, & capitū papaueris seminis, æquis portionibus, ouorū afflatorum luteorū, & rosacei quantū satis est, cataplasmate facto impone. Ceterū narcoticis minime immorator, sed quoad modeste ferat doloris uehementiā: plurimus quippe narcoticorū usus, densitates, callosas durities, & ægerrimas motiones efficit diurnas. Post anodynorū itaq; usum, uel cōfectione ex succis soluta per chamæmelinū utendū, aut ea quæ constituit ex alchæa, aut aliquo eiusmodi medicamēto. Sed post fomentationē refrigeratorū robur membro pro uirili inducemus, confectione *osæ & quipixins*, resoluta aceto rosaceo, aut uino rosaceo. At si grauent emplastris, acaciæ cremorē ē posca 10 illinito, aut lycium cum croco, & glaucio, & succo perdicidis in posca. Viētus insuper ipsis frigorigicus & humectans expedit: uerbi causa, ex ptisanâ, chondroq; sorbitiones: & ex holeribus malua, lactuca: ex auibus uero domesticis maxime pulli, & ex piscibus saxatiles, & echinus, et ctenia, atq; id genus alia. Deuitantibus ipsis omnia quæ calfaciūt, bilemq; pallidā atq; flauā pariunt: uina item cum uetera, tum rufa, tum nigra, satietatēq;. Lauacris uero ex fluuialibus aquis utendū. Et circa ipsos noxiū humoris fluxus, quatenus causam exhibent, uel non, si nihil aliud prohibeat, fugientes excandescētiā, ciborum abstinentiam, acrium eduliorū esum, ebrietatem, labores immentos, & Venerem.

Curatio sanguineo humore suffluente.

IN quibus uero sanguineus humor nimīū abundauerit, sanguinis detractiōne incūctanter utendū est, neq; in his modò, sed in pituitosis etiā, & plus atq; bilis habētibus: quoniā et his humor uenis magna ex parte cōtinetur, quātitate magis q̃ qualitate infestās. Aggrediunda est itaq; sanguinis secta uena detractiō in prima statim ægritudinis curatione, ut præoccupemus noxiū humoris fluxū, alioqui lædunt sanguinis euacuatione potius, q̃ adiuuant, præcipue quibus natura frigidius imbecilliusq; corpus est. Post uero, sanguinis euacuationē, si nō solus sanguis plus satis abundarit, parū per intermitteremus, & ex hiera purgationē usurpemus. Verū oxymel lulia 30 nium hos apposite admodū expurgat. Quicunq; aut eiusmodi cathartica horrent medicamenta, catapotijs utant, quæ recipiūt aloes, colocynthidos, ueratri nigri, scammonia, euphorbi, singulorū unc. i. nieri uncie semissem, excipe succo brassicæ, & prouiribus cuiusq; exhibeto. Præstabit autem si aliud catapotiu ē malorū cotoneorū succo præparatū, cum in paroxysmis, tum in remissionibus, & in quouis humore obtulerimus podagricis. Sume aloes unc. sex, agarici unc. dimidiā, croci tantundē, costi, spicæ nardi, rotundi iunci odorati floris, carpobalsami, singulorū unciam unam, cassiæ unc. duas, scammonia tantundē, epithymi unc. treis & semissem. Dosis autem huius mediocris fuerint dioboli duo, consummata dioboli quatuor. Cata 40 potia similiter ex Armeniaco lapide mirifice expurgāt, quæ priuatim articularibus ægritudinibus expediūt, in principijs & remissionibus rheumatismorū, etiam si in tēporis intercapedinibus fuerint exhibita. Sed quū non desint, qui scammonia ecū stomacho officientem damnēt ac fugiant, minis stranda

*Nutricatus est
stomachum ex
humore bilioso*

*Scammonia le-
di stomachū.*

stranda illis; præcipue pituitosa materia plus satis redundante, hæc sunt: Colocynthidis interioris, hellebori nigri, bdellij, cōmeos, aloës, singulorum uncia una, nitri Alexandrini, euphorbij, uniuscuiusq; uncia dimidia: datio huius compositionis expediens est, pondo diobolorū quatuor: Ego cōmeos loco epithymū pono. Quidam in ipsis accessionibus cuiusvis morbi articularis hermodactylo ad purgandū utuntur: Alij ceu improbum stomacho hermodactylū dānant: nam cibū fastidiētes, & stomacho omnia respiciente inappetentes, quorum Græci illos *ἀνιδόσι*, hos uero *ἀνίσπικτος* appellant, efficit. In solis igitur ijs, qui negotijs inevitabilibus obstricti defatigantur, eo utendū: breuiter namq; & ad summū post duos dies sedat rheumatismū, hoc est noxij humoris fluxū, ita ut cōsuetā obire possint munia. Non uipse quempiam medicum, qui substantiam hermodactyli nunq; præbuit, neq; quippiam ex eadem compositorū medicaminū: sed ipsam herbam elixabat cum aliquo medicamine solito: puta anisi, aut apij decoctū potui dabat: & suspiciendo quodammodo euacuatī fluxu liberabantur. Oportet aut quoniam stomachum lædit (ut postea inquit) his quæ stomacho conducunt, & quæ robur inducunt, cum mediocri calfactione os uentris emendare. Sed ex coronopodio (hoc est cornicis pede, quā sanguinariā dicūt) confectionē utiliorē asseruit Alexander, quā ea quæ fit ex hermodactylo, tanq; euacuationem dolorumq; mitigationem efficientem, quo cum nō amplius stomacho officere ait. Localia porro pituitosis apponantur: modico quidem dolore molestante, brassica uiridis cataplasmatīs modo adglutinata, & apium, & conyza, & trixago, & orthios. In uehementi aut dolore, farinæ scenogræci medimnos tres, lollæcææ medimnū unum, farinæ cicerū medimnū unū, cataplasmatīs modo imposito ex melicato, aut uino tenui, cum exiguo cyprino, aut nardino, præsertim brumali tempore: Et brassicarum radicis, & caulij cōbustorū cinis cum axungia cataplasmate impacta, præsentaneū multis amuletū præstitit. Verum ad mitigandū, recentē esse oportet axungia, ad disijciendū uero ueterē & salām: Et sterus bubulum cum farina hordeacea in mulso decocta, aut per se recens humida, cum folijs brassicæ cataplasmatīs more illita. Itidem præstant caprarū oletula per se, uel cum farina hordeacea in posca elixa. Quoniā uero & per ea quæ contraria esse uidebantur adiuti multi sunt (nam uaria illa humorū mixtio facit, quo minus discerni queant) ea quæ huc assumūtur promiscue exponamus: Conducit itaq; atriplex tam syluestris q̃ satia, cum pane cataplasma facto imposita: Aut uerbasci folia, cum bulbis & pane eliquata: uel cum farina; aut polenta hordeacea cataplasma. In uniuersum uero in quibus abditā causa est, faciendus est transitus, aliquādo quidē in consimiles quasiq; uniformes species, quādoq; uero planē in cōtrarias, neq; iisdem tamen im-

morandū, siquidē præsidio nullo sunt. Hæc quippe in arte obeunda, quoti die fieri cernimus: quandoquidē remediū idē, membrū hoc quidē iuuat, illud uero in eodem ægrotāte etiā accēsum, nō modō nō manus auxiliares in ipsa hora præstitit, uerū quandoq; etiā magis offendit. Et hoc admirandū:

Hermodactyli
usus.

Axungia recens
mitigat, uetus
dissipat.

Vnus enim & idem sæpenumero articulus ab eodem remedio nuncquid
dem iuuatur, paulò uero post ab eodem accensus est. In totum igitur nun-
quam ubi uiscida quidem & crassa materia dominetur, calidiora opis quip-
piam adferunt: acri aut ac feruido humore dominium obtinente, refrigerijs
placantur dolores: Nihil uero mirum, frigidiorē etiam materiam tempo-
re inflātionis accendi feruereq̃: quod quanto procliuus est, si admisceri
bile cōtingat. Meatuū cōstitutionē prohibet, lupinorū farina cum oxyme-
lite aut posca, uel laſerpitio, aut bryoniae radix cum pane. Et hoc præterea
sine detrimento mitigat diſſi-¹⁰ciendo modice: Lycij unc. i. guttē ammoniacē
thymiamatis unc. i. terens cum uetustissimo uino, & oleo omphacino elixa-
to, & inſice farinae fabaceæ quantū satis, & mediocriter coquēdo catapla-
smatis inſtar adglutina. Post ſummos uero morbi uigores tumore occupā-
te, cataplasma impone ē bulbis p se, uel cum farinē tenuiſſimo ſofculo, uſq̃
ad laniationē, ſic enim operari poſſunt. Quod ſi hoſce dolores cataplaſma-
ta nihil leniūt, irrigationibus utantur, & calido aliquo liquore conſpergan-
tur, & foueantur ſecundum locos dolore tentatos, præſertim ſi partes fue-
rint extremę, decoctionibus chamæmelorū, & ſertulæ campanę, aut etiam
centaurij: nonnullis uero ſola capparidis elixatio ſatis auxiliij tulit. Id uero o-
mnium efficaciffimū fuerit remediū: Decoquito in aceto acerrimo thymū,
& organū & thymbra-²⁰m & nepitam, conſpergito atq̃ foueto aceto locos
affectos, neq̃ ſemel modò, ſed identidem ac ſæpius in die ſidenter: cōpluri-
bus nanq̃ hoc profuit: neq̃ pituitoſo ſolū humore languentes, ſed etiā bile
quidam ſeruati ſunt. Probatur etiam illud: prinobalana, id eſt prini fructus
glandes, leuigata cōtundentes, & quāplurimū decoquētes, atq̃ elixationi
huic ab initio ſtatim articularis fluxus, extimi quidē artus ad bene longum
tempus immergantur: ſed interiores ſpongijſ liquore tinctis foueantur,
& quæ adiacent impetum materiæ reiſciunt: Hoc ſanē etiam hiſ qui ē bile
hoc malo laborant, accōmodatum eſt: quemadmodum & in aquam calia-
dam ſine elixatione aliqua inſuſio. Porro aduerſus eos qui ex immodico at-
que intenſiſſimo frigore oriuntur dolores, & cuneationes articularū, ualio-³⁰
riffimū egregiumq̃ eſt remediū illud: Habet olei ueteris libram unā &
dimidiā, nitri Alexandrini librā unā, reſinæ terebinthinæ librā unam, eu-
phorbi unc. unā, iridis uncias duas, ſcenogræci farinę ſextam unam & ſe-
miſſem. Hiſ etiā ea quæ in coxarū morbis recenſuimus, pulchre admodū
conferūt: plurimi nanq̃ in ſic perfrigeratis, in remiſſionibus morbi etiā ſi-
napi, cū ficibus aridis, & alijs phœnigmis uſi ſunt: aliqui etiā cōpoſito ex
cantharidibus medicamēto: ſed hæc demū detrimentū adferūt atq̃ lædūt,
niſi aliq̃ etiā molliſicantiū utant: uerbi cauſſa, cōſectio ex ſtruthio atq̃ Py-
xide, & Baſilij, & *ῥίζω ἀγριῆς*, id eſt medicamine ex abiete, item ex populo
nigro, & auena, & Iſſiponio, atq̃ acopis adhuc uehemētioribus. In quibus
nerui quoq̃ maxime p ſocietate affligunt, ſiuntq̃ deſitates & cuneationes:
Ceterū ex muli lotio & in ſummis præcipue incrementis impoſita cōſectio
gelidiorib. fluxibus cōfert. Pari etiā modo is q̃ ē duobus ueretri generibus
conſtitit.

constituitur pastillus, turgidis laxisq; tumoribus congruit, fomentatio quidam ex frictis salibus, aut aliâs marina calida cum spongijs conspersio aut infusio, atq; è salibus fabrefacta emplastra, & quæ è stacte nitroq; & his non dissimilibus cataplasmata post uigores. Victus præterea ratio aridior ita habentibus conuenit, & ab excrementis superfluis aliena, atque inedia, aut cibi frugalitas, quam *ἀλυστορία* Græci nuncupant, & crebrorum lauerum abstinentia. Loti uero nitrisq; & alijs utantur ramentis. Cæterum in dolorum relaxationibus exercitia, ac frictiones præsertim aruum, magna cum utilitate adhibentur. Danda insuper est opera balneis naturalibus, aut etiam psammismis, hoc est ijs quæ in sabulo fiunt. Probantur & uomitiones, raphanis cibarijsq; elicitis, sed in his qui suapte natura huc sunt prodiores: Adhæc cum ueratro quoq; candido euacuandum: breuiter per uomitum, uel per aluum inferiorem expurgentur.

De his quos sanguinei humoris fluxus iniquius infestat.

Cæterum qui eiusmodi in articulos fluxum sanguineo humori acceptum referunt, unâ cum sanguinis à principio morbi detractio, prædictis localibus etiam subsidijs utantur. Biliosior quidem si fuerit, & acrior, naturæ modum excedens sanguis, adhibeant breuiter ea quorum in bile proprie minimus: Atqui si frigidior, pituitosiorq; aut melancholicus magis, his utiq; quorum post illa mentionem fecimus, exceptis nimia acrimonia præditis, utendum. Quod si malum duret & inueterascet, etiâ iisdem ipsiis: uerum illud etiam cataplasma intra principia statim expedit. Lemnata præterea malorum Punicorum, rhus item, atq; farina in uino eliquata, cataplasmatibus modo utiliter imponuntur. Aliud: Folia brassicæ coquendo & leuigando summa diligentia, secem aceti infice, & ouorum crudorum lecythos duos, & rosacei parum, & soluens cataplasmatibus instar adglutina, permutans perpetuo. Alimenta præterea quæ extenuant parumq; nutriunt assumenda sunt. A carnibus itaq; & leguminibus, uinoq; multo ac nigro absteineat: Atqui si fieri queat, uini potum omnino horrere, atq; manibus (ut sic dicam) pedibusq; deuitare præstaret. Non paucos equidem noui, qui quum huic uni præcepto sedulo obtemperarent, ad unum omnes morbo leuati, pristina salubritati penitus restituti sunt: partim namq; in morbi confestim exordio ad unguem & exacte cõualuerunt, partim uero posterius & rarèter, atq; nunq; admodum graues senserunt accessionum dolores. Quocirca nisi cõtrarietas aliqua ex illo nascatur, uel oriri inde speretur, per uniuersum uitæ tempus, ne per somnium quidem uinum unquam admittant. Quicumq; uero propter imbecillitatem aut ob frigiditatem succumbere non nihil uidentur, biennium usq; uino temperantes, ex eo deinde tempore pusillum atq; dilutum perpetuo bibant. Cæterum qui uino abstinerere, ut hoc mali uident, emoluantur, elixationem anis si potent, uel alicuius id genus seminis: Poma pro uirili respuentes, & reliquorum frigorificorum, Venerisq; usum. At qui, sumptis per anni spatium phar macis, perfecte languentes à morbo uindicare conati sunt, plures quidem pituitosiores & excrementosos iuuerunt; calidioribus uero & aridioribus

Vicius ratio.

Sola uini abstinentia à podagra non iudicat.

mortis subito causam attulerunt, in intestinum, aut renes, aut latus, aut pulmonem, aut aliquod principalium membrorum translata materia. Sarius igitur fuerit in biliosioribus plurimique sanguinis uinum uitare, si nullum fuerit interim periculum ex aquae potatione quempiam in praedicta incidendi discrimine: In frigidioribus autem, & superfluis excrementis redundantibus, theriaca est uiperis composita utere, crebrius quidem hyeme, concocto reliquo cibo ipsam sumentes: rarius uero aestiuo tempore: aut enim permutat morbum, aut moderatiorem saltem illum facit, nullum praedictorum membrorum laedens. Quum uero aliqui nos impellunt, ut memoratis antidotis utamur, ex eodem quidem genere existentibus, scito confectionem ex Damafonio, & Agapeti nuncupatam, & atacton, quasi inordinatam dicas, & octaidon, atque eam quae refertur ad Proclum, quae fit ex allio, & quae ex corallio, atque complures denique alias expedire. Omnium uero tutissima est, & saepius experientia comprobata, ea quae constituitur ex corallio, lapidosas etiam articularum durities quae artus occupant, dissoluens. Horum uero omnium facultates, & utendi rationem, mali item huius euitandi consilium, in uolumine de medicamentis reperiens: parietiam modo psilothrorum quae ad arthriticos spectant compositiones, & utendi modum in ipsis habitibus: dico autem pituitosioribus. Alij uero ad omnem auferendam aegritudinem uulpes totas in oleo decoquunt, & articulari morbo medentur: alij quidem uiuas, alij mortuas cacabo immittunt coquendas. Simili modo & hienas elixant, quo oleum distrahens faciant: deinde solia ipsis implentes, imponamus arthriticos, ad tempus assidue fricari praecipiendo: consequi uero inde ut non tumores modo, uerum uniuersum etiam corpus leuetur & euacuetur.

De calculosis articularum duritiibus totis uere.

Sed quoniam in articulis saepenumero lapidosae durities (qui uelut graece dicuntur) coagmentantur & compingunt, interdum quidem ex crasso & terrestri inhaerente, & illuc per se ingruente, tabefactoque humore: quandoque uero etiam propter medicaminum usum quae distrahendi & arefaciendi immodice, nulla aut molliendi facultate fuerint. Sciendum idonea admodum esse medicamenta quae emolliendi pariter & dissoluiendi uirtutem habent. Molliunt itaque, adipēs ueteres, & medullae, & gutta ammoniacae, & bdellium, oleumque perquam uetustum, atque styrax. Dissoluiunt autem & arefaciunt, nitrum, salia, stacte, adarce, euphorbium, & id genus alia. Ceterum ad Poros eiusmodi articularum priuatim facit caleus antiquissimus, & acerrimus, cum carnis suillae pinguis & ueteris elixatione fricando & apponendo, sua namque sponte fracto toso Poros uero quotidie fit euacuatio. Compositum uero medicamentum ex perna, non semel experimento comprobatum, bisariam cōcinnaum est: Sed ea quae sunt est stacte praedicta, & id proprie quod habet spumae niri, terebinthinæ protostactae, propolis, singulorum uncias quatuor, cere uncias nouem, colophonie libram unam, olei uncias sedecim, quibus intermixtis utere, cum in coactis lapidosisque duritiibus, tum in ipsis etiam abscessibus. Atqui illud est cinnabari admirandum quidem aduersus

Emolliendi nim
habentia.

Distrabendi sic
candi; nim ha
bentia.

uersus eandem artuum duritiā, aliāq; plurima remedium præstat: sed inuentu admodum difficile medicamentū est. Hoc quidem quod ē leptocaryis tenuibus uel sicubus aridis constituitur, præterq; quod inueniri potest, & parabile est, neq; in robustioribus tantum, sed in subtilibus etiam locum accommodatū habet, si sumat quis confectionis ex melle, aut *discutiente*, id est ex orcitunica partes duas ad medicaminis unam: Vbi uero hæc in promptu non fuerint, diapsimythium quoq; non raro eodem pondere confunditur. Aliud ad eosdem poros articulorum duritas: Sandaracham resinam leuigatam in uisco quercino excipito, atq; poris discutiendis utere. Aliud quod confert aduersus fistulas & ægilopas: Sumito olei xestam unam, spumæ argenti uncias octo cum dimidia, auri pigmenti unc. unam: Spumam argenti atq; oleum decoquito, usq; dum reddatur impollutum, atq; sic deinde insperge auripigmentum egregie cōtritum, & priusquā cōcremetur adimens, utitor. Epithemata porro ex flore Asij lapidis, in remissionibus imposita, ad omnes quæ in singulis articulis consistunt collectiones cōcretionesq; pulchre conueniunt, & easdem quasi ad coruos, ut sic eloquar, uniuersamq; simul ægritudinem ueterum quorūdam testimonio abire iubent. Creditur item medicamentū ex flore salis contextū in morbi relaxationibus compari modo applicatum, separatos tumores dissipare atq; distrahere.

De euitanda podagra.

Vbi iam podagra, ueluti morbus etiam articularis, corpus hominis occupauerit, difficilime profectō absq; superiore methodo emendat. Atquū necdum aduenerit, haud fuerit sanē arduum eandem ægritudinē effugere, geniū cibis defraudādo, & alimentis rite dispositis, & a superfluitatibus alienis planeq; uacuis: mediocriq; uino utendo, & quammaxime fieri possit cruribus totiq; corpori exercitationibus succurrendo. Sal in oleo cōtritum, & articulis cum frictione impactum, cunctos qui podagricum morbū (in quem alioqui labi prodiuiter possint) euitare student, magnifice semper adiuuat, nisi aridam nīmium corporis intemperaturā habeant. Utendum aut ipso, tempore matutino, & uespere, per uniuersum uite spacium: & post inflammationum relaxationes, quas *ῥευματισμοί* dicunt, eiusdem quoq; usus plurimum cōmendatur.

Ad perniones, hulcera ē frigoribus nata, quæ græce *χίμνλα* nuncupant, & ea quæ in solo pedis, imisq; calcaneis oriuntur. Cap. LXXIX.



Himeta huculose sunt affectiones, in manuum digitis ac pedum brumali tempore exurgētes. Quibus medendis igitur, oportet eadem huculcula tepida marina cōspargere atq; fouere, aut betæ elixatione, aut lentis, uel erui, uel alphodeli radicis. Cæterū post conspersionē ac fotum, lenticulas coctas in uino leuigatas, cataplasmatibus instar impone: aut ficos tritas cum oleo leuigando impone: aut alumen & farinā hordei æquis portionibus conterens in uino, cataplasmatibus instar impinge: aut secem subaridam, aut bulbum recētem

uino tritum, cataplasmatis modo ad glutina: Vel allia in oleo frigito, inde alijs abiectis tantundē ceræ quantū olei liquefaciens impone: Aut malicoria mali Punici coquito in uino, & leuigans cera rosacea excipe, atque utere, aspergens antea elixatione lupinorum: Vel mannā, aut sulphur uiuum cum melle decocto impinge. Cæterum alterci etiam succus contineue illitus inflammationes arceat, & dolores placat ac tollit.

Marcellium ad Chimetla.

Rapi radicem sculpiſito, in q̄ foueam eius immittito ceræ uncias duas, Roleū lentiscinū, atq; elixās in diplomate cum aqua marina seu muria, aut decoctione lupinorū. Hoc quidem chimetla conspergito: sed liquefactum in rapo cerotiū, in frigidās impone. Sed in chimetlis exulceratis, thuris scissilis, minij, resinæ, æquales portiones adipe suillo immergens utere. Cæterū ad exulcerationes cum inflammatione, hoc medicamentum adhibe: Accipe olei uncias nouem, adipis taurini, & bilis animantis eiusdem, uniuscuiusq; libram unā, lithargyri uncias sex, colophoniz uncias quatuor, mellis uncias sex, & quum res poscet utere.

Ad digitorum, totiusq; pedis rhagadas.

Contra digitorū pedisq; rimas picem liquidam inunge: aut cancerum fluuialem marinum uel comburēs in carbones, leuiter testam incide, atq; cum oleo conterens, mellisq; crassitudinem inducens, purgatis & terſis rhagadibus instilla. Conducit uero & scillæ interaneum oleo seruēfactum: & resina terebinthina eliquata: & cornu caprinum deustum, caprinoq; adipe exceptū. Purgare porrò callos ad amussim expedit, atq; sic deniq; medicamentis uti.

Aduersus calcanei rimas, quas græce Rhagadas dicunt, soli q; pedis Antheram.

Svmto calcis uiuæ drachmas decem, cerussæ drachmas uiginti aut triginta, porcinae pinguedinis recentis uncias septem, colophoniz uncias nouē, cremoris seminis lini cyathū unum, olei dulcis uncias quadraginta. Hoc enim medicamentū tam planam quā ullū aliud reddit imam pedis plantam. Aliud: Contra eadem mala utere adipis caprini, ceræ, olei, æquis portionibus confusis. Aliud: Malicoria in aceto elixa, cataplasmatis modo diebus quinque impone: deinde ubi egregie purgaue ris, calcem uiuam cum oleo & balneorum strigmento adhibe. Aliud: Scillam oleo elixato, ipsam quidē frixam porricito, in oleo uero resinam terebinthinam liquefacito, atq; aduersus hæc pedum incommoda utere.

Medendis Ectrimmatibus foraminibus uel longo decubitu.

Accipe ceræ, olei, spumæ argenti, mellis, singulorum partes æquales, quibus simul temperatis ac mixtis, medicamentum constituunt ad omnem cum calcaneorum tum plantarum pedis ac uolæ atque intertillæ digitorum partis exulcerationem conducibile, atque id quidem potissime, si hulus ungui uicinum sit.

Ad fordi

Ad fordida quæ in plantis oriuntur hucera emmoton, hoc est medicamentum liquidū, quod conceptis linteolis excipitur, hucerbibusq; inditur. Prodest uero etiam ad ea, quæ pudendis adnascuntur.

A Murcæ cyathum unum, aceti tantundem coquito in ære ad melleam Aufq; crassitudinem: atque de more eliquato squamæ æris drachmas duas, mannæ tantundem, mollis lanæ succidæ ac sordidæ quantum manu capi potest faci admotæ, & implicatæ, & crematæ cinerem, conueniente liquore omnia excipe, atque medendis hisce hucerbibus utere. In uulneribus quidem uino irrigando: In pudendis uero soloq; pedū, passio. Aliud: Accipiantur amurcæ, mellis despumati æquæ portiones: cæterum hoc ipsum gingiuas etiam expurgat.

Ad protrigines, quæ calciamentorum attritu proueniunt.

S Anandis foraminibus quæ calceorum pressuram sequuntur, in primis quidem pulmo agninus, & porcinus, atque caprinus, conducunt: sed cutem à rigidioribus sandaliorum corijs deustam, inflammationemq; minime adiuvat. Inflammatione uero sublata atq; cessante modò, opis plurimum, quantumq; satis, singuli dictorum animalium pulmones conferunt: aut cepā cum adipe auriculari seu gallinaceo copiosiori inijsce: aut gallam concrematam insparge: aut acaciam aceto intinctam illine.

Aduersus clauos & callos, quorum quidem uisitorum Græci illud ἄλυσ, hoc uero τήλας nuncupant. Cap. LXXX.



H Elos, quos nostri clauos appellant, ubi exacte undiq; expurga ueris, aliquid eorum medicaminum quæ erodendi potentiam innatam habeant (συσφαι à Græcis nuncupatæ) impone: uel rubiginem rasilem, uel sandaracham, uel aridum Syringiacū, aut collyrium Syringiacum commeos loco, guttam ammoniacam aliquo liquore exceptam. Est aut clauus, circinatus in orbem callus, colore candido, clauo capite similis: omnibus corporis partibus, sed pedum plantis digitisq; potissime nascens. Auferitur autem longiusculo tempore, si quis smilio cultro sutorio apicem clauī cōtinue detrahat, aut cisseri instrumento conterat: parī etiam modo & callos curabis. Profunt uero lupinorum crudorum deustorum cineres cum melle, aut misy liquida pice exceptum: papauer nigrum cum urina aphthori, uel putamen fabaceū cum aceto decoctū. Ad hoc preterea mali sepius experientia cōprobata sunt, cantharidum, atramenti sutorij, castorijq; æquales portiones, excepte re sinaterebinthina, ita quidem ut emplastri formam induat, atq; clauo antè bene perpurcato imponantur. Aliud: Accipe sphecles, calcis uiuæ, uisci, partes æquales cum stactes cinere, uel lotio aphthori.

De his quæ nascuntur circa ungues, & ante omnia de

Paronychia. Cap. LXXXI.



R Ediuuium, quam Græci paronychiam dicunt, huculculum est iuxta unguis radicem nascens, quem utiq; abscessum etiamdū pusillum existentem, atq; incipientem, galla cum melle suppri-

*Hulcus suppu-
ratus aperien-
dum.*

mit ac sedat, atq; sisti prohibet, uel Musa pastillus, uel iris ex aqua. Sed ubi iam præter naturam caro fuerit prognata, scopus medicationis est, ijs maxime rebus quæ morfu carent expugnare atque consumere, rimamq; atq; solutionem moliri. Præsentaneum porro remedium ad paronychias, aurium sordes, atq; ipsum quoq; lycium suppeditant. Cæterū quum iam in suppurationem maturuerit hulcus, acu compungito, liqui- dumq; exauriendo, spongiam aqua maceratam imposito: aut eidem lenticulam cataplasmatris modo adglutinato, cum aqua prius eliquatam: aut phceniciū cum uino, seu rosīs uiridibus seu aridis irrigatis aqua & leuigatis: aut farinam hordei cum aqua. Prodest itidem ad paronychias lu- pinorum farinā, melle uel cœnomelite trita & macerata. Sed aduersus pa- 10 ronychias exulceratas illud expedit: Accipe eruginis, spumæ argenti (quod lithargyron appellant) uniuscuiusq; drachmas quatuor, sarcocol- lā, hoc est glutini carnis drachmas quatuor. Præterea motum (hoc est li- namentum conceptum, quem penicillum dicunt) de super ex uino, item spongiam impone. Oportet autem adhæc ipsam carnem undiq; ab un- gue distinguere & separare.

De pterygijs hulcusculis iuxta ungues.

Pterygiū supra iustum naturæ modū quoddā carnis circa ungues, hul- cusculi instar incrementum est, partem unguis operiens, ex rediuiuo, uel alia eiusmodi occasione præstita. Cui quidē succurrendo auripigmen- tum uel mannā aquis portionibus insperge, de superq; motum ex ui- no, atq; spongiam impone. Aliud: Chalcididis, squamæ æris, malico- riorū, æquas partes fico decocto affatōue excipe, & melle aspersis prius stimmaīs decoctione: Cæterū arefactum illud, pterygium hulcusculum egregie quidem expurgat.

Ad putrescentia digitorum pterygia, naturaliumq; hulcera.

Libanoti, squamæ æris, singulorum drachmā unā, æruginis rasilis & uermicularis drachmas quatuor, mellis cyathum unum, contere in sole tantisper dum subflauum induat colorem: deinde profigandis ran- cidis digitorum pterygijs, pudendorumq; hulcusculis utere, plenio cum emplastro uino ante irrigans atq; conspergens. 30

Breui exiccans pterygia atq; curans.

Soreos drachmæ duæ, thuris drachmæ duæ, æruginis rasilis dra- schma una cum melle conterito, in'que ipsum pterygium impone. Fac- cit uero idem ad reliquas etiā quæ in iisdem locis oriuntur cacoëthias, id est hulcera malefica, & nigredines, & putrefacta. Aliud: Squamu- las æris dactylorum carnibus aut ficuum excipito, & his uitijis medendis adhibe. Aliud: Fimum palumbinum cum tenuissimo farinæ flo- sculo in passo elixato, atq; conterito, calidumq; applicato. Lapa itidem squamulæ, per se insperfa arefacit pterygia. Cæterū uellicatus crebroq; 40 compunctus iuxta pterygium angulus, in ungue augmentatus, copario in sublime pertractus atq; sublatus, amputandus est.

Ad fra-

Ad fractos scissosq; ungues.

Vnguibus fractis ac contusis succurras, si in cataplasmatibus modum myrtum, & mali Punici tenerrima folia illis adglutinaueris.

Ad ungues sanguineos.

Adversus ungues sanguine suffulos, utiliter sanè hordeacea farina cū pice mixta imponitur.

De dimouendis unguibus qui doluerunt.

Quod si quādo ungues prae laboribus immensis abscedant, sulphur leuigatum adipe suillo excipiens, applica.

Medendis unguibus scabritie labefactis.

Sumito uisci quercini, sandaraches, scenogreci, singulorū uncias duas, Scantharidum, thapsiæ, uniuscuiusq; unciam unam, aceti quantum satis esse uidetur. Aliud: Propoleos, ceræ Atticæ, bituminis, uniuscuiusq; drachmas duas, sulphuris ignem non experti uiuiq; drachmam unam, oleo non admixto: Vbi aut usus poscet, calfactum unguibus cataplasmatibus more illinito. Aliud: Pici liquidæ, ceræ Colophonix, resinæ terebinthinæ, guttæ ammoniacæ thymiamatis, sulphuris uiui, spiritus nitri, æquis portionibus, non inquinato. Aliud ad tollendos scabredine affectos ungues absque exulceratione: Sumantur bituminis, auripigmenti, sandaraches, sulphuris ignem non experti, singulorum drachmæ quatuor, quibus contritis resina excipiantur, atq; utere, dissoluens per dies septem. Aliud: Erui farinam, bile ouilla, aut lotio ouillæ non terens ac macerans, utere: Aut calce aqua non extincta cum oleo, aut chia cum opobalsamo: Vel atramentum sutorium, & sulphur ignem non expertum uisco excipiens quantum satis esse queat, & cuti adglutinās, imposito: Vel staphida syluestrem cum aceto leuigans & eliquās, utere: Vel resinæ terebinthinæ drachmam unam, sandaraches duplum, simul unguis radici adglutina, accurate circumligās. Quū uero exiderit iam unguis, cerotā myrteam impone, quæ exiguum medicamenti *esse & furiosum*, hoc est ex resina compositi, adnexam habeat.

In hoc volumine operis uniuersi uidelicet quarto, de his præcipue ægritudinibus, quæ foris in humano corpore, nullo sanè certo limite, sparsimq; insurgunt, tractatio compendiosa quidem, sed absoluta satis instituitur.

CAPITA LIBRI QVARTI.

De Elephantiasi cutis uitio.	Cap. I.	De scirrhis, duritiæbus non sensilibus.	
De lepra atq; psora scabiæ.	II	XXXXII	
De imperigine quæ græcis lichen est.	III.	De strumis, quas Græci choerades dicunt.	
De prurigne, quod malū Græci <i>νογγισ</i>		XXXXIII	
appellant.	IIII	De steatomatis, id est adipationibus, et a-	
De Leuce scabiæ specie.	V	theromatibus & meliceribus.	XXXXIII
De Alphis cum candidis tumatris.	VI	De fauis.	XXXXV
Aduersus stigmata ex decretis Archige-		De simplici hulcere.	XXXXVI
nis.	VII	Quæ conglutinare hulcera possint.	
De papulis quæ Græci exanthemata uo-		XXXXVII	
cant.	VIII	Ad dolentia & inflammata hulcera.	
De epinyctidibus.	IX	XXXXVIII	
De pustulis quæ phlyctænæ dicuntur.	X	Ad immatura necdum purulenta hules-	
De ignis exustionibus.	XI	ra.	XXXXIX
Ad uerberibus percussos.	XII	De causis hulceribus.	XL
Pilos ex combustionibus nasci.	XIII	Quæ hulcera fordida expurgant.	XLI
Ad desquamations.	XIII	Ad uermicularia hulcera.	XLII
De formicis & uerrucis.	XV	De carnis excrecentia.	XLIII
De ganglio neruorū resolutione.	XVI	De nomis, semipedonibus, & phagedæ-	
De inflammatione phlegmonæue.	XVII	nis.	XLIIII
De abscessibus, quæ foris corpus infes-		De hulceribus cicatrice carētib.	XLV
stant.	XVIII	De cacoethibus, quæ chironia & teles-	
De gangræna & syderatione.	XIX	phia dicuntur.	XLVI
De herpete.	XX	Ad cicatrices nigras,	XLVII
De erysipellate, id est igne sacro.	XXI	De sinubus.	XLVIII
De pano & bubone & surunculo.	XXII	De fistulis.	XLIX
De dothienibus, tumidis abscessibus.		De ruptis.	L
XXIII		De hulceribus articularum.	LI
De termintho, tumore nigro & tereti.		De palis, lignisq; fixis, telis, spinisq; & id	
XXIIII		genus alijs corpore extrahendis.	LII
De carbunculis anthracibusue.	XXV	De sanguinis eruptione cum e uena, tum	
De canceribus.	XXVI	ex arteria.	LIII
De ædemate, hoc est tumore.	XXVII	De percussione neruorum.	LIIII
De emphysemate.	XXVIII	De ancylofobis.	LV
De luxatis & contusis.	XXIX	De luxatis artubus.	LVI
De carnibus cōtusis, & sanguine in con-		De lumbricis.	LVII
tusis concreto.	XXX	De ascaridibus.	LVIII
De ruptura & conuulsione.	XXXI	De dracunculis draconisue.	LIX

PAVLI AEGINETAE 247

MEDICI PRAESTANTISSIMI, DE ARTE

MEDENDI LIBER QVARTVS,

ALBANO TORINO

VITODVRENSI INTERPRETE.

De Elephantiasi cutis uitio. Cap. I.



MAIOREM oportere semper remediū, quā aegritudinis uim esse, Cappadox arbitror Aretæus inquit: indeq̃ fieri, ut curari Elephas minime gentiū possit, qđ scilicet medicina nulla superior inueniā. Nam si Cancer, qui singulorū modō corporis membrorū Elephas quidem est, inter morbos immedicabiles ab ipso etiā Hippocrate censetur: quī non sit Elephantiasis (qui cancer quidā corporeae molis uniuersae existit) multo potius, longe curabilis minus, medicināq̃ omnis magis respuens? Atra siquidem bile, in qua hic morbus consistit maxime, bilariam proueniente (aut enim ē melancholico feculentoq̃ sanguine, ac ueluti sanguinis limo: aut ē flaua bile, & quidē utriq̃ neglectisq̃ ortum habet) Elephantes quippe perrubros mitiores ferē, aut ut uerius loquar, malitiosos pestiferosq̃ minus, prima bilis atrę differentia gignit: Reliquos uero, qui utique & infestiores, nefastaq̃ tyrannide sauiunt, & corpus totū hulus reddunt, summaq̃ & extrema corporis membra decidere faciunt, altera (si negligatur) illa uidelicet ē flaua bile parit. Morbo igitur iam superāte, abdicanda medicina omnis est, deq̃ egroto iam actū putato. Incidente uero primū & auspicante, si quidē neq̃ etiam dum extrema deciderūt, nec exhulcerata cutis summa uspiam cōspiciē, nec in imensum dolor surgit, sed uultus tantū turpis quidā & informis admodū, atqui neutiquam absurdus omnino apparet, medendi tentare artem tum maxime licet. Quidam etenim, atq̃ hi sanē non pauci, morbum, ne quos inuaserat totos occuparet, sola circum caput uestione ne longius serperet, repulerunt. Ocyus itaq̃ nos, ubi morbus primum suppullulare coeperit, sanguinem secta uena detrahimus, & uerno potius tempore, quando frequens iste affectus ingruit, & accessionibus suis exacerbescit. Sed paucis inde diebus nouem uidelicet aut decē interpositis, pulte colocynthidos hac affectione recenter (ut dixi) oppressos expurgabimus, neq̃ ad uisum (quod aiunt) usq̃, prima quidem uice, sed identidem, accurata perpendione uirū languentis adhibita, medicamēti quantitatē plus minus applicabimus. Peraccomodata etiam ita affectis est ea quae per hieiram fit expurgatio. Rursum uero diebus decem fermē intercalatis, & in quiete transactis, serū lactis scissi hīdē est offerendū, neq̃ sanē minus tribus cotylis, neq̃ plus etiā q̃ quinq̃. Sequētibz uero diebus, nō scisso, uel recēs emulcto alantur. Adhuc morbo quidem remittente, alimento eodem utant. Permanente aut aegritudine lac omnino respuant, acrioribus

Elephantiasis
curatio.

*Acute non fiat
ad intima tran-
situs.*

*Potiones ele-
phantia labo-
rantium.*

*Theriaca pri-
ma tenet in ele-
phantia.*

cibus uescientes, & uomitum raphanis cibarijsq; prouocent. Probatum post hæc ueratro candido facta corporis expurgatio, bis quidem si queat fieri in Vere, semel uero autumnali tempore. Verum occupante iam ma-
lo & imperante, neq; uenam secato, neq; ueratro unquam tentato: nam nulla fieri in his debet à cute in profundū ac intima transumptio, nec ma-
teriæ ex his ulla etiam diminutio. Cæterum materia in aluum inferiorem atque intestina deriuanda est, syncriticisq; utendum, arefaciendo atque obturando summam corporis cuticulam. Cucurbitulæ itaque inanes le-
uesq; ex ore uentris & præcordijs pendeant: easdemque partes picato, dropacæue unguento illinito: pusillum inde temporis quiescendum, atq; 10
tum denuo ad remedia, à purgatione quæ per hieram fit auspicando, re-
flectendum: sanguinis missionem per uenam, plus detrimenti quam emo-
lumentum allaturam, procrastinantes: atq; hac quidem periodo ad summū
ter aut quater in anno utendum, tempore autem uerno potissimū atq; au-
tumno. Iam uero in hac affectione cōstitutis cum primis id genus potio-
nes expediunt: Aceti cyathus unus cum cedrini liquoris cyatho uno, &
cremoris brassicæ crudæ cyathis duabus commixtus, potui cum maturi-
no tempore, tum uespere quoq; exhibeatur: Aut uertemni herbæ, quam
græce sideritin nuncupant, folia arida pondo drachmæ unius in uino cya-
tho uno: Vel cornu ceruini drach. unam, et aceti scillitici cyathi mensurā, 20
post diluculariam in ambulationē quotidianā potui dato. Et cæteri potus
pro loco ac tempore hīdem porrigantur: Vel scillæ circiter drach. quin-
que in aqua mulsā, aut in melle per se, instar linctus exhibeto: Vel succi
Cyrenaiici erui quantitas melli atq; butyro intincta: Vel elephantini os-
sis rasuræ drach. semissis, cum uini cyathis duobus: Vel cymini Aethyo-
pici drachmæ tres cum melle eligmatis modo exhibeantur. Atqui mul-
to præstantius præsentiusq; auxilium quàm hæc præstiterit, theriaco-
rum pastillorum drachma una, in uino egregio & exquisito cyathi unius
mensura leuigata & macerata atq; epota. Pari etiam modo scilliticorū pa-
stillorum drachmam unam laborans bibat. Necnon nepetæ in super li- 30
quorem, tanquam efficacissimum in hoc morbo præsidium summis erco-
mīs euehunt, absorptum. Cæterum principio à cyathis tribus auspican-
dum perhibent, paulatimq; ad sex usq; transeundum. Verum omnibus
facile sua efficacia palmam surripuerit è uiperis contexta theriaca, cum
in potu sumpta, tum foris etiam illita. Quod si ad manum parabilisq; suc-
rit uiperarum (sic enim *θυσια* interpretor) copia, non est quod neq; nobis
liūs neq; præsentioris auxilij ullum inquiras, quemadmodū uiperarū car-
nes manfæ, albo iure ex aqua magna parte, salibus, porro, atq; anetho,
usque ad spinarum discretionem probe elixæ: capitibus ipsarum primo
amputatis, caudisq; ad digitos quatuor ablatiis, & intestinis ipsarū exem- 40
ptis, pelleq; detracta. Theriaci uero sales eiusdem generis morbis ser-
uiunt unā cum obsonijs assumpti: nam qui hīs hoc pacto utūtur, illis squa-
ma quandoq; aut ueluti quædam alopa à cute abscedit ac decedit.

Vicius ratio eiusmodi præscribenda.

Post somnū quidē ante omnia palpatō atq; prætentato uentre, aliū
 sese distendet cum uociferatione: postea triceſ atq; diuerſimode exer
 ceatur, partim quidē saltando, partim uero & quidem plurimum ſibulis,
 quos *κλυστροί* uocāt, et coryco utendo: ſudorē uero ſubinde abſtergēdo:
 perungatur adipe ſufficiente uel uulpino, uel hircino, uel alitis alicuius,
 uel butyro recente. Parum uero intermittens laueſ, illitus cremore ſceno
 græci, aut piſang, aut guttæ ammoniacę per exiguo aceto immerſo. Cæ
 terum à balneo terſum oleo lentifcino illinito, aut cenārhino, aut myrteo,
 10 aut uino modico cum alumine, guttæue ammoniacæ ſtrigmenti balneorū
 craſſitudine: abſtergens uero denuo tenerimis linteolis, horæ dimidiū
 quieſcat: à quo pingui & tepida aqua hauſta, euomat digitis pennæue
 irritando: ubi uero euomuerit uinum abſinthite, origonitēue eſibat. Por
 rō alimenta quibus in hac ægrimonia eſtur, panis hordeaceus eſto, pla
 centæue ex farina cōpacta, quam Græci *μαζα* indigitant. Ex oleribus ue
 ro beta, lactuca, raphanusq; et porrum, & braſſicæ, bis aqua ad dulcorē
 uſq; elota, & capparis: E maritimis aut admittūtur oſtea, pelorides con
 chæ, echini, peſtines, quę Græci dicunt *κρυία*, tellinæ, cum beta decocta,
 ſaſſamentum uetus perinde atq; medicamine mœra. Mero omni morbi
 20 tempore abſtineatur, & coitu ſimiliter: Pauciſſimum modo uinum ac te
 nue probeq; dilutum tempore quo refocillantur ac recreantur ab expur
 gationibus aſſumendo: in quo uidelicet & ea quæ acrorem habent abſq;
 condimentis, ſunt ſeligenda. Adhæc hoccine malo oppreſſis offerantur
 piſana, oua, chondrus elotus, lac, atq; mel cum pane, maluaq; & rumex,
 & liſer, & piſcis teneræ carnis: Ex auibus quæ inculpati ſucci ſunt: Ex
 fructibus ficus, uuæ, ſtaphides: Ex cōfectionibus uero quę melle cōſtiu
 untur, nō improbanē nuclei pinei, ſtrobili appellati, aut cōfectiones ex
 amygdalis friſtis, & cnico, bis in die nutritis: moleſtum ſanē ita habenti
 bus, ſemel tantum in die cibum capere. Vbi porrō corporis iam interni
 30 diligens habita fuerit ratio & cura, ſmegmatis quoque uſus commenda
 tur in balneo, cum elixatione betæ, aut ſceno græci, adieſta ſpuma nitri.
 Vel utendū erit ſapone, aut myrobalano, & nonnunq; piſiothris. Exte
 rituero & portulaca cum aceto contrita, tenueq; ſemperuiuum, necnon
 rumicis radices aceto cōcoctæ, & alumen cum ſalibus, & ſandaracha æ
 quis portionibus in uino & lentifcino. Facitq; hoc idem ad alphos ē ſpu
 ma maris alcyoniōue, & nitro, myrrha item, & ſulphure, lentisq; ſylue
 ſtris ſolijs aridis cum aceto leuigatum ac illitū. Atq; etiam illud quod con
 ſtat ex ſepiæ teſtæ ceratio, & pumicis, nitri, cretæ cimoliæ crematæ, com
 meoq; & gallæ immaturæ, æquis portionibus, aridum inſperſum, aut
 40 aceto exterlum. Ceterum illud etiam admirandum: Rumicis radicem ſa
 ſculus ingens, quiq; manum impleat, nitri drachmæ quadraginta, thu
 ris drachmæ uigintiquinq;, ſulphuris drachmæ totidem ex aceto Aegy

Podagricis mo
 noſica nimia

ptio circumliniuntur. Commendant medici insuper emplacton (quod pharmacon est, ut h ulceribus imponatur factum) eiusmodi: auripigmenti drachmæ decem, sulphuris apyri drachmæ octo, costi drachmæ duo, decim, calcis drachmæ quatuor, ceræ drachmæ quatuor, baccarum lauri aridarum drachmæ duodecim, hæc simul conteruntur & macerantur fororum populi albæ succositæ, uel crasso decocto, & quum iam mellis crassitudinem prætulerint, homini affecto illiniuntur. Aliud: Radicum rumicis fasciculi duo in aceto decoquantur, & in pila contunduntur, atq; leuigantur: deinde alcyonij libra una, aphronitri uncia octo, sulphuris uiui libra una, cochliarum testarum uncia quatuor, chamaeleontis cum radice uncia quatuor, conterantur pariter omnia usque ad balnearum strigmenti crassitudinem, deinde corpori huic malo obnoxio circumliniantur: æstatis quidem tempore in sole sæpicule: hyeme uero in balneo tantisper dum sudorem proliciat. Ceterum Asclepij aridum smegma sic habentibus pulchre conueniet: & omnia communiter absterilia quæ dicturi sumus usque ad Alphos, quemadmodum etiam in præfens enumerata aduersus illa. Molestiores uero abscessus epanastases, uel inflammatae, uel exulceratae, circumliniantur lycio Indico, aut glaucio, aut aloë, aut Andronis trochisco, aut polydæ sigillo. Cataplasma insuper imponatur ex chondro cum cremore herbæ seminalis, aut plātaginis, aut helxine leuigata: & melisig herbæ uiridis folia, cum axungia contusa, & cataplasmatismore imposita, mirifice profunt: rubescunt enim membra, secedit autem facile, pane cataplasmatism instar imposito, aut cerota ex amygdalo concinnata, & in naturalem colorem restituitur. Exulceratis uero emplastra congruunt, confectioq; ex diphryge confarcinata: & ea quæ è uino, meline, & coracion, & medicamen ex acetomulso, nec non Andronius pastillus, & bulla, quam pompholygem dicunt, & cadmia. Ceterum morbum totum modestius tolerari ac meliuscule esse indicat, quod cicatrix primum h ulceribus inducatur. Cæterum cōtra difficultates anhelitus laborantium elephantiasi, millepedas (quos Græci *βίβος* uocant) sub aquali hydriæ degentes quinque aut sex, ex mulsi cyathis tribus potui dato. Communiter uero & eorum nonnulla huic affectioni competunt, quæ iam pridem suspiriosis conducere literis sunt prodita. Verum aquarum sponte sua emergentium seligendus usus est, ueluti non utilium modò, sed & necessariorum maxime, atque in primis adeo aluminosarum, & quæ ferri uim naturamq; obtinent, & si possibile est frigidarū: E re uero usuq; hoc malo oppressis fuerint potissime potatæ. Maritimi item sabuli usurpatio, eiusdem semper est potentia, omniaq; sudorifica. Quoniam autem contagiosus hic morbus est, neque etiam minus quàm uel ipsissima pestis, seorsim ac longe à sanis hominibus, atque adeo procul quoque ab urbibus, in locis uidelicet mediterraneis & refrigeratis, & à mortalium cæterorum, ut dixi, frequentia maxime uacantibus

Lepre exulcerata idonea.

Leprosorum scorfus.

uacantibus tunc illa affectis est habitandum. Quin (si quidem possibile est) etiam hinc transeant ad proxima loca, tum propter se, tum propter eos qui congressuri (ut uerisimile est) sunt minore cum malo: Ipsi nanque commodiore ac salubriore aëre utentur, neque alios tam prompte mala contagione inficient.

De Lepra & Psora. Cap. 11.

Lepa pariter & psora communis quædam summæ cutis scabre do est, cui sanè prurigo lentæque corporis absumptio accedere consuevit, ex atra bile utraq; originē trahens. Sed lepra profundius circularibusque erosionibus corporis cuticulam depascit, & squamatorū piscium instar squamulas ex se remittit. Psora uero superficialitatenus summā corporis cutem uaria erosionē depascit, fursurosaque magis quam squamosa ex se corpuscula edit. In quibus sanè secta uena sanguis detrahendus, si tibi exuberantius & plethoricum ut uocant, corpus appareat: sin minus, omnino corpus alui deiectione atra bile est exonerandum. Extrinsecus uero utroque ueratro communiter utendum, calcemque ablutam seruato aridam, quumque usus & necessitas poscet, aqua dissoluendo in balneorum strigenti crassitudinem, illinito. Aliud: Sumito saluæ, oliuæ Aethiopice lachrymæ, singulorum drach, octo, ra, 10 dicis corticis capparis, cōmeos, uniuscuiusque drachmas tredecim, illinito ex aceto in sole. Sed lepras peculiariter exterunt ac dimouent anemonæ appositæ, uitisque candidæ radix. Composita uero, lolleaceæ farinæ chœnicem, cardamomi albi drachmas quatuor, spumæ nitri drachmam unam, atramenti sutorij drachmas octo, asphodeli radicis mediæ drachmas quatuor, conterens in aceto, atque cerotæ crassitudinem inducens, circumlinito, nitro prius fricato lotoque loco. Verum die tertio dissolue, & abluens aqua gelida denuo illinito. Aliud: Radicum hastulæ regię succi uncias sex, sulphuris ignem non experti, mannæ, uniuscuiusque drachmas decem, nitri drachmas octo inungito, tingens in aceto. 30 Ceterum ad psoram aspredinem proprie cōducunt: Ex simplicibus quidem, uua arida syluestris (quam *σαφύς αγρίου* uocant græce) lupini amari, cardamomum cum aceto, lilij radix melle adiecto, resina terebinthina, sulphur, ciceres, simus ouillus. Composita uero, misy unā cum chalcitide æquis partibus addito uino, psoris humidioribus illinito. Aliud: Rhododaphnes teneriora folia in olei xesta una decoquito tantisper dum arefiant, atque porriens inijce oleo cæræ unciam unam: ubi eliquaueris refrigerato, sulphurisque uiui unciam unam insperge, atque illinito, idque uel sub sole, uel in balneo. Sunt qui unā cum rhododaphne scillam etiam in hunc usum decoquant. Aliud: Accipe confectionis *οψία* xv. 40 *λββ*, hoc est cremoribus uncias duas, cæræ tantundem, rosacei unciam unam, spumæ argenti uncias treis, cerussæ uncias treis, picis liquidę unc. sex, elcysmaris uncias duas, sirici uncias duas, aceti quantū satis est ad leuigationem aridorū. Aliud: Sumito cerussæ unc. dimidiā, amyli tan-

Discrimen inter lepram & psoram.

tundem, plumbi unciam unam, lotaria rubra, uel anchusae herbae uncias duas, cerae uncias sex, rosacei uncias nouem: anchusam egregie unā cum rosaceo elixato, deinde infice etiam reliqua. Aliud: Oua decem, uel quot opus fuerint in aceto acerrimo macerato, donec cortex ipsorum emollescat, inde coquito in eodem aceto lutea ipsorum, eliquans rosaceo, & reliquo aceto: & spumae argenti symmetrum strigenti balneorum crassitudine illinito. Aliud: Accipe ouorum maceratorum in aceto uitellos treis, rosacei uncias sex, sulphuris uiui uncias treis: Prius eliquatis & contritis cum aceto uitellis, & sulphure, infice cerotam. Spuma quoque argenti aceto rosaceo leuigata, ut emplastri formam induat, acriores psoras exsternit purgat. Porro smegmata etiam ex rumice, atque pleraque quae elephantiasi medendo sunt facta smegmata, communiter cum curationi ipsius leprae, tum psorae quoque accommodata sunt.

De impetiginibus, quas lichenas nuncupant. Cap. 111.



Mixtis saniebus (quos *hæpæ* dicunt) tenuibus & acribus cum alijs crassis humoribus, impetigines oriuntur, quæ prodiuiter in psoram & lepram cutis aspredines transeunt: Quocirca uehementer arefacientibus egent pharmacis. Proinde post uniuersi corporis, si opus sit, euacuationem, simplicia quidem quæ conueniunt, sunt, Cicer, ueratrum, echinus saxatilis, pix cerotæ admixta, & resina, crocodili terrestres stercus, & sturnorum, quum oryza modò passuntur. Non pauci hoc solo medicamine lichenas, quæ in mento, aut alibi cubi alijs proueniunt, medicati sunt: Plurimum tritici sumens, in aliquam incudem candentem & ignitum impone, humidumque ex eo defluens, etiam dum calidum suscipito, & lichenibus inungito. Puerorum uero lichenas salua humana assidue perfricato: Hos etiam gummi coccomelæe illitum adiuuat. Veterascentibus uero lichenibus, uiticis folia terito in aceto, & cataplasmatibus modo adglutinato, aut pari quoque modo folia capparis. Composita uero hæc ad lichenas faciunt: Sulphur cum rore marino, libano tōue, uel cum gutta ammoniacæ, aliquando in aceto, illinito.

Pastillus aduersus lichenas.

Pastillus (quem trochiscum græce uocant) medendis lichenibus his constat: Glutini rubricæ fabrilis drachmis quatuor, thuris drachmis tribus, aceti cyatho dimidio: aceto hæc diluens, illinito. Aliud: Chalcitidis, cōmeos, uniuscuiusque drachmas octo, sulphuris uiui, misyos, singulorum drachmas sex, squamulæ æris, acaciæ, uniuscuiusque drachmas duas aceto illinito. Aliud: Accipito sulphuris ignem non experti, nitri spumæ, singulorum drachmas quatuor, hordei grana sexaginta, cōtere cum aceto: uerum locum tantummodo affectum illinito, sanam partem nihil inquinans. Aridum porro frigida aqua eluito. Aliud: Veratri albi drach. 40 accipe octo, farinæ lupini, buccinarum, uniuscuiusque ceratium, nitri choeniceum, arido abstergantur. Iam uero medici feras lichenas appellant, quæ à mediocriter arefacientibus nihil iuuantur, sed ab acrioribus magis exacerbantur.

erbantur exulceranturq̃. Exhibenda sunt igitur in his, medicamenta satis quidē efficacia, ita tamen ne plurimū uellicent: cuius est modi illud, quod habet glaucij, thuris, alcyonij, bituminis, sulphuris, cōmeos, uniuscuiusq̃ uncia unā, si cum aceto illiniatur. Aphricam picem cum aceto elixans refrigeratā illinito. Aliud ad lichenas, & pruritus: Atramenti futuri, sulphuris ignem nō experti, nitri, thuris, æquis portionibus ad lichenas cum aceto: sed ad pruriginem & rosionem cum uino. Aliud lichenium: Habet guttæ ammoniacæ thymiamatis, erui farinæ, farinæ lupini, æquas partes: cum aceto illiniatur.

De prurigne. Cap. III.

P Ruritus, quod malum Græci *σενοςπυς* nuncupant, quum senes obruunt, nō adeo curabile malum est: placabūtur autem subordinatis medicaminibus. Si mali causa deprehensa fuerit in alijs ætatibus cacoehymia, hoc est prauus ac corruptus humor, hunc euacuare quamprimū expedit. Sin autem biliosus quidam aut pituitosus humor, putris item uel falsus, malo occasionem præbuerit. Deprehenditur aut id quidē ex ætate, temperatura, uictu, tempore, regione, atq̃ reliquis hisce cognatis. Quocirca ubi ueriæ pariter sanguine fartæ, redundare eodem humore uidentur, contra id detractio sanguinis fuerit pugnandum: Sin potius qualitate molestat, is alternis medicaminibus est euacuandus. Nunc ad externam uertamus nos curationem: Lauacro itaq̃ utendum, sed omnino quidem stomacho etiā dum ieiuno: Verum nōnunq̃ etiā post exigū cibum sumptū denuo lauare concedit. Præuus namq̃ humor huius affectionis parens est. Decocto insuper scenogræci detergito, uel betarū, uel fursurū, uel maluæ syluestris atq̃ satiuæ, uel ptiæ sanæ. Cum his uero etiā farina fabacea, uel lupini, uel myrobalanina, uel cucumerina præparata. At si inueterascet moramq̃ diutius trahat hoc mali, lauacris consimiliter fuerit indulgendū. Fouendū præterea decocto saluig, myricæ, mercurialis, origani, pulegij, baccarū lauri, cucumeris syluestris radices, capparis, lixiulo staetes, & oxalmes. Deinde nitro arido cōsperge, uel cum fece acetij, uel eo quod accipit nitri spumæ x estā unā, roris marini libanotiue, sulphuris ignem non experti, uniuscuiusq̃ librā unā, cretæ cimoliæ libram dimidiam. Vel illud: Accipe spumæ nitri, sulphuris uiui, alcyonij, æquas portiones, quibus aridis uel cum prædicta decoctione aliqua utere. Quod si uidetur ueratro etiam arido consperge. Illinito præterea oxelæo cum syluestri staphide perforata, uel sulphure, uel sandarachā, uel simul omnibus: uel sinapi cum mirobalani succo expresso piefmatæue, & oxelæo. Vel cocleis excipe leuigatis ac dissolutis in melle, uel rumicis radicibus, uel ex iisdem rebus confectis smegmatis, ueluti paulò ante in capite de Elephante proditum est, uel super quibus in sermone de psoricis est traditum. Quod si præterea partes exulcerent, parygro cōpositione utendū, uel ea quæ diapompholygos nomenclaturā obtinuit: uel ceræ unc. unā liquefacito & macerato cyprini

Humor delin-
quens unde eli-
ciendus.

Pruritus ex
trinseca cau-
sa.

cyatho uno, quibus insere atq; implica sulphuris uiui unciam unam.

Aliud contra pruritus.

Medicamine insuper illo aduersus pruriginēs fuerit purgandū, quod accipit nucum (quę *νύκτα* appellantur) ingentium Tanorū unciam unam, sulphuris tantundem, apñ cremore elixans, utere in balneo, perfri-
cando q̄ plurimum. Hoc unum sanè medicamentū satis auxiliū plerisque p̄foricis, & aliās pruriginosis præstitit. Apium item per se, uiride, contu-
sum, & extersum in balneo, magnificam opem cōtulit: Pari quoq; modo perditium, & zygea cum rosaceo dissoluta, atq; corpori pruriginoso un-
dique illita egregie iuuat. Aliud: Oryzæ purgatæ atq; admodū al-
bæ uncias treis conqussato, & cribro discerne, & attamina, a cetoq; acer-
rimo tantisper dum strigmenti balneorū crassitudinē induat dissolue, at-
que sigillatim diuisimq; insiciens, leuigati sulphuris uiui unciam unam,
quibus pulchre probeq; cōfusus, in balneo utere, multum diuq; perfri-
candō. Verū in his qui excrementorū nimia multitudine obruti sunt, æquis
portionibus commiscens, longe præstantius ac melius reddes.

De Leuce scabiei specie. Cap. v



Aliud præterea cutis uitium sæpius homines inuadit, quod la-
tinorum nonnulli uiriliginem, Græci leucen nuncupāt. Est aut
id malum metamorphosis quædam coloris in candidiorē, ex
uiscida glutinosaq; pituita proueniens. Quū uero non ita un-
diq; omnino candescit, uitium medicabile putato. Huius autem notæ &
significationes (quod neminem fugiat) sunt eiusmodi: Acu compungis
to in superficie cutis leucen, ne ultra pellem introrsum penetret. Quod si
nullus sanguis promanat, morbus incurabilis non est: Sin lacteus uero
quidā humor profluit, tum curationem respuit. Vel laneo pāniculo aspe-
ro ipsam perfrixa: quod si rufescit color, curationem admittet: si uero in
eodem cutis colore permanserit, tum incurabilis creditur, & pleraq; cor-
poris inuadit loca. Patucas porro & antiquiores nouis ac recentibus, ma-
gis curam respuere putandum est. Nonnulli quidem ferro candenti leu-
gen exurendam autumauerunt, exustionemq; solam perpetrata proba-
uerunt: Alij porro combustionem dolorosam atq; ex hac cicatricem me-
tuendam, neq; minus incommodam leuce arbitrati, escharoticis, hoc est
crustā inducentibus usi sunt medicamentis: cuiusmodi perhibent ea, quę
cicatricem concolorem obducunt. Alij uero repudiantes difficultatem,
tincturis humectantibusq; uti maluerunt, in his imposturæ magis quam
utilitatis rationem habentes, qui sanè reliquis omnibus magis sunt aucto-
sandi, propterea quod statim reuertitur morbus. Utendum igitur subie-
ctis est remedijs & facultatibus: Adarce, hordeo, sulphure uiuo, æquis
portionibus singula contundendo, & singulatim lentēq; per cribrum at-
taminando: deinde pariter cum aceto conterens & eliquans, ad dies ali-
quot in sole illinito, nō cōfertim, ne corpus exhulceretur: procedente ue-
ro tempore exiguum quippiam hellebori, gallæq; similiter ingeratur.

Aliud:

Aliud: Ficus atræ uirgultis in aceto maceratis & contritis, misceto nitri spumam, sulphuris uiui, myricæ fructus, portiones æquales: nitro uero leucam antè perfricans, illinito, & in solato, obseruesq; ne exulceretur. Cæterū Archigenes folijs ficus, calcis quantum satis est cōmiscendo, similiter usus est: Vel helleborū candidum fricatis leucis tandiu quoad sudando reliquo corpori cōcolorem speciem induant, illinito: Sinopideq; aut mediade, uel acubus penetrantibus cōpungito, donec cruore infician tur: Illinito sinopide cum aceto: uel abstergendo prius recente cremore ficus ut dictum est, perungito, & folijs eius aliquantisper perfrica.

De Alphis candidis & atris. Cap. VI.



Alphi (qui itidem à quibusdā uiligines dicuntur) consimili omnino cum leucis origine nascuntur: uerum hæc quidem altius in corpus penetrando radices agunt, ita ut pili etiam consimiles inde enascantur. Alphi uero in superficie cutis oriunt, nisi quod ipsi quoq; si diutius permaneāt, in corpus profundius penetrāt, ut inde ob subiectum humorē pili natiuo colore mutato, candescant: Ex pituitoso namq; humore candidi fiunt: nigri uero ex atræ bilis humore redduntur. Communiter itaq; congruit utriq; calx abluta, & aqua dissoluta, uel dracunculi radix cum aceto cataplasmatīs modo imposita. Pari item.

Quo interu-
lo leuce et al-
phi differant.

modo ueratrum utrunq;: Lupinorū amarorū elixatio conspersa, & foris adhibita: necnon farina ipsorum ex aceto mellē acetofo impacta cata-
plasmate: radices itidē capparis cortex cum aceto: lilij radix cum melle: cepa cum aceto in sole illita: crocodili terrestris oletum: itidem & fimus sturnorum, quum oryzā modo comederint: sepiæ crustæ tostæ. Compo-
situm uero quod ad rem præsentē plusculum facit ex his constat: Aleyo-
nī, nitri, uniuscuiusq; uncij duabus, ueratri candidi, sulphuris ignem nō
expertī, singulorum uncia una: Nonnulli uero uini fecem adhibuerunt.

Aliter: Accipe sulphuris uiui, nitri spumæ, singulorum drachmas qua-
tuor, hordei grana septem, leuigato cum aceto, sed non nisi alphon per-
unge, nihil inquinans membrū incolume, arefactū uero aqua gelida di-
lue. Aliter: Farinæ lupini, buccinarū, & nitri, uniuscuiusq; chcenicem,
ueratri albi drachmas octo, arido absterge. Aliter: Erui farinæ li-
bras duas, seminis erucæ, amygdalorū amarorū, cucumeris agrestis radi-
cis, singulorū libram unā cœnomelite pariter eliquans, alphis illinito, &
tempore interposito, abstergito. Prodest idem & aduersus lentigines a-
speram & discolorē ceu à sole cutem, quas Græci *ἰσχυροὺς* uocant: item
ionthos, id est uaros: necnon ad humani uultus reliquiæ corporis deco-
lores maculas, quos Græci *αἰῶνες* nominant.

Ad Alphas candidos experientia comprobatum.

Sumito sulphuris ignem non experti xestas duas, calcis uiuæ albæ un-
Scias quatuor, albores ouorū quinq; olei nardini, & aceti aliquantulū:
Sulphur ante omnia dissoluatur, deinde in ipsum nardinū oleū immitta-
mus, ac denuo: eliquabimus ab hoc acetum instilletur, rursusq; diluatur.

Caltem uero priuatim abluentes, semel, bis, & ter sulphuri immittamus, unaq; ouorum albuginem & rursus eliquemus, coactumq; liquorem effundamus: Symmetrū aut relinquentes, quo illiniri ungentū queat, atq; ita quū opus est utamur. Aliud, quod ad Archigenē refertur: Accipe sulphur uiuū, folia ficus arida, aphronitrū, alcyonium, cretam cimoliam, myrtum cum aceto, utere. Aliud eiusdem Archigenis: Ficus foliorū exsiccatōrū in umbra, sulphuris, aluminis, æquas partes cum aceto illinito. Vel foliorū ficus drach. quatuor, nitri drach. duæ, alcyonij tosti drach. duæ accipiant, atq; in balneo illiniantur. Proprie uero alphas nigros maxime discutit & tollit sandaracha, cum parte dimidiata sulphuris: præfatio 10
cato uero nitro, sub sole perunge. Cæterum candidos alphas atramenti futōrij, æruginis, æquis partibus, nitri duplo plus absq; pinguedine extere: Vel hordei, sulphuris ignem nō experti, adarces, æquas partes eliquans, cum aceto absterge & obline. Vbi uero auerit, lauato terendo id quod medendis etiam leucis impendiō conducit.

De stigmatibus ex decretis Archigenis. Cap. VII.



Inter alia cutis uitia & uirilignes numerat etiam stigmata, hoc est puncta, quæ maculis decoloratâ cutis humanæ superficiem uariant. Eadem sanè curabis ad unguem, amide cum acerrimo aceto perliniens: Vel calcis uiuæ medimnū unum, 20
nitri assati, tritici semissem, adiecta aqua sub sole perungito. Vbi uero exulcerauerit, perinde atq; hculus ad cicatricē perducito. Verū enim uero Crito medicus ad stigmata curanda iussit cōfricatæ nitro prius cuti, locō ue affectō resinā terebinthinā illini: deinde linamētis colligatā sex, inquit, diebus relinquito, septima die solutā lauato, ac utq; stigma cōpungito, breuē tēporis spacio interiecto, sanguinē fluentē spongia detergito, tenui sale locum confricato: tum deniq; medicamentum imponito, quod habet thuris, nitri, lixiuī, calcis, cere, singulorū drach. iij. mellis octo, neq; ante diem quintū, imò sexto tandem soluīto, & *to pēdov*, hoc est, nigrum in medicamento deprehendes. Aliud ungentum: Piperis drachmas 30
duas, rutæ drachmas quatuor, sandarachæ tantundē, auripigmenti drachmā unam, mellis quantū satis est illinito, loco prius nitro confricato: atque alia cuncta perinde atq; in superiore peragito, soluēs uero per tridū, nigrumq; extergendo rursus obline. Tollit etenim, inquit, in uiginti diebus absq; exulceratione & cicatrice stigmata. Aliud, quod Criticum appellationē à parente obtinuit: Thuris fumere iubet drach. iij. nitri drachmas duas, atramenti futōrij drach. quatuor, cere drach. sex, piperis, calcis, thapsiæ singulorū, drach. treis, auripigmenti sesquidrach. sandarachæ drachmas treis, mellis quantum postulare uidetur confectio, utere haud aliter atq; superiore. Cæterum Oribasius affirmat batrachū 40
illitum, uel capparis folia stigmata expūgere. At si altius corporis interna petant, non auferuntur: si pauxillum uero cuti infederint, gelido caute crustam inducendo, maculas eiusmodi extere.

De papulis, quæ Græci exanthemata uocant. Cap. VIII.



Apularum eruptiones, quæ græce *ἑλκυσμα* dicuntur, oriri proprie consueuerunt, densatis in cute crassis humoribus, magisq; ubi densior suprema pelliculæ superficies extiterit. In quibus itaq; profunde in corporis interna subsedit humorum copia, hos ante omnia purgare expedit. Nam si quis id facere superfederit, tentaueritq; prius discere, is opilabit magis quam per cutem exhauriet. Sin autem corporis altitudo nullis redundarit excrementis, per cutem istiusmodi euacuandi sunt, & quisquis noluerit eminus per aluum euellere, aut per uomitionem deiecere. Verum curatio impactorum cuti humorū, ijs quæ inurant & calfaciant machinanda est, præcipue si latæ ac spaciøse infestant pituitæ eruptiones ac pustulæ. In gelidior quippe crassiorq; humore talia perpetranda sunt: Lauri foliorum mollium, rutæq; & mannæ, æquas porciones conterito, thusq; cum oleo macerando illinito: mollem uel betam elixando & terendo, cataplasmatibus more impingito. Vel ceræ drachmas octo, sulphuris tantundem, salis drachmas sex, arida friato, & infunde olei cyathi semissem, omnia simul decoque, concinnatoq; inde emplastro, utere. Frugi præstantissimumq; pharmacum, si diligenter coquatur.

*Humores inter
ni prius exha
uerendi quàm di
scutiendi.*

De Epinyctidibus. Cap. IX.



Epinyctides huiusculæ sunt sponte suaurgentia, faciem pustularum præferentia, & coloris ualde rubei, quibus discussis cruenta sanies defluit. Hæc interdiu hominē non magnopere cruciant, noctu uero grauiori dolore torquent, q̃ pro huiusmodi magnitudine debuerint. Cremorē itaq; laserpitij aqua eliquans, illinito: arefaciendi namq; naturam absque uellicatione possidet. Vel cicutam dissoluendo, impingito: uel brassicam crudam cum aqua: uel apium adiecta farina terito, atq; cataplasmatibus modo superinducito: uel herbæ apollinaris folia cum melle leuigata applicato: uel solanum absq; ullo additamento per se, & coriandro uiridi adiecto: uel eidem malo compescendo folijs oliuæ cum aqua decoctis utere: uel uuas passas acinis exutas contritas & eliquatas splenio (est autem id emplastrum figura lienis) impactas superinuehit: uel adiantū cum melle tritum epinyctidibus adhibe. Fugiendus porro est acrium & acetosarum rerum efus, fomentatio item, lauacrumq; & solis radius.

Splenium.

De pustulis quæ phlyctænæ uocantur. Cap. X.



On sponte sua ruptas phlyctænas, doloremq; grauiorem afferentes, acu peracuta perforato, quò defluat humor, inde humorem suspensam manu placideq; exprimito, cutem circumfusam sinēdo: & si impleatur conuiuente uulnere phlyctæna pustula, denuo compungatur, consimiliq; modo exprimatur, seruandaq; ut prius cutis ambiens, donec in cicatricem contrahatur, id quod sub ipsa exulceratum est. Quocirca priusq; pustulæ discutiantur, è lente elixa, cumq;

aqua eliquata factō cataplasmate illinito: Aut mali Punici uirgulas, quae graece rabdia dicuntur, in cinere calfaciens appone, locosque exure. Quod si fiat eruptio, & hulus oritur, adipem suillum liquefacito, spumamque argenti eliquando amisceto, & in linteolū impingens, superimponito: Vel lilij radicem coctam in aqua, tritamque cum cerota superinducito.

Ad epiphyctidas & phlyctenas.

ADuersus utranque pustularū speciem, spumā argenti, sulphurque igne non expertū equis portionibus cum aceto & myrteo dissoluito, forasque strigmenti balneorū illinito, adiecto oleo atque uino: Conducit & ad haec, & ad embrasata, & perizemata, necnon ichoras, incipientesque dothienas & exustiones, non *οξυμυρτιν* modo, uerum etiam *οξυμυρτιν*, hoc est plumbo, & ex ouis confectum medicamentum.

De ignis exustionibus. Cap. xi.



Mbusta Vulcano modice abstergentia medicamenta efflagrant, ita quidem ut eadem ipsa neque excellenter calfaciant, neque admodum refrigerent. Terra proinde Chia, cretaque Cimoelia, & Cretica, omnisque terra non ponderosa circumlita cum aceto haud ita acri, aut aqua admixta, pulchre expediunt, bullasque exoriri prohibent: Idem sane praestat ouum crudum integrum quamprimum impositum, uellere molliore assumptum: mediocriter namque perfrigerat, & uellicatione exiecat: scriptorioque adhuc atramento igne uita penurget: uel libanotum aqua maceratum, uel lentem elixam & eliquatam, uel eruum cataplasmatibus modo impingito. Caeterum ad exustiones feruentis aquae, priusquam pustulae exoriantur, oliuarum salutarum aqua continue conspergito atque foueto: ipsasque oliuas sale conditas cum farina eliquatas cataplasmate impone: uel alumen scissile terito cum aceto, & illinito: uel bilem taurinam cum aqua permulta liquefactam, circumlinito: uel puluerem stacten garo conspergito, uel muria: aut bulbos liliorum, uel hyacinthorum, uel narcissorum cum rosaceo teras, strigmentique balneorum crassitudine inducta, illinito. Caeterum Marcellus hoc modo componi imperat: Linteolum, inquit, melle irrigato, & in hordeo obuoluens comburito, & cineris drachmas immitte octo, cerussae drachmas quatuor, butyri drachmas octo, ceræ drachmas sedecim, adipis caprili drachmas totidem, rosacei tantundem. Sed medendis quae iam eruperunt pustulis, Rhum & farinam hordeaceam cum melle leuigata, cataplasmate impingito: Vel puluerem uiuae calcis cerotae confundito, & in linteum illitum superimponito. Medicamentum praeterea cognomen to Sphaerion ad haec est utile. Vbi uero loca iam exulcerata conspiciuntur, porris eliquatis cataplasma impone: uel portulacam terendo cum farina, cataplasmatibus modo inducito: uel sterces columbinum linteis obuolutum exurito, oleoque dissoluens, cinere ipsis utere. Mirum sane quam praesentaneum perhibeatur ambustis hoc remedium: Pini aut piceae cortex, seu adiantum aridum friatum, myrtive folia concremata, & in pul-

Exustionis
aque feruis
de medela.

uerem

uerem contrita insparguntur. Cōducunt insuper hæc singula si cum cerota concinnentur. Necnon quod accipit rubeæ anchusæ radicis aridæ, scætæ, contusæ, & friatæ uncias quatuor, ceræ dealbatæ uncias nouem, rosæ facci unc. octodecim. Postremo cōpositio ex cerussâ cum exigua medulla ceruina, exquisitū præsentaneūq; in exustionib; id genus est remediū.

Ad uerbisbus percussos. Cap. XII

M Edendis flagellorū plagis, sumito cerussæ, & spumæ argenti equas portiones, ceræ quadruplum, cum lilino aut rosaceo, & emplastrī modo utere. Primo uero die lilino tantum seorsim utitor: uel croci, tragacanthę, singulorum drachma una, ouoq; integro absq; eruis concusso utere. Flagris præterea cæsis, pellis ouis recens excoctatæ calida circūposita, reliquis omnibus magis naturalis diei spacio medetur.

Pilos ex combustionibus nasci. Cap. XIII

Apilli ab exustionibus emergunt, si folia ficus in aulula decocta cum cerota emplastrī modo imposueris: uel caricæ drachmas octo, amaraci (quod Græci *σάμψωρον* dicunt) drachmā unam terendo cum oleo, cerotę crassitudine utere: Aut ramentorum lapidis drachmas centum, squamulæ aeris drachmas decem cum aqua concinnatis inde pastillis reconde, & quum usus poscet, misce partem unam cum cerotæ partibus octo.

Ad desquamationes. Cap. XIII

IN corporis desquamationibus porrò, & summæ cutis h ulceribus, primis diebus uel uino, uel aceto, uel oxalme cōstrin-gito: sequentibus autem diebus ad inducendā cicatricem, pinguis & albis emplastris, teneris & delicatis utere. Maxime uero iuuat illud: Cerussæ medimnus unus, guttæ ammoniacæ semissis, myrtei quantū satis: guttā ammoniacā in aqua eliquando, cerussam admisce, infundens myrtinū, & utere lipara aut ramento lapidum qd marmorarū deradūt, squamā aeris admiscens, & myrteo cōterens: uel cretam cismoliam & argenti spumā cum uino & cacino & myrteo leuigans, utitor.

Ad parafymata, & attritus *σπογγώματα* appellata, & hulnera inueterata, & seniles ac molles cuticulas.

Spumæ argenti, chrysidis aureæ uel harenæ drachmæ quinquaginta, Sceræ drachmæ uiginti, resinæ aridæ piceæ drachmæ duodecim, olei cyathus unus & dimidiatus: lithargyrū & oleum ubi coxeris, reliqua insce, rudiculaq; commouens, & in mortariolo emolliens, utere. Desquamatam uero cutem h ulceribus amputare non conuenit, sed adducere remediū, & foris impingere, coit namq; & conglutināt hoc pacto, etiam si denigratū extiterit: Denudata uero carne, egre cicatrix cōtrahitur, uellicatione & sordibus infestato hulcere. Cæterū ab inflammatione seruat apofymata rhus rubeus cataplasmatīs more superinductus, leuigatus cum melle: uel iunci rotūdi odorati coma cremata, & cum melle imposita,

Ad apofymata, & flagellata, & contufiones articulorū, dolorem fedans.

Sumæ argenti, ceruffæ, uniuscuiusq; uncia unā, ceræ unc. sex, olei pū-
ri uel rofacei librā unā & dimidiā, amyli uncias duas cōfunde. Prodeft
adhæc eadem, pelariū *ἡλιότροπον*, necnō confectio ex ouis confimiliter.

De formicis & uerrucis. Cap. xv.

Quo interu-
lo formica &
verruca diffi-
deant.



Horum uterq; morbus exigua quædam est in cute excrescen-
tia, callosa, & magna ex parte rotūda. Hoc uero dirimūtur di-
scrimine: Formica quidē, quæ *μυρμικία* græce appellat̃, latiore
basi fessiliq; est, & in scalpendo & attritu similem uellicantis
formicæ sensum facit. Verruca uero, quam *ἀκροχρόλον* nuncupant, basim
habet angustam ac pensilem, ita ut chordæ nexu suspensa pendere uidea-
tur. Hos sanē tumores ē medio tollunt elaterium cum sale impactū: liba-
notus item cum aceto, grossi cum aceto, & farina, nitroq; : succus fic illi-
tus: itidem tithymalli, imaridisq; caput, falsa, cremata: Aerugo item cum
sulphure igne intracto combusta, ocymi folia cum atramento futorio, pal-
mitum clematidum uel etiāmdum uiridium & deustorum instillatio, re-
trimentum ouinum cum aceto, hirci bilis illita: herbæ solaris (quod græ-
ce heliotropion dicūt) maioris fructus, cum uino cataplasmate inductus:
ruta addito nitro, & pipere: nitrum cum lotio impubis pueruli, ster-
cus bouis armentarij in aceto adhibitum.

De Ganglio neruorum reuolutione. Cap. xvi.



Ganglion, neruorū est concretio siue reuolutio ex percussu uel
labore proueniens in plerisq; corporis quidem partibus, præ-
sertim uero secundum eas quæ mouentur, puta manus extre-
mas, & pedes. In quo utiq; malo Archigenes iubet asbeston
caleem cum adipe anserino, & resina terebinthina imponi: crebro tamen
ex achate lapide medicamento utitur. Oribasius uero usus est illo, quod
habet ceruffæ, resinæ pineæ, olei ueteris, uniuscuiusq; unciam unam, gut-
tæ ammoniacæ thymiamatis, galbani, singulorum unciam unam, ceræ
uncias quatuor: Aut plumbeum orbiculum crassiore, spondylorum in-
star, magnitudine excedentem ganglion; imponi & alligari præcipit:
pondere nanq; suo dissoluit ipsum longo tempore. Et nos illo quoq; so-
lenniter utimur, uel Arida & mastichira.

De inflammatione, quā Græci phlegmonen dicunt. Cap. xvii.



Communit̃ quidem omnes calentes cum dolore & inflāma-
tione (quæ phlogosis græce uocatur) tumores, phlegmonas
Græcorū medici appellare consueuerūt: Latini nunc inflam-
mationes, nunc ardores, quandoq; collectiones, tumores in-
terdum. Cæterum pro diuersitate materię ipsos efficientis, horum quoq;
differentiam cōmutari perhibent. Sanguine nanque bono & symmetro
in partem aliquam cumulatim sese insinuante, & ob nimiam copiam con-
denfante, peculiaris cognomen phlegmonen fieri asserūt. Bile uero fla-
ua in aliqua corporis parte hærente, collectionē hanc herpeta uocant. At
ubi

Herpes.

ubi sanguis unā cum felle flauo in partem defluit, erysipelata constituit. *Erysipelat.*
 Quando uero subterfluens sanguis calidus satis fuerit atq; crassus, *anthrax.*
 id est carbones parere solet. Ab ea igitur quæ proprie appellat phleg-
 mone, quæq; in permultis usq; accidit, inchoandū. Ea tumor quidā est ru-
 bens cum dolore, renitens ac reluctans tactui, calensq; , ex sanguine ut
 dixi bono ortum habens, qui aliquando ex uniuersa corporis mole fer-
 tur: nōnunquam in ipsa modò particula nimium redundat, ita ut in uasis
 non contineatur, sed roris instar in mediā loca uacua excidat. Vulnera-
 tionibus adhæc sæpius & ruptionibus, h ulcerationibusq; , & alijs com-
 pluribus quæ foris ingruunt caussis hæc accedit & comitatur affectio.
 Quū igitur pars corporis aliqua subito absq; præcedente causa euiden-
 te inflāmatur, toto uero corpore in partē mitēte, uniuersum tum corpus
 sanguinis detractiōe leuandum est: membrū aut inflāmmatum irrigan-
 dum, & cataplasmatibus illinitione consolandum, non caloricis & hume-
 ctantibus rebus, sed his quæ id qd influit auerrūcare & repellere queunt,
 quodq; in loco hæret affecto, deijcere. Cataplasmatibus igitur modo sem-
 peruiuū, & mali Punici lemmata in uino decocta, ceramq; cum farina cō-
 positam impingito. Quum itaq; dolor uehemens nullus excruciat, hoc
 etiam fuerit utendū. Cum dolore uero maiori parte fluxu infestata, neq;
 tum calidam aquam aut oleum adhibeto; uel quæ ex farina contextuntur
 cataplasmata: hostilia nanq; hæc rheumaticis affectionibus sunt. Ad mi-
 tigandā uero doloris uehementiam medicamentū *αλυσίος*, & ex rosa-
 ceo, ceraq; exigua, uelleribus sordidis hyssopi quamplurimum continen-
 tibus excipiuntur, & applicantur: æstatq; quidem frigida, hyeme uero
 tepida: complectendo superiores locos affectarum partium spongia in-
 tincta uino adstringente & austero, siue posca egelida. Admiscendę por-
 rò sunt cataplasmatibus ad eam prouinciā idoneæ ac utiles herbæ. Helixia
 ne propterea omni inflammationi accommodata est, cum intra exordia
 statim, tum etiam in ascensu & incremento. Glaucium non dissimiliter,
 atriplex, & malua, lactuca item, & cucurbitæ calidis illitæ. Ex re quo-
 que & usu sunt tribuli utriq; ad eas quæ ex destillationibus oriuntur in-
 flammationes. Brassica præterea ad tumores induratos. Cæterum quū
 discrimine quopiam dissident, pusq; nullus subcidit, ex chalcitide empla-
 stro medicamine curato, uel aliquibus eiusdem generis, quæ ad fluxus
 egregie conducunt. Puram porro lanam uino imbutam austero, extrinse-
 cus medicamēto iniijce: Quocirca istoc medebere modo his qui ad fluxū
 referuntur ardoribus. At qui in aliqua occasione cōsistunt, humectando
 calfaciendq; non lædes, & si quando res ususq; feret scarificato eisdem,
 opportune id atq; decenter faciens. Verū si eas quæ ex fluxu originē tra-
 hunt partium inflāmmationes scalpello incideris, præsertim ab
 initio statim, auctor certe causaq; ingentis alicuius
 incōmodi fueris languenti.

De his quæ foris incidunt abscessibus. Cap. XVIII.



Quod si tibi suppurationē coire aut cōglutinari nō posse uideatur, panē in hydrelæo coctū cataplasmate impingito: uel hordeaceam farinam compari modo præparatā. Conspergatur præterea & foueatur membrum aqua althææ radicis recoctæ. Atqui si ægre in suppurationem tumor perducatur, aut cute imperperabili difficulter distrahatur ac digeratur, cataplasmate ex ficibus facto utere. Oportet autem dulces & præpingues ficus elixas eliquari in aqua, & aquam mellis instar tenuem efficere, farinamq; hordei injicere: & si dissipetur quidem tumor, sed leuius quàm opus sit, cum ficibus hyssopum aut origanū coquito. Si extendere uehementius est animus, salia decoctioni immittito. Exquisita autē diligentia attendendū, ne propter uehementiorem ariditatem membrum obdurescat. Et si quando eiusmodi quippiam olfeceris, aqua cucumeris syluestris radicem, aut althææ, aut bryoniæ decoquito. Fortior autem est dracunculi elixatio, quæ utique uehementius multo distrahit & discutit. Ipsum adhæc ex dracunculo medicamentum ualidius eiusmodi dispergit & discutit. Interdum igitur hæc sola decoquas, aliquando uero etiam ficus aridas injicias, Farinam quoque cum adipe misceto. Et oleum anethinum discutiendi uim habet, humoresq; crudos ac tumores incoctos conficere & maturare potest. Pix quoq; duriores & crudos tumores uniuersos maturat ac concoquit, indita cataplasmat, & præcipue liquido.

Medicamentum compositum.

Iam quidem maturi concoctiq; abscessus imposito splenio, post eijcere deprehenduntur: Incoctos uero tandem discutunt ac dissipant, lapidis pyritæ drachmæ duodecim, guttæ ammoniacæ leuigatæ tantundem, fabaceæ farinæ uncia sex: excipiantur resina liquida, & cuti inungendo impingant. Cæterū splenium ne tollas, quoad ultro decadat. Remedium tamen illud haud ita diu ante est præparandū, arefit enim ocysime. Si uero ob hæc tumor nihil distrahat, pus autē circūquaq; subiaceat, detrahendum illud, & euacuandū. Obseruato quidē ac fugito deinceps ne oleum applies aut aquā: uerum si abluendū quandoq; huius fuerit, mulso, potest ac uino, necnon cenomelite utendum. Et si quidē inflammetur, ex lente cataplasma: sin nulla adsit inflammatio, aliorū quippiā medicamentorum in forma emplastri in istiusmodi sectionibus usurpemus: Neq; etiā his minus confectionem *ἡ δὲ τῆς χαλκίτης*. Spongiam insuper aut lanam uino irrigatas acerbo superimponere. Ast uulneri nullum pinguetudinem præferens medicamentum admoue: cuius farinæ tetrapharmacum est: pressius namq; & exactius potest arefacere.

Quæ dilantant abscessus.

Quoniam autē nōnulli ferro apostemata diffecare nō dubitant, faciendū fuerit periculū, id ipsum ne remedijs etiam *ἰσχυρῶς*, hoc est colligendi attrahēdiq; uim habētibus, queat emoliri, narcissi radicē cōterēdo eliquan-

eliquandoq; in mulso cum irino coquendo, cataplasmate impingito: Vel harundinis mollem radiculam cum melle contere. Quod si duri fuerint abscessus, in aqua mulsa pariter decoquito: uel aristolochias cum melle cataplasmatismodo superinducito. Disrumpunt præterea picis aridæ, propolis Creticæ æquales particulae, & cicatricem inducunt.

Dionysia medendis abscessibus admirandæ uirtutis, & ad sanandas mamillas affectas, & bubones, congregandi attrahendiq; potentia re-
gnans, per abditos meatus distrahens.

10 **P**harmacon cognomento Dionysia, prædictæ ad enumeratos affectus facultatis, ex his componitur: Sumito olei ueteris, aquæ, uniuscuiusq; libram unam: Hydrelæum illud decoquito, paulatimq; spumæ nitri uncias sex immittito, misyos unciam unā seu duas: decoquantur donec à sordibus impolluta reddantur, deinde adijce, mannæ, thuris, ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum uncias sex.

Ad neruorum abscessus.

Ad uersum abscessus, qui *ἀνέκδοτοι* dicuntur, & neruos occupant, hæc probantur subsidia: Ceræ colophonice, butyri, uniuscuiusque libra una, picis aridæ, mellis, singulorum libræ duæ, ferruginis uncia tres, uisci quantum satis est, & oxyra, & mastichira. Aliud epispasticum:

20 Accipe guttæ ammoniacæ thymiamatis uncias sex, ceræ, resinæ terebinthinæ, uniuscuiusque uncias quatuor, sulphuris igne intacti uncias treis, nitri tantundem, atque Smelion quod uocant medicamentum, nec non diascordon, id est ex alijs præparatum, uiolenter ea quæ iam mutata sunt, disrumpunt. Id etiam quod è cremore seminis lini fit, discutit, & transmutat, rumpitque ad aptitudinem. Sed ad mansuetiora apostemata, contra abscessus quoque, secundum atque post aures, quas Græci *ωπισθεν* appellant, dicta expediunt pharmaca. Hæc igitur super descendente ex inflammatione abscessu. Galenus quippe asserit abscessum (quod *ἀνέκδοτος* Græci indigitant) nonnunquam etiam si nulla inflam-

30 matio præcesserit posse consistere, hac quidem ex sanguine inculpato originem trahente: confestim nanque ab initio, inquit, per alium quempiam humorem (intelligit aut pituitam aut bilem) densatur tempore, subiectæq; partes adhærentes abscedunt, & ob id sectæ quoque omni generam ideam humidorum & solidorum corporum intra sese habere uidentur: Oleo etenim & lotio, grumoq; atque humore mellis speciem præferente, & mucoso, & ossibus, unguibusq; & capillis, in abscessibus similia reperiuntur corpora: certe & animalia non raro deprehensa sunt, cunctis ferè quæ ex carie nascuntur quamsimilima. Porro lapidibus & harenis, testis, lignis, carbonibus, argillæ, glæco, strigmentoue

40 balneorū, amurcæ, & feci deniq; (infit) comparia, *ἀνὸ σκῆπτου* maxime inueteratis hulceribus ac suppurationibus consistunt. Proinde absolutior apostematum extra corpus significatio quam compendiosissime dicenda: & quæcunque adhibitis remedijs non admittunt diaphoresim,

*Apostematis
conuulsi.*

quam latine digestionem euaporationem uel dixeris. Est igitur abscessus seu apostema, carniū, carnosarumque partium, corruptio & migratio; uerbi causa musculorū, uenarū, arteriarū. Horum alij quidem abscessus tunica continentur, ueluti atheromata, steatomata, melicerides: Alij uero tunica destituuntur, genere onomasiæ nomenclaturam sortiti, de quibus in præsens uerba facere statuimus. In abscessuum generatione magna ex parte præcedit phlegmone, qua de nunc agemus. Cæterū quādoque confestim etiam à principio, ceu iam pridem diximus, oritur abscessus. Accedit autē apostemati, umbręque instar comitatur ardor uehemens ipsius loci, & spaciosus tumor, rubicundiorque solito, & durus cum dolore pungitio, & pulsu, & grauedine, ita ut uideatur partiū aliqua suspendi. Quod si locus opportunus sit, febris quoque inuadit, & horror inordinatus, & per noctem impensus dolent ac febriunt: Adhęc bubo nōnunquam eisdē emergit exurgitque prope adenas, quas dicunt glandulas. Quum autē ad unguem cōsummatur apostema, magna ex parte minuitur, stimuli uero pruriginosi redduntur, & torpere nōnihil incipiunt, tumorque fastigiatur magis in apicem quasi in pyramidem acutam, admodū tinctus, & tactui cedens, & superficies in acumine detrahitur ac desquamatur. Dico autē hæc de ijs qui foris rūpuntur. Si quidem igitur ex medicamentis, aut sua sponte rumpatur, emmo curetur & educatione, particulatim euacuato pure: Sin contrā nihil exacuatur abscessus, eo quem in chirurgia præscribemus modo succurito.

De Gangrænâ & Syderatione. Cap. XIX.



Gangrænâ.

Syderatio.

Vando inflammatio, quam Græci φλεγμονή appellunt, neque detrahitur, neque in pus conuertitur, frequenter in gangrænâ & syderationem, quam σφάκιον gens eadem nuncupat, commutatur: de quibus impræsentiarū agemus. Gangrænâs quidem esse dixerūt ob magnitudinem inflammationis, uitæ, sensus & motus partis uidelicet affectæ extinctionē, neque dum factas, sed iam futuras ita cognominant. Huius affectionis tanta tyrannis est, ut nisi quispiam rupta omni mora præsentissimas tulerit suppetias, pars afflicta promptissime mortis habitum contrahat. Cuius membrum eiusmodi perpetuo languore uexatur, ut egritudinis hominē ipsum extinguere necessum est. Quū uero postremo sensu carere locus ita languens cœperit, nō iam hunc morbum gangrænâ, sed syderationem, σφάκιον à Græcis, ut dixi, appellatam, nominant. Accidit autē istæ affectio ipsis etiam ossibus, quū eisdem circumfusa caro tetros gignens ichoras eadem humectabit & tabefaciet: membrum proinde extinctum tandem, ocysissime ad uiuum usque est amputandum. Cæterum in gangrænæ curatione, sanguis ante omnia male habentis membri quāmaxime fieri potuerit detrahendus est: aut enim uenam secādo labefactus sanguis exhauriendus est, quum circa eandem partem uena spaciola ac turgens conspicitur: uel totā cutem incidendo, pluribus & altis scarificationibus, sinentes sanguinem ad loca tabida putridaque

tridaq; defluere. Succurritur autem his ex melle farina erui, aut oleacea, aut fabacea. Si quis uehementius desideret, salem immittat, uel pastillum Andronium, aut id genus aliud quippiam: Conferunt & gangrænis nuges peruetustæ: Perpurgat uero & abstergit ipsas urtica, cremorq; tithymalli, in loco ac tempore & mensura exhibitus. Conducit item hoc malo affectis lupinorū amarorum elixatio infusa hauistæue. Nonnulli post sectionem, tutoris excisionis gratia, cauterijs adhibitis exurūt, quibus sal cum porro admouendum. Postremo ad crustas dimouendas cataplasma adglutinandum ex pane, uel hordeacea uel frumentacea farina decocto
 10 in hydrelæo: Et cephalico arido seu xerio cum melle, tetrapharmaco item & Macedonico quod uocant, utendum. Pulchre uero beneq; crustas detrahit, panis cum apio leuigatus eliquatusq;, aut ocymo: Aut iris, aut panax, aut aristolochia, acorum'ue cum melle, uel etiam rhus. Probe similiter crustas abducit, & e medio tollit Machærionis medicamentum: Et iſis, linamentaq; concepta, quæ græce emmota dicuntur, ex melle. Sed in corporibus delicatis & mollibus sufficit farina erui cum melle.

*Crustas porri
citræ.*

Ad gangrænas ex Orbasio.

Rubiginis rasilis, rubricæ, aluminis scissi, æquas portiones aqua liquesfaciendo, gangrænis inungito: Oleacea item farina cum rapha
 10 no & sale cataplasmatibus modo impacta gangrænas remouet, quandoq; etiā cum aceto: Vua passa acinis demptis cum cortice adiecto sale & oximelite idem præstat: Interna iuglandiū (quas nuges uocant Basilicas) myrtiq; folia in uino elixa, & macerata cum melle: Raphanus cum aceto crustas, quas Græci *ἰχθῆρας* dicunt, ad os usq; exterit & effringit.

De Herpete. Cap. xx

Hæc, nulloq; alio humore confuso flaua bile excreta, in membro aliquo hærente, affectus quem herpeta Græci, id est serpens hulus nominant, paritur: qui si concretione sua crassior & maioris accrementi fuerit, altius totā usq; ad subiectam car
 10 nem exulcerat cutem: & appellatur hic *ἰσχυρὸς ἰδίοφυλος*, quod est herpes corrodens ac deuorans. Sin tenuis minorq; acrimonia, & calida fuerit materies, exiguas bullas, paruasq; pustulas in summa cutis superficie miſi seminibus instar excitat. Miliaris herpes à similitudine nuncupatur: quanquam Orbasis opinione, mixta flauæ bili pituita, miliarē hunc herpeta constituit. Curandus igitur erit herpes, uniuersi corporis per chologogon (quasi selagium, hoc est bilem proliciens atq; e ducens dicas medicamentū) expurgatione & euacuatione. Locisq; languore possessis frigorifica, siccificaq; adhibenda sunt remedia: intra principia quidem cataplasma preloſis titis, rubiq; & plantaginis, cataplasmatibus more impingentes:
 40 deinde lenticulam his admisceto. Quandoq; etiā ex melle & farina, & quod iam pridem traditum est ad inflammationes ex destillatione, cataplasma absq; semper uiuo. Exulceratis uero locis pastillos passo, uinōue tenui, & adstringente, nō uetere, uel posca diluta eliquatos & dissolutos

*Herpes estio
mucos.*

*Herpes mi
liaris.*

illinito: Admouendum præterea est glaucium, & quæ hoc uiribus potentiaq; maxime referunt, ex aqua. Si nihil remittatur, acetum admisce. Cremor adhæc plantaginis, aut solani, uino temperatus magnifice opitalatur: uel semen lini arefacito, inq; uino & oleo decoquito, & eliquans superinducito: uel cretam cimoliam solani succo diluens & eliquans, inunge: uel spumæ argenti uncias quatuor, & porri cremoris cyathos treis, betæq; succitantumdem leuigando, illinito. Vetustis porro iam eiuscemodi hulceribus, pastillus Musæ & Andronis expediens est presidium.

*Herpetis anti-
qui ex pustulis
si curatio.*

Aliud ad pustulosum herpeta: Recrementum plumbi in uino adstrigente austeræue conteratur, & illiniendo superimpingantur cataplasmatibus modo folia betæ in uino decocta: uel ceræ uncia quatuor, myrti uncia sedecim, recrementi plumbi uncia quatuor uino dimidio illiniantur. Consistente aut noma hulcere pascendo serpente, ex recremento cerota utere: uel lente cocta cum melle, cataplasmate medetur. Ceterum ad herpeta sub cute, recrementum plumbi excipiens, rutæ cremore eliquato, uel cerotam rutæ loco myrteam. Aliud: Lanæ ueteris illotæ circa facem adustæ drachmas duodecim cum dimidia, ceræ drachmas uingintiquinq; recrementi plumbi oxybaphi drachmæ semissem, adipis caprilli seruati, & aqua abluti drachmas uingintiquinque, myrtini uncias quinque. Aliud ad acriter depascentes: Accipe corticum dulcis mali Punici, spumæ argenti, uniuscuiusque drachmas sex, lanæ sordidæ ad facem crematæ drachmas treis, ceræ drachmas duodecim, cerussæ drachmas octo, thuris scissilis drachmam unam, uino & myrtino excipe.

Deigne sacro, erysipelatæue. Cap. XXI.



Aleno autore, tumor ex feruente tenuiq; sanguine excitatus, priuatim & proprie erysipelas, id est ignita rubedo ab inflammatione, uocitatur: atq; ex utrisq; sanguine pariter ex bile factus, ex abundante dominanteq; altero humore nomen affectioni inditum est. Sanguine nanque iustum naturæ modum excedente, inflammationem erysipelaceam: flaua autem bile superante, erysipelas inflammatum nuncupant. Plerunque autem ferme ex sanguine biliq; incalescens membrum ac turgens, erysipelatis cognomen tum obtinuit: Verum secundum utranq; rationem, haud ita magno discrimine dissident. Sed quod ad opis ferendæ usum attinet, non ignorandum est erysipelaton operosiora esse circa caput: proinde nisi efficaciore subueniat administratio, languentes interdum suffocat. Quamobrem ab initio confestim simul atque apparuerit, uenam in cubito aperi, maxime quidem ad humerum, uenam appellatam humeralem: at si ea non compareat, obuam. Sin uero sanguinis detractionem quippiam uetet, utendum fuerit purgatione, bilem proliciente agenteq; medicamento facta, qua in ceterarum etiam partium erysipelatibus utere, uel maioris efficaciae clysteribus. Erysipelataq; perungito, id quidē quod influendo sese in eandem partē insinuare molitur, retundentibus frigorificis: acruatum uero usq; dissipando modice calia.

*Erysipelas capitis
late curatio
tunc difficilis.*

calfacientium & humectantium beneficio, priusquam liuorem nigro rem uel membrum contrahat: Obseruatis perpetuò illinitionibus *δι' ὕγρου*, id est humidis, ut crassius commutetur per spongas probe intinctas, ablutis prioribus: multa nanque & feruida membri incensio ocysissime euaporans, exiccat arefacitque eadem. Initio itaque statim erysipelata, ut dixi, rebus cum humiditate quadam citra uellicationem frigorificis illinito: Cuius classis censentur, semperuiuum, & portulaca, & herba pulicaris, & ex locis cœnosis lens, feris, cucurbita, solanum, herba apollinaris, lactuca, & glaucium, aliquando etiam apium, ramique folia cum per se, tum addito pane cataplasmatibus modo impacta: necnon cerotæ ex aqua egelida: Admiscetur uero his opij nonnihil, succique papaueris, & cicutæ, & mandragoræ. Concinnenturque composita medicamenta, fiatque cerota ex cera dealbata, rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino, absque sale facta: in pila emollitis omnibus, aqua gelida infusa, quantum in se suscipere potest. Quod si aceti tenuis, & *δι' αἰῶνος* pauculum quid admiſueris, præstantius reddideris remedium. Atque farina quoque cum herbis aliquot prædictis refrigerantibus, frigoris quantum res postulat, inducit. Epalmularum dactyli pingues cum horum aliquo. Illiniatur præterea membrum cum cerussa, aut creta cimolia, aut terra figulari cum solano, aut spuma argenti cum rosaceo: uel chalcitide adiecto oleo & passo: uel cerussa cum aceto, & lycio, uel acacia cum aceto. Remittente porro feruore probatur usus quidem simplicium, sulphuris igne intacti ac uiui, mentarumque cum oxyrhodino, aut rutæ cum absinthio, aceto, & oleo: uel spumæ argenti, adiecto porri betarumque cremore. Compositorum uero priuatim quidem ac proprie in capite commendatur usurpatio huius pastilli: Spumæ argenti, cerussæ, croci, sulphuris ignem non experti, opij cum uino passo. Communiter uero partibus uniuersis, rubricæ sinopis, chalcitidis, misyos, ossis, rubiginis, atramenti sutorij scissi, æquis portionibus, cum aceto utere. Aliud: Accipe sulphuris uiui, cerussæ, opij, acaciæ sin-

30 gulorum pares partes cum aceto.

Cataplasma ad ignem sacrum, hulcera serpentia, abscessus parotidas, & ignis ambustiones.

Sume althææ recentis foliorum mollium libram unam, coquendoque in Sydhrelæo probe conterito, &ingere rosacei uncias quatuor, spumæ argenti, cerussæ, uniuscuiusque uncias duas cum dimidia: denuo cum coriandri succo leuigato, uel cremore semperuiui, aut solani: inde fragminas uel inijce, donec formam induat emplastri, & superinducto. Atque qui emplastro etiam illo utitur: Cecini gallacinæ uel libra una, myrtei tantundem, *μυρτῆ* uncia quinque, spumæ argenti uncia quatuor, eruginis rasæ

40 uncia duæ: Aceto dissoluantur rubigo & lithargyrus.

Cerota ad erysipelata & igne uisita.

Ceræ dealbatæ sumito uncias quatuor, rosacei quadrantem unum, Coua sex, perdicidiadis uncias quatuor. Cessante autem inflammatione

Humida absque morfu refrigerantia.

aut diutius permanente, priusq; liuescat membrum, cataplasma illinito ex farina hordeacea. Quod si luridum iam fieri occeperit, scalpello partes incidendae & scarificandae, cataplasmaq; impingendum. Fouendum item deinceps passo ex unda calida, interdum uero etiam marina, aut salisugine: nonnunq; etiam cataplasmati commiscetur: Postremo praedictis compositis utendum, animum cum medela applicando: Nam si diutius perseuerent, in suppurationem uel in cariem commutantur.

Depano, bubonibus & furunculis. Cap. XXII



Bubon
Panus

Ecundum Galeni sententiam bubon, quem inguen à loco, eo quod in scemoribus plerunq; ingruat, Romani nuncupant: & panus, quod φύμα Græci appellant: & furunculum, quem φύνθλον gens eadem nominat, nihil aliud quidem sunt quam ἀσθήματα, hoc est adenum glandularumq; affectiones. βόλεα quidem inflammatio, Panus uero glandulae inflammatio suppurare incipiens. Aliorum autem quorundam opinione, tubercula communiter omnia, è quouis membro præter naturam erumpentia, ita quidem ut abscessus tumores referant, phymata, hoc est Pani uocantur. Tradit enim alpha medicorum Hippocrates, quibuscunq; tubercula phymatæ in fistula urinario ue meatu erumpunt, his suppuratione facta & prorumpente, labor soluitur. Quicunq; igitur bubones ex cespitatione, uel alijs hulceribus, doloribus ue excitantur, periculo uacant. At qui in febribus, præcipue infestante pestilentia ingruere consueuerunt, pessimi, siue in inguine aut scemoribus, siue sub alis collæue proueniant. Verum priores intra initia statim, quemadmodum quæuis inflammatio, præsidijs perfrigerantibus & constipantibus auerruncantur: uel spongiæ impositu è posca, uel lanæ ex uino, & oleo ex oliuis acerbis & immaturis expresso, uel rosaceo, uel melino, aut lentiscino, uel myrteo: Inde eis quæ discutiendi uim habent utendum. Quod si totum humoribus succisq; redundat corpus, letandum est: Sin excrementis corpus non affluerit, loco in quo hulus consistit amussatim prospiciamus, perinde atque in sermone de hulceribus pressius agetur. Cæterum glandula inflammatione oppressa, uelleribus oleo chalaistico, id est relaxare intinctis, mitiganda est: membrumq; uersum eis circumuoluito. Suppuratum uero tumorem noli prompte incidere, uerum medicaminibus cerotæ formam imitantibus distrahere tentato: qua in re primas facile tenet medicamentum ex aperano, & botanicum, id est herbaceum. At si non procedat distractio, aut eius uirtutis medicamenta ad manum non sint, ad sectionem perueniendum, perinde atq; in reliquis abscessionibus. Opus item ferendæ cõsimilis erit ratio: Porro in febribus, uel ut summatim dicam, in humorum nimietate, auersanda & fugienda sunt resutantia excutientiaq; ne rursus extrusa in profundum descendat materies: sed à discutiendi facultate prædictis confestim auspicandum est. Et si nullum impedimentum uetat, puta ætatis, aut uirium, ex uena cubiti ante omnia sanguis detrahendus est. In topico

Tumores non
statim incidendi.

rum autem usu, fons ex decocto chamæmelorum, aut anethi, aut id genus aliorum comprobantur. Reliqua uero medicamentorum materia, huc ex his quæ proximi uoluminis capite de parotidibus inscripto, memorata sunt, transferenda: neque ex his etiam minus, quæ nuper admodum mihi ad inflammationes conferre dicta sunt. Proinde furunculorum quoque curationem ex his quæ ad erysipelata conducere recensuimus sumo. Atticus insuper aster herba, quæ bubonũ, hoc est inguinalis etiam ob hoc ipsum appellatur, non solum cataplasmatibus instar impacta, sed aligata quoque bubonibus, opitulari creditur. Panos præterea discutit ac
 10 discijcit emplastri modo adhibitum adiantum, atriplex, helxine, althææ radix in uino elixa, gutta ammoniacæ cum melle eliquata & imposita: uiscum cum resina cerota. Rumpit item propolis (sordes apum, quæ legi in aluearibus potest) lupini amari cum aceto cataplasmate illiti: cucumeris syluestris radix resina terebinthina excepta: radix capparis consimiliter: nitrum itidem cum fermento uel ficibus.

*Atticus aster
cur bubonũ
dicatur.*

De Dothienibus abscessibus cum tumore. Cap. XXIII

Dothien, quem & furunculũ appellant, tumor est abscessionis faciem præferens, ex crassissimis humoribus in carnosissimis partibus consistens: clemens quidem ac mitis, quum in sola cute constiterit: maleficus autem curatũque difficilis, quum non
 20 in summa cute, sed altius coierit. Dissipat autem ac discijcit dothienas & maturat triticũ mansum, atque dentibus ita friatum & impositum: Mastiche Aegyptia, uuæ passæ exemptis acinis sale contritæ, & cataplasmatibus more impactæ: hoc utique uel distrahit, uel findit. Vel ficus aridæ ex hydromelite adglutinentur, aut resina ficibus commixta imponatur: Aut ipsæ ficus aridæ dum fuerint pingues diuisæ: aut fermentũ cum nitro: aut semẽ lini cum melle: aut alterci folia leuigata cum butyro. Hactenus quidem incomposita. Mixta uero, confectio ex fermento: quæque confecta est ex polline, diagyreos nomen obtinens: & medicamentum suo nomine Dothienicum appellatum, conuenit. Fons uero calfactioque, spongissimis mollibus continue in calidam aquam immersis, indeque ita impositis, id genus tumoribus remedio sunt.

De Termintho tumore atro ac tereti. Cap. XXIIII

Ribasius terminthum phymatis speciem esse asserit, bullamque nigri coloris, tam superiore quàm inferiore parte adiacere, quæ sublata inferius simile quiddam desquamato apparet: quo quidem dissecto, pus deprehenditur & subterfluit. Dioscorides uero & Alexander inquirunt: Terebinthi sunt exuberationes tumoresque in corpore prouenientes rotundæ & oblongæ, atrii coloris, terebinthi
 40 fructibus consimiles. Quocirca his quoque cõpari omnino ratione, ceu alijs phymatos faciem habentibus tumoribus succurrendũ, ex predictis subsidijs huc transferẽdo adminicula.



Vum sanguis copiosiore atra bile abundarit, & referbuerit, inq̃ aliqua corporis parte (toto enim corpore pariter erumpit) tabescet, carbones abscessus, *αἰσχροί* appellati, plerūq̃ nascuntur, quæ crustosa quidem sunt hulcera, magnaꝝ parte bulla, igne ambustis non dissimili incipiunt: quandoq̃ sine ea emergunt. Locus à principio tantum perpruriscit, mox una interdum quidem pustula, nōnunquam uero plures etiam tenues miliꝝ magnitudine sequuntur: disrumpitq̃ ijs, crustosum redditur hulus, in faciem omnino earum quæ cauterio adusta fuerūt: Quandoq̃ cinereo colore crusta apparet, quandoq̃ uero atro, sic ut adhæreat ima radice, & ueluti infixū sit, atq̃ quodāmodo serpat. Fit etiam cætera quæ circūfusa hulceri caro est, cum ualidissima inflammatione, nigra colore, nitetq̃ bituminis aut picis instar: Eiusmodi uero bilis est ad unguem atra. Verum quæ in carne consistunt carbunculi, breui limite circumscribuntur auferunturq̃: qui uero in membranulis, quos græce *υμελæ* dicunt, aut neruis gignuntur, longo tempore durant, & dolorem finitimis etiam subiectisq̃ locis communicant, ita ut inflammationes erysipelatosæ fiant: nō paucis sanè in suppurationem uertatur, plurimis uero & febres aliquando superaccedant. Oboriuntur aut̃ & pestilenti aliqua ex causa carbunculi. Medendum itaq̃ ijs ipsi nisi omnino perpusilli sint, sanguinis uena secta detractione, ad animi deliquium usq̃ auferendo. Post uero sanguinis è uena missionem, scarificationibus incumbere altioribus neq̃ alienum fuerit neq̃ absurdum, ob humoris crassitudinē. In parte uero languente, reijcientibus modice & discutientibus utamur: cuius est modi, compositio ex plantagine, diarnoglosson nuncupata, lentisq̃ elixæ cataplasma, sumendo panis furnacei clibanitue molle, neq̃ puri nimium, neque impuri. Ipsi uero hulceri uehementius aliquod remedium applicabimus: cuius generis est, medicamen Andronis, & Polyidæ, & Pasionis, immergentes eadem passo usque ad uisci formā habentem coagulationem, strigementiue balneorum concretionem. Massaleoticum item xerium, & ipsum pariter eliquatum, dracunculiq̃ radix, uel aristolochiæ, uel laserpitij liquor, uel succo eyre naici, singula in aceto scite illiniuntur. At quæ erysipelatos faciem habent hulcera, eadem ratione qua erysipelata curentur: At si per consensum finitima adiciantur loca, irrigationibus ex lana succida, & cenelæo indulgendum. Placata uero phlogosi flammeo ardore in carbunculis, ce-
rotæ cephalicæ sunt adhibendæ, remittentia que filatim discerpta linamenta, quæ Græci *εμπίπνο* uocant, admoveantur. Probatissima uero fuerit herbacea, quæ diabotanon appellatur, & quæ ex nitro confecta di-
nitrum nomenclaturam habet, & quæ nomis depascensibus hulceribus conferunt, arida priuatim, & cum rosaceo admota. Duritie aut̃ mordicus perseverante, utendum melina Serapionis: Danda que est opera, ut quamprimū suppurauerint carbunculi, bis quidem per diem, noctu uero
semel

Qui breui longiore tempore
durent carbunculi.

semel cataplasmata remediaq; cætera permuentur. Cæterum ad eradican-
dum funditus carbunculos, liberandumq; loca continue uicina, mala
Punica acerba discindens in aceto elixato, & ceram liquefaciendo, in lin-
teolum emplastri modo illinito, & superimponito: Vbi uero aruerit, ace-
to humectato. Carbunculos porrò ad suppurationem & purulentiam
perducet & diffringet, nucis basilicæ, id est iuglandis ueteris nucleus,
uel etiam non antiquæ: Cupressi folia, & uirgulta seu germina, recen-
tesq; & teneriores galbuli, quæ græce *σκαρβίς* nuncupant, cum farina:
Vua passa acinis excussis: ficus aridæ in uino elixæ: papaueris corni-
cularis flores, liquor laserpitij cum ruta, exiguoq; melle, hygropissum
adiectis uuis passis & adipe suillo.

Aduersus carbunculos impendiũ utile.

Medendis carbunculis cum primis ferè quod ex his constat, ducitur
Mutile: spumæ argenti uidelicet libra una, olei ueteris libra una cum
dimidia, auripigmenti libra una: Oleum argentiq; spumam decoquito
tantisper dum inquinamenta exuat, atq; ubi sustuleris, auripigmentum
immittito rursusq; donec nigrore suffundatur decoque, atq; ubi contri-
ueris eliquauerisq; in mortariolo, utere emmoto, quod linteolis concer-
ptis hulceribus, imponitur.

Ad gangrænas, uetera hulcera, choeronia, strumas, podagramq;, & ad carbun-
culos, adq; eos qui in palpebris oriuntur anthraces.

Hisce calamitatibus singulis feliciter succurras, accipiẽdo opij, acaciæ,
misfys assati, squamæ æris, uniuscuiusq; drachmas duas, atramenti
futorij drachmam unam, seminis herbæ apollinaris drachmam unam,
quibus eliquatis in aqua, unicuiq; ex enumeratis uitijs adhibe. Confert
etiam (ut quidem perhibent) eximie ad eadem corporis uitia, ex qua-
tuor contexta, unde tetrapharmacos appellatur, compositio, continens
quintam partem thuris.

Ad pudendorum carbunculos.

Cæterum contra carbunculos qui in uerendis insurgunt, chalciti-
dis, atramenti futorij, singulorum drachmas octo, spumæ nitri dra-
chmas duas cum aqua eliquato, & utere. Subuenit etiam fimus ouillus
torrefactus, cum melle. In Alexandria testiculo sarapiade, herba (quæ
etiam orchis atq; triorchis uocatur) uiridi, cum fragminibus ac micis mo-
do formaq; cataplasmatibus utuntur aduersus carbunculos & omnia quæ
crustræ faciem induunt. Cæterum ubi iam crusta deciderit, triualis hul-
ceris modo curationem adhibe.

De Canceribus. Cap. XXXVI

Nomnibus ac singulis humani corporis partibus cancer ori-
ri potest: si quidem nõ oculis modò, uerum muliebribus etiam
locellis, quemadmodum peculiariter de hisdem suo loco tra-
didimus, atq; alijs corporis partibus bene multis, uerũ præci-

Cancer morbus
unde nomen
sortitur.

pue ac sæpius in foeminarū mānis sese insinuat: quoniam raritate sua laxę & fungosę crassissimā atrę bilis (unde hoc malum gignitur) materiam prompte admittunt, ne dicam obujs (ut aiunt) ulnis excipiunt: ex eo nanq; humore quū referbuit oriuntur cancri: qui si adrior fuerit, cum hūcere. Ob hoc, colore nigriores omnibus inflammationibus liuescunt, citra caliditatem: uenę circa id malum implentur & intenduntur, cancri aquatici animalis pedibus speciem non ab similem præferens morbus: unde factum etiam huic malo nomenclatura est. Inquiunt uero nonnulli, eo quod ægerrime euellatur ab his quas occupauit partibus, ueluti cancer animal pertinacius retinet, quę semel corripuerit. Grauis hic & incurabilis morbus est, qui ob humoris crassitudinem neq; extrudi neq; uelli aut discuti potest, neq; purgationi totius corporis cedit: sed tam malefica naturę, ut mitioribus remedijs medium unguem porrigat, asperioribus autem ueluti crabro irritetur. Possunt uero cancri primum emergentes, quo minus augeantur, impediri, a tribilarij humoris deiectione, priusquam in membro languore affecto radices agat. Euacuabimus autē primitus quidem, nisi remora quędam impediatur, sanguinis ē uena detractione: mox inde purgatione, simpliciora quidem intra primordia statim exhibendo: Verbi causa, epithymum quatuor unciarū & semissis quantitate, in sero lactis aut aqua mulsā. Proximum est, ex hiera, quę helleborum atrum admixtū habeat, purgationem instruere. Atqui si in loco languente ad moueatur, sine molestia exhulceratis subuenit. Solani item succus, si linteolū molle duplicatū in ipso irriget, & canceri imponatur. Foris autē circa ipsum lana mollis in ipso cremore madefacta inijcienda est: prospiciendum autem ne exarescat, succo perpetim infuso. Utatur infuso per quis longo tempore in exhulceratis canceris, diapompholigo, id est confectione ex bulla. Expediunt etiam egregieq; quadrant ad cancerosa & uitiosa formidolosaq; hulcera, quęcunq; libro tertio de foeminarum locorum canceris descripta sunt remedia. Sed ad ea quę sedem occupant torminosa, & ad pudendorum, aut testiculorū, mammarum uel inflammationes, in plumbeo mortariolo, & cochliari plumbaceo, lemnis sigillatam ē posca & mulsō, lactē uel conterendo, ut nigrescat: uel rosacū uel omphacinū oleum, uel cremorem semper uiui, uel umbilici Veneris, uel lactuę, uel laserpitj, uel omphacis, ubi triueris compari modo illinito. Manducet autē languens cremoris ptisanę plurimū, serum item lactis: ex oleribus maluam, atriplicem, blitum, cucurbitam: Ex piscibus uero saxatiles, & aues omnes, exceptis ijs quę degunt in paludibus.

Archigenis ad cancri speciem æmulantia, & malefica formidolosaq; hulcera remedium.

Cancrorum fluuiatilium, & terrę cadmię æquas portiones leuigatas consperge: uel eiusdem animantis cremati cinerem cum cerota superinducito: uel crysimi semen eliquatum cum melle superinuehit.

De tumor

De tumore œdematœue. Cap. XXVII.



Vper tumoribus qui ex feruidis humoribus eriguntur uerba facientes, rursum de contrarijs tractabimus: principium quidem à tumore, quod *œdema* græce uocant, sumentes. Quem admodum enim biliolis humoribus in partē aliquam sese affatim recipientibus, sacer ignis, quem Græci erysipelaten (ignitam scilicet rubedinem cum inflammatione) appellant, gignitur: ita pituitosi illius humoris cōfluxu & collectione œdema, qui sine dolore tumor est, exurgit. Verum ne te lateat nōnunq̃ etiā alijs in locis œdemata emergere, uerbi causa, in hydropicorū cruribus, & circa pedes, in corruptionibus & prauo corporis habitu, quam cachexiam uocant: In his quippe istiusmodi tumor affectionis hominem opprimentis, comes est, necessarium ue conflagrat: Satis siquidē tum utiq̃ est, si crura perfricentur, interdum quidē cum oxyrhodino, aliquādo uero cum oleo & sale, uel ipsum quoq̃ oxyrhodinū salibus cōfundendo. At si propter pituitosi humoris in mēbrum aliquod cōfluxū, œdema coeat, opis interdū satis tulerit spongia poscā immerfa & imposita, cum illigatione placide & elemēter cōstricta, ex inferioribus quidē partibus inchoante, superioribus uero terminante. Cæterū spongiā hanc nouā esse expedit. At si ad manū nō sit eiusmodi, mundato eam quæ in promptu est nitro, imò potius puluere cognomento stacte. Quod si his tumor nihil expurgetur, pusillum quiddam aluminis admisceto. Idoneum item fuerit elychinium molliissimum, humore eiusmodi irrigatum atq̃ impositum. Probatum etiam glaucium. Militarem porrò (hoc est qui grani milij speciem habet) tumorem, illito prius cum oleo membro, deinde spongia ex lixiuio imposita & torrefacta uiolentiùs medeberis. Distrahit uero & cōprimit tumores œdematis speciem preferentes, illita omnis terra, & uehementius Aegyptia, & ifatis satiua atq̃ uernacula.

*œdematis ex
pituita curatio*

30

De inflatione emphysematœue.

Cap. XXVIII



Piritu flatuoso, sub cute quidem aliquando, interdum sub membranis ossibus circumfusis, uel musculos ambientibus, collecto & coaceruato, emphysema (quam inflationem Latinorum quidam nominant) gignitur. Congregatur autem & accumulatur quandoq̃ secundum uentrem, & intestina, & inter utraq̃ ipsorum, & peritonium membranā; ceu in tympanijs ut uocant, intercutibus. Dirimiturq̃ à reliquis œdematis, quod digito cedens, non tantam relinquit foueam, quemadmodum illa dum premuntur, & strepit instar tympani. Adiuuat autem densitas cutis, quæ spiritu non tam facile perflatur: cumq̃ hac si crassarū partium sit spiritus: Vnde curationis scopus est, corpori raritatē inducere. Extenuatio uero crassioris spiritus, medicamentis tenuium partiū, calidæq̃ potentie absoluit. Quamobrē ad emphysema

Tympani quibus ab alijs tumoribus differt.

quod uentrem exta^q interiacet, oleum tenuium partium illud, eximiam
iuuandi operam praestat, in quo ruta fuerit elixa, aut cuminum, aut ap^h se
men: non raro cucurbitula ingens, nō incisa cute scalpello, umbilico adia
centibus locis bis aut ter adglutinata, flatus distraxit & discussit. Quum
autem muscoli ob contusionem, ceu in pulsationibus insufflantur, mem
bra calidis admodum rebus acrioribus^q indignatur, molestia^q afficiun
tur. Quocirca à principio statim mitigantibus consolatorijs^q remedijs
plurimum occupari expedit: In declinatione uero mali, distrahentibus,
Elixatione igitur cum oleo exiguo utendum, cutem lana succida instau
rando, uel cerotam ex hyssopo confectam immiscendo: Dato^q operam
quò caliditas permaneat: quæ si ualedixerit, frigus^q sublit, plus incom
modi quam emolumenti affert. Conualescente uero iam non absq^q sola
mine summo languente, acetum admisce; nitrum^q uel nitri spumam, &
posthæc staeten puluerē: Posterius emplastris diaphoreticis, hoc est uim
disiendi discutiendi^q habentibus, instaurationis gratia utitor: cuius fa
rinæ utiq^q est proximum quod subiungam: Glceon, quod est balneorum
strigmentum comburens, cola & defecato primum ut purum reddatur,
atque rursus cacabo immitte. Et calcem præterea extinctam conterens
do ueluti in farinam, impinge, atque oppleto tantisper dum argillosa fiat
coeniq^q crassitudo inducatur, atq^q contra emphysemata utere. Cæterum
multo efficacius quam hoc censetur pharmacum ē fico Aegyptia, quem
sycamoron uocant; contextum.

Glceon.

De luxatis & contusis. Cap. xxxix



Duerfus articuloꝝ luxata & contusiones (quorum Græci
illa *σπριμαται*, has uero *θλάσματα* appellant) conferunt uelle
ra succida haud ita pridem ab ouibus detonsa: uel sponsia
oxelæo irrigata; & imposita. Mollia bulborum decoctorum
cum melle, uiticis folia, & sal, & nitrum assatum leuigato cum cerota: ute
re item fori infusionis aquæ dulcis, uel marina calida: Sed ubi iam inflam
matio dolores^q sedati sunt, membra luxata perfricentur.

30

De sarcothlasmatis & ecchymomatis, id est carnibus contusis, &
sanguine in loco contuso collecto. Cap. xxx



Arne sub graui aliquo pondere illapso contusa, exquis^q in
hac uenulis discretis ac ruptis, sanguis cum saltatione effundi
tur, unde sub cute coaceruatus constitutionem inducit quam
uocant Græci ecchymoma, hoc est sanguinis in parte contusa
coitionem. Quo quidem in casu, nisi cutis discindatur, tumoris instar mo
les tactui cedens sequitur, liuidi coloris absq^q dolore. Plerunq^q igitur no
ster medendi scopus est, congregatum hærentem^q que sanguinem distra
here, idq^q sine mora prius quam nigrescat. Cæterum inter principia sta
tim astringentia quædam discutiendibus sunt admiscenda, eo quod tui
cæ uenarum fractæ, opus omnino habent densitate & solidatione: Post
hæc uero etiam absque stipandi uirtute præditis rebus, digestiuis tantu
modo

40

modò & disijcientibus utamur: & scarificando ab initio ecchymomata, sic deinde curationem ad mouebimus. Cæterum ad inueterata ecchymomata accommodatus est raphanus cataplasmate adglutinator: discutit autem ipsa, ubi uellicare coeperint: Vel raphanorum cremor cum micis cataplasmatibus modo impactus. Species autem ecchymomatibus sunt ea quæ Romani fuggillata, Græci *καρμια* dicunt, & ruptiones uenarum ex ictu plagæ prouenientes, *καρσάματα* nuncupata, & sanguinis ex plaga facta circa unguem influxio, de quibus abunde suis actum est locis uolumine tertio: Atqui de his quæ oriuntur in unguibus etiam fusius in chirurgiā explicabimus.

De unitatis solutione rupturæ, & Conuulsione. Cap. XXXI

Rupta per se à continuitate discedentia, græce *ρῥύματα* appellata, cum ecchymosi, id est sanguinis in loco cōtuso collectione, uelis nolis prouenit. Succurritur autem his medicaminibus medio crite calorificis: cuius utiq; classis habet *ῥῥαίον αἰγύρεον*, id est nigris populis acopum, & quæcunq; uiribus huic naturæ respondet. Oportet aut rhegmatis corporis profunditatem petentibus, maiore acrimonia acutiorq; medicamēta adhibere. Vtilis aut hoc malo afflictis fuerit cucurbitulæ usus. Quod si confestim quidem discutatur uniuersa eiusmodi sanguinis in parte contusa congregatio, concrefcit non difficile dispalata caro. At si inueterascet, sordesq; subtus alantur, rupturā coalescere deinceps impossibile. Verū inter se se mutuò labia solum componit, ita ut eadem exigua quoq; occasione facile distinguantur, spaciumq; id in meditullio ipsorum relictum, humore aliquo oppleri, & continue modo quodā ecchymoma gigni uideas; confine ei quod erat à principio: nisi quod hoc quā illud citius distrahitur, ueluti saniem tenuem continens; quum illud ab initio ex sanguine constaret. Cæterū distentio fit conuulsis quibusdam neruis: & solamine solo pacantibusq; remedijs usq; ad indolentiam opus habet, conglutinari namq; ipsi nequeunt. Aristologia igitur rotunda, rupturis & conuulsionibus, si quid aliud, accommodata est. Compari etiam modo & centaurij grandioris radix, & cremor eiusdem: Rheum, quod rha quidam nuncupant, costus, bdellium, cum oxymelite hausta.

De scirrhis duritiebus non sensilibus. Cap. XXXII

Exactus quasiq; ad unguem expeditus scirrhus, præter naturam tumor est insensibilis, & tactui ob duritiā non cedens: Sed non expeditus, parum sensibilis, non incurabile quidem, sed non facile tamen medicabile malum. Oritur autē sub tenaci crassoq; humore, nodo indissolubiler membris scirrho infestatis impacto: Quandoq; igitur confestim intra principia coit & augeatur: Plurimq; uero & medici eius mali autores sunt, frigescentes & immodice contringentes cum sacros ignes tum etiam inflammationes. Quamobrem si quis uehemētius efficiētia distrahentiaq; corporibus, insensilibus

Arrige aures
medice.

Diaphoretica
contra calorem
emollientia.

Tenonics.

istiusmodi duritijs oppressis medicamenta adhibeat, & manifestam scirrho diminutionem breui tempore efficiat, reliquias passionis deinceps insanabiles reddet, tenuiore quidem humiditate discussa, reliqua uero arida & perinde atque lapidea facta. Oportet itaq; medicamentum diaphoreticum aliquam etiam emolliendi uim, citra uehementem calfaciendi & arefaciendi potestatem, habere: cuius facultatis sunt medullae omnes, atq; in primis ceruina & uitulina: Ex adipibus uero, leonis, & pardalis, & ursinus & taurinus: in auiibus uero anserinus & galligallinacci, & phasianicus: aridior uero caprarum & hircorum. Adhæc præterea, gutta ammoniacæ quæ ad odorem uaporat, unde græce *ἀμύωνος τομια* uocatur, & bdellium, præsertim uero Scythicum, & styrax liquidior ac pinguis, mastiche item Aegyptia. Quocirca in alijs quidē partibus scirrho infestatis peculiariter his seorsimq; utendum, necnon ex his compositis medicaminibus. Cæterum in neruis quibus sustinetur collum, quos à robore & firmitate *σφόνδες* appellant, & ligamentis, quæ *σύνδεσμοι* dicuntur, lapidem ignitum aceto acerrimo extinguere expedit, si fieri potest pyriten, sin minus, myliten, in quo languentis membrum hinc inde permoueatur, atq; ita agitetur, ut uaporem sublatum excipiat: Post hoc denuo remedium emolliendi uim habens præstat imponere: tenuiumq; partium oleo mox à principio, non aqua membrum foueto & conspersito, ad summum unoquoq; die: elixantes interdum in oleo althææ radicem, uel cucumeris syluestris. Lauacris uel omnino facessendum est ita affectis, uel magna saltem ex parte abstinendū. Scirrho autē mediocriter mollificato, guttam ammoniacam pinguiissimam aceto acerrimo immergentes, membrum afflictum perungemus ad plurimos dies: quibus elapsis rursus ad emolliendi uim habentis remedij usum reuertendum, illito prius galbano & opopanace pinguiissimis: cuius generis certe habetur præcipue, cōpositio *ἰσχυρὸς*, & Amythaonis, atq; ea quæ deinceps strumis medendis prescribuntur medicamenta.

De strumis, chceradibus ue,

Cap. xxxiii



Trumæ, quas Græci *κυστὶδες* appellant, glandia (quæ ab eadem gente adenes dicuntur) sunt obdurata, quibus collū, axillæ, & inguina frequentissime occupantur. Communiter itaq; subiiciuntur curationi proximo capite de scirrhis uidelicet in medium allatæ. Priuatim uero lupinorū amarorum farinam in oxymelite decoctam scrophulis cataplasmatismodo inducito: & tuberibus ipsis ac uomice bubulum stercus cum aceto elixum cataplasmate imponito, id quod tumores etiam obduratos omnes discutit. Egregie uero strophas discit calx aqua non extincta, uel melle, uel balneorum strigmento accepta, uel oleo, uel adipe suillo: Vel calcis aqua non extincta, & nitri æquas portiones, nasturtij, & scenogræci quadruplum cum melle, instar cataplasmatism impinge. Durities distrahit, permutatas rumpit, loleacca farina cum fimo columbino & semine lini, in uino decocta: grossi syluestres

stres atq; fatiui, aut nasturtium candidum cum pice liquida in malagma-
tis speciem formatum impone: Vel cucumeris agrestis radice aridæ, &
foliorum lauri aridorū crematorum cinerem cum resina terebīnthina su-
perinuchito: uel uug passæ syluestris, nitri, æquales partes, eruce duplum
cum resina immitte: uel sterus caprinum aut bubulum in aceto perco-
ctum: uel erui farinam in lotio impubis puelli maceratam, & pice & cera
& oleo eliquatis exceptā. Vel serpentem extinctū mitte in aulam, & gy-
pso probe circumuniens ponito in fornacem quò cōcremetur, cineremq;
ipsius misce cum tantundem scēogræci, atque melle excipiendo utere.
10 Compositio præterea ex aspidibus miris admodum modis remedio est,
atq; ea quæ ex struthio cōstituitur, necnon quæ ē cucumere syluestri con-
ficiuntur, & ē cedrio itidem liquore. Strumas præterea ad suppurationem
perducunt uel diffundunt, myrrhæ drachmæ decem, guttæ ammoniacæ
thymiamatis drachmæ duæ, uisci quercini drachmæ octo, galbani dra-
chmæ quatuor, propoleos drachma una, in pila contundantur.

Ad strumas strophas ue mammarū & duritias.

Mammarum strophulis duritiebusq; quas *ουροτολας* Græci appellant,
uisci elaborati, resinæ aridæ, cere, uniuscuiusq; libra una, galbani un-
cijs tribus scite adhibitis, egregie succurrit.

Ad strumas exulceratas, & hulceribus carentes.

Choeradicibus hulfusculis oppressis, atq; exulceratione immunibus
iuxta medendis, accipe ceræ, resinæ, adipis porcini insulsi, marru-
bij, æruginis rasæ, singulorum uncias sex.

Choeradicum, hoc est strumis curandis factum.

Olei ueteris libras duas, ceræ libram unam, colophonix uncias qua-
tuor, nitri tantundem, allia duodecim detractis tunicis ac pellibus,
macerato in oleo per triduum, deinde elixans tantisper dum reddantur
arida, ipsa quidem porrice: Vbi autem ab igne detraxeris, eliquata in o-
leum immittito: leuigatissimū quoq; nitrum insparsum, abscessus rumpit.
30 Aliud: Cineris cucumerini uncias duas, schistes unciam unam, nitri spu-
mæ unciam unam, liquidæ picis uncias septem.

Erodendi uim habens medicamentum choeradicum.

Schistes, sandaraches, uniuscuiusq; drachmas quatuor, squamæ æris
drachmam unam, auripigmenti drachmam unam, arido hoc medica-
mine strumas consperge: Quod si cancri speciem habeant, rosaceo cōtes-
rens & macerans, bis per diem utere.

De steatomatis, id est adipationibus, & atheromatibus, id est pultatio-
nibus, & meliceribus. Cap. XXXIIII

Teatomata, atheromata & melicerides in genere abscessuum
a cunctis (quemadmodum in illis explicuimus) enumerantur:
30 quorum singula a sola substantiarū tumoribus circumfusarum
similitudine nomenclaturā inuenerunt. Est etenim earū quæ
dam instar adipis pinguetudinisq; alia uero mellis speciem præfert, &
A.



*Stratomatum,
atheromatū, et
meliceridum cu
rationis scopi.*

alia pulsi deniq; triticeæ alteriusue frugis aspectu maxime respondet. Scopi autem curationis cōmunes, Discutere quod tunica illa inuolutum cōtinetur, uel totum medicamentis exedere, uel sectione auferre: Nōnullis quidem ex his tumoribus triplici hoc consilio subuenitur, hisce nimis rum qui tenuiorem humorem possident, cuius farinae est meliceris: Quidam uero duplici solum ratione curantur, qualis est atheroma, quod non tam abscondere quàm remedijs tollere licet: Sunt qui uno tantū scopo medicantur, è quorum classe steatoma est, quod neq; medicamentis, inducta putrefactione exedi, neq; distrahi potest: sed chirurgia duntaxat (ad quā omnino referendum est) curatur. Vnius cuiusq; horum igitur significationem in opusculo de Chirurgia reperiēs. Eorum itaq; quæ discutiendi uim habent materiam, inter hæc quæ de strumis edocuimus, inuenies. Priuatim uero ac proprie meliceridas discijcit illud: Vuas passas excussis acinis octo, squamæ drachmas treis prius fouendo impone. Aliud: Accipe ladani, bdellij, galbani, guttæ ammoniacæ thymiamatis, propolis, resinæ terebinthinæ, portiones æquales in pila contusas: conducit id quidem etiam strophis, post, secundumq; aures abscessibus, dothienibus, Panis, phymatibus ue. Verum ad meliceridas Archigenis sententia, spumam etiam nitri, ueratriq; duplum cum cerota rudi crassaq; super imposito, Cæterum medicamentis erodendi uim habentibus uti non licet, cute circumfusa. Meliceridas itaq; & atheromata, uel ipsas etiam strumas medicamentis adurentibus denudare expedit: è quorū numero simplicius quidem est, quod constat ex calce aqua non extincta, & sapone, stactesq; unguento. Varium autem magis et quod appositū à malo ueri potest, habetur proximū: Sumantur calcis aqua non extincti drachmæ quatuor, sphecles, quæ uini sex est, nitri liquidi cocti singulorū uncie duę, rubricæ drachma una, dissolue in stacte unguento, reducito ad mellis liquidioris crassitudinem, & feruefacito ter donec aliquantulū consistat & & coeat: atq; reponde in plumbea pyxide, instillans unguentū, ne celerime arescat. Confert ad acrochordonas uerrucas, formicas, pterygia, clauos, & callos, cicatrices eminentiores, tuberaue ex crescentia, uini sex nō admodū uetusta, uerum duorū modò mensiū: hoc medicamentū cuti illinito: Quod simul atq; arere coeperit, spongijs madidis locisq; rursum inungito, & ubi nigrescit cutis denuo, his quæ crustam inducunt lauandū. Cæterū crusta decedente, medelæ erodendi facultate natura præditæ ad hibeantur. Erodit aut citra uellicationē quantū res ipsa postulat, quod habet squamæ æris drachmas quatuor, sandaraches, feminis urticæ (quæ & cnide dicitur) exiccata, æquas partes: cuius usus cum primis probatur cum rosaceo. Aliud: Echinorum crustæ, sepiæ testa, auripigmentū, æquis portionibus cum rosaceo circumquaq; in circum circumliniant. Proba quoq; & ex re fuerit cerussa cum oleo illita: Necnon compositio ex calcis aqua non extinctæ & illaboratæ medimnis duobus, chalcitidis medimno uno, auripigmenti medimno uno confecta.

Sphecles quid.

*Medicamentū
exedens absq;
morsu.*

De fauis hulceribus foraminosis. Cap. xxxv.



Auus quod Græci *xygisp* nuncupāt, tumor est pluribus & continuis in cute foraminibus terebratus, per quæ mellis omnino crassitudine humor defluit. Vuæ igitur passæ tali hulcusculo sunt imponendæ, post mollissima rutæ, ficij arboris folia, adiecto interim melle, uel nasturtium cum semine lini & melle: Vel cucumeris satiui radicem cum melle, uel sulphur ignem non expertum ceteræ aut resinæ terebinthinæ copulatum. Cæterū expeditius magisq; uarium remedium reddes, si huc ea quæ superiore uolumine, de manantibus capitis hulceribus, quæ Græci *oxygispas* appellant, recensuimus, inde transferas præsidia.

De simplici hulcere. Cap. xxxvi



Voniā hunc simplex nō nisi hiatus quidā est, cuius si quis labia diducta contrahat, undiquaq; coronæ instar uinculum circumponendo, dissitæ partes facile absque ulla alterius rei ope coalescent & concrecent. Verum ubi quidem in uno aliquo labiorum foraminibus perforatorū hunc aliquod transuersim extiterit, principium hinc ligaturæ fieri, atq; in contraria uertere operæ precium & necessarium est. In utrisq; uero diuortio facto, apprehendendum est duobus initijs ligamentum, & labijs hoc pacto contrahendum: nulla siquidem immunditia ueluti pilo, aut arena, aut oleo, aut festuca, uel alia quaptam simili re labijs incidente, hunc plenissime glutinabitur. Quod si hunc adeo magnum fuerit, quā ut queat separata omnino prædicta deligatione glutinari, confusionibus ea prius sunt cōmittenda: deinde hoc pacto futura cōmissa, remedijs conglutinandi uim habentibus utendum, & quæ arefaciendi cōsumendiq; humorem coactū, & ne alius quispiam se insinuet, arceri potestatem obtinent.

Quæ hulcera conglutinandi uim habeant. Cap. xxxvii



Onglutinare hulcera possunt quercus folia cataplasmatibus modo impacta, & salicis, brassicæ, fructus oleaginis fruticis, quæ Græci chamælæan nuncupant: folia item, & cortex, & succus austerioris plantaginis. Papyrus posca uel uino irrigata & macerata, coronæq; modo circumducta. Recentia uero hulcera cōglutinate egregie pinus, & piceæ folia, & cortex recens ut uinculum circumactus cum aqua, aut posca, uinouæ, caseus recens solutus: Foris autem rumicis folia applicato, aut uitis, aut betæ, siue lactucæ. Cæterum caseus, qui quoniam ex acido lacte fit, oxygalactinus nomen obtinuit, uulneraq; ampliora ceu glutine cōmittit: Pyra item syluestria quæ achrades græce dicuntur, cōmittunt & fluxum reprimendo sistunt: Equisetumq; ut cataplasma impactū. Quod si nerui dissecti fuerint, satis satia in durioribus quidem corporibus, etiam si in capitibus musculorū extiterint, pulchre admodum hulcera conglutinat: item cupressi folia et ramuli, conij iuuenes et molles in corporibus duris: sed admiscere conuenit araneam leuigatā,

Que conglutinant hulcerare cecilia.

quæ ex mola uolitantem farinam acceperit: Myrrha cum aqua illita, uel libanotus, lumbrici terræ. Neruorum præterea discissiones cōglutinant pentaphylli folia cum melle, aliaq; exusta cataplasmatibus instar imposita.

Quæ hūlcera
antiqua cōglu-
tiuant.

Hulceribus autem uetustis ē diuerso conducunt hordea combusta, cerussa cum cerotæ myrti triplo. Capitis porrò hūlceribus myrrha arida insparfa non irrigua celerrime conglutinat: Vel aloë aridam, uel aristolochiam terito, melleq; & uino simul decoquito, quoad in mediocrē crassitudinem deuenerint, inde in linamentum conceptum (quem penicillū uulnerarium dicunt) illiniens imposito. Ex compositis autem medicamentis conglutinandi uirtute præditis sunt Barbara, & chrysa, & confectio Nicolai, *ἡ Νικολαίου*, id est ex salicibus, & *ἡ δὲ δὶ τριτάτου*, & his aliæ cōgenes neq; dissimiles, quæ ingentia maxime uulnera conglutinare possunt.

Ad dolentia & inflammata hūlcera. Cap. XXXVII



Olore infestantibus & inflāmatiis uulneribus adhibenda sunt necessario siccifica, & quæ inflammationē extinguunt medicamenta. Ex liquidis igitur probatissimū creditur uinum: confert & posca. At si non absq; sorde angat inflammatio, etiam mulsum aqua dilutum. Ex aridis autem pharmacis communi quidem curatione expediunt cuncta, quæ aduersus inflammationes facere prædicta sunt, demptis oleosis & acribus. Priuata uero ac propria curatione, illud præ alijs cōmendatur: Mala Punica dulcia in uino elixa & cōtrita cataplasmate superinducto: suspiciendū id, & multiplicis usus: nam capitis quoq; hūlceribus sanandis conducit, necnō ad uerendorū & in uniuerso corpore infestantia hūlcera, item contra oculorū inflāmationes. Quod si facer ignis etiam erysipelas ue, aut simile quiddam hūlceri accedat aut superueniat, hisce aduersus illa incōmoda descriptis suppetijs usq; utendū.

Aduersus immatura & necdum purulenta hūlcera. Cap. XXXIX



Recentia quidem, atque ob id etiam dum inflammata, necdum suppurata hūlcera maturant purulentāque reddunt, simplicia quidem aqua temperata insparfa, & ad fouendum de more adhibita, triticea farina, uel chondrus, uel panis, uel glutinum, membranæ cum resina terebinthina cataplasmatibus modo illita. Adhæc cera, crocus, libanotus, pix rosaceum, adeps porcinus, uittulinus. Compositum aut in primis laudatur tetrapharmacū, emmotum rosaceo imbutū. Cæterum hūlcera perantiqua & callosa maturant, ex simplicibus quidem uua passa, styrax, galbanū, myrrha, ladanū, pix, resina, butyrū, mastiche Aegyptia, hyssopum. Ex compositis uero, *ἡ τῶν κρυφῶν*, hoc est ē galla oleūue rhicinino compositio, aceros Galeni, medicamentū liquidū quod linteolis conceptis excipitur, uulneribusq; inditur, oleo uetere aut rhicinino subactū, dichromos item, & Basilicū, atq; eius generis cætera.

De hūlceribus concauis. Cap. XL



Vlcus cauum amissæ carnis repletionē instaurationēq; expetit: cuius sanē materia, sanguis cum moderatus tum inculpatus est: Huius


Huius ergo symmetriā, id est iustam cōuenientiam ipsius sufficiente quidem cibo cōposite efficiemus: Eucrasian uero, hoc est mediū ad unguem temperamentū, non tam cum eorundem alimentorū euechymia, q̄ bona membri quod hūlcere premitur temperatura. Sed in euacuando superuacaneo (cui nomen *πρόψυμα* græce est inditū) si tenue quidē, humidius hūlcus reddit: crassius uero, undiq̄ sordes adglutinantur: quamobrē medicamentis mediocriter arefacientibus & elidentibus indiget: cuius farina censentur libanotus, farina hordei, farina fabacea, orobina, iris, aristolochia, terra Cādmia, panax, pōmpholyx. Vbi uero nullū medicamentum sarcoticū (hoc est quod carne implet) adhibēt succurrit, ad aliam medendi rationē est transeundū. Verum si quidē sordes ingenti multitudine cōpareant, atq̄ humidius omnino hūlcus, sciendum planē est quod mitiore medicamento exiccatur, atq̄ mellis admixtione intenditur. At si mundum & siccus deprehendatur hūlcus, plus quā conueniat arefcit, oportetq̄ cerotam oleo permulto madefactā adhibere. Accidit aut aliquando cōtrarium, ut medicamento existente uiolentiore, caro tabefiat & conficiatur, ita ut putridū humidumq̄ uideatur hūlcus, haud sanē aliter quā ea quæ sunt minus exiccata: Atqui hoc cōcauitatē ampliorē & colliquatā contrahit, & turgidū redditur labijs, & cum inflāma

10 tione præterea rufum: Sæpe uero nūntio liquidē admodū ac manifeste languens uellicatur. Alterū uero sub his quæ minorē arefaciendi uim habent, nihil horum potest consequi. Quamobrem lignorū caries, atque ea in primis quæ moderatam constringendi facultatē, abstergendiq̄ sortita sunt, ueluti ulmus quæ quidē iuxta expurgat & implet munda & impolluta hūlcera, uel anemone appositæ. Pini quoq̄ corticem detractū atq̄ cum cerota in penicillū contritū, cōcauis hūlceribus illinito, sed præ cæteris recentem superinducito, carne etenim cōcaua implet. Cōposita uero, mundatis iam hūlceribus probatissima censentur, ex ostreis compositio, Ma-

20 neethonis medicamentū ē uini fece confectum, item illud ex aloē: Necnō Meletera cognōmento xerion, & quod constituitur ex amyli, mannæ, alicæ, erui, æquis partibus: consimiliter etiam medicamen ē thure, *ἡ δὲ λιβνὴ* græce appellatum, & Aphroditiariū. Sordidius uero quodāmodo, ueluti quæ græce *κεφαλὴ* nomen sortita sunt xeria: & quæ in linteolis concepris medicamenta (*ἱμωτα* græce nuncupant) excipiuntur: quæq̄ trophos appellationē obtinuit: & isis, & cui titulus athena, & *ἡ δὲ ἀπτακτολίδα*, id est ex atriplicibus confectū: Est præterea cui appellatio Itali-
cū est indita, & breuiter quorumcūq̄ factum est periculum.

Si hoc non fuerit, alia agnoscenda q̄ uia.

Quæ sordida expurgant hūlcera. Cap. XLI

40  Ordibus referta hūlcera, siue concaua fuerint, siue plana, egregie malum terræ, quæ *ἀριστολογία* appellatur, cum melle perpurgat. Resina itidem terebinthina cum pari mensura rosacei & mellis, uel loco rosacei butyrum, iris Illyrica cum melle, oliuæ falsæ colymbades uocata, cataplasmatibus more impactæ. Aduersus uero

hulcera nervos occupantia, resina terebinthina liquefacta cum butyro adhibetur. Verum his quae immodica quadam sordium ui obruta sunt hulceribus, & eorum quae depascendo serpunt speciem habentibus, marubium cum melle expedit: hoc etiam crustas porricit. Haecenus in composita quidē. Mixta uero eiusdem, ne uehementioris dicā, efficaciae haec sunt: Misce amurcae decoctae, mellis despumati, aluminis frugi & accommodi equas portiones. Aliud: Sarapiadis, & buteonis, quae graece *μύκη* dicunt, ireos Illyricae aridae, marrubij exiccati, mali terrae, singulorum drach. octo, farinae erui drach. x. arido utere, atque non raro cum melle. Porro aduersus hulcera perpolluta Aegyptia quoque facit: nec non ex salibus contextae cerotae colliquatae, Indicae & Athenae, & chlorae liquefactae, praeterea *ἀσπιδιοειδής*, & ex eruo comarsinata arida: adhuc melanchloros pastillus, consimili denique modo & Ocriogenes.

De uermiculosis hulceribus. Cap. XLII



Accendis quae in hulceribus prognati sunt uermiculis, primum quidem omnium ac optimum est, humiditatem cariemque uermium parentem compescere atque arcere. Profigunt autem & interimunt uermes in genere quidem cuncta quae ad aurium lumbricos conferre depicta sunt remedia. Ceterum tollendis est medio his qui in hulceribus enascuntur, Archigenes cerussam & polium aequis partibus, cum liquida pice illinienda, magna cum utilitate asserit.

De carnum in hulceribus praeter naturam incrementis. Cap. XLIII



Aurium in hulceribus supra quam par est excrescentium purgatio, medicamentis acriter arefacientibus tentatur: eorum sane numero habet diphryges cataplasmatibus instar inductum, & squama aeris, & quaecumque ostrearum imitantur speciem cremata, echini quoque combusti, tam terrestres quam marini cum toto corpore. Verum haec non admodum eximie, sed mediocriter modo carnum id genus excrescentias expurgant atque compescunt: atque Asiae petrae flos longe ualidius id muneris obit: hoc uero adhuc uehementius, sory, & sarcocolla, & chalcitis, & misy: uerum deusta minus uellicant, flos itidem aeris. Ceterum arugo uiribus, multis (ut sic dicam) para sanguis reliqua quotquot sunt omnia praecedat. Sales porro combusti carnes cum humore flaccidas subliquefaciunt & labefaciunt: Consimiliter & linamenta filatim ex resiculis pannosis discerpta in muria maioris acrimoniae irrigata, & denuo arefacta atque imposita, mediocres carnum excrescentias liquefaciunt atque aueruncant. Verum ferrugo cum squama aeris incrementa potentius reprimunt. Composita autem non Rhodia modo cognomento arida, sed etiam phaeon, praeterea xanthum, absque morsu tumentia supprimendo in modum uiamque reuocant. Ingentissimas uero eiusmodi carnum excrescentias corporis interna petentes, crusta obducunt Phaustiani pastilli friati atque in parsi, & heliocades (quasi sole exustum dicas) xerium. Conducit pariter id etiam, quod accipit calcis aqua non extincti, squamae aeris, mannaeque

mannæq; partes æquales: idem incrementis immodicis succurrit, & fungis similia cum melle repurgat, & cum cerota carne implet.

Xerium præter naturam incrementa carniū suppressens.

Accipe spumam argenti, rubiginem laminæ plumbeæ, æquis portionibus. Aliud efficaciter excrescentiæ luxum sine uellicatione reprimens, subueniens præterea nomis, & epulidibus, hoc est carnis gingivarum excrescentijs, & dentes deniq; candidans: Calcis uiuæ libra una, auripigmenti uncia sex: auripigmentum aridum cum aqua dissoluens, calcem aqua nō extinctam immittito, terræ Cadmiæ modo elotam atq; cōtritā arefacito & utere. Ex pastillis pantolmij, & quicunq; polytis medendis descripti habentur, scite admodum hulcera reprimunt. Emplastra porro uiridia, præsertim quod ex Cappadocicis salibus confectum est: Isis item emplastrum, hulcera increfcere prohibent.

De nomis & putredinibus atq; phagedanis. Cap. XLIIII



Quod si mortaliū corpora hulceribus quæ depascendo serpunt, & putredinibus tabefacientibus, quas eadem gens *σκαπιόλινας* indigitat, angantur, fomentis, quæ confici debent cum irrigatione, infusione ꝓaceti & poscæ, uel uini astrigentis aut aquæ gelidæ, aut marinæ, aut decoctionis lenticulæ, maliciorum, balauftiorum, lentisci, myrtorū, acanthes Aegyptiæ, aut rerum deniq; constipandi & arefaciendi uim habentium, utendum est. Cataplasma præterea ita affectis impingendum, ē sequentibus simplicibus consarcinatum, erui farina, alumine liquido, panis siliginis (quem *σμηδάλινον* Græci nominant) interiore, quam medullam uulgò dicunt medici: gobio ueteri, uel alio fassamento antiquæ carnis illotæ, resinam in super terebinthinā liquidam æqua lance leuigans & dissoluens, imposito: uel malum terræ, uel gallarum foliorū cremorem æquis partibus: Rubiginis dimidiū ex aqua mellis crassitudinē habens illinito. Quod si crusta non abscedat, elaterij æqua pars ærugini admisceat. Porro in sepe donibus, hoc est purulentis ac hulceribus, prodest sory leuigatum & insparsum: & superne tilma aridum, uel malum terræ rotundū, uel gallas, æquis partibus cum oleo inungito: uel cucumeris syluestris radicē, uel brassicæ, aut betæ, aut rumicis folia illigans calidis cineribus reconde: ubi aut oleo eliquata fuerint, cum sale terendo impone. Valide purgat ipsa Thalia in uino decocta cum melle, modo cataplasmatibus adhibita: uel chalcitim cataplasmate superinducito: uel apij semen contritū, uel semen lini friatū cum atramēto sutorio impingito: uel ex thymo, & uua passa, & ficubus decoctis imposito cataplasmate: uel cucumerinis folijs leuigatis cum melle: uel nitrum & cyminū & farinā cum melle imposito: uel cucumeris syluestris radicē, uel scillam coctā cum melle, uel fereos drach. duodecim, chalcitidis drac. decem, mysos drachmas quatuor, cum aceto acerrimo ad dimidiū acetabulū soluendo donec exarescat, detractisq; ab igne utere, melam instrumentum, quo medici hulcera interna explorant, inferens, hulcerique inuoluens,

& superne duplum linteū ex celæo imposito. Quod si inflāmatio pre-
stō fuerit, altercum cum farina, uel brassicā cum melle cataplasmatīs mo-
do impingito. Ad putredines quæ in singulis locis cōtingunt & no-
mas: Calcis non extinctæ, chalciteos, uniuscuiusq; drach. duæ, auripi-
gmenti drach. una: hoc quidē & aduersus quæ in digitis proueniūt pre-
rygia, & phagedænas, & ad carbunculos utendū: In uerendis quidem
cum melle, in reliquis uero locis arido, superne splenio resing imposito.

Aduersus nomas omne genus, atq; adeo etiam eas quæ in ore proue-
niunt, & ad sanguinis eruptiones, & excrementias domans,
multiplicis usus arefaciendo.

HUlcibus quæ depascendo serpunt omnibus, etiam si os occupent,
sanguinis item profluuiō, quam Græci *αιμορρῶν* uocant, & carnū
incremētis frenum imponitur succurriturq; cōfectura eiusmodi, quæ ha-
bet chalcitidos, mysios crudorū, uniuscuiusq; drach. uiginti, squamæ fer-
ri drachmas sex, gallæ immaturæ drachmas octo.

Medendis nomis & putredinibus.

SVMantur salis drach. xij. aluminis combusti drachma una, squamæ,
punicis cremati, æquis portionibus: bene etiam facit rubigo rasilis
cū mysios deusto, si pice liquida excipiant, & squama ferri, adiecto oleo.

Curandis nomis uerendorum.

NON tam hæc, quàm dictum meleterium nomis pudendorū conue-
niunt: Confectio ex aceto myrtino, & illud ex charta medicamen-
tum aridum, etiam ad nomas quascunq; & ex melle cōfectum coracium,
atq; Andronis pastillus, & id genus alijs. Cæterū hæc eadem ipsa meden-
dis quoq; phagedænis apprime quadrāt: nam & phagedæna hulus est
depascens, nomæ forma & aspectu, naturaq; haud admodum ab simile.

Phagedæna.

Ad hulcera cum humore flaccida, & retriq; odoris.

HUlcera cum humore flaccida graueolentiaq;, horum medicaminum
happositu curantur: Lemnium sigillū ex aceto, uel aceto mulso (quod
græce *ἰσχυρὸν* appellant) aut uino immersum tantisper dum cenosam in-
duat crassitudinē, illitum optime succurrit: Vel cupressi folia & ramuli,
& galbuli molliusculi, uel cucurbitæ aridæ deustæ cinis, uel platani cor-
ticis tosti, & anethi cōbusti consimiliter, uel lanæ sordidæ crematæ, uel
plantago: Isatis cum per se, tum adiecta farina, aut peucedani radix arida.

De ulceribus cicatrice obducendis. Cap. XLV



Arnes hulerum quæ cicatrice indigent, tam aridas reddentes
atq; constipantes adeo, ut non modo id quod præter natu-
ram superuacaneum sit, distrahatur discutiaturq;: sed id etiam
quod secundum naturam est, in superficie huleris prope cu-
rem accendatur, præparabimus, & hulus in cicatricem agemus: ad quā
sanē functionem idonea sunt, galla omphacitis, hoc est immatura, atque
mali Punici lemmata, seu cortices: mediocriter arefacientia, & breuiter
quæcunq; absque astringendi facultate citra uellicationem arefaciunt:

atq;

atq; hæc quidem cicatrice quocq; obducunt, nempe myrrha, spuma argenti, & si comburetur ostreum, insertis quippe aridis. Hæc quoque cicatricem identidē inducunt, cortex pini addita cera myrtea, hæderæ flos cum cerota, lilij radix adiecto rosaceo, pityina, id est resina arida, pumex affatus, squama æris, pari pondere, aridis utere: hoc etiam compescit & reprimat. Vel pumici friato, mannæ & diphrygis exiguū admisceto, & utere: uel spumæ argenti partem unam, diphrygis semissem, cum cerota ut splentum impone. Cæterum ueteribus cicatricem auferunt, uiscus cum dhure, frugo cum diphrygis tantundem, atq; cum cerota myrtea: uel centauryū exiguū recens cataplasmate adglutinaū. Sed liquidioribus cypri-
 10 nradicem impinge. Porro aduersus sedis & uerendorū maxime hulcera inflammata, aloë utere leuigata, arida uel ex aqua: uel squamam æris, uel chryfocollam in sole cum cera mollificando adhibeto.

Aridum Apuloticum.

Ostreorum drachmæ duodecim, mannæ drachmæ sex, cadmiæ drachmæ quatuor: profunt itidem ad nomas. Aliud: Mali terræ, quam aristolochiam dicunt, uncia sex, corticis pini drachmæ sex, mannæ drachmæ sex, pumicis drachmæ quatuor, colophoniam, ireos, singulorum drachmæ quatuor. Aliud: Sumito cornu ceruini deusti uncias
 20 quatuor, corticis pini uncias sex, cerussæ uncias quatuor, æruginis rasæ uncias nouem, cadmiæ drachmas duodeuiginti. Aliud: Florum mali Punici, quos Græci priuatim cytnos appellant, atramenti sutorij, singulorum drachmas sedecim, squamæ æris, aluminis scissi, uniuscuiusq; drachmas octo, gallæ drachmam unam. Aliud: Accipiantur cerussæ, spumæ argenti, uniuscuiusq; uncia octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ, singulorum drachmæ quatuor.

Cicatricem inducens.

Medicamen illud *καταλοιδορ* est, quod habet aluminis fissi uncia unā, quā leuigando in aque xesta una irrigato: ubi uero dissolueris aqua,
 30 linteola concepta macerans & arefaciens, ipsis utitor.

Emplastrum Apuloticum.

Ceræ drach. quadraginta, spumæ argenti drach. trigintaquinque, diphrygis drach. octo, myrtini semicotylium: Facit autē ad hæc & emplastrū ex dactylis palmæ, & *οξυ καδμιας*, & medicamentū myrsinati, & id genus alia. Cæterū ad reluctantes & ægerrime cedentes cicatrices probantur, ceræ, myrtinæ, singulorū uncia sex, cadmiæ tantundem, plumbi, thuris, singulorum uncia duæ, aluminis fissilis, æris cremati, uniuscuiusq; uncia una, rubiginis rasæ drachmæ duæ, dissolue alternis diebus.

Inueteratis & cicatricem difficilime exuentibus.

40 Cadmiæ drach. octo, chryfocolle, schistes, singulorū drach. octo, gruginis, squamæ æris, uniuscuiusq; drachmam unam, pityinæ, hoc est resinæ drachmas quadraginta, ceræ drachmas centum, myrtini quantū fatis est. Aliud: Accipiantur ceræ, resinæ, pini, singulorū uncia sex,

cadmiæ tantundem, chalcitidis crudæ uncia tres, myrtini quod sufficit. Cadmia in uino dissoluatur: & chalcitis sub temporibus Canis platisina te, superne autem linamento concepto, & spongia ex uino utere.

Aliud: Aeris tostii uncias duas, aluminis fissi, salis ammoniaci, singulorum tantundem, ceræ uncias sex, colophonæ uncias sex, myrti uncias duas, arida dissoluantur aceto in sole diebus uiginti: Quum autem mellis speciem crassitudinemque acceperint, liquefacta & refrigerata cera, misce mollificando. Confert ad hæc præterea medicamentum etiam *ἀντιπυρ*, hoc est confectum ex pumice, item isis, & id genus cætera.

De cacœthibus hulceribus, quæ Chironia, Telephiacque dicuntur à medicis. Cap. XLVI

Hulcera Chironia.



Hulcera Telephia.

Nitiqua & inueterata ægerrimeque cicatricem contrahentia hulcera, quæ *κακορδῖ*, hoc est malefica appellantur, alij Chironia quidem, tanquam Chironem centaurum, Apollineæ artis antesignanum peritissimum in curatione respectantia: alij uero Telephia (hulcera multæ malignitatis, quæ salutarem Achillis manum requirunt) quod in eiusmodi hulcere Telephus Mysiorum rex aliquandiu fuerit, nuncupant. Considerandum igitur ne quando uniuersum corpus prauo succo redundans, id genus affluentias immittat hulceri: humorque superfluous idoneorum inter se medicaminum officio euacuandus est. Quod si uarices etiam crura una cum hulcere occupent, recuperanda tum etiam hæ sunt, quemadmodum in Chirurgia explicabitur: Vel sanguinis detractione sic habentes leuandi sunt, non parce auferendo sanguinem: Posterius topicis utendum est adminiculis, quæ instaurandi potentiam absque uellicatione contineant. Simplicia ergo quæ ex pumice, diaphryge, squama, ærugine, calceque mediocriter abluta constant, alumen item scissile leuigatum insperge: Hyssopti drachmas quatuor, nitri drach. duas, uue passæ drachmas quatuor, illiniendo prius melle, cataplasmatibus modo inducito. Squamæ porro æris drachmas decem, aluminis drachmas duas, cum ceræ drachmis decem, mollificans sub sole, formidolosis neque facile curabilibus hisce hulceribus superimponito.

Composita aduersus uitiosa multaque malignitatis hulcera.

Emplastrum ad Chironia.

Crussæ uncia octo, aluminis scissi uncia duæ, squamæ æris drach. duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, corticum malorum granatorum, uniuscuiusque uncia duæ, calcis uiuæ uncia una, ceræ libra una, myrti libra una cum dimidia, arida uino dissolue: Hoc callum tollit principio, mox depositum seruetur: Postremo autem remollitum myrtino cicatricem contrahit. Aliud: Spumæ argenti libra una, olei libræ duæ, chamæleontis herbæ nigrae, radicis aristolochiæ, quod malum terræ Latini uocant, gallæ omphacitidis, singulorum uncia una, galbani, guttæ ammoniacæ thymiamatis, thuris libanotivæ, uniuscuiusque uncia duæ, parato cum radicibus uiridum harundinum mouendo.

Archis

Archigenis ad Chironia cum in tibijs tum in mammis,
cacoëthe, strophulas & parotidas.

A Dipis bubuli libræ tres, resinæ terebinthinæ uncia quinque, mannæ
uncia septem, terræ quod uocant Sardæ, qua pictores utuntur, un-
cia quinque, liquefactis cum aridis cōfusis utitor. Aliud eiusdem Archi-
genis: Cera accipit uncias quatuor, olei omphacini, mannæ, uel thuris,
diphrygis, squamæ, singulorum drachmas quatuor, cum aceto arida eli-
quando, mellisq; crassitudinem faciens, misce cerotæ, et utere, immergen-
do linamentū conceptum, quod Græci appellant *ἱμυόβη*. Aliud, ad ea
10 quæ foeminas, & alios tenerioris cuticulæ homines infestant maligna, cu-
ratq; difficilia hulcera: Cera Tyrrenicæ drach. octo, pinguetudinis
taurinæ, resinæ terebinthinæ, plumbi deusti, et piperis, uniuscuiusq; dra-
chma una, utere linteorū fragmentis uel rosaceo uel myrtino imbutis.

Ad cicatrices atras. Cap. XLVII

Vicas pūllatasq; cicatrices exterit radix bryoniæ nō tam can-
didæ quā nigrae in oleo ad succositatem, ut ita dicam, deco-
cta & imposita. Nepeta item in uino elixa, spuma argenti elo-
ta cum rosaceo candido. Quæ lichenas uero sequuntur cica-
trices, & alias iuxta reliquæ cuti concolores facit, asininus adeps illitus,
10 cruce herbæ semen contritum cum felle caprino & bouillo & ouino il-
litum cum spuma argenti. Composita porro ex lithargyri, mentæ, thu-
ris, æquis portionibus, & melle. Aliud: Nitri, guttæ ammoniacæ thy-
miamatis, sulphuris igne intacti, myrti, æquas singulorū partes in aceto
albo, uinōue aut aqua eliquās, fuscedini cicatricū inungito parcissima ma-
nu, ne exulcerationem inducat. Aliud: Cretæ cīmolix, stercoreis co-
lumbini, saponis, thuris, partes æquales ex aceto illinito. Smema ab-
sterisōue tollendis cicatricū fuscedinibus: Cretæ cīmolix drach. octo,
spumæ nitri drach. quinque, ueratri albi drach. quinque, glandis unguen-
tarie piæ smatis drach. quatuor, quibus cū in balneo cicatrices absterge.

30 De hulcerum lacunis. Cap. XLVIII

Quando cutis quæ hulceribus adiacet, longo tempore & spa-
cio, subiecto corpori nō coalescit & conglutinatur, Græci *ἰσχυρὸν*
hoc malum, Romani sinū appellant: Proinde quū in supe-
riorem hulceris partē lacuna extenditur, facili destillatione ex-
cernitur per os sanies, & promptius multo coalescit: Contrā autem quæ
superiorem partem occupat, nulla se destillatione purgante sanie, conti-
guas omnino partes corrodit: & nisi incisionē primitus quo subterfluat
machina beris, nihil egeris, neq; lacunas carne implendo, neq; congluti-
nando. Quod si autem in aliquo membrorum, uerbi caussa brachio, aut
40 crure lacuna existat, tum absq; diuisione poterit etiam conglutinari infe-
rior pars, modō te schema nō effugiat: In brachio nancq; prope cubitum
ore existente, summam extremamq; manus partem altius in sublime ex-
tendens, lacunam in fluxionem conuerteres. At si lacuna in foemur supra

*Uulnere causa
carnis implenda*

genu incidit, formam eius ita pronam reddes, si hygnyæ puluinar molle
subiciens, suræ situm inclinatioem reddes. Quapropter si neque carnis
impletione eget lacuna, continuo per fistulam rectam uesiculam intus ha-
bentem, à sanie melicrato dilutiore eluenda est: sed ad futuram conglu-
tinationem uino uel cenomelite: atque deinde ad ea quæ conglutinandi
uirtutem habent, deueniendū est. Quod si concauus existat sinus, carnis
expletione omnino opus habet. Primū quidem ac præcipuū est, exiguū
medicaminis ē charta arida cum rosaceo immittere: Proximum, linamen-
to filatim discerpto ostiū obturare: Ab hoc Isidis, aut Machæronis, uel
id genus alia in forma emplastri medicamina, cū rosacea cerota liquidiora
re compari modo iniicere. Sinu uero moderate iam carne impleto, con-
glutinandi aliquod uirtute præditū medicamentū imposito, perinde atq;
recens cruentū uulnus curatur. Eius ordinis facultatisq; censentē empla-
stra Barbara, & *δυσμα*, id est incerti coloris, & quæ *πύρρα*, id est gilua co-
gnomenū habent: sed omnium præcipue id quod ex rhicinino, & metal-
licis, nō addita cera præparatum est *πύρρον* Galeni emplastrum conuenit.
Vbi uero medicamēta dicta ratione fuerint adhibita & imposita, deinde
spongia inanis uel ex cenomelite uel ex uino circumquaq; applicetur, de-
menter admodum ac molliter. Fiat etiam colligatio: ab imo quidem sinus
& radice inchoandum, circa os uero manus extrema imponenda. Com-
plicationes uero fasciæq; lintæ, quas *πυβιλλὰς* Græci nominant, fundū
sinus constringant quidem, sed ne dolorem inferant ac torqueant. Haud
ita uero diu post, exoluentur usque ad ostiolum, circumposito foris sinui
emplastro, & forcipe secundum orificium inciso, quò sanies excernatur.
Pusillo autem alio in ipsum emplastriolo imposito, ex eodem medicamen-
to laxiore & molli, ad promouendam effluxionē. Sinuito autem ipsum ad
dissolutionē usq;, quam ubi tertio die effeceris, auferes id ipsum, atq; per-
mutes sedulo, dimittendo nōnihil in uniuersum medicaminis sinui circū-
positi. Argumentū porro tibi fuerit altitudinem fundumq; sinus conglu-
tinari, sanie non informiter effluente, parumq; & concocta, uel omnino
etiam nihil effluente. Præterea uero secundum ipsum etiam sinum si neq;
dolor aliquis sentiatur neq; tumor, sed contrahatur locus omneq; spaciū,
aridum & indolorium est. Quin si pus quoq; præmaturū circa os conspi-
cias pauculum, adhuc spem animo meliorem cōcipito: Sin autem primo
uel altero die sanies aliqua tenuior ē sinu excernat, conglutinationis spem
tantum non abijcias: Sæpe etenim numero medicaminis uires uehemen-
ter ex subiacentibus partibus humorem prætenuem exprimunt, quo qui-
dem expresso, moderate arida facta spacia contrahunt & conglutinant.
Tertio uero die uel quarto mox ab initio, si crudus & immaturus ichor
appareat in sinus foramine, iam tum sinum coaluisse & ceu glutino com-
missum esse intelligito. Perseuerandum præterea in eodem pharmaco, &
remouendo, ut par est, ipsum propter madorem quempiā, ab ipso medi-
camine permutari nihil est absurdum.

De sinibus cute attritarum uestium speciem præferentibus.

Aliud adhuc lacunarum genus est, quod tarde secto abscessu, aut medentis chirurgi imperitia, aut eius cui medetur timore fit, quum uidelicet sinui cutis tenuis, & attritis uestium fragmentis compar (unde *ῥακιδῶς καὶ κόλπῳ* priuatim à Græcis uocantur) superiacet: quæ quum circumuersari nullo pacto possit, post traditas nuper lotiones, quæ græce clysmata dicunt, glutinandi uirtute prædito medicamine utendum, substantia quidem crassitudine uel liquido, potentia uero arido: Cuius farinæ est, compositio *ὀστὴ χαλκίτης*, quæ phœnicina nomenclaturâ obtinuit, imbuta *Phœnicina.*
 10 immerfas oleo uetere, ut neq; nimium dura sit, neq; impolluta: mox uero cum uino mediæ ætatis trita & macerata: deinde in orbem imposita, cum apposita & competenti ligatura. Subuenit præterea in reijculis detritis similibus, ceu traditum est, cuticulis haud parum, mel ad concretionem usq; emplastri elixum, & superinductum. Satius uero fuerit si postquam in linteolum impactum sit, spargatur per cribrum sublime leuatum pulueris specie myrrha, uel aloë, uel thus, uel pariter omnia. Expertus uero ipse sum, tenue centaurium præcipuæ & admirandæ opis esse in hac re præsidium: proximæ uero est symphytum: ab hoc tertium bonitatis locū habet Illyricæ iridis radix: post quæ eruaceam comperi farinam cū primis
 20 utilem. Atqui secundum decoctionem nonnunquā inserimus ipsa melli, quando uidelicet auferendus est ab igne cacabus: prestantius uero etiam post sublationem, deinde mouere dum tepidum fiat, sinuiq; ipsum imponere, atq; perinde ut tradidimus, alligare.

De fistula. Cap. XLIX

Istula sinus est in callū induratus, ex abscessibus plerumq; constans, sumpta per translationem ab harundinū fistulis appellatione. Quare si ad os usq; syrinx penetrat, curari hanc absq; manu chirurgica impossibile est, nisi diuturnitate sua sponte squama uel os abscedat. At si nō terminetur in osse, medicamentis callum
 30 auferētib; & cōglutinātib; curabitur: Sunt igitur ecstylotica, hoc est *ἐκὺλωτικά.* callum abducentia huiusmodi: spondylii radix circumrasa & imposita, fistularū callos amouet: Veratrū item nigrū fistulis impositum in duobus tribusue diebus callū expungit, amurca cocta & offusa: Sory crudū uel tostū, cum exiguo cramate, quod est uino immodice diluto, infusum: So- *Κράμα.*
 ry quoq; & crocomagma cum hydromelite: Aut elateriū resina terebinthina excipiens collyria formato & superinducto: Aut laserpitij radices cremorem infundito. Liquefacit præterea nō nihil illud: Aeruginis drachmas duodecim, guttæ ammoniacæ drachmas duas aceto excipe, proderit id quidem longo tempore.

40 Collyrium cuius usus est ad eruncationem calli fistularum.

Callū fistularū aufert collyrium constans ex guttæ ammoniacæ thymiamatis, atramenti sutorij, rubiginis, misyos, chalcitidis, cōmeos, æquis portionibus, exceptis aceto. Aliud ex Heliodoro chirurgo:

Cadmiae terre, misyos atramenti sutorij, æris cremati, cômêds, singulorum drachmas quatuor, chalcitidis crudæ drachmas treis, lotio pueri impubis excipito, & redige in collyria: imponendo uero collyriū in fistulam, foris applicato panis uiscera aqua macerata, mutās ac renouans subinde, tantisper dum pituita fiat, & crusta exciderit.

Aliud collyrium, quod ab Alexandro sumpsit.

ANchusæ radicū, misyos tosti, chalcitidis, eruginis, aluminis fissi, atramenti sutorij, aloës, uniuscuiusq; unciam unam; cantharidas quinque aceto eliquādo pange collyria. Aliud: Atramenti sutorij drachmas duas, chalciteos, rubiginis, singulorum drachmā unam excipito gummi, & utere. Verum ubi callum discusserit, rubigine tosto cum mulsi purissimi octuplo repurga, affabre faciens collyria. Cæterum callo iam proseripto remedijs carne implentibus utendū. Collyrium sarcoticum, id est sinus ac fistulas carne explens: Aloës, myrrhæ, guttæ ammoniacæ, ouiorū testarū crematarū, cineris, æquas partes aqua soluas, facitoq; collyria, & applicato. Aliud: Myrrhæ, aloës, thuris, corticum mali granati, portiones quantitatis eiusdem aqua excipito: sunt qui felle taurino excipiant. Carnibus uero etiā omphacium (qui ex uuis acerbis expressus cremor est) offundūt. Nouimus ipsi quempiā qui cedrio liquore fistulas inundabat, & uoti compos subinde factus, admirandus habebatur. Postquā autē fistula carne expletur, medicamentum conglutinandi potentia præditū, est adhibendū, ei consimile omnino, quem in alijs sinibus explicui modo. Sed quā angusta pariter & oblonga fuerit fistula, inquit Galenus, & non appareret mihi completi intra se callum, uerum sordes & immunditiem duntaxat insidere, ante omnia lixiuium immisi, deinde in fistula tandiu continui, dum sorditiem uniuersam radicibus profligatā iam emanasse sperabam: post hæc pharmacum imposui: super illud uero rhicininum oleum, de quo superius egimus.

De ruptis. Cap. I.



HUic Vicerū uero nōnulla cicatrice obducta, postea tempore haud ita multo interiecto denuo inflammantur, rursumq; sua sponte & per se à cōtinuitate sua discedunt: Osse etenim quopiam male affecto, caro quidē quæ superiacet facile in cicatricē contrahitur, atq; sana, ad unguemq; restituta uidetur: Rursum uero ualenter influente ex corrupto sensim in altitudine osse, inflammatio cum purulentia cicatricē lacerans & effringens superuenit. Quæ ergo curatio istiusmodi, qua hulcera tantopere arefacias, ut os languens abscedat? Quocirca prompte quidem ossium interstitia uel papaueris syluestris, uel arboris ficus folijs leuigatis cum tenuissimo hordeaceæ farinae stosculo, & uino cataplasmate factō, curabis: Vel alterci (quem græce hyoscyanū dicunt) semini, uel atramentū sutorium æquis portionibus cōterens: Peucedanig radix ossium lamas breui remouet & abscindit.

De hulo.

De h ulceribus articulorum. Cap. LI



Ra iculi sicciore s carnofarum fun t partium , cuius ergò quum h ulceribus impetuntur , aridioribus egent pharmacis . Pa st il lus igitur polyidæ cum uino tan ti s per dum strigenti balneo rum constitutionem ac crassitudinem induat , contritus , ma gnifice opitulatur : Pa ri quoq; modo siccifica medicamina , & aqua insu per marinam , & muriam , sæpius maiore cum utilitate conspeximus id ge nus h ulceribus imposita . Utendū itaque in articulis etiam ijs , quæ ma iore efficacia ac uiribus arefaciunt .

10 Quæ paxillos , & tela , spinasq; , & alia innumera corpore fixa extrahunt. Cap. LII



Ela , spicula , culmos , surculos , præterea & spinas , atq; alia id ge nus quæ corpori fixa inhærent , educunt quidem & euellunt anagallides duæ , aristolochia rotunda , gutta ammoniacæ cum melle , herbæ apollinaris fructus leuigatus , & cataplasmatis modo impositus . Harundinis porro radicem contunde , melliq; confun de , & in linteū impingendo proluxe ac liberaliter imposito , & celerrime sanè quicquid infixum est corpori , extrahit .

De sanguinis eruptione , cum è uena tum ex arteria. Cap. LIII



30 Vando corporis humani aliquod profusa sanguinis effusione (quod mali αἱμορραγία Græci appellant) membrum laborat , sinibus contraria planè medendi forma competit : hæc uero anarrhapos est , atqui hoc ipsum etiam intra modum fieri ex pedit : periculū nanq; ne dolorem inferat , & cum impetu denuo sanguis è uase erumpat : Nihil enim uero quicquam dolore uehementius , grati dem sanguinis eruptionem concitabit , inflammationesq; adaugebit . Sed quod ad opem ferendam attinet , sanguine hoc modo ex membris profliente , confestim digitum in h ulceris circa uasa osculū immitte , blan 40 de quidem & clementer innitēs & suffulciens , digitisq; tam suspensis ne quem dolorem inferas , reprimens : pariter enim sanguinem cohibebis , & grumum in pusillos globulos concretum adglutinabis , atq; constabi libis in uulnere . Profectò si uena sanguinē effundens densa lateat altitu dine , exactiore diligentia obseruabis , atq; perdisces cum positū ipsius , tum quantitatem , & uenæ ne sit an arteria : post hæc uero uase existente angusto & exiguo , eorum aliquo quæ sanguinem supprimunt utendum . Bonitate uero reliqua omnia post se relinquunt , ea quæ emplastri modo inducuntur composita , tum ex resina fricta , tum farinæ triticeæ puluere , & quæcunq; id genus , oui albore friata & eliquata , atq; leporinis cum pl 40 lis imposita . Spacioso autem & capaci uasculo existente , hamulo transi ge conceptaculum , non tam extendendo quàm circumuertendo medio criter . Suppresso uero sanguine , si quidem uena fuerit , tum citra laqueum sanguinem mittere tentato , eisdem ipsis medicaminibus : Sin arteria , è

duobus alterum, uel laqueū circumponens, uel totum intercicens conceptaculum, cohibebis sanguinis effusionem. Laqueos uero quandoq; magnis etiam uenis circumponere cogimur, quemadmodum & disseccare interdū totas nempe transuerfas. In hanc necessitatem deuenies in his uenis, quæ rectæ ueniunt è profundiore corporis loco, præsertim in angustia loci, ubi uena sita est, uel in principibus membris: Sic enim uellet ad se utraq; sectæ uenæ pars utrinq; & confodit̃ tegiturq; à corporibus adiacentibus uulneratio. Tutius uero fuerit utrinq; sacre, laqueū quidem uas radici circumponere: secare uero deinceps. Hæc ubi perpetrata sunt, uulnus quamprimū fieri potest, carne expleto, priusq; consumat̃ & dissoluatur conceptaculi uinculū. Quod si ocys quidē carne impleat̃, locus uero alibi uacuus offendit̃, malum quod Græci *αὐλὴν*, id est dilatationem nominant, oboritur. Perpendes aut̃ & discernes uenā ne an arteria sit, unde sanguis promanat: Arteriæ namq; sanguis gilui flauiq; coloris magis & tenuior esse consueuit, & cum pulsibus multis exhauritur. Venæ autem sanguis atrior & sine pulsu existit. Omnium igitur quæ scimus medicamentorū carne implentium probatissimum est, quo aduersus etiam sanguinis eruptiones meningarum (quem cerebri panniculum Piam matrem uulgò appellant) sine omni perniciæ metu, & securissime utitor, & aduersus ceruicis uulnerationes, necnon ad iugulares usq; pertinentes; nam harum quoq; re uera nullo adhibito funiculo sanguinem compefcit. Accipit autem id de quo agimus amuletum, thuris libanotiue pinguißimi partem unam, aloës, in delicatioribus tenellisq; corporibus medimnū dimidiatum: In durioribus uero tantundem, & thuris præterea loco, mannæ æquale pondus, oui albugine etiam illud conterito & liquefacto, tantisper dum mellis formam crassitudinemq; induat, tum denique leporinis pilis mollioribus excipiat̃, inde uasculo & hulceri uniuerso imponatur. Alligetur autem foris ex uelamine lineo: prima porrò applicamenta quatuor aut quinque uasculo unde sanguis erumpit diligenter alligando: inde uero in radicem ipsius distribuito: posterius aut̃ die uidelicet tertio soluito, si quidem asq; periculo hulceri etiamdū adhæreat pharimacum: rursus alterū in orbem circumfundens & tanq; cōmadefaciens denuo alligato. Quod si primū linamentū conceptum sua sponte & per se resilit respuiturq; leuiter summis digitis cōceptaculi radicē premendo, ne quid influat, illud quidē sensim detrahe, sed applica alterū, atq; ad hūc modū usq; opem ferre pergito, donec carne expleatur conceptaculū sine molestia perpetuò in sublimi erecto schemate obseruato. Cæterum crustas adglutinantia glabriorem efficiunt partem, quā secundum naturalem constitutionem fuerit delapsa crustula. Plerosq; uero hæmorrhagia difficulter compefcibilis secuta in crustarum decidentis: utendum tamen etiam illis, quum urget necessitas ingens. Ipsa autem res quammaxime poscet remediorum usum quæ crustam inducendi uim habeant: cauteriorū item candentium, quādo uidelicet ex erosionē cariosa marcorisq; formam

formā præferente sanguinis prouenit eruptio. Atq; enim uero postquam in id genus affectibus totum absciderimus marcidum, minore cum discrimine uel deurere ipsam ueluti radicē, uel remedijs incrustandi naturam tenentibus utilicet, id uero in uerendis & ano potissime solet cōtingere. Scopus uero crustantiū est cum stipticitate caliditas, perinde atq; cerne-
 re est in chalcitide, misyri, & atramento sutorio. Sed quæ ē calce uiua con-
 stant, uehementiora quidem sunt: sed quoniam cōstringendi uirtute calx destituitur, crustæ citius ipso forū applicatione decidunt: præstaret autem ut manerēt: anticipant enim præcoci casu carnis in fundo excrecentiam
 10 & tanquam operculi uasis creationem. Cæterum eiusmodi hæmorrhagiam ilatis satiaua inaspera eximie compescit, uel gallæ tostæ: expedit aut ipsas candentes aceto uel uino extinguere. Porro sanguinis eruptiones omnino supprimunt, incōposita quidem, aloë, thus, manna, samius aster, ærugo ferri, & lanæ crematæ: Consimili etiam modo leuigatissimus cinis, sterqus asini, & equi pusillum, malicoria, diphryges, galla, myrtus arida, alumen omne genus, tum crudum tum etiam combustum, resina fricta, uitis cortex, uel folia arida platanorum, galbulorum puluis, præsertim quum humorem concretum abiecerint. Priuatim uero ac proprie
 20 narium sanguinis profluuia impositu sistunt, iunci marini (quem græce oxyshenum uocant) fructus, foliorum urticæ cremor, chalcitis, solastrū deustum, capilli leporis, ferulæ dimidium crematum cum aceto, onia arida uel uida, succus porri cum thure elychnio exceptus. Hactenus simplicia. Composita autem cuiusuis sanguinis profluij remedia hæc sunt: Spongiam recentem liquida pice immergens, & in aulula cum bitumine circūquaq; obturata combure, cineris uero medimnos duos immittens, admisce plumbi medimnum unum, & stibij medimnum unum. Aliud: Thuris, mannæ, sulphuris uiui æquas partes inferere. Aliud: Chalcitidis drachmæ octo, thuris, uel mannæ drach. sedecim, resine frictæ drachmæ octo, gypsi deusti tantundem. Escharoticum ischæma, hoc est
 30 crustas ducendo sanguinem compescens: Accipe chalcitidis, æris tosti, atramenti sutorij, misyos assati partes æquales. Præterea Rhodia cognomento compositio, necnon & ipsa Xantha, è numero præstantium medicamentorum quæ sanguinem sedant, censentur.

De neruis saucijs. Cap. LIIII



Nerui saucijs uel stimulatī inflammationem doloremq; immensum excitant, propter immodicam, qua præditi natura sunt, sensa-
 tionem. Proinde febres quoq; & cōuulsiones ita affectos cor-
 ripiunt: nonnullos uero deliria inuadunt, propter neruorum
 ad cerebrum continuitatem. Verum quandoq; etiam in alijs quibusdam
 40 locis percussī membri phlegmonæ & apostemata oriri assolent secun-
 dum neruum percussū, ob perpetuitatem ipsius: Cutis itaque uulnus
 nullo glutine cōmissum, diductum patensq; seruandū est, quo per ipsum
 ichores sine impedimento defluant. Atqui in compunctionibus, si latere

uidentur nerui, duplici sectione & decussi se secante opus est. Sed quod ad opis ferendae attinet iudicium, ante omnia quidem, si corpus humoribus redundarit, inflammatioque magna affuerit, à sanguinis per uenam detractione medendi inchoanda est ratio. Quod si prauis corpus affluxu re nimis uideatur succis, deiectionis usus cum primis commendatur. Præsidia autem uulneri adhibeantur, quæ dolorem placandi sedandique uiribus polleant, & effluxionem aperiendo promoueant, præsertim si deficit sectio. Aquâ proinde calidâ cæteris quidem inflammationibus perquam idoneam ac utilem, scito his esse quæ infestam: satius ergo oleum partibus suis tenue, nulla stipticandæ uel præditum aspergere sensu feruidû: Neque profecto algidum, neque etiam tepidum his est admodum exitiosum. Cæterum ex medicamentis resina terebinthina accommodatissima est per se, cum pueris, tum sceminis & carne teneriore molliculaque præditis: eliquata uero cum euphorbio in carne durioribus: Et si quando duriora obuerint corpora, cum oleo quoque tenuium partium macerata. Cataplasmatibus insuper, inflammatis & marcescentibus neruis utendum. Hordeaceam præterea farinam, aut fabaceam aut eruaceam coquendo in lixiuio stacte cum oxymelite: Sine coctura uero in puncturis etiam cerotâ eiusmodi adhibe: ceræ uncias treis, euphorbij unciam unam, uel stercus columbinum: in durioribus carne corporibus olei uncias duas, & resinae terebinthinæ nonnunquam unciam unam. Emplastri uero instar remedium præparans, in euphorbij unciam unam, ceræ, resinae frictæ, olei & picis pinguis, singulorum uncias sex infice: uerum resinae loco propolim (quæ est uiscida in aluearibus apium materies sordesque, quibus quasi fundamenta operis instituunt) pinguis immittens præstantius effeceris. Ad compunctos præterea neruos illud excellens ac præsens est subsidium, conferens etiam ictibus rabidorum: habet aceti sextam unam, picis pinguis libram unam, opopanax uncias tres: Opopanax solue in aceto, ampliusque leuigato, & picem eliquans decoquito: Hoc neruorum puncturis expedienti est præsidio, non permittens punctiois os conuulere, ueluti neque rabiosorum morsuum huius cicatricem ducere: sed duris duntaxat prodest corporibus: Quod si in pueris, aut mollioris earumculæ hominibus punctis uti uelis arido, liquefaciendum est aliquo discutiiente ipsum & discutiiente medicamento: Verbi causa, amaracino, uel opobalsamo, uel oleo uetere: Cõuenit etiam Basilicū pharmacū assumens nitrum, aut calcem uiuam, aut euphorbium, aut sulphur igne intactum, aut siluestris palumbi fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut succum Cyrenaicū, aut castorium: In libram uero medicaminis, dictorum aliquius unciam unam inficito: Conducit autem ad neruos percussos optime, atque in primis compunctos. Poterit autem quispiam rurî, nullo horum ad manum parandique copia existente, propolim recentem & pinguem uulneri imponere, uel fermentum, præsertim antiquum cum per se, tum propoli admixtū, uel unā cum succo cithymalli. Cataplasmatibus præterea his

Puncturæ neruorum remedia.

his ex oxymelite, uel stactes lixiuio, cum farina fabacea, aut eruiua, aut ciceris, aut lupinorum amarorum, aut hordei, uel tenuissimo denique farinae polline non solum in iam inflammatis, uerum ab ipso confestim initio, uitor. Cataplasmata uero relaxantia, quæ χαλαστικά à Græcis appellantur, in neruorum percussorum curatione semper facestant ac ualeant. Quod si non puncto neruus, sed euidente sectione laucietur, ita ut circumfusa etiam pelle diuisa, neruus nudus & rectus appareat, minime autem oblique diuisus, prædictorum ex euphorbio atque alio tantæ acridinis medicamine nullo utaris: nudatus quandoquidem neruus non feret uehementiorem ipsorum uiolentiam. Calcem itaque, adhibe ablutam, iterum atque iterum tempore calido liberaliore oleo irrigatam. Uilis uero & confectio est ex pompholyge, necnon compositio ex melle contexta, in rosaceo multo eliquata: neque uel tantillū quod uellicet uulnerationem attingat: quoniam plurimum sub sensum uenit neruus, & est temperatura frigidus ac cōtinuus maxime principi membro. Enimuero ne oleo quidem id genus hulceris aspergendum est, squaleret enim sordetque: lanies ergo tantum abstergito, lana molliore hypalipro implicato atque inuoluto. Omnibus uero ex animi sententia succedentibus, citra periculum datur Siderei passo madefacere. Atqui in fortioribus, polyidæ etiam passillo cum calido linamento discerpto ac infecto utere. Posthæc autem neruum denudatum contege: linteola item discerpta quæ ulcere conduntur foris adhibenda sunt, aliquo eorū quæ ad angusta uulnera cōducunt adiecto: uerbi causa, medicamine ex euphorbio aut eo quod confectū est ex stercore columbino plurimū etiam salubrium paruum amplectentibus. Vulneratio uero si obliqua sit, maiore quidem cum periculo operitur: Hæc itaque, atque similia ad curationem neruorum attinent. Atqui in uulneratione etiam dum recente, confusionibus quidam usi sunt, & glutinantibus quibusdam medicamentis. Verum caue nimium propere in superficie cōmissiones admittas ne altitudo ac uulneris interna inglutinata permanent, sed profundiora quidem obseruans denuo neruum acu stimulat. Scire, uero omnino in neruis percussis oportet, quod medela puncturis subueniens, calidior existens, non potest nerui hiatus sanare: uellicatio nem enim ipsarum atque phlogosim, id est inflammationem non sustinent. Neque præterea quicquid medicamenti diductionibus subuenit, punctio nibus statim cōgruit: quoniam uis eius ne utique in intima fundūque penetrat, arctā admodū cutis à cōtinuitate sua diuisione cōsistente. Sed quod ad uetus rationē attinet: Nutricatus tenuis esto, culcitra mollis, calidoque utatur oleo in axillis, capite, & ceruice. Si crus, inguina fumen, & finitima loca uulneratio impetat, ualeant omnino lauacra, usque ad inflammationis relationē, infecto illis & incōmodo aquæ, ut diximus, attractu. Quoniam autem nonnulli propter solennem lauandi consuetudinem, lauacris abstinere non sustinent: si quidem membrū uulneratū, fuerit manus, danda est opera pro uirili cuiusque, ne hæc aqua uel calida & multo minus gelida mada-

*Neruum seu
sano maxime.*

*Dietā in uulne
ratione uerū.*

Nervi pedis
uulnerati cu-
rati.

fiat. Sin pedem angat uulneratio, quum fieri nequeat ut non irrigetur aut humectetur qui lauare omnino uoluerit, fauciae pedis parti cum aliquo medicamine imbutum imponat emplastrum: foris insuper multiplicatis linteis quā plurimis oleo madidatis muniat & operiat: in posterū extrinsecus uinculū ē linteo inficiat: atq; posthāc rursum in balneo ligamentū oleo perfunde iamiam secundū neruū uulnerato in solum descendente: ubi lauerit aut, cuncta quidē quae adiacent porrice. Vtere praeterea praescripta totius curationis institutione & regula. Si uero neruus solū pressus quassusq; fuerit unā quidem cum cute, ita ut exhulceret, appositū fuerit remediū ex farina fabacea, & oxymelite cataplasma. Licet etiam inter
10 dum erui farinā & ireos, cōcussioni doloris mitigandi gratia admo-
picem liquidā miscendo: Sin cutis pressa quassaq; nō sit, distrahendi sum-
mam facultatem habet, calido oleo conspergi & foueri perpetuō, anethi-
no inquam, aut rutaceo, aut irino, aut amaracino. Neruo autem uniuers-
so dissecto, discriminis quidem nihil incumbit, sed membrum succendi-
tur: curatio uero compar alijs h ulceribus adhibeatur. Haecenus qui-
dem de omni neruorum fauciorum, quae simplicioribus adminiculis per-
agitur, curatione sufficiat. Neq; tamen defunt, qui polysyntheticis uti in ita
afflictis consueuerunt, qualia sunt, ē metallicis confectum pharmacum,
emplastra cognomento Barbara, & cissinum, hoc est ex hedera, & quod
20 fit ex irigeronte, necnon melanchlorū, ipsaq; Indica harmonia, & Athe-
na: quorum compositiones utendiq; rationem ultimo reperiēs uolumi-
ne. Quoniam autem locupletissimi quidam sumptuosos preciososq; in ner-
uorum uulneratione medicaminibus uti dignantur, Galenus ad punctio-
nes neruorū huiusmodi tradidit: Cinnamomi, dictamni, sceniculi, unius-
cuiusq; unciam unam, maioranae uncias duas, cerae uncias octo, opobal-
sami uncias decem, resinae terebinthinā unciam unam. Aliud: Acci-
piantur, succi Cyrenaici uncia una, cerae unciae tres, succi balsami unciae
duodecim. Cæterum ad neruos denudatos illud: Cerae aromata-
30 riae uncie fumantur (inquit) tres, unguenti Spicati aut Phuliat, uel Nardi
unciae duodecim, pompholygosq; uncia una, spicae nardi, amomi, solij,
singulorum uncia una. Atque haec quidem sunt ijs qui opibus pollent,
ostensa à Galeno remedia.

Stodis neruis
remē dicitur.

De curatione neruorum, quam Angylosim dicunt.

Cap. LV



Neylas & ancylofes nuncupare solent articulorum detentio-
nes, originem ad densitatem obstructionemq; uel nerualē
quāpiam extensionem referentes: In quibus emolliendi &
relaxandi uiribus praeditis medicaminibus opus est. Com-
muniter tanē his ea quae in membris scirrho infestatis, adhuc uero magis
ea quae de dissolutis enumerata sunt partibus, succurrunt. Priuatim ue-
40 ro & peculiarius multo confert per hydrelaū aspersio, in quo cocta sunt
semen lini, fenogræcum, althæa, laurus, cucumeris syluestris radix: &
sic cucumerinum oleum post asperionem adhibeatur ita affectis: acopa
quidem

quidem primum simpliciora, ueluti sunt medicamentum ex alno, item il-
 lud ex abiete, & bromium, & Basilij, & Pyxis: post quæ etiam Aristo-
 phanium, & Azaniti. Vehementissima uero sunt, quod Lisoponium
 appellatur medicamentum, & ex his quæ emplastri formam habent reme-
 dia non modo Amythaonis, sed & Anicetus. Probatissimum uero illud:
 Bdellij, adipis uitulini, guttæ ammoniacæ thymiamatis, ireos Illyricæ,
 singulorū drachmæ sedecim, opopanacis, galbani, hordei, styracis, thu-
 ris, uniuscuiusq; drachmæ octo, piperis grana centum & sexaginta, ce-
 ræ libra dimidia, resinæ terebinthinæ tantundem, fecis irini quantum
 10 satis est, uini quod sufficit: incisum & contusum est medicamentum. Pro-
 batur etiam acoptum permixtum irino, uel cyprino, uel laurino. Inter aco-
 pa uero & emplastra numerantur *ἑλκυστῆρας*, polymagmatum. Cæterum
 acoporum usus cum molli & constanti frictione fiat, languentis mem-
 bri leui pericitatione, tum curuatura tum extensione.

De flaccescentibus luxatisq; artubus.

Cap. LVI.

IN diuturnis quæ cum febre sunt morbis, & in colicis paraly-
 ticisq; ægitudinibus articuli sæpenumero flaccescunt, uiri-
 busq; omnibus destituuntur: calidiore plerumq; & humidio-
 re eisdem à iusto modo intemperie occupante: hinc utiq; etiā
 20 motio impeditur. Quibus acaciæ cremor aque inditus, & fouendi gratia
 aspersus congruit: uel rubi, uel myrti, uel lentisci, uel ulmi radicum corti-
 cis elixatio: uel malicoria cataplasmatibus modo impacta: uel myrti folia unā
 cum cerota myrtea imposita. Robur quippe neruorum nexibus est indu-
 cendum, cum stipandi & arefaciendi uirtute prædita materia. Huius ita-
 que farinæ artubus medicamenta sunt adhibenda, cuiusmodi est *ἑλκυστῆρας*
 appellatū, quod salices contineat & oxyra, & phœnicina quæ uino astrin-
 gente uel a ceto constet. Permulti uero ex algore & frigedine istiusmodi
 languorem imbecillitatemq; oriri autumantes, calidioribus usi admini-
 culis, detrimentum multo acerbius intulerunt.

De lumbricis. Cap. LVII.

Res sunt in summa lumbricorū differentiæ: una quidem quæ
 tereti & rotunda forma est secundū crassitudinem: altera ue-
 ro, quos lumbricos latos nominant: tertia, quos Græci ascaris
 das nuncupant. Omnium uero eiusmodi uentris animalium
 species, caussa & origo est, cruda & crassa pituitosaq; materia, & putrefa-
 ctio huic functioni idonea est, cuiusmodi in pueris colligitur, & in alijs
 pariter ætatibus, his scilicet qui ultra satietatem auide sese ingurgiant:
 uerum nunquam à calida & acri, uel melancholica materia: nam hæc nu-
 trican-
 30 tricandi naturam supergressa ad lumbricorum constituendam originem
 inepta est & prorsus inaccommoda, imò uero etiam contraria, corrum-
 punt enim hos biliosa præsertim excrementa. Quod si aliquando unā
 cum lumbricis flaua bilis eijciatur, siue per inferna, siue etiam per uomitio-
 nes, in intestinis scito cōsistere: biliosum uero humorē, uel in ore uentris,

*Tria uentris
animaliū ge-
nera.*

*Lumbricorū
caussa.*

uel in alio quopiam membro hærere. Singulorum itaq; differentiarum species ortumq; explicabimus, locum item & notas, curationemq; principium à tereti & rotunda sumentes.

De lumbricis teretibus ac rotundis.

Lumbrici igitur uentris rotundi formā nemini mortalium obscuram cōtinent, quoniam hi quā alij copiosius abundant: in gracilibus uero intestinis plerumq; consistunt, & in superiorem uentriculum progrediuntur: proinde per os non raro eijciuntur: nonnulli uero per nares huiusmodi animalia uentris eiecta sunt. Quod quidē uermium genus infantibus quā alijs ætatibus peculiariter magis quotidianum, & magna quidem ex parte cum febre est. Verum si circa febrium principia proniant, substantiā ex discrimine subiecto obtinēt: Circa summos uero uigores, ex malitioso putridoq; morbo. Circa autem relaxationē febrium scaturiunt lumbrici rotundi ex omnium in melius mutatione. Afferit namque Hippocrates, bonum esse ac utile lumbricos etiam rotundos in euntis ægrimonīæ iudicatorium progredi, sed hi ocysime pereunt. Accidit uero plerumq; cunctis lumbricos teretes habentibus, uellicatio intestinorum, & uentris, & tusses non magnæ, aridæ, & irritantes: quibusdam uero etiam singultus, somniq; cum tremore, & irrationabilibus stultisq; ex somno resurrectionibus: Nonnulli cum uociferatione exurgunt & profiliunt, sed rursus desciunt, & in soporem prosteruntur. Pulsus inordinati, & augentur febres nullo ordine errantes, cum magno articulorū algore, quæ per tertiam quartam uel diei noctis uel partem hominē temere inuadūt: Puerulis uero & grandioribus natu, cum prominēte lingua exhausta: stridor sit dentium, oculi cōniuent, silentium amant, & excitantibus indignantur, stomachantur, oculiq; apparent, & suffunduntur malæ rubore, atq; rursus mutato colore liuescunt: Breui uero hæc & ex interuallis fiunt: quorundā uero stomachū petentes, nauscarū & uellicationū autores sunt: cibum ad hæc laborantes auersantur, coacti uero nauscentes, uix deglutiant, oblatumq; ac sumptum alimentū euomunt: Non paucis uero uenter etiam desicitur cum esculentorū corruptione, atq; tympani instar inflatur. Reliquum uero corpus præter rationem liquefit & tabescit, neq; fame præscripta, neq; ulla euacuatione immoderata admissa. Cæterum non in omnibus prædicta sunt singulatim inquirenda indicia, sed quæ principatum tenent: aliquando uero plurima. At hæc animalibus sese in intestinis circūuolentibus rotantibusq; & mordentibus deniq; solent accidere, & febrili ardore uapores ad cerebrū ferente prauos, ex coaceruato in uentre putrido humore natos: in quibus partim quidem utrisq; iuxta cum febre tum lumbricis prospiciendum est: partim uero febrim haud magnopere curantes, prorsus expelli uentris animalia cōueniet: Pleriq; etenim quū negligerent, corrosi ab ipsidem conuulsiq; extincti sunt. Neq; uero desunt, qui asserunt se uidisse per inguina languentis lumbricos prorepisse. Præstat igit ipsos expellere; expelles aut si prius enecaueris

Teretium lumbricorum nota.

Præcipue lumbricorum cura expulsio.

enecaueris: enecantur autem medicaminibus maxime amaris. Cōmuni
 igitur quartanæ febris curatione & animalium uentris existente, expe-
 dient sanè præsidia simpliciora. Mixaria igitur decocta sic habentibus
 uel potui uel esui offerenda: exhibendus item succus sereos, coriandriue
 seu coriani semen, cum exigua aqua calida contritum, siue cum posca: uel
 auriculæ muris herbæ decoctum, uel cornu ceruini ramentum, uel etiam
 rubrica sinopis leuigatissima: olei præterea ex nondū maturis oliuis ex-
 pressi amari cochliaria duo paulatim absorbeantur, amarulentia nancq;
 lumbricos abigunt, lubricitate uero ipsos unā cum oletulo expellunt. In
 10 inflammatione uero distentioneq; uiscerum exuperante, ē semine lini & fa-
 rina lupinorum, absinthij item & bryoniæ radice utendū cataplasmate
 ex hydromelite, uel aspergine cum oleo chamæmelino, uino, fructuq; ab-
 sinthij, uel aloë secundū præcordia aspersa. Verum ne febres uehemen-
 ter fatigent atq; perturbent, miscenda est mixarijs menta, atq; præben-
 da. In apyrexia uero febrē ue iam decedente etiam efficaciora, uerbī caus-
 sa, serphi decoctum, uel nepitę, uel filicis, uel semen cardamomi, uel mali
 Punici acidi radice ad tertias decoctum, uel fricti cymini, & nitri, tritici,
 uniuscuiusq; diobolos treis, uel sandonicū uel abrotonū, uel utrunq; unā
 cum melle catapotijs factis, uel lupinorū amarorū dioboli tres, aut bras-
 20 sicę, aut eruçæ semen contritum, uel absinthium, quod unum sæpius sa-
 tis profuit. Exhibendi insuper aloës lotæ pondo dioboli tres, id quod
 ex his quæ in primis probantur medicamentis est unum, in his uideli-
 cet quibus roboris plus & spaciosior corporis moles consistit. Quoniam
 autem pueri aloën non admittunt, instrumento quo os diuarcatur, supi-
 nis ipsis uiolenter seruatis, os diducentes, per clysteridium quodpiam fi-
 stulam non fragilē continens, inuitis ijsdem q̃ possumus maxime aloën
 interius inserentes inficiamus: quæ quidē admiranda est methodus pue-
 rorum moleste aloën ferentium, quibus sorbilia sæpe etiam numero ali-
 menta eo modo cibum stomacho respuente infundimus: Et Cyphi confe-
 30 ctio, necnon masuarium pulchre & utiliter adhibeatur: Cornu item cer-
 uinum deustum, adiecto pipere cum melle uel oxymelite, & reliqua quo-
 que tentanda experiendaq; in ipsis sunt. Præstat uero plusculum, si scilli-
 ticum acetum fuerit, præsertim in adultioribus: uel sinapi, cum olei & ace-
 ti cochliarij quantitate. Cæterum quibus lumbricorum culpa fluore al-
 uis perturbatur, his succus plantaginis propinandus est: uel ipsa etiā ari-
 da exhibenda est plantago, iuxta nancq; & ex æquo utriq; suppetias cum
 defluxioni ipsius alui, tum infestantibus lumbricis contulerit. Catapla-
 smatis præterea modo ita habentibus adglutinanda sunt, polenta hordea-
 cea, filix, absinthium, farina lupinorum, sandonicum & abrotonum: iam
 40 uero malicoria quoq; acacia, galla, balaustiumq; admisceantur. Quoniam
 uero sæpe potionibus amaris offenduntur aliqui, ea sanè quæ iam pridem
 enumerauimus, haud euidenter sed remissius amara exhibe. Adhæc etiam
 chamæpityn, marrubiū, enulā campanā, daphnoloccū, baccas ue lauri,

Porinfeca libri
corii curatio.

casiam, thymum, pulegium, carpesium, cyperum, polypodium, irin, cni- cum, rubiam passiuam, acanthum Aegyptium cum pipere, æquis portio- nibus pondo diobolorū sex, uel decoctum (quod ἀναξίμης græce uocant) mētē, uel radices mori cremorē, uel elixationē petroselini, et id genus alia fragrantia semina: Extrinsecus aloē cum melino uinoq; adhibeto: hoc utiq; et appetitum excitat summo admodū studio affectatū. Admiscenda porrò non raro aloē, absinthium: uel felle taurino umbilicum additis ali- quibus amaris enumeratis impleto: seu oleum rhododaphnes ubertim illiniendum: uel cedrius liquor per se, aut cum cerota uniuerso uentri, uel pix arida trita & leuigata inspargenda: uel mentam, aut melanthium cum 10 rosaceo adhibe: uel laserpiij quoque decoctum ita affectis miscendum: malūe Persici folia contrita & soluta cataplasmatibus instar imponamus. Iam uero medulla quoq; ceruina unguinis modo utendum, cum circa um- bilicum, tum secundum abdomen & inum uentrem, tum etiam lumbos. Cerotā insuper, si res ipsa poscere uidebit, applicabimus: Accipe aloēs, absinthij, farinæ lupinorum, seriphi, nigellæ, quod melanthion græ- ce uocant, uniuscuiusq; diobolos sex, ceræ unciam unam & dimidiatam, chamæmelini quantū satis est, bilem taurinam, leuigato quæ sunt arida. Mulsum porrò crebrius id genus lumbricos habētibus est immittendū, ut dulcore mellis inescata eadem uentris animantia, subducant per infer- 20 na: Atqui si iam putruerint in profundo, non excernentur, sed euapora- tiones potius machinentur: Sunt uero uel aloē, uel ex hac medicamento peramaro sumpto subducendi: quandoquidem alioquin etiam ipsis neu- tiquam inutilis est mediocris per hypalātū delectio.

De tæneis seu lumbricis latis.

L Atitudo tæniæ uentris est, ut ita dicam, adnatæ in interiore intestino membranæ, in materiam animalis permutatio, quæ identidem excer- nitur etiam tota, incredibili sua amplitudine, uisu horrendum exhibens spectaculum, uel pars eius modò aliqua redditur: dissoluta quidem non consistit, sed redundat, quandoq; sanè in non febrientibus: Cæterum se- 30 bricitantibus quoq; per diuturnas egritudines accidit, uellicationes ad- iacentis stomachi inferens, & à cibis auersionem appetitus inducens, ali- menti q; in cōtinentiam, uiuificatū etenim in intestinis animal: nutrimen- tum rapit, & consumit assumptum, ita ut confestim altero opus habeat: quod si sumere quis superfederit, lancinat intestina. Accedit autē his & ceu umbra comitatur corpus strigosum & male habitum, imbecillitasq; cum inæqualitate turbaq; corporis. Infallibile aut ac certissimū indicium, si cum stercoribus simul excernant quædā semini cucurbitæ similia. Sed in curatione omnium ore probantur propinationes acrium, & aliorū elus, Græci σκαρποφαγίων uocant: & filicis uel centaurij decoctio cum hausta, 40 tum etiā enemate immissa: aut nepitæ, uel dictamni, pulegij ue. Infunden- da est insuper his interdum muria. Propinato etiam illud, quod neq; his qui alijs lumbricis conturbant inutile, potissime si liberi à febre fuerint: nitri

nigri rubei, piperis, cardamomi, portiones æquales, exhibentur cōmode una vice dioboli tres in uino aquæ calida. Alius linctus: Suman- tur piperis, baccarū lauri purgatarū, cymini Aethiopici, mastiches, par- tes cōpares, mellis quantū satis est, cuius iusta præbitio est cochliarium unum, non tam mane, quàm demittendo iam membra grabato. Quod si idiplum efficacius reddere uolueris, nitri quoq; rufi tantundem adijce. Aliter: Enulæ campanæ, guttæ ammoniacæ thymiamatis, † piperis, sin- ^{† Aliis filicis.} gulorum drach. quinque cum oxymelite calido, per interualla potui dato, euphorbij drach. unam, uel geminas integras ad summū. Aliud:

- 10 Filicis acetabulum, quem Græci oxybaphum nuncupant, nitri drach. duas in cotyla aquæ præbeto, iam antea euacuato. Præstantius & salu- brius redditur adiecto scammoniae momento, id est modico & pauxillo. Aliud: Mali granati acidi radicum corticis in superiori parte detracti drach. quatuor, piperis tantundem, cardamomi drachmæ sex, marrubij drach. duæ, in melle ei qui prius in cibo alia sumpserit contra lumbricos latos utiliter exhibentur. Cæterū quò exacte quis & in totum ab hac fa- sciarum uentris afflictione uindicetur, theriacam (nisi uehemens febricu- la impedimento sit) incunctanter adhibeto.

De Ascaridibus. Cap. LVIII

- 10 **O**rrò ascarides (ceu iam & in superioribus præmonstratum est) species sunt lumbricorū, uermibus forma respondentes atq; persimiles, qui in extremo longanone plerūq; solent con- sistere, & quamprimū claudit se intestinum illud, prope anum conspiciunt, grauesq; in his partibus pruritus excitant. Quæ sanè uen- ^{Cassia asca- tris animalium species, ex prauis alimentis, frigidine, ciborumq; corru- ridam.} ptione prouenit. Dissiciendi sunt itaq; in pueris quidē glandibus ex mel- ^{Materia glan- le, cum salis momento, aut nitro: In natu uero grandioribus, mūria maio- dium.} ris acrimoniæ, uel centaury elixatione cum nitro, & melle, uel colocynthi de, aut absinthio, uel chamæleonte, uel anchusa, uel cnico, uel hyssopo, uel 30 pulegio, uel nepita, uel lupinis deniq; contextis. Verum post ablutio- nem longanoni intestinū subungendū est, simplicibus quidem hisce, aca- cia, hypocystidæe, addito nitro, uel rho Syriaco cum liquido alumine: Sed quorū alius astrictior est, lemnio sigillo, qd ^{oxydila} Græci uocant, cum uino. Cōpositis uero, Andronis pastillo, atq; id genus alijs. Liquor præterea cedrus per clysterem multis foraminibus terebratū immitten- dus est: cuius sunt modi quæ metrenchytæ nomē habent: uel ubi carnem ^{Metrenchyte.} salām accōmoda temperandi uī præditā imposuerimus, illigatione uta- mur q; longo sustinuerit tempore, atq; hoc ipsum identidem permutet. Cōmuniter aut omnibus lumbricorū infestatione ægrotantibus succur- 40 runt, ex ichneumonis capillis suffusus. Alimenta item probi succi, inq; lo- co ac tēpore rite exhibita, utilia sunt, quæq; lumbricorū materiā non ac- cumulent, atq; ea quæ corporis robur uiresq; labefactari & cōminui non permittunt: Proinde uinum etiam exhibebimus ualde dilutū. Crebrius

uero & celerius cibaria ob hoc ipsum affectis prebeto, ne nutrimento destituti lumbrici, uellicationes inducant. Opportunum autem edendi tempus uidetur, quum maxima adhuc copia alimoniam habent. Quod si profluuium etiam (quem rheumatismum uocant) uentris adsit, sciendum est multiplicari magisque redundare lumbricos uentris, non rite dispositis edulijis: Et iam forbilosas quidem ipsis dapes administrare conuenit, admiscentes non nihil etiam stiptici: uerbi causa pirum, aut malum, & malum Punicum, praesertim acidum. Foris uero uentri adminicula quae alui recrementa impediunt atque etiam astringunt, ea graece *epanema* dicuntur, sunt applicanda, quorum sylvia quaedam in superioribus est enumerata.

De Draconculis Dracontij's ue. Cap. LIX



IN India, regionibusque supra Aegyptum animantia quaedam uina lumbricorum forma praefereantia, dracontia uulgariter appellatio ne nuncupata, in musculosis corporis partibus, puta brachijs, cruribus, furis consistunt: In puerulis etiam in lateribus sub cute coeunt, aperteque mouentur: deinde ubi perennarint diutius in extrema aliqua dracontij ora, locus suppurat, & aperta cute foras progreditur dracontij caput. Si hoc quicquid est animalculi trahatur, cruciatus excitat, atque adeo maxime si quando dirumpatur: Cuius ergo plumbum appendere dracontio necessarium esse quidam affirmant, ne cumulatim, sed perdetentim & particulatim graui plumbi pondere decidat. Alij uero eam curandi rationem damnantes, propterea quod nihilominus grauitate plumbi dracontium abrumpatur, grauioreque dolores inducat, praecipiant membrum in aquam calidam esse immergendum, quod dracontium per calfactum sese foras proferat ac prodeat, mox digiulis sensim & particulatim extrahendum. Soranus contra non animantis principium, sed neruuli alicuius substantiam siue concretionem dracontiu esse autumat, opinionem duntaxat animalis, eo quod moueatur inducentis. Ceterum siue hoc, siue illud cuius superius mentio facta est, fuerit, cum Sorano, tum Leonidae, tum etiam ceteris uisum est, in utrisque nullo discrimine conspersione, focique calido, cataplasmatisque maturantibus esse utendum, nempe ex melicrato, & farina triticea aut hordeacea concinnatis. Emplastri praeterea eiusdem facultatis usum interdum approbat. Ex re porro usuque existere queat confectura, quae ob id quod e baccis lauri constat, *dracontia* appellationem obtinuit, & quae ex melle conficitur pariter: Ex horum namque remediorum usu extincta iam dracontia, uel circumfusum corpusculum excidunt. Suppuratione porro induta, nisi prodeant, diuide cutem, & continentem pelliculam denudatam auferto,

cutemque dissecato, atque deinceps consensu

tanea puris effectrix curatio

tentetur.

In hoc volumine operis uniuerſi quinto, non tam de uenenatorū animalū medicaminibus, quæ *ἀντιδοτὰ* Græci indigunt, quàm de toxicis potionibus medicis, & aduerſus hauſta letalium herbarū, animalūq; uenena adminiculis, quæ eadēgens *ἀντιφάρμακα* nominat, quod perinde ſerē ſonat, quaſi dicas, propulſatoria ueneni, ſeu præſentiſſima contra uenena quoquo modo ſumpta remedia adiumentaue, eo qui hic tanquā in tabula oculis ſubjicitur ritu & ordine tractabitur.

CAPITA LIBRI QVINTI.

Præcautiones omnium cōmuniter quæ ictu uenenum relinquunt eiaculari- turq;.	Cap. I	De pinorum eruca.	XXXIII
Cōmunis omnium quæ uirulenti animalis morſu ictuq; accidunt curatio.	II	De lepore marino.	XXXV
De rabioſi canis morſu et aquæ metu.	III	De rubeta rana paluſtri.	XXXVI
Aduerſus non rabientium canum mor- ſus.	IIII	De hīrudinibus.	XXXVII
De crabronibus & apibus.	V	De chamaeleone.	XXXVIII
De phalangijs.	VI	De alterco.	XXXIX
De araneæ ictu.	VII	De coriandro.	XL
De ſcorpij ictu.	VIII	De pulicaria herba.	XLI
De ſcolopendra terreſtri & marina.	IX	De cicuta.	XLII
Aduerſus aſcalaboteæ morſum.	X	De papaueris ſucco.	XLIII
Contra felis morſum.	XI	De carpeſiæ cremore.	XLIIII
De mure araneo.	XII	De mandragora.	XLV
De anguib; & uiperis.	XIII	De aconito.	XLVI
De amphibæna & ſcytale.	XIIII	De ixia.	XLVII
De dryino.	XV	De ephemero.	XLVIII
De hamorrhō, & preſtere, & diſſide.		De taxo arbore.	XLIX
De hydro.	XVII	De ſolano ſuriſo.	L
De cenchro.	XVIII	De ſardonja herba.	LI
De ceraste & aſpide.	XIX	De papauere corniculato.	LII
De baſiliſco.	XX	De pharico.	LIII
De paſtinaca marina & muræna.	XXI	De toxico.	LIIII
De dracone marino.	XXII	De fungiſ.	LV
De ſcorpio marino.	XXIII	De ſanguine taurino.	LVI
Præparatio ſanguinis teſtudinis marini.		De lacte cui admixtum coagulum eſt.	LVII
De crocodili ictibus.	XXV	De uenenato melle quod ad Heracleam naſcitur.	LVIII
De hominis morſu.	XXVI	De gypſo.	LIX
De uenenis.	XXVII	De ceruſſa.	LX
De præſeruatione uenenorū.	XXVIII	De calce, ſandaracha, & auripigmento.	LXI
Communis quoruncunq; uenenorum curatio.	XXIX	De ſpuma argenti.	LXII
Enumeratio ſimpliciū uenenorū.	XXX	De plumbo.	LXIII
De cantharide.	XXXI	De argento uiuo.	LXIIII
De buſſeſtre.	XXXII	De ueratro albo, thapſia, elaterio, agaria co nigro, ruta ſylueſtri, nigella, et pap piſ.	LXV
De ſalamandra.	XXXIII	De hijs quæ domeſtica & in quotidiano uſu ſunt, uiuo & aqua frigida.	LXVI

PAVLI AEGINETAE

MEDICI PRAESTANTISSIMI DE ARTE

MEDENDI LIBER QVINTVS,

ALBANO TORINO.

VITODVRENSI INTERPRETE.

Prophylactica omnium cōmuniter quæ ictu uenenum relin-
quunt etiaculanturq̃. Cap. I



IN hoc uolumine de animalibus uirulentis, uenenumq̃
ciaculantibus tractaturi, ab id genus cōmuniter omni- 10
bus præcautionibus antea demonstratis, sumendū est
exordium. Quocirca si urgente aliqua necessitate, so-
mnum capere alicui, in locis ubi uenenatę cōplures be-
stiolę diuersari consueuerūt, contigerit, præsertim ubi
plerunq̃ salamandrę, aut phalangia, uel serpentes alicui magna copia
degunt, obturanda sunt ferarū lustra alio cum aqua cōtuso, uel alia qua-
dam ex his de quibus agemus; herbula. Adolenda sunt etiam suffitus
gratia cornua cerui, ungulę caprarum, aut pili, gagates lapis, bitumen,
bdellium, galbanum, cupressi uel cedri scobes, nigella, peucedanum, ui-
ticis folia, nepita, sagapenū, castoriū, radix hordei, conyza, quam Roma 20
ni intybum uocant, uel aliquid id genus aliud tetrum odorę spirans. Culi-
ces aut peculiariter ac proprie suffitus auertūt, atramenti sutorij, nigellę
syluestris, seminis cymini portiones æquales, & sterces bubulū: adhuc
etiā densior ignis accensus: magna etenim ex parte bestiolę ignis splen-
dorę fugiunt. Substernenda sunt præterea cubili herba albucū, nepita,
uutex, pulegiū, polium, conyza, abrotinū: Atqui si fieri nequit, ut omni-
bus his pariter utamur, circūponenda tamen aliqua sunt stratui. Atten-
dere item oportet animū circa esculēta, & aquas, uasq̃ uinaria, ut accu-
rate summaq̃ semper diligentia cōperiant. Neq̃ item uasa culinaria po-
nenda sunt sub aliqua arbore, maxime sub picea aut pinu: in his enim ue- 30
ro salamandrę aut bruchi pestilentes scatent, qui quum aliquę ignis te-
porem senserint, decidunt in fercula, uel in alias patellas, si casu quodam
nullo fuerint operculo contextę: Proinde quę adhuc tutiora seruare stu-
demus, eis cerotam liquidiorę illiniemus ex cera, & rosaceo, & galbani
momento, id est perexiguo, & ramento cornu ceruini modico, aut cymi-
no quoq̃ Aethiopico. Ab apibus uero & crabronibus cōpungi prohibe-
bent folia maluę illita, cum oleo attrita & leuigata.

Communis omnium quę uirulentę animalis morfu punctuq̃
accidunt, curatio. Cap. II



QUod si contingat forte fortuna quempiā ictu morfuue à quo- 40
piam uirus immittente offendi, confestim etiam dum recenti
malo, exuctu utendum. Cæterū ne is qui exuctionis munus
obit ieiunus sit, cautio est, sed uino etiam os suum abluisse, &
ore

Culices proflu-
gantis.

ore oleū tenere cōgruit, deinde loco inherere cōpuncto, cucurbitulamq̃ cum multa flamma incisa prius cute scalpello imponere, proximaq̃ loca conuellere: uirus nancq̃ cum flatus ac sanguinis attractione iuxta elicitur & educitur. Inurendum præterea, crustaq̃ huiusmodi inducendæ uene no extracto. Quandoq̃ etiam haud importunū fuerit membrum, præsertim extimarū partiū amputare, si fere letalis ictus sit, ut ex aspide, cerasse, uiperā, & consimilibus, quemadmodū Galenus memorat, uinitorē quēpiam morfū petiū a uiperā, is ubi animantis naturā cognitā probe haberet, neq̃ ictum pestiferū letalemq̃ dubitaret, falce protinus morfo à mortifera bestiola digito amputato, periculū omnino euasit. Quod si uirus iam corpus subierit, sanguinis detractionē quā celerissime utendū est, atq̃ in primis si morfū uideat corpulentus. In cibo statim edendū piper & allium præbeto: Vinūq̃ potui forte ac potēis, qđ recente fragrantēq̃ odore spiret uernaculum, concretionī calorem inducendo. Post hæc etiā locus fuerit calfaciendus catāplasmate quod. extrahendi laniandiq̃ facultatē habeat: cuiusmodi est cinis brassicę, aut ficus arboris cum aceto mixto, aut unguine seu cōiā stactē, uel garo, & cēpæ cum farina, panē ue, & porri plurimū cum sale, uel pix liquida pariter & calida cum sale, aut cedro, stercoribusue caprarū. Competit præterea ipsis haustus aceti calidi, in quo nepitā elixa sit, uel haustio ex aceto & aqua marina, uel ex oxalme. Locis insuper ictis gallinæ superimponendæ sunt, atq̃ potius galli gallinacę, aliāue animalia dissecta calida: uirus nancq̃ ebibunt, & dolores leniunt. Utendū præterea emplastris alijsq̃ medicamentis, adhibito interdū sale, interdū hordeo, atq̃ a darcy, & quod in totū sit acerrimæ potestatis. Cæterū omnibus in genere qui nō tam morfū q̃ ictu uirulentī animantis oblesi sunt, uinū potandū est, nisi partes profundiores omnino uideātur incolomes & illasæ: feris item, uel erice, uel astragalus cum aceto, siue bitumen paliuri, uel ~~uisceris~~ ^{uisceris} quasi ueteris putris ue fluminis dicas elixatio, uel mustelæ arefactæ drachmæ duæ, celebre admodū medicamentū est: uel testudinis marinæ sanguis, uel castorij drachma una, addito uino nimis diluto, uel libanotidis drach. i. uel cucumeris siccyoniæ ue radice, aut porri cremor, uel chamæpitys, uel smyrnium, uel cinnamomū, uel aristolochia, uel uiticis semen, uel galbuli cupressi, uel seseli, uel piper, uel trifolij semen, uel baccae lauri, uel cancri fluuiatiles tam tostī quā elixī. Utendum adhuc theriaca ex hisce composita:

Theriaca aduersus uenena, herbasq̃ toxicas, morfus uiperarū, ictusq̃ scorpionum.

Accipito bryonię, opopanax, iridis Illyricę, libanotidis radice, zigruberis, singulorū drach. quatuor, aristolochię drachmas quinque, thuris, rutę syluestris, uniuscuiusq̃ drach. treis, farine eruacę drachmas duas, uino pange pastillos, & cum uino porrige triobolum. Purgatio deniq̃ omnibus proderit, & hydroteria, & theriaces eius quæ ex uiperarum carnibus constituitur assumptio.

Historiam
narrat.

Medicamentum
describit.

Animalia imposita
uirus ex-
trahunt.



Vper his qui à cane, alijs uè rabidis mordicus impetuntur be-
stijs, præ cæteris in præsens differemus, quoniam id animan-
tis frequens & contubernale est, rabieq; cõtinenter infestaf;
& ob id obseruatu perdifficile, & periculũ ex eo proueniens
minus euitabile, nisi quis õpe multa, adq; hanc rem ad unguem factis in
tempore utatur auxilijs. Rabie aut canes in uehementioribus Solis æsti-
bus potissime corripunt, quemadmodũ & de lupis asserunt: interdum
etiam quũ intensissima sunt frigora. Rabie porro correpti cum esculenta
tum poculenta horrent & auersant: & sitibundi quidẽ sunt, potare ue-
ro nequeunt: suspiriosiq; linguam exertant anxie ut plurimũ, & auricu-
las demittunt, sputũ largum atque spumofum eiectant, & sine uoce atq;
amentes reddunt, adeò ut ne domesticos quidẽ agnoscant. Impetunt aut
passim sine latratu omnes, feras pariter ac homines; & nullo discrimine
mordent. Mordentes uero nihil infestũ primo, nisi uulneris modò dolo-
rem afferunt: temporis aut progressu morbus ille, quẽ Græci à re *ὁδονο-*
φικῆς appellant (ea affectio qua à canũ rabidorũ moribus petiti, aquam
horrent) exoritur, qui quum aduenerit conuulsiones cum rubore totius
corporis ingruunt, maxime uero uultus cum sudore, suiq; & domestico-
rum ignorantia: quorũ aliĩ aquam modò uidentes admotiq;, aliĩ humorẽ
prorsus omnem auersant. Sunt etiam qui canũ instar latratus edunt, &
interuenientes mordificationi impetunt, mordicibusq; suis alijs eiisdẽ ra-
biei causam inferunt. Inter aliorũ porro sympt^amatũ causas, nihil adeò
affectionẽ istam inducit, q̃ ubi uirus uniuersas corporis partes occupa-
uerit. Formidinẽ aut aquæ, nõnulli quidẽ ariditati immensæ, tanq; nati-
ui prorsus humoris abacta essentia, acceptã referendã asserunt. At Ru-
phus ipsis melancholiæ speciẽ huiusmodi putat accidere, qd id uidelicet
uirus eundem æmuletur humorẽ, haud sanẽ aliter, q̃ reliquos etiam me-
lancholicos nouimus alios alia formidare, omniaq; tuta timere: quæ unq;
caussa ne tantillũ quidẽ discrepat ab ijs qui opinantur & perhibent spe-
ctrum canis à quo demorsi sint, in aqua existere. Eorũ uero qui ad id per-
uenerunt malum, neminem nouimus incolumitati pristinae redditum,
dempto ex historia uno aut altero duntaxat, eosq; nõ à rabido cane mor-
fos, sed à morfo homine mordicus petitos: Verum antequam malum al-
tius infedisset, non pauci etiam à canibus morfi sospitatem recuperave-
runt: Hinc itaq; nobis auspicanda est curatio. Sed quoniã frequẽtissime
ex eo quod non confestim à morfu sese hydrophobica appetit afflictio
(plerunq; etenim post quadagesimũ à morfu diem solet ingruere, qui-
busdam uero post sex menses, alijs fertur etiã post septem) aliĩ mordentẽ
canem arbitrati sunt nõ fuisse rabie percitũ, & proinde cicatricẽ hulceri
inducere studuerũt, atq; hoc pacto ipsimet huius mali autores sibi perni-
ciem statuerũt. Proinde huiusmodi usus experientia, facile deprehẽdes
rabiosus sit canis nec ne, qui momordit; Nuces basilicas accurate tritas
cataplasmatis

Hydrophobi-
ca affectio.

Demorfi rabi-
do cane, confu-
runtur melanch-
olicis.

cataplasmatīs instar hulceri adglutinato, ac deinde demptas gallinaceo, gallinæ uē in cibo obijce: primū quidē nō attinget: sin autē fame pressus, tandem uorauerit, tum curiosius attendito: enim uero si qui momordit rabiosus non sit, sospes atq; superstes auis quæ comederit permanebit: sin rabie correptus fuerit, illa postridie moriet, inde hulus obductū absq; mora aperito: idēq; experimentū post aliquot dies iterū tentandū, & siquidē auis nō extinguat, tum hulceri cicatricē inducito, nullum siquidē laboranti imminet periculū: Huiusmodi uero experimentū Oribasius tradidit. Quod si ex prædictis notis cognouerimus, rabiosam fuisse mor-

Rabiosi canis morsus cura ratio.

dentē caniculā, medicamētis aperienti facultate præditis repēte utendū. Ex his itaq; primū honorē habet, qd ē pice, acetoq; austerissimo, nec non opopanax conficiē, de quibus capite de neruorū uulneratione disseruimus. Porro si morsus teneriore cuticula præditus sit, immittendū fuerit irinū oleum, seu balsamus, uel aliud eiusmodi. Licebit etiā calfacto prius hulceri allium cataplasmatīs modo impingere, & crustā inducere. Aridum uero qd crustā contrahendi uirtutē obtinet, hoc modo cōcinnatur:

RECIPI. Aridum uulneribus à rabidi canis morfu factis, crustam offundens.

Apponantur salis fossilis drach. octo, chalcitidis drach. sedecim, scilg tantundē, rutæ uiridis drac. iij. eruginis rasæ drach. totidē, seminis porri drach. i. utere primitus arido, quō facilius crustā obducatur, deinde cum rosaceo, ut excidat crustā. Custodiant autē partes ne cicatrice scant, dies ad minimū quadraginta duos. Cataplasma autē quod à rabido cane mordicus petitis os hulceris diductū seruat, ex his constat: Cepam cum sale & ruta more cataplasmatīs applicato, uel laserpitium cum sale, uel salamentum uetus, uel cinis pampini cum oleo, uel allia, uel sambuci folia, mentaue seu apiastrum, quodlibet per se, uel adiecto etiam quandoq; saleiuglandes cum cepa, sale, & melle, aut cinis ficuum, cerota excepta & indita. Proluendum uero abstergendumq; hulcus, decocto in aqua chamæmeli, syluestrisq; rumicis radice: Nec desunt qui causticis etiam fer-

Cinis cineris

reis hulcus inurant. Potionandi uero sunt languētes, ex simplicibus quidē lycio, & absinthio, succoq; laserpitij, & trixaginis, allio & polio. Composita uero potent huiusmodi: Cancrorum fluuiatiliū in malleolorum uitis candidæ tostorum in uase cyprino aut æneo cochliaria duo, gentianæ radice leuigatæ cochliarium unum, cum uino meraci ueteris cyathis duobus in potu per quatrīdū præbeto: Quidam sanguinis perdicum cochliaria duo porrigunt. Cæterum cancri cum luna recente sunt accipiendi, priusquam ad oppositionē cum sole peruenerit. Si qui aliquo ex his diebus potionē intermiserint, duplā postea aut triplā interdum præbeto. Quinetiā ex uiperis theriaca magna admodū cōmoditate exhiberi potest. Purgādi aut sunt cotidie medicamento ex sicyonia cōcinnato cum saluig decocto, aut sideritide Heraclea, quā aliās *diæuolū* uocāt. Sunt præterea qui canis, qui morsum intulerit, hepar ad edendum exhibēt. Porro uictus ratio eiusmodi obseruāda est, quæ pariter & hebetet ac

Victus ratio.

extinguat ueneni uolentiam, simulq; prohibeat ne malum altius radices agat. Vtrunq; aut horu praestabit uini dulcis meraci ueteris, puriorisq; lactis pontis, consimiliter etiam allij, cepis & porri esus. Quod si autem dictis adminiculis ob impedimentu aliquod ab ipso statim principio uini superfederit laboras, minime gentiu praetermittendu est quo minus aut caro circuncidat, aut parti laesa cucurbitule apponant, aut hulus deri, que ipsum aduret, potissime uero si iam uirus altius penetrauerit: Memoratis porro cum decenti uictus ratione utendu est, anteq; rabies aquae ue horror homine occupet. Non mediocriter etiam conferet contra istiusmodi malu purgatio cum hiera, & lacte scisso facta. Sudores excitandi, ad mouendu unguentu est dropax, id qd dropacismu dicunt: probantur & sinapismi, particulatim singulis corporis partibus adhibiti. Praecipuum aut ferre auxilium res ipsa docuit helleborismu identidem sumptum.

Aduersus non rabientium canum morsus. Cap. IIII



Orsus praeterea canu nulla rabie percituru, ueneni quiddam exitialis secum adferunt: protinus itaq; aceto uulnere irrigato, os eius morsus ue porrecta palma uapulet, deinde uero nitru cum aceto contritu de super applicato. Spongia item nouam cum aceto madidatā, aut etiam cum ipso oxynitro per triduū imponito, ir-rigans ipsam, nam omnino malu discutit: uel eruacea farina oleo macera tam impingito: uel spongia noua, lanae uel succida pollutaq; adhuc, aceto & oleo madefacta uulnere imponatur. Vel amputatis rubi frondibus, & contulis cum aceto, cataplasmatibus more superinducito: aut si praestare uideatur, cepa cum melle subactam, uel origani coma, & sale, æquis portionibus cum melle, uel marrubium nigrū, quod alijs Βαλάντω nuncupant, adiecto sale. Vbi uero iam ardor morsus occuparit, plurimu contulerit si eruinam farina melle subactam & maceratā imposueris, quandoquidem peculiariter hisce prodesse creditur: Sed eis que iam inflāmata sunt locis, spumam argenti eliquatam & contritam cum aqua inungito.

De Crabronibus, & Apibus. Cap. V



Vi ab apibus percussi sunt, eos dolor quida comitatur & rubor, tumor item circa aculei plagam, qui in eadem fixus haesit. Caeteru a crabronibus puncti, haud aliter quidem quam caeteri afficiuntur, praeterquam quod aculeus non haesit in plaga. Succurritur autem utrisq; si obliniatur locus luto, seu stercore bubulo, aut ficuum succo, uel sycamini, quod & morum uocatur, folijs eliquatis, uel maluae, aut etiam farina hordeacea cum aceto ut cataplasma impasta. Fouendum praeterea muria, uel aqua marina.

De Phalangijs. Cap. VI



Vbore ac ueluti distinctis punctis in phalangioru ictu morsus locus ipse infici conspicitur, neque tumens tamen, neq; adeo callens, uerum mediocriter quide subrufus est, perfrigerationibus horret, & pruriginosus est: Accidit uero & umbræ instar sequitur per-cullos,

cussos, frigoris occurfus, tremor, totius corporis lassitudo seu grauitas, sudor egelidus, dolor intensus, pallor, & cōtinuus efficiendæ urinæ pruritus: quibuscum uero ex aduerso multa in pellendo difficultas, & genitalis membri intensio, oculi humentes & lachrymosi, tenor quidā & rigor circa inguina & poplites, conuulsioni per omnia similis, uellicatio stomachi uehementior, linguæ torpor, uomitiones aquarū, uel araneis consimiles: Neq; defunt quibus per lotium aluumq; eadem feruntur, descendentesq; in aquam calidam dolorē primo nullum sentiunt, mox ualidissime dolitant. Presenti uero ita affectis præsidio est, forinsecus cinis
 10 cucumerinus appositus, cum sale in uino dissoluto maceratus: uel radix syluestris mali Punici summa contrita diligentia, uel malum terræ, quam aristolochiam dicunt, cum farina hordei aceto immersa & eliquata. Pro luendū præterea fouendūq; uulnus est aqua marina calidiore, aut apii stri decocto: cuius etiam folia pariter sunt iniicienda. Lauacris insuper perpetuis si quis indulgeat absurdum nō sit. Utendum uero potionibus eiusmodi quæ primo ex abrotoni consistunt semine, anetho, aristolochia, cicere syluestri, cymino Aethiopico, baccis cedrinis comminutis, platanicortice, trifolij herbæ semine, & fructu myricæ: horum uniuscuiusq; drachmas duas cum uini cyathopotui dato: Et uiridium cupressi galbulorum decoctum cum uino temperatum. Sunt etiam nonnulli qui can-
 20 crum fluuiatilem in succum redactum addito lacte, & apij semine exhibitum, præsentem aduersus phalangiorū ictus opem conferre asserunt.

De Araneæ ictu plagæ. Cap. VII

Est etiam quoddam araneorū genus, quod ubi hominem pupugerit, intensus ac uehemēs circa medium præcordiorū labor excitatur, rubor itidem & lotij expellendū difficultas sequitur, quandoq; etiam suffocatio quædā. Leuantur autē icti hisce adhibitis remedijs: Cymino syluestri Thebaico, uel uiticis semine, & populi albæ folijs epotis: uel his nō minus allia sola, si offerantur adhi-
 30 beanturq; eiusmodi, conferunt: uel uini quoq; meracioris sorbitione ab omni planē araneæ ictus periculo liberantur.

De Scorpionis ictu. Cap. VIII

Inflammati confestim à scorpj ictu percussusq; locus incipit, durusq; & ruber, ac distensus, supraq; modum rigidus cum dolore redditur: & nunc quidē feruor, mox etiā algor alternatim occupat: quandoq; sequitur dolor, qui iudem alternis nunc meliuscule habet, mox iterum intenditur & augetur. Accedit insuper à scorpio percussis sudor, horridus quidā sensus, & tremor, & ex-
 40 tremarū corporis partium frigus, eriguntur inguina, ueretrūq; extenditur, sæpius item feruntur cum strepitu per sedem pedius, rigent pilī, discolor summa cutis redditur superficies, dolorq; tota percipitur cuticula tantq; acus confossionibus factus. Succurrit autē scorpj ictibus efficacissime quamprimū instillatus uulnèri siculneus cremor. Ipse etiam qui

percussit, plaga sua dissipatus, attritusq; & impositus scorpius: Posthæc salem tritū cum lini semine, & althææ herbæ, qui hibiscus est, semen imposito. Subuenit & sulphur uiuū cum terebinthina resina exceptū. Prodest pariter & galbanū emplastelli more extensum, & parti affectæ impositū: nepita quoq; leuigata, et cataplasmatibus modo imposita: & hordeacea polenta uino cōfecta, & in rutæ decocto exhibita. Neq; minore efficacia succurrit semen trifolij herbæ, tritum uulneri indicū. Utendū præterea est potionibus eiusmodi satis efficacibus: Aristolochiæ drach. ij. pondere, præcipue corticis cum uino, gentiana tusa, pulegioq; ad summum elixato, lauri baccis numero decem leuigatis, & nepita diu multumq; cum posca elixa. Confert etiam cyperis, quæ iunci odorati quadrati radix est, cum uino sumpta. Prodest similiter & ruta, & ficulneum lac, & laserpitij itidem, si copia eius ad manum sit: sin in promptu nō sit, paritico liquore utendū erit. Cōducit adhæc trifolij, & ocymi semen in potu sumptū: Valet mirifice argentū etiam statim plagæ impositū. Omnibus his adhibeatur lauacrorū cōtinuus cum multo sudore usus: temperatiq; nimia aqua potus. Cōposita uero antea in potu sumenda sunt, sulphuris uiui, Aegyptiæ fabæ quantitas cum piperis granis octo in uini dimidiata cotyla, uel succus laserpitij cum cancro leuigato ac dissoluto, aut nigella, cymini Aethiopici, uiticis semen, æquis cum uino partibus.

Aduersus Scorpionū formidolosorum & Phalangiorū periculosos ictus.

SVMantur fecis uini drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, seminis rutæ syluestris drachmæ tres, castorij, erucæ seminis, singulorum drachmæ duæ, excipiantur sanguine testudinis marinæ: Dentur oboli quatuor cum uini meraci acetuæ cyathis tribus. Aliud: Pyrethri, aristolochiæ, cuiuslibet uncia quatuor, piperis uncia duæ, liquoris laserpitij drachma una: Dosis esto fabæ Aegyptiæ magnitudo.

De Scolopendra terrestri & marina. Cap. 1X.

Lerunq; aut ijs quos scolopendra momordit, locus plagæ in orbē liuescit, & quasi in tumore attollitur: Interdū sanè fecis speciem induit, rariuscule uero subrufus apparet, exulceraturq; sumpto à morsu principio hulcere quodā laborioso & lurido. Adhæc uniuerso quoq; corpore sentitur quasi pruriginis sensus. Pæculiariter uero his quos marina scolopendra pupugit, aquæ per similibus & ueluti transparentes quandoq; insurgit tumor: Rubicundus aut his quos scolopendra terrestris sauciauerit. In horū utriusq; igitur curatione, oportet circa morsum & plagam salem ex aceto tritum, aut concisam & leuigatam rutam imponere, uel cinerē aceto contritum & maceratū, seu scilicet: conspergendus fouendusq; oxalme etiam locus est. Cæterum Archigenes oleo etiam multo feruido prædicta eo quo dixi modo imponere solebat. Potui uero præbenda est aristolochia cum uino, uel serpyllum, aut nepita, uel syluestris ruta, uel trifoliū, uel succus radicis albuci, mensura ferme dimidiata cum uini cotyla.

Aduersus

Aduersus Aſcalabotæ morſum. Cap. x



Duerſus aſcalabotæ plagam iſtum'ue, utiliter ſeſamū ſub actum & contritum cataplaſmatis modo imponitur.

Contra felis morſum. Cap. xi



Vi porrò felis morſu percuſſi ſunt, uehementiore admodum dolore afficiuntur, luridumq; omnino uulnus redditur. Succurras aut ijs, ſi q̄s primum uulneri cataplaſmatis inſtar cepas alliaue impoſueris. Porrò iſdem etiā uelcētes, uini meraci & indiluti ſorbitione egregie curantur, priſtinæq; ſoſpitati reſtituuntur.

De mure araneo. Cap. xii



Vris aranei morſum conſequunt̄ dolores magni & pulſato-
rij, rubores ſecundū unūquodq; dentis ueſtigium, punctura,
puſtulæ (quæ appellant̄ phlyctænæ) fartæ circa morſum ſa-
nioſo humore, liuorē contrahunt adiacentes & propinquæ
partes omnes, detracta q; phlyctænes cuticula, ſub candidū apparet huius-
cus: Ad hæc depaſtione his quæ ſerpunt nō abſimili facta, partes ſolent
putrefactæ decidere. Accedūt poſthæc, grauiffimus inteſtinorū dolor,
loij reddendi difficultas, gelidiq; ſudoris undiq; fluxus. Succurrit aut à
mure araneo morſis, ex galbano conſectū ſpleniū emplaſtellū per ſe, uel
trituū ex aceto impoſitū. Remedio itidem eſt farina hordeacea cum oxy-
melite cataplaſmatis modo impaſta. Quinetiā ipſe araneus muſ qui mor-
ſum intulit, diſſectus, ſuoq; uulneri impoſitus, ſubuenit: & pyrethrū em-
plaſtri more adhibituū: malicoriaq; dulcis mali Punici decocta, uel malua
ſylueſtris, allia item trita, & ſinapi leuigatū cum aceto. Præterea cōmen-
datur ex calida muria facta ſomentatio & conſperſio: deinde ex hordeo
combusto concinnatū cum aceto cataplaſma. Vtile aut fuerit & ſalutare
miſcere & propinare abrotonū cum uino decoctū, uel ſi ſymbriū, uel ſer-
pyllū, uel herbā crucā, uel galbanū, uel ſaluiā, uel cupreſſi molliores gal-
bulos cum oxymelite, aut pyrethrū cum uino, aut chamæleonis radicē,
aut coagulū hœdini agniniue aut uiticis, gentiane'ue, radicē, ſeu uerbe-
nacam in potionibus exhibetō: cæterū eadē cataplaſmatis quoq; modo
utiliter impingitur. Sunt etiam qui murē ipſum qui momordit contrituū
aduerſus propriū morſum cum uino hauriunt. Prodeſt ad hoc uenenū ge-
nus medicamentū etiā illud, habens myrrhæ pondo drach. ſex, corticis
ariſtolochiæ drach. iij. Cæterū cōtra aranei muris & ſcolopendræ mor-
ſum, ſales cum liquida pice hygropiſſiue emplaſtri modo illinito, uel li-
quorē cedrium addito melle, uel allium cum folijs ficulneis, aut cymino
uel folia nepitæ, ſeu hordea, adieſto etiam aceto.

De anguibz & uiperis. Cap. xlii



Aeterum ab anguibz aut uiperis uel id genus alijs animali-
bus morſu ſeu iſtu uenenū reliquētibz demorſos, intra prin-
cipia ſtatim dolor in loco quidem morſu compuncto, inde in
uniuerſo quoq; hominis iſti corpore comitatur. Apparent
autem ſecundū uulnus gemina foramina per exiguis admodū interſtitia

*Accidit mor-
sus anguis et
aspidæ.*

bus inter se spacijs, unde à principio sanguis saniosus, aquosusq; humor defluit, deinde oleosus, in omnibus indiscriminatum uirulentus, quod se-
rarum esse uenenū quidam autumant. Consequitur aut, tumor ubi ictus
rubicundus ac luridus, pallor in corpore, uertigo, resolutio stomachi, ani-
mi deliquium: nonnullis uomitiones biliosæ, mictionis angustia: insur-
gunt præterea circa ictum locum haud aliter atque in ambustis pustulæ.
Occupat & noma hulus depascendo serpens, progrediens ad finitimas
partes: cruentant his etiam gingiua: accedit præter hæc ictu petitis tre-
mor, sopor quem Græci *νάγας* nominant, & frigidi sudores. Minore uero
periculo euadere credunt, qui ab echidna, quam qui ab echi fuerint icti, 10
sed minus etiam ab iisdem ipsis offenduntur ei qui nutrimentū offerunt.

*Curatio denor-
sorum à uiperis
et anguib.*

Cæterum in medendo tam efficacissimum præstat auxilium alij deuos-
ratio, meraciorisq; uini potio, ut si quis eo remedio utatur, alijs sanè nul-
lis opus habeat suppetijs. Cōmendant aut moribus eiusmodi animan-
tum percussi porros, cepas, & salsamentū acerrimū, quidam ranas etiam
iurulentas in cibo dederunt. Conducunt uero hæc quoq; in poculis cum
uino singula, marinæ testudinis sanguis aridus cum cymino syluestri, Je-
poris hin nullæ triobolari ponderē coagulū, aridi ceruini genitalis dra-
chma una, anchusa tenui folio tota: hanc uero aliqui etiam pro amuleto
applicant atq; imponunt: porri cremoris dimidiatæ heminae pondo, in 20
melicato, foliorum apiastrī succus, & ruta syluestris, contubernalium
gallarū cerebrum, panacis radix cum uino decocta, agarici drachma
una, iuniperi, asphodēli radix, pistacia leuigata atq; soluta, uiticis semen,
arefactæ mustelæ drachmæ duæ, echini cum radix cum liquor, cancri
non tam fluuiatiles quàm marini, cum priuatim per se, tum adiecta pedi-
culari herba, quam græce staphidagriam nuncupant, saleq; & polio,
mali terræ (quam aristolochiam dicunt) radix cum myrrha, & gentiana,
baccarum lauri æqua portione melle excepta. Mirificum porro habetur
cōtra uiperæ morsum Oribasij illud, cōstans anisi in aceto tincti, piperis
cuiuslibet sigillatim drachmis quatuor, aristolochiæ corticis, opij, casto- 30
rij, myrrhæ, uniuscuiusq; drachma una: Passō uino hæc cuncta diluenda
sunt, atq; sabæ græcæ magnitudo fingenda, exhibeto habita uirium ra-
tione cum uini immodice diluti cyathis tribus. Aliud ex Lyci cōmenta-
rij medicamentū cōtra uiperarū morsum concinnatū: Accipit myrrhæ,
castorij, piperis, sandaraches, singulorū drachmam unam, feminis ane-
thi oxybaphum, passō eliqua & exhibe. Aliud ex Archigene:
Cancros uiginti cum sufficiente farina frumentacea in mortario summa
cura contundito, nepitæq; salisq; nonnihil confundito, redige in pastil-
los, & arefacito: In usu uero cataplasmatīs modo cum lacte impingito, at-
que unum cum mulso potui dato. At si ad manum fluuiiales (inquit) cancri 40

*Que feris adhi-
benda sunt in ui-
peræ moribus*

non sunt, marinis utitor. Extrinsecus uero opem uiperinis moribus fert
caprinus fimus, in plagam emplastri instar cum uino accurate impactus,
is sanè opitulatur magnifice; uel lauri folia cocta cum oleo, aut bacce lauri,

aut nepita, erice, ruta, apium, abrotonum, galbanum, emplastelli splenis
modo iniectum, origanum uiride leuigatū: pulli gallinacei discerpti ac
calidi imponendi sunt iugiter & perpetuo. Ad glutinanda præterea crui
farina contrita & macerata in uino, raphani cortex eliquatus, scilla elixa,
farina polentæ uel hordeacea ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cum
polenta ex tenuissima hordeacea farina flosculo, ruta, sale, melleq; adhibitis: fur-
fures elixi in aceto, cinis cum aceto, cedrius liquor appposito sale, pix li-
quida itidem adiectis salibus. Fouerī præterea locum trifolij decocto
30 expedit, aut elixatione pulegij, seu muria acida. Vbi uero sanguineæ ac
suppuratæ comparent pustulæ, ipsas confestim refecato, cutem nō detra-
hēs: mox inde larga aqua cōperge ac foue, atq; cataplasmatīs modo len-
ticulam coctā cum melle donec sanitatē recuperent, loco ictō impinge.
Cæterū ex uiperis confecta antidotus peculiari quadā efficacia in huius-
modi pota moribus opitulatur, nec non ictui quoq; ipsi imposita.

De Amphisbæna & Scytale. Cap. XIII

Amparia omnino, in eius quæ amphisbæna, & eius quæ scy-
tale appellat, bestiolæ moribus, usū semper ueniunt. Reme-
dio sunt igitur eisdem communia: quocirca priuatam ac pro-
30 priam descriptionem, quam sibi exigere nobis minime uide-
bantur, fortiti non sunt.

De Dryino, Galeni uero præfatio. Cap. XV

Vitam dryinus bestiola in radicibus quercus (à qua arbore ap-
pellationem sortitus est) agit, tam malefica parataq; ad no-
cendum uī, ut si quis calce modò eum premat, cute hominis
pedes denudet, & totis cruribus tumorē largum ac spacio-
sum inducat. Ferunt præterea quod maiori admirationi futurum est o-
mnibus, nudari cutem pariter eorum, qui curationem eius tractauerint,
Quod si quis pœnam ab eo illatę iniurię sumpturus, bestiolam perime-
30 re tentauerit, tetri admodum odoris fluxum emittere, suoq; graueolenti
odore omnium aliorum odorum sensum tollere. Cæterum in dryini ani-
malculi plagis, circa morsus locum cum rubore tumor fit, & insurgunt
in iisdem partibus in orbem pustulæ, defluit præterea aquosus aliquan-
do humor, quem ἰχθυή Græci nominant, urgent erosiones stomachi, qđ
malum eadem gens καρδωγμὸν appellat, & circa umbilicum torsio, qui
σπασμὸς ab iisdem dicitur. Succurrit dryini moribus cum uino pota aristo-
lochia, trifolij item herba, & hastulæ regiæ radix pari modo sumpta, &
quercus cuiuscunq; glandes concisæ ac potæ. Illicis itidem radices tusæ,
locoq; cataplasmatīs more impositæ, dolorē placant & leniunt.

40 De Hæmorrho, & Prestere, & Dipside. Cap. XVI

A hæmorrhī morfu graues statim dolorū uexationes insurgunt,
& ex earum continuitate breues omnino & angustas raritates
præbent, multus etiam erumpit ex morfu sanguis: & si cicatrix

Dipsa.

Prester.

Drimyphagis

Dipsadis mors
sui remedia.

quæ in toto corpore inducta fuit rumpatur, & sanguine defluat, cruenta egeruntur excrementa, interq; meiendum pro urinâ in exigua frusta quasiq; minimos globulos densatus redditur sanguis. Extussunt porro è pulmone cruenta, deniq; euomentes tanq; deplorati pereunt. A dipsadis præterea morfu æstus intolerabilis ac constans irrumpit, sitisq; tam indomita, ut nunq; expleri neq; intermittere queat; poculentaq; affatim ac larga manu infusa hauriunt quidē, eadem tamē sitis perpetuò exerceat, haud aliter quàm si ne tantillum quidem potionis sumpsissent ab initio. Neq; ex assiduo poculorū hauſtu sitis sedatur aliquid, sed idem iugiter & equalis totius sitis durat habitus; unde ab urendo prester, & ab arden-¹⁰ do *νεύρωγ*, ab inexplibili siti *στέαρ* appellatur. Cæterū à multis præcisq; autoribus ab hæmorrhoea ac dipsade morſu, seu deplorati & insanabiles relinquebantur. Tentanda uero cōmunia sunt remedia, si quæ priuatim opem illis ferre possent, desiderentur. Confodiendusq; scalpello confectus & urendus locus, & si liceat mutilandus: deinde acerrima quæq; applicanda sunt cataplasmata. Profueritq; in pendio omniū quidē acriū eduliorū efus, quam drimyphagian uocant, imprimis uero ex balsamensis, meraciq; uini potus, pariter & lauacrū: Vtile aut fuerit breuibus temporum interuallis cōtinuare, priusquā morbus grassetur, & inualeſcant mali huius comites: his enim semel emergentibus, nulla prodesse potest¹⁰ medicorū opera. Quæ uero ad localia attinent remedia, eorum in morſu uel sylum descriptam deprehendes: In dipsadis igitur morſu, portulacæ folia cum aceto trita et eliquata, farinaq;, & rubi folia accurate soluta cum melle, plantago item & hyssopus, allium album, porrum, ruta, urtica, quæ & cnide dicitur. Aduersus uero hæmorrhū omnia sanè eadem hæc faciunt medicamēta, atq; supra hæc uitis etiam folia elixa, cum melle concisa & eliquata, Per os autem, hæmorrhii ipsius qui morſum intulit crematū caput potetur, aut allium, cum oleo irino; manducandæ pariter sunt in eiusmodi periculo uuæ passæ.

De Natrice. Cap. XVII

30



Vi ab natrice, quam Græci hydron dicunt, morſu petiti sunt, horum uulnus dilatatur, & postremo spaciosum amplumq; euadit, ichor ex eodē ater ac largus, tetroq; odore spirās, perinde atq; ex depaſtione (Græci nomā dicunt) destillat & egeritur. Medicatio aut mali cum tempore & egre suo tandem munere fungens, quod petit assequitur. His itaq; succurrit origanus concisa, & aqua eliquata, atq; morſus uulneri tandem superinducta; uel conia quæcus oleo irrigata, uel hordeacea farina cum melle eliquato in potione sumetur, & aristolochiæ geminæ drachmæ, uel in cramate poscæ, quod *εἰς ὑγρῶν* græce dicunt, cyathis binis: Deinde cremor marrubij, uel elixatio cum uino, uel nasturtium syluestre, uel fructus hastulæ regiæ aut flos, foeniculiue semen cum uino, & fauus deniq; recens comestus, adiecto simul aceto, hydri ictibus subuenit.

De cens



Enchri morsus per omnia uiperæ morsui respondet, accedit putredo seu exulceratio, atq; post tumores subeunte cutem aqua carnes omnino decidunt: lethargici præterea euadunt & cataphorici, hoc est ueternosi, & mali soporis delationi obnoxij. Erasistratus his iecur, & uesicam, & crassius intestinum, quod Græci *κόλον* appellant, affici corruptiq; asserit: Dissectis namq; eorum corporibus, corruptæ offenduntur eadem hominis partes. Virulenti huius animantis moribus lactucæ semen cum semine lini cataplasmatris instar impositum succurrit: necnon & satureia leuigata, & ruta syluestris, & serpyllum cum asphodelo tritum. Potiones aut quamprimū centaury radices drachmæ duæ cum uini cyathis tribus, uel mali terræ radix itidem, nasturtiumq; pariter & gentiana contra cenchri morsus utiliter adhibentur.

Curatio.



Res aspidis esse species Galenus testatur, nam unam terrestrem nuncupat, alteram chelidoniam, tertiam pyada, quæ omnium perniciosissima est: siquidem erecto in anteriorem partem collo, ex intervallo longitudinem quod satis est emensa, uenenum hominis in corpus iaculatur & expuit. Hanc aspidē ferunt Aegypti reginam Cleopatram, quum superato & interfecto Antonio, Augustum uictorem timeret, ne in seruitutem se & triumphalem abriperet pompam, sinistrae mammae feriendæ admouisse, unde demorsam celerrima & subitanea mors consecuta est. A cerasstis igitur morſu locus cum duritie in tumorem attollitur, & pustulas agit, ex ictu autem loco fluit aquosus humor, quandoq; ater, subpallidus interdum, & colore porraceo: uniuersum uaricum modo corpus in hac peste constitutum tu met, pudenda arriguntur, mente capiuntur, oculorū caligo exoritur, conuulsione tandem rigentium modo decedunt. Qui porro ab aspidē icti sunt, uulnus sanē his quæ acu puncta fuerunt, prorsus simile apparet, exiguū admodum & absq; tumore, non usquequaq; cruentum, paucillus uerō & ater sanguis destillat, caligo quamprimū oculorum acies obnubilat, uniuersq; statim corpore multiplex, sed leuis, nec sine uoluptate languor urget. Proinde scite admodum Nicander cecinit: *κακίστη δ' ἄσπις ἀνθρώποις*, hoc est, peritq; citra dolorem homo. Color demorsus permutat atq; uirescit, stomachi nō adeò grauis erosio infestat, frons perpetuò reuellitur, palpebræ absq; sensu, quasi in somnio uacillent, contremiscunt & conuiuent, & his mors incumbit, uix enim in tertiam diei partem supersites sunt. Vtriusq; igitur his ocyssime mutilatio succurrit: Quam ob causam mature pars icta si fieri possit, à reliquo corpore amputetur. aut confestim omnis circūsecanda ad os usq; in uulneratis partibus illisq; adiacentibus caro est, deinde etiā quæ supersunt cauterijs persequenda:

Cleopatrae inuenerius.

Aspidis morsus

Horum namq[ue] uirus æquale Basilisci est, nec aliter quàm lac bouis occi-
me in arterijs sanguinem ac spiritum coagulat.

De Basilisco. Cap. xx



Aec fera in mortalium conspectum rarerent quidem uenit,
Erasistratus uero tradit, quum Basiliscus momorderit, plaga
subflauo & quasi aureo colore fulget. Eiusdem aut tam uiru-
lenti animantis ictibus cōferre putat castorij, si potentur, dra-
chmas treis, similiterq[ue] papaueris liquorem, quod opium dicitur. Nos
uero horum nihil experientia comprobauimus.

De Pastinaca marina, & Muræna. Cap. xxii



Aeterum inter has quæ in mari degunt feras, pastinacæ qui-
dem & murænæ cognitio omnibus admodum liquidò patet,
nobiles enim atq[ue] omnibus cognitipiscis sunt. Moribus aut
horu succurrut succi ficulnei ita lagni quatuor, uel paulò plus
cum conijs serpylli tribus aut quatuor poti, & cuncta quæcuncq[ue] aduer-
sum uiperæ morsus remedio sunt.

De Dracone marino. Cap. xxiii



Arini draconis ictus plumbo cōfricandus est, uel locus trito
serpyllo, lentèue decocta, aut sulphure cum aceto obstruen-
dus, uel idem hominis urina fouendus & conspergendus:
Dandum insuper contra eius animantis iniurias ablinthium
in diluta plus satis uini potione, uel saluia, ficulneorum ue surculorum in
dulci uino dilutum, aut piscis etiam cerebellum.

De Scorpione marino. Cap. xxiiii



Cui scorpionis marini medetur trigla dissecta & uulnere im-
posita, sulphur igne intactum ac uiuum, cum aceto contritum
& leuigatum, quo quidem confricandus est locus: potandæ
item baccae lauri numero tres.

Præparatio sanguinis testudinis marinæ. Cap. xxv



Testudinis belluæ marinæ sanguis ad reponendū hoc modo
præparandus est: In ligneo aut fictili uasculo supinā inclinan-
do testudinem, quamprimū eius oberuncato capitulum: Con-
gelatum aut sanguinē in plures particulas harundine disijce,
impositoq[ue] uasi operculo intar cribri, in solem colloca, arefactū uero iam
tolle: deinde ubi res postulat in uiperarum moribus quemadmodū tra-
ditum est, utere, drachmis uidelicet duabus, cum aceti cyatho uno, tertio
autem loco drachmis duabus cum aceti cyathis tribus.

De Crocodili ictibus. Cap. xxvi



Duersus crocodili ictus, utiliter nitrum cum melle eliquatū,
tantisper dum hucus repurgatur, imponitur, mox melle, bu-
tyro, medulla cerui, adipe anserino implendum. Porro Gale-
nus testatur à crocodili morsu percussos pinguedine eiusdem
belluæ

belluæ uulneribus imposita, exacte ab omni periculo liberatos.

De hominis morfu. Cap. xxvi



Non à nostro instituto fuerit alienum, cum ijs quæ uenenū ictu morfuue relinquit animalis, hominis quoq; morfum ictumq; describere, siquidem longe perniciosiora cæteris hulceribus uidentur, quicunq; ab hominibus inferuntur morsus, præsertim si qui morsum intulit ieiunus fuerit, anteaq; legumina pro cibo sumpsit, atq; in primis lenticulā. Eapropter quæcunq; cōmuniter alijs uirulentis prodesse docuimus, eadem in his quoq; extrinsecus morfui inter
 10 principia adhibita cōuenient, exceptis nimium acribus, & causticis, hoc est deurentibus. Priuatim uero morfu prius oleo perūcto, sceniculi radicem admixto melle ut cataplasma impinge: uel fabaceā farinam cum posca & oxyrhodino emplastri modo impone, identidem mutando. Emplastro adhæc utere, cōstante ex squamæ aeris, galbani, æruginis, uniuscuiusq; uncia una, ceræ libra una, plumbaginis libris duabus, olei xesta una: Plumbago cum oleo prius elixata æruginem assumit & squamulā, & ubi iam in angustū contractū fuerit, accipito eliquata. Postquam uero inflāmatio quieuerit, ueluti cōmune uulnus, etiam illa curato.

De uenenis. Cap. xxvii



Postquā de uenenū ictu morfuue relinquentibus animalibus
 20 cōpendio tradidimus, consentanea admodum ratione sermonem de uenenis quoq; aggredi instituimus. Simplicia quidē persequentes, & horū non significationes modò notasq; sed amuleta præsentanea aduersus idem uirus, quæ Græci ἀντιστήρια uocant, cum in genere cōmuniter, tum singulorum priuatim deprompsimus: ex his per se suo cuiusq; Marte coniectanda & colligenda sunt composita: Sunt etenim qui uaria diuersaq; uenena letalia cōpositis profligent, quæ legentibus officere plus q; prodesse possunt: Neq; enim indicia horum exacte ac liquide in affectis deprehenduntur, ut quis inde his cōueniens
 30 applicet auxilium: Diuersis uero his apparentibus, ex eo quod in mixtura pollet. Aequali etiam modo quis traditum uarij generis uenenū coniectans, operabitur interdum quidem ex æquo, nōnunquam uero ex eo quod præualet. Auspicandum igitur etiam hic loci denuo à præcauendi modulis, qui græce prophylactica dicuntur, quasi latine dicas præseruatia, & quorum beneficio uitari queunt exitia.

De præseruatione uenenorum. Cap. xxviii



Inter ea quæ de letalibus uenenis traduntur, ea quæ de præcautione agit ardua magis ac difficilior est species, propterea quod qui uenenis homini clam insidiant, tam dolose insidias
 40 temperant, ut peritissimo cuiq; facile imponent: quoniam uenena sua amaritudine, admixtis dulcibus spoliant, & odoris grauitatem mixtura odoramentorū à letalibus uenenis eximunt. Non raro autē ceu

ad leuandam ualeitudinem, opus est ferendae gratia propinare creduntur maxime in infirmitatibus eiusmodi, puta ablinthium, abrotonum, opopanax, castorium, quibus uenena permiscunt: Necnon in cibarijs nempe solidioribus, uel opsonijs rebus diuersis uarietatis, uenena compingentes exhibent. Quam ob causam, qui in istiusmodi suspitione fuerit, condita elaborataque cibaria omnia uitare debet, omnesque intensas gustu qualitates, quae ex dulcibus uidelicet salisque & acidis saporibus constant: praesertim uero gelida potu praesumenda est aqua. Satiato enim appetitu, facile corripuntur à stomacho postea qualitates. Sed alius adhuc est efficacior precauendi ab ijs qui uenena insidiosae miscere student, modus, ut uidelicet quibus ceu eius praesaga malimens semper praecomendant aliquid, quod uenenorum uires retundat, inefficacesque reddat: cuius farinae sunt carice cum iuglandibus, quas nuces basilicas uocant, manducatae: & ruta, & chondro & grumo salis, & mala medica, quae citria dicuntur: Naporum item semen drachmae pondere cum uino potum, uel nepitae foliorum, uel sigilli lemnij par pondus, aut rutae folia uiginti, & nullo sic ueneni genere laedent. Eundem effectum praestant & antidoti cum uino sumptae cotidie Aegyptiae fabae magnitudine, citra omne periculum praeseruant: e quorum numero censetur, quae scinco, id est terrestri crocodilo & sanguine temperatur, & Mithridatios: hac olim rex ipse Mithridates cotidie usus est, quo se à letali ueneno defenderet, & tutum omnino ab eius periculo redderet: Quocirca à Romanis captus, quum iterum atque iterum letale uenenum potasset, atque mori nequiret, seipsum ense confodere aggressus est. Verum quoniam fortunae temeritas saepenumero in itinere locisque desertis periculo expositis similia sine insidijs hominum discrimina adfert, si forte fortuna sub aliqua arbore, uerbi causa pinu uel picea cibus sit capiendus, animaduertenda sunt quae ex his provenire possunt exitia, uel laquearia, unde letifera labuntur interdum animalia. Inspicienda porro etiam diligenter sunt uasa uinaria & aqualia. Adhuc etiam aululae in quibus decoquuntur edulia, suo accurate cooperiantur operculo, quemadmodum & in animalium morsu istius uirus relinquentium praecautioe iam pridem est traditum.

Communis quocunque modo sumptorum uenenorum curatio. Cap. XXIX



Quod si praeseruatiuis quibusdam aliqui ante mortiferi ueneni haustum sese probe muniuissent, tum certe nullo medicamento sumpto, sponte uirus uomitione efferent, qualia saepicula multa in uita hominum solent accidere, uel ex quorundam etiam insidijs: Siquidem nobis sumptum uenenum liquidum quale fuerit patefit, uel his qui sumpserint, aut ijs qui interfuerunt annunciantibus, primum ad idoneum accedentes remedium, ueluti in horum explicatione memorabitur. Verum si nulla nobis hausti ueneni cognitio prebeatur, protinus ad

ea properandū, quæ communiter in cuiuslibet ueneni haustu opitulari consueuerunt: nam expectare quæ comitantur indicia, malum nullis cedens medicaminibus reddit, quod intercedente dilatione, nō nisi æger, rime succurri possit. Proinde sine mora calidum oleum per se uel cum aqua bibendū, ut uomere cogantur, dedisse expedit. At si oleum ad manum nō sit, butyrum olei loco cum calida aqua, aut malua, aut semine lini, uel tragi frugis, uel scenogræci, uel urticæ deniq; seminis decocto exhibendum. Hæc quippe non modò uomitione purgabunt stomachum, sed aluum quoq; subducent, & malignitati uirus aduersabuntur, adeo ut accrementū eius hebetent, præsertim oleum, quod euidenter ex eo datur argumētoprehendere: Si quispiam cantharide, aut calce aqua nō extincta, aut quauis acriore alia recutem exulcerare statuerit, is si ipsum oleo præunxerit corpus, nō exulcerabitur. Atqui neq; spissare, si antea oleo illitum fuerit, corpus poteris. Vomitus præterea non ob id modo quod uacuet, & noxium humorem educat, salutaris est, sed assumptum aliquando uenenum, odore, coagulatis grumis, ac frustulis concretis, uel colore arguit: Odore quippe & amaritudine cicutam, colore cerussam & gipsum, globulis cōcretis lac, uel nuper iugulati animalis sanguinem: Fœtore autem halitus, & materiæ euomitæ qualitate, & odore, leporem marinum, & rubetam ranam prodit. Ita ut ab ijs nonnullam opem sperare liceat, ad accommodata singulis uenenis remedia transeundo, oleo malug decoctum admisceatur, uel adeps anserina, uel pinguium carniū ius, uel auium, uel lixiuium ex lignorum cinere factum. Facit item ad hoc nitrum cum hydromelite tritum & haustum, & uinum uetus copiose potum, & quæ ex adipe & butyro constant. Deiecto uero per uomitum quod hæserat in aluo, acerrimo clystere reliquias in intestina delapsas educemus. Post hæc uero propinandum est lac, nam molestum & uirulentum facile ab illo permutabitur: Dantur præterea quæ comuni dote cunctis uenenis accommodata sunt remedia: cuius generis habentur, rubrica lemnia, agaricum, abrotonum, irion, radix eryngij, pastinacæ erraticæ semen & nepitæ, nardum Celticum, castorium, uiridis ferulæ medulla, nerij, quod rhododendron appellant, flores, uel rhododaphnes, marrubij cremor, laser, aut laserpitium, quod est silphium eius uel liquor, sagapenum, panacis aut peucedani succus & radix, aristolochia longa, rutæ syluestris semen, Betonicæ (quam cestron dicunt) folia, singula cum uino drachmæ unius pondere. Confert insuper & polij elixatio, & pix liquida in ecligmate sumpta. Egrege uero præter cætera opitulantur antidota prædicta, & magis adhuc ex uiperis concinnata theriaca, uerum ne utiquam eandem potestatem habent, quum le-

talibus uenenis succedunt, & quum eadem anteuertunt. Quæ enim antidoti quantitas præsumpta sufficeret contra afflictionem & calamitatem, quas uirus comites habet, idem antipharmacon post ueneni haustum

ad auctum in quadruplum, aut quintuplum exhibitū uiuit, neq; id semel modo per diem, sed bis: nam sic egregio & ad miraculū usq; in arte praeclaro uidetur ipsi Pergameni Galeno.

Enumeratio simplicium uenenorum.

Cap. xxx

Animalia exi-
tiosa.

Semina leti-
fera.

Liquores mor-
tiferi.

Radices uis-
ridentes.

Plantae co-
pitales.

Animalium
partes.

Metallo.

Inopportunitas
uini & aquae.



X uenenorū catalogo, animalia mortifera hae sunt: Cantharis, buprestis, salamandra, picearum eruca, lepus marinus, rana rubeta, & muta palustris rana, haustae hirudines. Ex seminibus uero letalibus sunt: Apollinaris herba, quae hyoscyamus est, coriandrū, pulicaris, quod psyllium significat, cicuta, nigella Cith appellatū, graece uero melanthion. Ex liquamentis aut exitiosam uim habentibus censentur, meconiū, carpasi liquor, opocarpa son graece uocatum, thapsia, elaterium, & mandragora. Radices porro exitiales sunt, Chamæleon, aconitū, thapsia, ixias, helleborus, agaricum atrum, & ephemeron, quod colchicum nonnulli à Colchide ubi nascitur appellat. Arborū germina, frutices & holera capitalia sunt, Smilax, quam aliqui thymion, Romani uero taxum appellant, solanū manicum, hoc est furiosum, quod & dorycnion dicitur, sardonio herba, quae ranūculi herbae species est, corniculatū papauer, pharicum, toxicū, ruta syluestris, & fungi. Ex animalū uero partibus letales etiam hae sunt: recens taurinus sanguis, coagulatum lac, melq; in Heraclea Ponti genitum. Metallica uero gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod nomen obtinuit argentum uiuum, graece ὕδρῳ γυγῶρ. E uitibus postremo, uinum liberalius à balneo potum, aut passum, uel aqua egelida consimiliter, hominibus tanquam praesentaneū possunt esse uenenum.

De Cantharide. Cap. xxxi



Is qui cantharidas hauserint, notē accidit omnium grauissimae: nam ab ore ferre ad uescam usq; cuncta morderi sentiuntur, picem aut simile quiddam cedrio liquori resipiunt, inflammantur in dextra parte praecordia, urinam egerrime emittunt, saepiusq; per eam sanguis fertur. Quinetiam excernuntur per aluum strigmenta haud aliter atq; dysentericis, animae deliquis, ciborū ueluti ex repletionē fastidijs & uertiginibus cōcidunt, postremo abalienantur mente. Succurrit itaque uomitus citatus cum hydrelæo, & laetis potu, cretae cimoliae drachmis quatuor, cum mulso: nuclei praeterea pinei, cucumeris item semen, ius bubulum pingue, uel anserinum, & ouinum. Carnes insuper praebantur uolucrum, gallinaceorum uel, aut agninae, uel ouium, uel porcellorum deniq; flaccescentes longiore coctura, & pingues cum lini semine elixae. Vino praeterea potentur dulci & prolixius. Accommodatae sunt insuper ijs qui cantharidas sumperunt, thuris corticis drachmae quatuor. Post esculenta item fercula clystere ducenda

ducenda aluus, qui conficiatur ex succo oryzæ, uel chondro, uel trago, uel ptisana, uel malua, uel semine lini, uel althæa, quam Romani hibiscum dicunt, uel scenogræco. Quādoq; mulsum cum nitro oportet his ad abstergendum intestina infundere. Postremo inflāmantia cum confectura seminis lini, ac hordei mitiganda, intra primordia nancq; statim offenderrint: Deinde dulcium aquarū balneis in hoc periculo utendū: Vtile fuerit deniq; potionari ungento cum irino, tum rosaceo.

De Bupreste., Cap. xxxxi

Qui Vibuprestidem potauerunt, uiroso nitro simile quiddam in sapore sentire uidentur: urget stomachi & alui grauissimus dolor, inturge scunt eadē partes difflatæ, ut in cutem subeunt tibus aquis, totoq; corpore cutis extima contenditur, lotium item supprimitur. Opitulatur autem his eadem quæ haustis cantharidibus opem ferunt: priuatim post uomitiones & purgationes, quas clysteribus molimur, caricæ (quod est ficus aridæ) bono & remedio sunt, & cum uino pota earum decoctio, uel cum lacte hausta, uel œnomelite, mulsoe: pirorū omne genus esse, & lac muliebre potare expedit.

De Salamandra, Cap. xxxxi

Alamandram qui hauserunt, linguæ inflāmationem subeunt, & in sermone linguæ impedimentum, & cum torpore quoddam resolutioneq; aliqua tremorē: pallorq; corporis partes aliquas circumquaq; inficit, perennenteq; ueneno diutius, sæpenumero putrefactæ defluunt: Quibus præstabimus cuncta, quæ contra cantharidas fieri instituta sunt: priuato uero peculiariq; remedio exhibebimus resinā pineam, uel nucleum pineum, aut galbanū cum melle, uel nucleos pineos cum terrestri piceæ herbæ (quam chamæpityn dicunt) decocto: uel urticæ folia cum lilij & oleo decocta. Conducunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestris elixa, ranarum item esculentum ius, cum quibus pariter eryngij radix decocta sit.

De picearum eruca, Cap. xxxxi

Inorum erucam haustam comitatur illico oris & palati dolor, linguæq; inflammatio uehemens, & stomachi, aluiq;, & intestinorum dolor, ita quidem ut pruriginem sentire laborans uideatur: corpus uniuersum æstuat, ciborum fastidium urget. Quibus est succurrendum his itidem suppetijs, quibus cantharidibus deuoratis medicinæ professores opem ferre consueuerūt: peculiari tamen simplicis olei loco Melinum accipimus.

De Lepore marino, Cap. xxxv

Vi leporem marinum in potu hauserunt, corruptis piscibus similem in gustu uirosum saponem sentiunt, progressu deinde temporis aluus intenso dolore afficitur, lotium supprimit, & si quando id erūpere cōtingat, purpure omnino faciem refert. Oderunt præterea eo malo languentes & auersantur etiam summpere

piscium omne genus, foetido sudore, cruento ac sanguine mixto manant. Quibus opis terendae gratia lac asininum, passum uel continue exhibendum est, uel radicis malug foliorumque decoctum, uel peucedani radix tria cum uino, uel ueratri nigri, aut scammoniae herbae succi drachma una in aqua mulsa: suoque calore adhuc tepēs anserinus sanguis. Et quū omne piscium, ut dixi, genus respuant, qui leporem marinū biberūt, solos fluuiatiles cancos, si haberi queāt, libenter in cibos admittūt. Quamprimū amare & comesse pisces ceperint, futurae salutis indicium & spes est.

De Rubeta ranāue palustris. Cap. xxxvi



Curatio.

VBeta seu muta palustris rana assumpta, tumores corporis cum eo pallore sequuntur, ut buxo per omnia similes compareant, qui hauserint. Superaccedunt spiritus difficultas, grauis animae orisque foetor, & singultus, quandoque nolentibus uolentibus seminis profusio. Succurritur autē facillime post uomitiones, largo meraci uini potu, radicum harundinis binis drachmis, uel cyperi: Atque ut uno uerbo perstringam, cogendi in eo discrimine constituti sunt, multa celeritate deambulare, & cursui operam dare, ob eum quo ex hoc malo corripuntur torporem: Quinetiam lauari cotidie expedit.

De Hirudinibus. Cap. xxxvii



Medic.

Hirudines simul cum aqua haustas, & uentriculi ostio in descensu haerentes, ex eo quod alios fugent mordentque deprehendentes: Nam hoc deuoratae hirudinis fatis euidentis argumentum est: Interdum excreando sanguinem etiam expuunt floridum, gutturi affixis hirudinibus: Quas eijcit muria sorbitione sumpta, uel laeseritiae aut betae folia cum aceto, & liquor Cyrenaeus, uel cum posca niuis glebula hausta: Gargarizetur praeterea nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. Sed eas quae faucibus haeserunt hirudines, ubi in eo periculo constituti in calidam aquam tuo iussu descenderint, dato lupinorum farinam, & aquam frigidam in ore retinendam, eaque ratione easdem expelles hirudines: proficient etenim ad gelidam promptissime. Sunt qui cimices his qui hirudines biberunt utiliter exhibere. Caeterum ipse, inquit Galenus, alijs priuatim in hirudinis haustu usque usus, cimicibus non indigui.

De Chamaeleone. Cap. xxxviii



Curatio.

Equitur uernilagii (quod chamaeleon graece nuncupant) haustum, cum uellicatio uehemens, tum dolor etiam ingens, cum uniuerſi corporis subuersione tremor: mox ingruit etiam coeuiusio, & uomitiones pituitosae & spumosae, & perdita uoce singultus cum peruersitate & contorsione uultus. Subuenit his triticeus cremor pinguis, calidus in potu sumptus, & dulce uinum aqua dilutum calidum. Recreat item eos qui carduum nigrum (sic enim Romani chamaeleonem uocant) sumperunt, uomitus, lactipotatio, & mollis clyster, forisque, cum cataplasmatibus. Atqui aduersus ea quae suffocationem spiritusque angustiam inducunt

inducunt & luriditatem, potum absinthij uel nitri cum oxymelite, uel raphanis, quas Latini radículas dicunt, dare conuenit. Prodest insuper & præcordiorum fomentatio.

De Alterco, quod Hyoscyamum nuncupant.

Cap. XXXIX

A Pollinaris herba, quæ à Græcis *ύονόκλυσ* uocatur, pota man-
saue, ebrietati similem inducit mentis alienationem; citra ue-
ro omnem difficultatem curantur qui eam hauserint, si libe-
ralia quæ mulsæ potu, & lacte, præsertim asininio, egregijs
in hunc hostem præsidijs succuramus. At si lac asininum desideretur,
10 caprillo, seu bubulo, caricarum uel decocto utere. Efficaces præterea sunt
nuclei quoque pinei, cucumeris semen haustum cum passo, uinumq; sal-
sum, cum adipe suillo recenti, & passo; necnon uricæ semen, uel nitrum
cum aqua accommodatum est, & intybus erraticus, quod cichoriū uocant:
Prodest item sinapi, nasturtium, raphanus, & allia, atq; hæc singula cum
uino sumpta conferunt. Quies porro imperanda his est, ut uelut ebrij uil-
lum edormiant, somno concoquant.

De Coriandro.

Cap. LX

X Equit ob odorij uehementiam latere coriandrū, uocem autem
haustum densiorem reddit, furorem inducit ebrietati non absi-
10 milem, turpia dictu qui hauserunt, blaterant, totoq; corpore odo-
rem coriandri spirant, uenenumq; fatentur. Succurrit uero ita affe-
ctis (si antea ut præmonstratum est, uomitione oleo aut irino citata uirus
eduxeris) merum tum unā cum absinthio, tum etiam per sese epotum.
Magna itidem utilitate aduersus coriandri iniurias, ouorum putamina
omni humore euacuata, & in seipsa cōfracta tritaq; cum muria absorben-
tur: quin ipsa seorsim quoq; muria in eundem usum potanda est. Prodest
etiam salsum esculentum ius ex gallina & anseris, atq; passum deniq; ad-
mixto lixiuo sumptum.

De Pulicaria herba.

Cap. LXI

P Sylliū, id est pulicaria herba, potū toti corpori aliorū & tor-
10 pore cum exulceratione animiq; tristitia infert. Cui sanē
omnia cōueniunt, quæ cōtra coriandri haustum remedio sunt.

De Cicuta.

Cap. LXII

C Icutæ potus tantam oculis caliginem offundit, uertiginemq;
excitat, ut ne minimum quidem eminens dissita possint cerne-
re, singultum cit, amentiam inuehit, & extremarum corporis
partium frigiditatem: deniq; suppresso à motu omni in arte-
ria (spiritu, cōuulsione suffocantur qui cicutam hauserint. Quam ob caus-
sam inter initia statim, ueluti in alijs decretum est, uomitui operam dan-
40 tes, cicutam excutimus. Postmodum euacuatione facta, quod ad inte-
stina prolapsum est excernamus: tum deniq; ad id qd primas in hac pro-
uincia tenet adminiculum deueniemus, meracas potiones per interual-
la propinantes, in quibus profuerit lac bubulū uel asininū potui datum,

uel absinthii cum pipere comuni & castorio, rutam itidem & mentam cum uino, & cardamomi, uel styracis drach. unā, uel piperis cum urticae semine & uino, uel lauri teneriora folia: laser itidem & laserpitium cum uino & passo. Quinetiam uinum dulce seorsum prolixius & liberalius potum, ita affectis auxiliij quantum satis strenue praestat.

De Papaueris succo, quem Meconion uocant. Cap. XLIII



Apaueris succi (qui opium dicitur) potum sequitur cataphora, quae sopor quasi ueternofus est, cum tam uehementi algore & pruritu, ut saepenumero inualefcente ueneno tanta erupat prurigo, ut qui hunc liquorem biberint, ea uexatione excitentur: Odor praeterea eius pharmaci grauiter toto corpore spirat. Succus rendū his est, post citatū oleo uomitu acriore clystere, corporis cum acetō mulso illinitione: Melle insuper cum rosaceo calfaciendū: & meri multum cum absinthio, & cinnamomo, & aceto calido per se prebendū: nitrum itidem cum aqua, rutaeq; semen cum pipere, organū cum castorio, uel oxymelite, uel thymbra, uel origani decoctū cum uino. Oporteret etiā eos qui papaueris liquorē potarint, naribus odorientis adhibitis excitare: Loti praeterea in calidae aequae balneas deducēdi sunt, fomentisq; obenantā pruriginē fouendi. A lauacro confert iurium esculentorū pinguius usus cum uino, aut passo: Proderit etiam medulla cum oleo pota.

Opium totum
corpus graue
sens reddit.

De Carpesiae cremore. Cap. XLIIII



Tarpesiae herbae succus in potione haustus, soporem, quem caron dicunt, praecipitemq; strangulationem adducit. Opitulatur his qui sumplerunt isdem omnino suppetijs, quibus epotae cicutae succurritur.

De Mandragora. Cap. XLV



Opit etiam protinus malo sopore, si potetur mandragora, commitatur item languor & exolutio, inexpugnabilisq; somninessitas, quam ueternum Romani, Graeci uero *καταρσις* indigitant, nihil à morbo quem lethargum nominant, dissidens. Proficat priusquā aliquid eorum accidat, uomitus, & à uomitu mulsū, & nitrum, & absinthij decoctum cum passo uino dulci sumptum. Caput rosaceo, & aceto irrigandū: Corpus item excitandū & commouendū. Opem etiam fert olfactus piperis, sinapis, castorij, rutae tritae in aceto, & liquidae picis: Quinetiam nō tam accensi, quā extincti lucernarū funiculi odor. Quod si difficulter excitabūtur, & odorientis nihil egeris, sternutamenta quae altius excitent, admouenda: alijsq; comunibus admiculis aduersus mandragorae haustum utere.

De Aconito. Cap. XLVI



Conitum confestim à potu interq; bibendum cum adstrictione quadam edulcat linguam, uertiginesq; praecipue in assurgendo oboriuntur, humiditatemq; oculis infert, facitq; periculis & praecordiorū cum crebriore peditum aliorumque elixae

spirituum redditione grauitatē. Quocirca in huius mali curatione, re-
medio ueneni educendi gratia ciendus est uomitus, & ducenda clysteri-
bus aluus. Vtemur etiā ad expellendū uirus aconiti, potionibus origani
& rutę, uel marrubij cum uino, uel absinthij, uel mentę, uel abrotoni, uel
chamaelę, hoc est herbę oleastelli, aut terrestris piceę, Expedi prę-
terea aconito infectis, liquoris balsami drachma una cum uino, coagulū
itidem hęcidi, uel leporis, uel hinnuli cum aceto. Prodest etiā ferri recre-
mentum: prodest item uinum in quo ferrum, uel aurum, uel argentum
candens extinctum sit, potū. Lixiua insuper cum uino confert. Confert
10 itidem elixę gallinę, uel carniū pinguiū ius cum uino epotum. Cha-
mępitys pręterea priuatim aduersus aconitum succurrit, quę in Hera-
clea quidem Ponti, ubi aconitum prouenit, holoceros nuncupať, Athe-
nis uero didonia, & in Eubcea sideritis.

De Ixia. Cap. XLVII

IXias, quę ulophonon quoq; uocatur, inter potandum ocymo
quiddam simile gustu & odore pręfert, uehementem linguaę
inflammationē & amentiam infert, omnia etiā corporis re-
trimenta excretionēq; supprimit, & cum animi deliquio stre-
pitum latratumq; intestinorū ac uiscerum excitat, neq; tamen uel tantū
20 lum excernitur. Opem his pręsentaneam adferre post uomitionem, al-
uiq; deiectionē potum cum largiore uino, aut aceto, uel oxymelite absin-
thij dilutum, hoc est aqua in qua absinthium maduerit. Confert itidem
rutę syluestris semen, uel laseris radix, necnō hirtinę origani decoctū,
cum aliquo supradictorū, aut lacte, aut resina terēbinthina, aut nardo, uel
castorio, uel laserpitio, quorum singuli oboli cum uino expediunt. Quin
& iuglandis nucis, quam basilicā dicunt, nucleī cum uino, aut resina, ru-
taq; concisi & leuigati, ita ut singula pondo drachmam æquent. Confe-
runt itidem oleastelli herbę drachmę duę, uel binę cremoris thapsię
drachmę, cum mulso, uel acetum deniq; calidum potum.

Dilutum quid.

De Ephemero. Cap. XLVIII

Iquis ephemerum, quod colchicū aliqui aut syluestrem bus-
bum appellant, hauserit, pruriginem uniuerso corpore sentit,
non secus quā si qui urtica aut scilla laceffuntur. Morden-
tur illi interanea, & cum ponderosa grauitate stomachus æ-
stuat, inualecente deinde morbo, cruenta strigmentis mixta per aluum
secedunt. Quibus sanē non aliter atq; ijs qui salamandram hauserūt,
uomitionibus & clysteribus succurrēdū est, priusquam uenenū inua-
lescat. Exhibenda est potui foliorum quercus, aut glandium, aut malico-
riorum, aut serpylli cum lacte elixatio, aut sanguinalis herbę succus, aut
40 uitis, rubiue palmitum, uel tenerarum ferularum medullę, myrtiue cum
uino. Quin baccae etiā myrti tusę, friatę, & in aqua maceratę, earum
diluto, liquore uel epoto, pręsenti remedio sunt. Efficax pariter est me-
dius castanearū (quas glandes Sardonias dicunt) liber, cum aliquo prę-

dictorū succorū haustus. Vtilis quoq; est origanus, si cum lixiuio in potu sumptitetur. Eximie uero & ad unguem pristinae sospitati, qui ephemerum hauserunt, redduntur, asininum bubulum uel lac bibentes, aut si in ore modo contineant, atq; uoluerint, a deo praesentanea ope, ut si huius lactis copia adsit, nullum aliud desideretur remedium.

De Taxo arbore. Cap. XLIX



Rbor quae smilax, & à quibusdam thymion, à Romanis uero taxus appellatur, pota, algorem uniuerso corpori inducit, strangulationes, & celerem interitū infert. His sanè qui eam hauserunt, eadem remedia, quae cicuta in potu sumptae succurrunt, opem admodum praesentaneam conferunt.

De Solano furioso, quod & Dorycnion quidam uocant. Cap. L



Orycnium, quod quidam manicū, hoc est furiosum solantum nuncupauere, potū, affeclas habet mordicus inhaerentes, ceu lactis in gustu qualitatem, cōtinuos singultus, linguāq; ariditatem, & sanguinis iugem excreationem: Per alium praeterea mucosa quaedam, perinde quasi in intestinorū torminibus egeri sollet, ita infectis ferunt. Quibus antequā aliquid ex his contingat, remedio communiter sunt, quaecumq; in Ephemero comprehensa sunt, uomitus inquam, & clyster, intestinorū inundatio, atq; summatim omnia quae potum uirus expellendi potestatem obtinent. Proprie uero subueniūt hoc malo oppressis mullum, lac asininum, aut caprillum, uel cum aniso tepidi passi momentum, epotum. Prosunt itidem amygdala, & gallinaceorum elixa pectora. Quinetiam omnes marinas conchulas cum crudas tum tostas in cibo esse conducit. Salutares item sunt locustae marinae, quos *καρχαροι* Graeci, & *γαμμάρι*, quos *ἀσπίδες* eadem gens appellat, & haustum eorundem elculentum iusculum.

De Sardonía herba, quae ranunculi species est. Cap. LI



Herba quae Sardonía nomē habet, ranunculi herbae generi adscribitur: quae dum estur aut potatur, dementiae infert, & neruorum conuulsiones, cum laborū in rictum contractione, ut risus imaginem praeferat: à qua quidem affectione atq; euentu Sardonius risus nephasti ominis adagio omnium ore iactatur. Cui quidem malo obnoxius, post uomitionem proprie mullum prolixius, neq; auare exhibitum confert: pariter etiam lac, uniuersiq; corporis irrigatio, atq; illinitio cum calfaciendi uim habentibus medicamentis, Conducit praeterea in hydrelaeum calidum descendere, post descensum uero in balneas aquae calidae cui oleum admixtū sit: Vngendi fricandiq; egregie sunt, qui eam herbam gustarūt. Atq; ut summatim unoq; uerbo perstringam, curationem huius incōmōdi omnem perinde atq; in neruorum cōuulsione, ne latum quidem unguem diuaricans exequere.

Risus Sardonicus.

De papauere corniculari. Cap. LII



Apauer, quod cornutum appellationē obtinuit, siue mansunt, siue potum fuerit, eadem omnino quæ papaueris succus infert sympt^amata: & proinde hīsdem etiam expugnatur præsidij.

De Pharico. Cap. LIII



Ardum per omnia sapore & gustu æmulatur quod pharicum uocant. Id in potu sumptū, cum mentis alienatione & neruo- rum conuulsione paralytim adfert. Quod quidem malum si expugnare fert animus, eis qui id quocunq; pacto deuorarunt

10 eductis per deiectiones aut uomitiones cum uenenis extremētis, uinum absinthite, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo ciliſſa, quā ifatim ali- qui nuncupauerunt, potui dato. Aut spicæ nardi pondere obolos duos cum passo cōmixtos, aut iride, & croci flosculo cum uino. Opem præte- rea fert, si deraſum caput hordeacea farina ex aceto cum ruta illiniat trita.

De Toxicō. Cap. LIIII



Idetur quidem toxicum inde nomenclaturā mutuasse & ob- tinuisse, quod barbari sagittas cuspidesq; suas, quæ toxema- ta appellant, eo inficiunt. Consequuntur eos qui ipsum bibe- rint, labiorū & linguæ inflāmationes, incoercita infania, ua-

20 rijs mentem perturbans imaginibus obuersionibus. Quocirca perar- dua eorū est curatio, cui ut deplorati medicum unguem porrigentes, ra- ro ad pristinam incolumitatē perducuntur, qui toxicum hauserunt. Vin- culis ergo cohibendi, ut curæ subsiciantur, & uiolentia quadā cogendi, ut passum cum rosaceo potēt, tum ut uomitionibus reddant. Raporum semen itidem cum uino bibendum, pariterq; euomendū. Peculiariter ue- ro contra toxicum ualet quinquēfolij radix, & sanguis hircinus, atq; ca- prillis compari modo epotus. Confert etiam quercus cortex, aut fagi, & ilicis cum lacte tritus. Opem etiā ferunt mala cotonea mansa, uel cum pulegio concisa, & aqua bibita: præterea amomū, & balsami cum uino

30 semen. Neq; unquam, nisi longo tandem spacio temporis cōualeſcunt, ita tamen, ut qui iam periculis defuncti sint, stratis diu decumbāt, & uix deniq; exurgant, & ubi surrexerint, stupore consternati & attoniti reli- quo uitæ tempore degunt.

De Fungis. Cap. LV



Vngorum alij genere, alij nimietate efficiunt: omnes tamen sumpti, ad unguem omnino uidentur ad strangulandū facti, neq; enim secus fermē q̄ suspendio laqueisq; suffocant. Qui- bus absq; dilatione quamprimum suppetias ferre cōuenit: In genere quidem oleo ad uomendū, qui fungos hauserunt, cogantur. Exi- mie uero eiusmodi languore quem fungi inferunt sumpti, subleuātur, ex

40 uitium palmitibus, & pyraſtri ſarmentis cinere factum lixiuium cum po- ſca, ſaleq; aut nitro potantes: Proſunt & pira ipſa ſylueſtria, aut folia unā cum fungis elixa: ſiquidē quam habent fungi ſtrangulandū uim, auferūt.

manfaq̃ eadem eisdem opitulantur. Conferunt præterea contra fungos gallinarum oua decocta, & in posca sumpta, addita mali terræ, quam aristolochiam dicunt, drachma una, uel absinthij cum uino. Prodest præterea mel linctum, & cum aqua potum: apiastrū itidem cum nitro, uel panacis radix, semenq̃ ex uino: fex item uini deusta cum aqua, & flos æris cum aceto: raphanus quoq̃ aut sinapi aut nasturtiū esu aduersus fungos proficiunt. Sed quoniam fungi quidam à uenenatis bestiis corrosi non tantum strangulant, sed etiam intestina exulcerant, exhibendū in eo di scrimine larga manu absinthium, & ficuum origaniq̃ decoctum. Aqua porro mulsa & uomitus in eo periculo constitutis, descensus item in calidæ aquæ solum, hordeacea deniq̃ polenta cataplasmatibus instar præcordijs imposita, languentibus multum subsidij præstant.

De sanguine taurino. Cap. LVI



Anguis tauri recēs iugulati potus, spiritus angustia, & strangulationem ingerit, tonsillarū ac faucium, per quos cibus deglutitur meatus, non sine ualida neruorū conuulsione præcludens atq̃ obturans. Lingua rubore, dentes corrosi eodem colore à potu eius infici conspiciuntur, & inter eorum cōmissuras coagulati sanguinis globuli. Non tentādæ in hoc periculo uomitiones sunt, dentantibus se magis in stomacho sanguinis concreti grumis, quā uomitionis conatu per attractionem in superiorē partem eleuantur. Exhibenda præterea hīs sunt, quæ coētis & condensati sanguinis concretionē discutiendi, alui deſciendi uim atq̃ naturā obtinent. Grossi item suo lacte turgentes, cum posca & nitro succurrunt. Prodest itidem nitrum per se. Cōducit nō secus coagulū omne cum aceto, pariter & laseris radix cum laserpitio, itidem & brassicæ semen, & ex ficulneo cinere lixiuium, cōnyzæ folia cum pipere. Quinetiam ranunculus cum aceto præsentē facis in hoc malo constitutis opem confert. Alius præter hæc subducenda: solenne admodum est his qui periculo defuncti reduces sunt, per inferna reddi teterrimi odoris excrementa. Stomachum postremo aluumq̃ hordeacea farina & mulso cataplasmatibus more operiri expedit.

De lacte coagulato. Cap. LVII



Quoniam lac coagulum admixtum habens, promptissime per exigua quædam frustula grumosq̃ coalescit, multam ac firequentem facit his qui id hauserunt, strangulationē. In quo periculo constitutis manus auxiliares efficaciter tuleris, si antidoti loco coagulum cum aceto exhibeas, atque sæpius id sumere cogas. Succurrunt etiam nepitæ folia arida, item eorundem succus, aut laserpitij radix liquor uel cum posca. Subuenit itidem thymus addito uino: necnon lixiuium luto traiectum, uinōue per cinerem factū: falsilago nulla admittetur, ne magis lac coeat, & in caseum densetur. Vitandæ in hoc periculo uomitiones sunt: siquidem hærens in uentriculi angustijs conglobatarum in perpussillos globulos lac, ad exitum eluctando suffocat.

De uenenato melle, quod in Heraclea nascitur.

Cap. LVIII

Quimel in Heraclea Pontica natum comederint aut biberint, eisdem planè incòmodis obruuntur, quibus qui aconitū hauserunt, obnoxij tenentur: quare huic eadem, quæ dicta sunt in aconito, conueniunt. Saluberrimo tamen atq; in primis secundo opitulatur remedio his qui id cibo potūue hauserunt, aquæ mulsæ (quod hydromel est) admixtis rutæ folijs continui potus.

De Gypso. Cap. LIX

Gypsus hausta, strangulationes efficit in lapidem durens: proinde eisdem omnino his qui ipsum hauserint succurrendum, quibus fungis mansis fuerit adminiculis: è quorū catalogo censetur maluæ elixatio uice olei: pingue enim quum sit, lubricum uomitum ac facilem inducet, prohibet interiora erodi corpuscula, quod lapidescens efficit gypsus. Remedio præterea oleū est in mulso, & sicū decoctio, & ficulneis furculis aut ex pampinis uitiū cum largo uino lixiuium. Quinetiam organū, aut thymū cum lixiuiū siue aceto. Postremo etiā passo & maluæ decocto hoc modo affecti proluendi sunt.

De Cerussa. Cap. LX

Erussa suo se prodit indicio, utpote cuius color celari non potest: nam simul atq; fuerit deglutiū, palatum, lingua, interstitium qua se dentes contingunt, quasi niueo candore inficiuntur. Singultus præterea cit, tussim, linguæ ariditatem, extremorū corporis artuum frigiditatē cum delirio & amentia, corporis torporem ingerit. Quo in periculo cōstitutis aqua mulsa utiliter exhibetur, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamū in uino solutum, aut ex uicium palmitibus factum lixiuium, aut amaracinū oleum, irinum ue. Quinetiam persicorū ossa cum hordei decocto, necnon ipsum etiam thus, cerussæ aduersantur. Confert præter hæc prunorum comagummi ue: Opem itidem fert, qui in ulmorū folliculis continetur liquor cum tepida aqua: sed in singulorum potu uomitiones citandæ sunt. Ac cōmodum præterea contra cerussam est remedium, thapsiæ succus, uel scammoni cremoris triobolus cum aqua mulsa haustus.

De Calce, Sandaracha, & Auripigmento. Cap. LXI

Vexantur & differuntur, alui & interancorū cum grauissima uellicatione doloribus, quicunq; calcem, sandarachā, & auripigmentum, quod ἀπορρυσπ græce dicunt, hauserint. Summo igitur fructu præbentur omnia, quæcunq; admixta frenū eis imponere & soluere possint, quæq; pariter uomitus promouēt, aluumq; lubricam reddant: cuius farinæ hibisci, & maluæ cremor est, seminisq; decoctū. Præbenda est præterea aduersus horum incōmoda tragi herbæ, oryzæ ue elixatio. Quinetiam lac cum mulso liberalius sumptum, iuraq; elculenta pingua, quæ inculpatum succum generent.

De spuma argenti. Cap. LXII



Tomacho, aluo, & intestinis ingentem grauitatem cum gra-
uissimis circa umbilicum torsionibus ingerit spuma argenti
(quem Graeci *λιάργυρος* appellant) pota: praeterea pondere
nonnunq̃ suo intestina sauciat, suppressit lotium, intumescit
sumentibus eam corpus, & pumbeo colore inficit, deformitatemq̃ con-
cipit. Primum in spumæ argenti (sicuti in omnium uenenorum) malefi-
cio est remediū, uomitu quicquid noxij ueneni fuerit educere: à uomi-
tione uero statim syluestris lupini semē cum uino potui dare, myrrhae ita-
dem drach. octo, absinthij item, hyssopiq̃, aut apij semen: Prodest etiam
piper, uel cyperi (hoc est angulosi iunci odorati) flores ex uino potasse:
columbarumq̃ agrestium simum siccatum, cum nardo uinoq̃.

De Plumbo. Cap. LXIII



Omparia omnino atq̃ eadem sanē his qui plumbi ramentum,
uel *πλύμα* hauserunt, accidere consueuerūt: iisdem itaq̃ reme-
dijs, quibus spumæ argenti succurritur.

De Argento uiuo. Cap. LXIIII



Argentum etiam uiuum (quod grece *υδράργυρος* appellatur) nō
secus quàm spuma argēti bibētes lædit: Similibus igitur atq̃
eisdem omnino auxilijs subueniendum, lac tamen liberaliter
haustū, peculiariter ijs uidetur succurrere: Atqui ubi biberūt,
praestat idipsum uomitionibus reddere, uel alioqui uomere.

De Veratro candido, Thapsia, Elaterio, Agarico nigro, Ruta syluestri,
Nigella, & floribus carduorum, qui *πύππος* dicun-
tur. Cap. LXV



Ari praeterea industria prospiciendum etiam ijs, quæ homini
quidem sanitatis salubritatisq̃ gratia exhibentur, sepe tamen
numero calamitates nihilo minores alijs quibuscunq̃ uene-
nis inuehunt: cuiusmodi sunt quorum iam meminimus, helle-
borus inquam albus, thapsia, elaterium, agaricū nigrum: Strangulatus
etenim hæc ingerunt, uel purgando iustum modū longe lateq̃ excedūt:
quocirca suffocationibus illis quidem, non secus quàm paulò ante capitu-
lo de fungis demonstratum est, medebimur. Purgationes uero æquo
copiosiores, his quæ excretiones cōpescere nata sunt remedijs supprime-
mus. Neq̃ socorditer aut oscitanter tractanda sunt, quæ minus quidem
offendere uidentur, uitæ tamen discrimen nonnunq̃ afferunt: e quorū
genere censentur, ruta syluestris, Git, quam nigellam dicunt, atq̃ recen-
tes pappi, qui flores sunt spinæ, quam cactum nominant. Aduersus
quorum incommoda citandus est uomitus: nam is solus in
melius emendare, atq̃ ex periculo quantūuis gra-
ui in pristinam fospitatem restituere satis
commode potest.

Super his quæ contubernalia & in cotidiano usu habentur, uino

& aqua frigida. Cap. LXVI.



Trangulatus & dolores inuolunt, aqua gelida acruatim, aui-
de, & citra interpirationē hausta, uel meracum uinum largius
& copiose potum, aut passum pari liberalitate sumptum, præ-
cipue confestim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitio.

Vbi sanguinis per uenam detractio mature facta, atq; inanitio, ingruen-
tia iam pericula egregie auertunt, atq; etiam soluant.

LIBRI QVINTI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI SEPTIMI.

In hoc uolumine uniuersi operis septimo & ultimo de medicamentorum, cum
simplicium, tum compositorum omnium facultate & uiribus uerba seruntur, quo-
runcunq; hactenus in superioribus sex libris facta est mentio. Est autem huius com-
mentarij series in hunc modum digesta.

CAPITA LIBRI SEPTIMI.

De temperaturis, quæ à saporis qualita- tibus significantur. Cap. I	De pastillis. XII
De temperamentorum ordine, atq; à me- dia temperie excessu. II	Arida sinegmata. XIII
De simplicium medicamentorum uiribus particulatim. III	Vnctiones quæ ori inserviunt. XIII
De purgandi uim habentibus medicinis simplicibus. IIII	Suaues & utiles potiones. XV
De compositis medicinis purgantibus. V	Collyria & reglutinaria. XVI
De custodia eorum qui catharticū medi- camentū sumpserunt, & quid facien- dum his qui non admittunt in potio- ne purgationem. VI	Emplastra & modi coctionis eorum, & de symmetria ceræ ad oleum. XVII
De his qui nimium purgantur. VII	Malagmata & epithemata. XVIII
De sacris antidotis. VIII	Acopa, & synchrisimata, & dropaces, & sinapismi. XIX
Vnctiones sedis, & locorum supra umbi- licum purgatiua. IX	Oleorum & unguentorum preparatio- nes diuersæ. XX
Medicamina uomitoria, modis hellebo- ris. X	De labruscarum preparatione. XXI
De distrahentibus antidotis. XI	Thymiatata & cyphi. XXII
	Preparatio Masuchæ, qd masuaphion quidam appellant. XXIII
	Pelli diuersi generis. XXIIII
	Ex Galeno de succedaneis. XXV
	De ponderibus & mensuris. XXVI

De temperaturis quæ à saporis qualitatibus signifi-
cantur. Cap. i



NE QVE odoratu confici certo satis de naturalium corpo-
rum temperamento potest: Nam quæ odoris minimū
de se præbent, crassarū partium uidelicet, quantam ca-
loris aut frigiditatis habeant uim, intelligi nō est. Quæ
uero fragrantem admodū odoris fluxum emittunt, etsi
natura non paucam quodāmodo habeant substantiam
in se tenuē & calidam, tamen propter inæqualē eorū essentiam certū uel
tenuitatis uel caliditatis suæ modū nullum ostendunt. Magis etiam lu-
bricum ex colore iudicium est, quando calida, frigida, humida, sicca in
unoquoque colore deprehenduntur. Gustu autem, quia æqualiter gu-
stabilium omnium partes linguæ incidunt, & sensum cum pariter mo-
uent in tantum, ut manifeste ex hoc temperaturæ eorū uis inueniri ac de-
prehendi queat. Astringens igitur, aut si stipticum appellare mauis, 10
colligere, constringere, densare, eijcere, repercutere, in crassare atque ad
hæc etiam omnia tum refrigerare tum exiccare sua naturæ aptitudine so-
let. Acutum uero, incidendi, separandi, diuidendi, attenuandi, obstruen-
di, & expurgandi denique, & hæc citra calorem omnem, uires obtinet.

Acerbum. Acerbū aut communem cum acuto sortitum est facultatem, attenuando
nempe & purgando: hoc uero discrimine dissidet, quod acutū frigeface-
re, acerbum calefacere natum est: præterea quod hoc ad eijciendū, illud
ad extrahendum, distrahendum, penetrandū, & crustam inducendum
natura comparatum est. Eodem quoque pacto amarum, expurgat meas 30
tus atque abstergit, extenuat item, & lentos crassosque humores secat absque
caliditate memorabili ualde. Gelidum uero aquæ instar quod est, sistit,
cogit, obturat, solidat, stupefacit. Salsum autem cogit, stringit, condit,
siccatur, uidelicet sine euidenti uel calore uel frigore. Dulce, laxat, soluit, di-
gerit, mollit, ac denique rarefacit. Oleoso postremum humectandi, lique-
faciendi, emolliendi & remittendi denique functio à natura delegata est.

De temperamentorum ordine, atque à media temperie
excessu. Cap. 11



MEdium ad unguem inter extrema pharmacum, symmetron à
Græcis appellatum, tanquam æqualis cum eo cui admoetur 40
temperaturæ existat, eo quod neque exiccandi, neque hume-
ctandi, neque refrigerandi, aut calfaciendi denique uim obtinet,
minime gentium neque aridum, neque humidum, neque frigidum, nec calidū
denique

deniq; nuncupare fas est. Sed ab ea facultate quæ in qualitatum mixtura pollet, appellationem sortitur temperamentū: Siccus appellantes id, in quo maior siccitatis portio est: humidus, in quo humiditatis: calidus, in quo calidū gelido præstat: frigidus, in quo frigus calorē excedit. Satis aut fuerit secundum unamquanc; præpollentem potentiam, quatuor ordines, quos gradus uocant, pro necessitate instituere: uocantibus nobis calidū in primo ordine, quod nos tam obscure calfaciat, ut sensu nō, aut uix percipi possit, sed considerantis solum ratione perpendatur. Pari etiam modo gelidum, aridum & udum, quod indicatione indiget, nōdum ualidam efficaciam ac euidentem obtinēs. Certe quæcunq; iam manifestō sensu arefacere, aut humectare, aut calfacere, aut refrigerare possunt, secūdi à media temperie excessus seu ordinis esse dicenda sunt: Sed quæ manifeste quidē, non tamen ad extremū, tertij: Quæ postremouic; adeo ad calfaciendū nata sunt, ut crustam inducendi atq; exurendi uim habeant, hæc quarti & ultimi ordinis censenda sunt. Contrā quæ tantam refrigerandi uim sortita sunt, ut statim uitam in mortem cōmutare queant, hæc itidem in quarto à temperatis excessu censentur. Exiccatorum uero nullū quarti ordinis inueniri potest, sine exustione: nam quicquid extreme siccatur, id omnino exurat necessum est: eius farinæ sunt, chalcitis, misy, calx. Tertiæ autem à medijs arefacientium distantie aliquid esse potest, nec exurens interim: cuiusmodi sunt, quæ gustu uehementer acerbescunt & astringūt, omnia: è quorū numero habetur omphacium, qui ex uuis acerbis expressus cremor est, & thus, atq; alumen.

Quatuor gradus qualitati.

De simplicium medicamentorū uiribus particulatim. Cap III

DE HIS QUÆ INCHOANT A LITERA A

Abrotonum, Absinthium Ponticum.

Abstinthio Pontico, abrotonon græce appellato, uis & natura calfaciendi & arefaciendi in tertio à media temperie recessu: habetq; eadem herba distrahentem, & non instrenue secantē potentiam: minimæ nanq; acerbitalis particeps est, qua si uniuersum corpus trita cum oleo, probe perfricetur, cum tremore algoribus, qui per circuitum in gruunt, succurrit: Cæterum infesta ac noxia etiam est stomacho. Crematū abrotonum uiolentius arefacit quàm igne intactum. Desluuijs capillorū ex alopecia medetur, oleo quoq; rararum partium adiecto.

Agallochum.

Agallochum lignum est Indicum, Thyiæ ligno non dissimile, odore bene fragranti, quod dum manditur, oris & animæ suauitatem conciliat. Odoris præterea gratia uaporat, & ad suffimenta incendit: Cuius sanè radix in potu unius denarij pondo sumpta, aquosa stomachi ultia siccando, fractamq; eiusdem partis imbecillitatē roborando sanat. Remedio insuper agallochum est satis saluari iocinorosis, intestinorū torminibus oppressis, Pleureticis quoq; hoc est laterali dolore uexatis opitulat.

Agaricum.

Agaricum radix est, quæ arboris trunco adnascitur, & incumbitur. Agiter, laxi corporis & friabilis, ex aërea & terrea essentia cōposita: Quocirca distrahendi, crassitudinemq; secandi potentiā obtinet, infarsusq; cum obturationibus intestinorū ac uiscerū reliquorū expurgādi.

Ageratum.

Ageraton frutex naturam uiresq; habet discutiendi, & præter id clementer ac sensim quadantenus inflammationes arcendi.

Agnos, Salix amerina, & Vitex.

Vitex, qui agnos à Græcis uel lygos dicitur, calidæ & aridæ potestatis est in tertio ordine. Constat aut ex partibus tenuibus. Flatus peditusq; discutit, qua ratione nō tantū mansa uitex potaq; uerū substrata etiam impetū in Venerē cōpescere, castitatē tueri credit. Haustū plantæ huius semē, obturatis et oppilatis iocinorib. lienibusq; succurrit. Si frigitur agnus castus, minus q; non frictus inflat, digestuq; longe facilius est.

Agrostis, Gramen.

Gramen, quod in monte Parnasso prouenit, utilitate albis (si adagio ne uti licet) equis reliqua præcedit, & ob id carior est, siccificæ modiocriter frigoricæq; facultatis, rararum item partium, leue quoddam acrimentum gustu præferens, atq; proinde cruenta hulcera cōglutinat: calculos decoctum eius atterit.

Anchusæ.

Anchusæ species quatuor sunt, neutiquam easdem obtinentes potestas omnes: Nam cui onocleæ nomen est inditum, acerbam pariter & subamaram radicem continet: cuius ergo lienosos commode, atq; renū cum lotij malo quopiā dolores adiuvat. Cataplasmatibus modo cum farina imposita, ignibus sacris, quæ erysipelata dicuntur, tollendo opitulatur. Cæterum huius herbæ folia imbecilliores refrigerandi arefacientisq; uim possident: quare contra alui citra inflammationem exulcerationemq; fluores, quam diarrhœam nominant, utiliter in potu sumitur.

Lycopos. At quæ lycopos appellationem habet, pari modo erysipelatis subuenit, maiore quodāmodo quàm onocleæ astringendi potentia. Sed onochilos & alcibiadios his maiore ui medica prædita, à uipera demorsis eximie conducit, nō tam cataplasmatibus modo inducta, quàm suspensa: neq; minus etiā iuuat deuorata. Quarta anchusæ species reliquis est exilior, & tantum non *ἀνίσχυρος*, id est nullo insignita nomine, uerum alcibiadio uehementiorem habet amaritudinem, tæneis alui necandis pellendisq; oxybaphi mensura epota magis est accommoda.

Anonymos anchusæ.

Adarces.

Adarces, spumā quandam falsilaginis congelatā præfert, in harum adinetis storeæ, calamisq; adglutinata proueniens, summam habens acrimoniā, tantamq; in calfaciendo uim, ut parū absit quin adurat, forinsecus corpori mixtis alijs applicatū, alioqui per se inutile a darcioni.

Siquidem

Siquidem intro in humanum corpus ipsum suscipere, ne per somnium quidem, ut ita dicam, conuenit.

Adiantum, Herba cincinnalis.

Adiantum exiccandi, attenuandi, modiceque dissicendi potestate præditum est. Medium aut quodammodo locum calore & frigore temperatum sortitum est: quamobrem caput ex alopecia glabrum capillis conestit, eidemque capitis uitio planè remedio est, tumores discutit. Quin & uellicæ reniumque lapidosa excrementa frangit si potetur. Opem præterea adiantum ariditate sua exiccando uiscidis è pulmone excreationibus confert, & uentris compescit profluuium.

Aizoon, Pedum.

Aizoon, quod semperuium uocis etymologia interpretatur, maius & minus est, & utrumque tertiæ quidem distantie refrigerantium. Exiccatur uero & astringit aliquantulum, atque ob hoc quidem ignitis cum inflammatione rubedinibus, quæ græce *ιγροπιλάτα* uocant, aduersat: atque huiusmodi, quæ à serpente herpetas nuncupant, & inflammationibus denique quæ ex destillatione oriuntur, Pedum herba succurrit.

Aetonychion.

Aetonychi non hic loci, sed infra inter lapides preciosos mentionem iustam facere instituius.

Athara, Pulticula.

Athara uel athera, pulticula sorbilis est, ex zea triticouæ mollitis confecta, puerulis idonea & utilis, eadem cataplasmatibus accommodatur.

Aegylops, Avena.

Avena herbula, quam ægylopa dicunt, dissicendi potestate prædita est. Eapropter inflammationes induratas, & sui nominis in maiore oculi hircu, qui ad nares fiunt abscessus, medetur ac sanat.

Aegyros, Populus nigra.

Aegyros, quæ Romanis populus nigra est, calidæ est potentie in primo temperatorum ordine, arefacit autem modice, & ex raris admodum est partibus. Populi nigra folia cataplasmatibus more cum aceto impacta, dolores qui miseram pedum ualitudinem sequuntur, amouent. Cæterum quæ ex ægyro lachrymæ modo destillat resina, maiorem calliacendi uim habens, acopis inseritur, malagmatisque inditur. Fructus eius unâ cum aceto in potu sumptus, morbo comitiali languentes pristinae sanitati restituit.

Aedæon, id est, uerendum masculi cerui.

Maris cerui genitale arefactum, & in uino leuigatum & eliquatum, si potetur, ictibus uiperinis subuenit: præterea medicaminibus quæ contra uiperarum morsus componuntur, non raro eius animantis pudendum confunditur.

Aethale, Fuligo.

Aethales, & lignyos, quæ utraque fuliginem Latini dicunt, inferius in altera L fiet à nobis mentio.

Aethiops.

AEthiopidis herbae folia uerbasco sunt similia: Radicis eius elixatio Apota, coxendicis doloribus, lateraliq; dolore languentibus, cruentum item sputum efficientibus succurrit. Arterias praeterea & scabredines cum melle praesenti remedio curat.

Haema, Sanguis.

HAema Latini sanguinem dicunt. Nullus sanguis frigidus est: Suillus quidem humidior, minusq; calidus caeteris est, temperatura sua ab hominis sanguine ne tantillum quidem discrepans.

Haema peristera, Sanguis columbae.

Sanguis colubinus, palumbinus & turturis adamussim ferme aequalis ac medijs temperamenti. Calidus oculorum uitijis, quae Graeci *ὀφθαλμια* dicunt, opitulatur instillatus. Crassiori cerebri membranulae infusus, in his quorum calua perforata est, phlegmonas profligit.

Haema glaucos, Sanguis noctuae.

ADuersus spiritus angustias, quas graece dyspnoeas appellat, magna cum utilitate sanguis noctuae non tam e uino quam ex aqua potatur.

Haema nycteridos, Sanguis uespertilionis.

Vespertilionum sanguis in uirginibus mammaru incrementa custodit & compescit, si ipso perungantur. Ferunt etiam loca quae colliguntur sanguine, depilari atq; glabrescere. Eiusdem facultatis esse affirmant sanguinem ranarum, chamaeleontis, & ricinorum qui canibus tanquam affixi usq; adherent, atq; ob id muscae caninae nomen obtinent. Atqui Galenus mendacium hoc esse asserit, facto rei periculo.

Haema ægon, Sanguis caprarum.

Sanguis caprillus cum melle potus immodica sua ariditate aquis intercutem medetur, & renum praeterea calculos cominuit.

Haema catœcidion ornithon, Sanguis galli ac gallinae.

Porro domesticarum alitum, nempe galligallinae atq; gallinae sanguis, eruptiones sanguinis ex membranulis, quas graece meningas dicunt, suppressere perhibent.

Haema arnon, Sanguis agninus.

Comitiali morbo, quem epilepsiam nominant, obnoxijis, strenue manens praestat auxiliares & salutares sanguis agninus.

Haema eriphan, Sanguis haedorum.

Sanguineus item haedorum liquor nondum concretus, sed a recens interempto hoc animante receptus, plus minus dimidiatæ heminae mensura, cum tantundem aceti haustus, e pectore sanguinem cum sputo reiicientibus praesenti est remedio.

Sanguis urforum, caprarum, hircorum &c.

Si abscessibus, quae graece apostemata uocant, imponatur sanguis urinus, caprearuq; & hircinus, atq; taurinus densq; maturatiōis munia probe admodum exequi perhibent.

Sanguis

Sanguis crocodili.

Sanguis postremo crocodili terrestris oculorū speciem exacuendi potētiā habere creditur, qđ medicaminis genus Græci *ἐκροκοδιον* uocant.

Sanguis admissariorum equorum.

Commiscetur medicaminibus, quæ exedendo sunt (*συνίσχεται* à Græcis *ἐκ* dictantur) sanguis matricum equarum, & quæ admissuræ inseruiunt. Cæterum antidotus ē sanguine quæ contra letalia uenena exhibetur, sanguinem anatinum, hædinum & anserinum suscipit.

Aera, Lolium.

Aera, quod lolium Romani uocant, calfaciens est & arefaciēs in terra ferme à temperatis recessu, & iridi æquales atq; easdem omnino in medendo uires obtinet.

Acallis, aliās Acacalis.

Acallis, quam alij acacalida dicunt, fructus est plantulæ cuiuspiam in Aegypto prouenientis. Cuius utiq; dilutum collyrijs, quæ cuncta claritati oculorum officientia discutiunt, aciemq; eorum perspicaciorem reddunt, utiliter commiscetur.

Acacia.

Acacia siccificæ uirtutis est in ordine tertio, frigoricæ uero, si elota non sit, in distantia à temperatis prima, uerum ubi lota fuerit, secunda. Est porro peracerba & terreæ essentia.

Acalyphæ, Vrticæ.

Vrticæ non tam semina quam folia subtiliorum sunt partium, citraq; omnem uellicationem arefaciunt. Tumores porro præter naturam omne genus (puta cancerenas, phymata, paroidas, furunculos, & consimiles abscessus) distrahunt, atq; abstergunt, deiciuntq; per inferiorem aluum, inflandi etiam potentiam obtinēt, sed moderate: quæ sanè causa est, quod in rem ueneriam tantopere proritat ac stimulat.

Acanthos, Spina uulgaris.

Acanthus, hoc est spina illa triualis à quibusdā melamphyllon, à nō nullis pæderota nuncupatur. Est autem ex eorum numero, quæ digerendi arefaciendiq; potentiam habent.

Acanthion.

Acanthium, non crassarum sed subtiliorum est partium, ex calfacto-
ariam facultatem obtinēs, proinde his qui conuelluntur remedio est.

Acantha luce, Spina candida.

Spina candidæ radix exicatoriæ & modice adstringentis est potētiæ: quapropter non cōtinentibus cibum, quos Græci *σπομαχικὸς* appellant, & cruentis reiectionibus auxilio est. Quin & dentium cruciatus pat.
cat. Semen huius acanthæ tenuis essentia, caloricæq; potestatis est, quamobrem ijs qui conuulsionibus infestantur, conuenit.

Acantha Aegyptia, uel Arabica.

Sunt qui spinam Aegyptiam, acantham Arabicā nuncupent: ualidam

astringendi & arefaciendi uim hæc spina possidet: Quare nō sanguinis modò, sed alias quoq; fluxiones cohibet.

Acros, Ocimastrum.

ACinus herba, quam ocimastrum uocant, ocimo similis, mediocres astringendi uires continet, eo fit quod pota aluum mensesq; com-
primit ac sistit. Panis præterea, sacrisq; ignibus, si modo cataplasmatibus inducatur, præsentis est remedio.

Aconitum, Pardalianches.

AConitum, quod pardalianches etiam appellat, putrefaciendi & erodendi uim, uenenosamq; facultatē obtinet: quam ob causam in cibo
potuq; manibus pedibusq; uitandum: ad putrefaciendum tamen & excorpiendum carnes erumpentes, aconito pardalianches utendum.

Aconitum, Lycoctonum.

CAeterum quod aconitum lycoctonū appellatur, similis atq; eiusdem propemodum superiori facultatis est, sed peculiariter lupos interficit, ceu proximum illud pardos.

Acorus, herba Venerea.

ACorum calfacit & exiccat in tertia à media temperie distantia. Probatum radice eius usus ad proritandū lotium, & ad lienis scirrhum, quod est insensibilem duritiem. Extenuat præterea atq; exerit ceratidis claritati officientem crassitiem.

Acrides, Locustæ.

ACrides, quæ latine locustæ dicuntur, suffitæ meiendi difficultatem, maxime mulierum sanant: sed quæ *ἀσπίς*, hoc est alis destituta locusta dicitur, scorpionum moribus cum uino pota succurrit.

Acte, Sambucus, & Ebulus.

ACte, cum magna, tum humilis, & coactæ ad terram breuitatis, quam Græci chamæacten nuncupant (Ebulum hanc, illam sambucum Romani uocant) utraq; exiccandi, & tēperate disijciendi, conglutinandiq; facultatem obtinent, & non tam bibitæ quàm esæ etiam aquas per uentrem inferiorem pellunt.

Hales, Sales.

SAles in uniuersum omnes magnopere desiccant, atq; stipant. Ideoq; si quicquid humoris in corporibus continetur, id totum uel depascendo consumunt, uel mordacitate sua subducunt: Proinde salsamenta con-
diunt, & à putredine uindictant. Sed cremati, ualidiorem distrahendi diggerendiq; potentiam habent.

Althæa, Ebiscus.

ALthæa uel Ebiscus, maluæ syluestris genus est, cui uis & natura distipandi, laxandi, inflammationes leuandi, placandi, tubercula deniq;
coctusq; difficiles abscessus maturandi inest. Radix porro eius & semen cætera quidem pariformiter folijs agunt, sed uutiligines insuper deter-
gunt, & semen calculos confringit.

Halimum,

Halimum.

Halimon dissimularis est essentiae, sapore saluginoso, atq; subastrin-
gens. Plurima uero eius essentia temperate est calida, cum uitate
coniuncta. Lac pariter & semen genitale plantula haec generat.

Alcea.

Alcea quoq; agrestis maluae species est, quae cum uino pota intesti-
norum torminibus ac moribus medetur, praesertim eius herbu-
la si potetur, radix.

Alcyonia.

Alcyoniorum omnia genera detergunt ac distrahunt, qualitatem ha-
berentia acris, eiusmodi sane est, quod uocant Miliolum. Bonitate uero
post se caetera relinquit, quod uermis praefert faciem, colore purpureo;
quod combustum medetur alopecij, lichenas & uirilignes extemit. Sed
quod extrema superficie leui, interna substantia quam maxime scabrum atq;
asperum, non modò cutem extergit, sed excoriat etiam usq; in altitudi-
nem, & molitur hucera. Vltimum siccis lanis est simile, id quod non pa-
rum reliquis omnibus habetur imbecillius.

Halme, Muria.

Habet falsugo siue muria immixta quidem, etsi alterius essentiae, co-
munes salis in extergendo facultates, licet non tam ualidas aqua ad-
mixta. Muria porro salforum piscium, oliuarumq; sale conditarum, quas
colymbadas dicunt, in extergendo maiorem uim continet, atq; ob id qui-
dem contra coxendicum dolores, & exulcerata intestinorum tormina,
clystere magna cum utilitate infunditur.

Aloë.

Aloë ex eorum medicamentorum numero est, quae excalfaciunt in ordi-
ne primo, & arefaciunt in tertio. Est aut aloë medicamen stomacho;
si ullum aliud gratissimum; ut quae pariter abstergendi, distrahendi, &
aluo oletulum ciectandi uires continet idoneas: inter haec enim medica-
mina censetur, quae *ικκροπολική* Graeci dicunt. Verum elota, imbecillior est
lotionis expers, extergendi uim possidet; atqui magis amica uentriculo, &
ἀφλὺγματος, hoc est inflammatione leuat, huculceribus cicatrices detrahit (ut
puta ex horum medicamentorum classe, quae Graeci uocant *ἀφελυλική*) po-
tissimum his, quae ani & genitalium loca torquent.

Halos anthos, Salis flos.

Halos anthos, hoc est salis flos, liquidum medicamentum est, multo
subtilioris essentiae quam sales cremati, acris qualitaris, & admodum
distrahentis potentiae.

Halos achne, Spuma salis.

Spumosa salis efflorescentia, halos achne, hoc est salis spuma est, longe
subtiliorum partium ipsis salibus, uehementius preterea extenuans ac di-
gerens; uerum ad contrahendum quod reliquum est, minus est salis se efficax.

Alfina, Auricula muris.

Alfina, quam nonnulli Græcorum *μυρὶς ὤτια*, quod est auriculam muris appellant, comparem omnino helxinæ potestatem fortita est, frigoricam scilicet & humectantem, quamobrem feruentibus inflammationibus ceu præsens remedium congruit.

Alypon.

Alypon herbæ semen per inferna atram bilem expurgandi uim obtinet, sumptum cum pari epithymi pondere, adiectionis salibus & acetoso, leui tamen exulceratione intestina afficit.

Alysson.

Alysson frutex inde quidem nomenclaturam sortitus est, *ἀλυσσὸν* quod auxilio minime siculneo rabidorum canum moribus succurrit. Habet uero facultatem siccificam, distrahentem, ita quidem ut cum his absterforiam quoque potestatem obtineat, ea propter infartos renū meatus obstructione liberat, & ephelin. hoc est aspritudinem, & decoloratam tanquam à solis ardore cutem exterit.

Alopex, Vulpes.

Oleum in quo tota uulpes uiuens uel extincta elixa est, tantā distrahendi potentiam obtinet, ut qui in imo hærent corpore humores, in summā cutis superficiem extrahat. Qua ratione oleo istoc impleto solio, ualidissimis artuum doloribus uexatos, toto corpore incendere, diutiusque immorari in eodem cogentes, languorem inchoatum sedauerunt, & qui multam in eo moram traxerunt, hoc medio sanitatē affecuti sunt.

Amaracum, Maiorana.

Amaracum, quod Latini maioranam uocant, est calfacientium tertij ordinis, arefacientium uero secundij.

Amarantum.

Amarantum, extenuantis & incidentis est nature, cum uino itaque potum menstrua proritat agitque, sanguinē in minima frustula conglobatū liquat atque dissoluit cum cenomelite haustū. Vno uerbo, omnes si potestur, fluxiones arefacit, stomacho tamen admodū infestum & exitiale.

Ambrosia.

Ambrosia potentiam habet constipantem & eiectantem, si cataplasmatismis modo fuerit illita.

Ammi.

Ammi calfaciendi & exiccandi uim habet in tertio à temperatis gradu, tenuiorisque consistentiæ, discutientis & urinā prolicientis nature existit: Cuius herbæ feminis usus, tanque optimæ frugis commendatur.

Amianton.

Nascitur in Cypro insula amianton, scissilis omnino aluminis faciem præ se ferens, inflammaturū quidem ab igne, non tamen combustum. Utuntur amianto nonnulli ad unguenta depilatoria, à Græcis *ψιλάρα* appellata, maxime uero quæ ad arefaciendum concinnantur.

Ammos,

Ammos, Harena.

SAbulum in littoribus maris potentioris est potestatis exiccatoriae: succensum igitur sub sole, aquosa arefacit corpora, si eo aggeris modo obruantur & sepiantur: arefactum uero calfactumq̃, fomentū siccum milij salisq̃ loco praestat.

Ammoniaccū thymīama, Gutta ammonica odorata.

GVtta ammoniaca quæ ad odorē uaporatur, liquor est ferulæ, intensam emolliendi facultatem obtinens, adeò ut duricias non sensiles, quas scirrhus uocant, & articulorum tophos dissoluat.

Amörge, Amurca.

AMurca è secūda classe est potenter calfacientiū & siccantium intensæ. Quo quidē modo corporū siccioris tēperamenti hulceribus medet̃: quæ uero in alijs omnibus continēt, cōtendit amurca & exasperat.

Ampeloprasum, Agreste porrum.

AMpeloprasum, tanq̃ syluestre prason, hoc est porrum acerrimum existit, calidissimæq̃ facultatis in extremo à tēperatis recessu. Quo circa sumptum affligit, sed uiscidos lentosq̃ humores incidit, & organa obturata obstructiōe liberat. Quin & stomacho quoq̃ perniciosum est.

Ampelos agria, Vitis syluestris.

AMpelos agrias, hoc est, uitis syluestris cum racemī, tum uirgulta, quas ἀμπελον Græci nuncupant, abstergentis sunt potentiæ, non nihil tamen interim stipticitatis obtinent.

Ampelos hemeron, Vitis domestica.

AMpelos hemeron, uitis uernacula, satīua, & cōtubernalis, consimilem omnino atq̃ eandem fermē quam uitis syluestris facultatem habet, nisi quod in omnibus imbecillioris & minus efficacis est potentiæ.

Ampeloleuce, Vitis alba, Bryonia.

BRyoniæ, quam Græci ἀμπελοδένδρον quoq̃, id est uitē candidam, & ἀνιδρωγόν à depilandis corijs, quem usum habet, nominant, ramuli ueluti stomacho accommodati, manducantur, & lotium proliciunt. Radix uero extergendi uim habet, & subtilium est partium, ac temperate calida: qua ratione splenes induratos si bibatur, liquat. Cum caricis eadē foris cataplasmatīs instar illita, scabies quas p̃foras dicūt, leprasq̃ medicat̃.

Ampelos melæna, Vitis nigra.

Vitis nigra Græcis ἀμπελος μέλαινα dicta, & ipsa bryoniæ nigrae uidelicet nomen habet, per omnia prædicta refert, nisi qđ inefficacior est.

Amygdala amara.

AMygdala amara extenuant, & ab obturatione tenaciū crassorumq̃ humorū qui in alto corporis herent, uindicāt, cutem extergendi potentiam obtinent. Eiusdem etiam facultatis ipsa arbor est.

Amygdala dulcis.

AMygdala glycea, quod est dulcedinem quandam gustu præferentia, temperatam admodum caliditatem sortita sunt.

Amylum.

Conficitur amyllum ex purgato tritico ad hunc modum: Triticū aqua
cut madefcat irrigatū, sub Syrii stellæ, quam caniculā dicūt ardoribus,
aqua transfusa & cōmutata per diem quinq̄ies: Vbi autē maceratū iam
& eliquatum probe fuerit, teneritudinemq̄ omnino contraxerit, colata
aqua, denuoq̄ infusa, surfures supernatantes cribro excepti separantur,
& quamprimum sub sole siccantur, priusq̄ acefcat. Hoc modo confectū
amyllum, facultatē modice frigoricā siccificamq̄ possidet: adhæc aspre-
dinem quamcunq̄ placandi mitigandiq̄ potestate regnat.

Amomum.

Amomū uiribus acoro penitus compar & affine est, præterq̄ quod
acorus maiorem siccandi, amomū uero coquendi potestatē obtinet.

Anagallis.

Anagallis utraq̄ admodum extergentis est potentia, caloris uero
non nihil etiam continet, & nōnullas trahendi uires, aded quidem
ut furculos, spinas, corpori infixas euellat. Cremor ipsarum caput perna-
res mucum exugendo purgat.

Anagyris.

Anagyris teterrimi odoris frutex est, acrimoniā habens, calfacien-
diq̄ & distrahendi potentia. Semen autem anagyri ualde tenuium
est partium, & ciere solet uomitum.

Andrachne, Portulaca.

Portulaca ex tertia classe refrigerantium est, humectantium uero se-
cunda: qua de causa æstuantibus aluo imposita opitulatur, fluxus
expellit: Dentiū præterea stuporē, qui ab acidorū contactu cōtrahitur,
suo lentore explanat ac mitigat. Quoniā autē stipticandi quoq̄ facultatē
habet, opem nō instrenue dysenterijs & sanguinis eruptionibus cōfert.

Androsæmon, hoc est, humani sanguinis herba.

Androsæmon (uel andrasiamion) duplex est: alterum quidem ascyr-
arhon siue ascyrrhoides uocatur, & est species hyperici: alterū uero
Dionysias nuncupatū est. Vtriusq̄ semen expurgandi uim continet, sed
folia earum potentioris facultatis sunt siccificæ.

Androsarces.

Androsarces herba, amarorem & acrementum habet, naturamq̄ di-
strahendi & arefaciendi. Potest non tam herba ipsa, quam semen
eius, si potentur, urinam ducere.

Anemone.

Anemone omnes aëres sunt, & abstergetis naturæ, euellentisq̄, &
ora uasorum aperientis. Pituitam itaque euocant, & lepras detra-
hunt appositæ, lacq̄ eliciunt.

Anethum.

Anethū calfaciendi quidē extensam habet facultatē in recessu à tem-
peratis secundo, arefaciendi uero remissius, qua ratione oleo elixatū
dissipat, dolores sedat, somnū cōciliat, crudos & incoctos humores con-
coquit.

coquit. Crematū porro tertiam calfaciendi, siccandiꝫ distantiam induit, & propterea hulceribus humore flaccescentibus impactū subuenit: Cæterum liquidius, minusꝫ calidū, coquendi munere præditū est uiride.

Anthyllis.

Anthyllidis duo sunt genera, sed utraq; arefacit hulcera: Cæterū ea aquæ chamæpityi nō absimilis est, ex tenuioribus constat partibus, quā altera, ita quidem ut & comitiali morbo obnoxios iuuat. Postremo in extergendo maiorem efficaciam exerit quā altera.

Anisum.

Anisi semen acrimoniam minime uulgarem habet: calidū præterea est & aridum in tertia à temperatis distantia, atq; ob id quidem lotium elicit, & flatus deniq; discutiendi uim retinet.

Antirrhinum, & Anarrhinon.

Antrrhinum uel anarrhinon, bubonio, hoc est inguinali herbæ similem sortita est potentiam, sed imbecilliolem: ex illo igitur etiam huius coniecturam facito.

Anonis, uel Ononis.

Anonis ononis uel excalfactoriæ uirtutis est, præsertim radix: cuius succus cum uino potus, non lotium modo proritat, uerum lapides etiā atterit, crustasꝫ frangit & detrahīt, ac dentiū deniq; cruciatus lenit.

Aparine.

Aparine, sunt qui philanthropon, qui omphacocarpon uocāt, lenem habet abstergēdi calfaciendiꝫ potentiā, & est subtiliorū partium.

Apios, Pirus.

Apios, quā pirum latini cognominant, disparis temperaturæ est: par tem etenim unam terream, aliā aqueam obtinet. Quapropter esu pira stomachū oblectant & adiuuāt, sitim sedant. Quod si cataplasmatismodo illiniantur, exiccare & moderate refrigerare assolent.

Apocynon, Cynocrambe, Brassica canina uel rustica.

Apocynū uel cynocrambe, hoc est canina brassica. Vocatur aut hæc herba à quibuldā cynomorū, id est canum mors, quod canes enecat ocysime: sed & homini letale uenenū est, satis tetrum odorē spirās, citra ariditatem calida. Quocirca emplastri more impacta, strenue distrahīt.

Apochyma, Pix zopissa.

Apochyma, resina zopissa, uetus à nauigijis derasa pix est: ea dissipandi uires habet, quoniam marino sale macerata est: arefaciendi insuper & digerendi tumores facultatē resina zopissa obtinet.

Arachne, Araneus.

Arachne animal, autore Dioscoride, in emplastrum emolliū, frontiꝫ & tēporibus impositū, tertianarū febrim circuitus persanat:

Tela uero eius adhibita, sanguinis eruptionē compescit. Et hulcera quæ summæ cutis superficiem occuparunt, ab inflammationis iniuria uindicat.

Argemone.

Argemones herbæ potestas in abstergendo & dissipando sita est.

Arisaron.

ARisarum multo minus quantitate quàm aron est, qualitate acrius, radicem oliuæ multo grandiore obtinens.

Aristolochia, Malum terræ.

Aristolochia
rotunda.
Clematidis.
Longa.

OMnes aristolochiæ species calidæ sunt potentia, & subtiliorum paratium, in abstergendo efficaces, amarulentæ & subacres, atq; ad medicationes multo utilissimæ: Verum rotunda tenuitatis longe plus, & ad omnia uires efficaciores cōtinet. Sed quæ clematidis appellatur, fragrantior quidē, ad sanationes uero imbecillior. Longa porro inter utrāq; medium facultatis locū obtinet, nisi qd caliditate sua rotundæ nihil cōcedit. 10

Arceuthos, Iuniperus.

Iuniperus calfactorige siccificq; in tertio ordine facultatis est. Fructus leuius arboris parī quidem modo calfacit, uerum non tam aridus est: atque in hoc primæ à temperatis est distantia.

Arcion.

ARcion herba, quam & Profopiten cognomināt, folia colocynthidis similia cōtinet, ampliora uero & duriora. Naturæ distrahentis est, & exiccantis, sed habet nōnihil astringentis potentia: Qua quidē ratione folia uetustis hulceribus succurrunt imposita.

Arctium, Lappa minor.

20

ARctium uerbasco per omnia ferè forma respondet: radicem uero tenerā, candidam, & dulcem possidet. Attenuantis naturæ existit: arefaciendi itaq; admodū, mediocriterq; extergendi facultatē obtinet.

Armeniacum.

ARmeniacum abstergendi uirtute cum leuiuscula acredine, & exiguâ stipticitate præditum est: qua de causâ ocularibus induræ medijs. Prodest itidem ad pilorum in palpebris incrementum.

Arnabo.

ARnabo in odoramentorum censu est, cuius rei gratia unguentis subinde inferitur ab unguentarijs, tertij calfacientium & arefacientium ordinis, cassiæ carpesioq; simile: Quāobrem in eius penuria Polidonium cinnamomum in ipsius locum substituendum esse censuit.

Arnoglossum, Plantago.

Plantago frigorisq; pariter & siccificæ facultatis est, secunda à temperatis distantia, mixtoq; temperamento constat, partim quidē terrena, partim uero aquosa est substantia. Obtinet adhæc austerū quiddam atq; astringens arnoglossum. Ob eam itaq; causam aduersus morosa atq; malefica, quæ Græci *κακὰ ὄντα* appellauerunt, hulcera remedio est: quonomine symmetria uidelicet & cōuenientia temperiei purredinibus & fluxionibus strenue aduersat, & hæmorrhagias compescit: atq; ut se inel dicam, multiplicis usus est, & plurimis conferens: ariditatis etenim absq; uellicatione particeps est, frigiditatē torporis expertē obtinet. 40

Arum.

ARum ex prima calfacientium & arefacientium classe consistit, terream

ream & ipsum consistentiam sortitum est, sed calidam atq; extergentem. Radices tamen eius maiorē quidem calfaciendi uim possident, non adeo tamen ualentem quam draconium.

Arsenicum, Auripigmentum.

Auripigmentum urentem habet potentiam, quo ad denudandam piliis quamuis corporis partē uulgo utuntur: Atqui nisi mature detrahatur, ne cuti quidem ipsi parceret, ita quidem ut eadem psilothrū sequatur. Cæterum uisione subtilioris redditur essentiae.

Artemisia.

Vtræq; species artemisiae calfaciendi uim habent in secundo à mensuris recessu, exiccandi uero in primo. Constant uero ex partibus rarioribus, subtilibusq;. Quae utiq; ratione renum lapides egregie confringunt, & ad muliebrium locellorum fomentationes accommodae sunt.

Arios, Panis.

Cataplasmatibus modo illitus panis potentiorē habet in distrahendo facultatem quam triticū, id quod ad salis & fermenti naturā referendū est: Præditum enim extrahendi facultate fermentum existit.

Asarum, Perperna.

Asarum, quam Romani perpernam dicunt, acoro assimilis est potentiae, sed paulo magis intentae.

Asbole, Fuligo pictorum.

Fuligo qua pictores utuntur, quæq; ex uitriarijs officinis colligitur, distrahentis & acris est potentiae: proinde non tam adurit, q̃ exedit. Combustis præterea cicatricē discutit fuligo pictoria, si cum cerato quod unguine rosaceo coactum fuerit, confundatur.

Ascalabotes.

Ascalabotes animal, tamen ad alia nihil adferat momenti, à scorpij tamen ictu cōpunctos iuuare perhibent, si plagæ imponatur. Commiscetur etiam intendendi facultatem habentibus medicamentis, quæ Graeci *γυνή*, hoc est intensua cognominant.

Asclepias.

Qum asclepias herba calidæ & aridæ facultatis sit, subtiliumq; partium torminibus, quæ strophii dicunt, uexatis cum uino sumpta succurrit. Cataplasmatibus aut modo impacta facit optime aduersus uenenatum ictus, uteriq; & mammarū inaligna & rebellia hulcera medetur.

Ascyrrhon.

De ascyrrho in historia Androsæmi satis memoratum est.

Aspalathos, Erysi sceptrum.

Aspalathi facultas ex dissimilaribus constat partibus, gustu quidem acris pariter & astringentibus. Ex utriusq; igitur ratione siccificæ est potentiae, atq; ob id quidē medendis putredinibus necnon profluuijs ac destillationibus frutex ille est perquam accommodus.

Asparagus.

Asparagus petraeus siue myacanthinus abstergēdi uim possidet me-

dia ad unguem temperie inter caliditatem & frigiditatē. Inde renū & hepatis meatus ab infarctū & obturatione vindicat, præsertim radices ipsius ac semen: quinetiam dentium cruciatibus sua ariditate medetur.

Asplenum.

A Splenū facultatis quidē est partium attenuantiū, uerū minime calidū, quo utiq; nomine calculos atterit, & renes liquefacit ac minuit.

Asstaphis, Vua passa.

A Staphis, satia quidem coquendi pariter & spissandi, moderateq; disijciendi uires obtinet: Syluestris uero & inculta, potentioris acrimonie est, tantę profectō, ut pituitā & quoscunq; noxios humores capi-
tis per os deducat & expurget, quinetiam ut ualenter abstergat.

Aster Anticus, Bubonium, Inguinalis herba.

A Ticus aster herba, quam alij bubonium, id est inguinariam ob hoc ipsum appellant, quod nō solum cataplasmatismore impacta, uerū adalligata etiam suspensaq; bubonibus prodesse atq; opitulati adeo creditur. Habet inguinalis hæc herba quiddā discutiens, & refrigerans nō nihil, hinc non simplicis, sed mixtę dicitur esse potestatis.

Astragalus, Ficus terrę, seu glandula.

A Stragalus, pusillus breuiq; fruticulus est, radice adstringente, arefaciens nō instrenue. Ulceribus itaq; diuturnis cicatricē inducit & glutinat: Alui fluores cohibet, radix in uino elixa & pota. In Phæneo
Arcadię plurimo prouentu hic frutex nascitur.

Asphaltus, Bitumen.

B itumen secundi ordinis arefacientium & calfacientium est, quade causa uulnera cruenta conglutinat.

Asphodelus, Hastula regię, uel Albucum.

H astulę regię radix cum abstersione qua prædita est, discutiendi quoq; facultatem obtinet. Deustę autem cinis multo magis, quam uestionis expers, tum excafactoria, tum resiccatoria, subtiliorūq; partium reddit. Qua de re capillorū defluuijs, alopecijs uidelicet pulchre medet.

Attractylis, Fusus agreitis, uel Colus rustica.

C olus rustica (quam attractylida gręce uocant) uel cnicus syluestris, planta ex spinarum existit genere, persiccatorię & mediocriter caloricę potestatis.

Atraphaxis, Atriplex.

A Triplex humida quidem in secūdo à media temperie excessu, gelida uero in primo, ideoq; uentrem ocysime permeat. Semen herbe huius abstergendi uim obtinet, quam ob rem contra morbum regium ex iocinoris præfarctū natum, utilis est.

Aphace.

A Phace exiguus frutex, modo lentis adstringit: estur quidē sicut & ipsa lenticula, cōcoctioni uero cōtumacius renititur. Sed potentior rem arefaciendi uim cum moderato calore possidet.

Aphor.

Aphonitron.

Aphonitron, tantæ digerentis & abstergentis est potentia, ut non fordida quæq; tantum detergere & expurgare, sed pruriginē etiam opitulari possit. Lædit autem si potetur, stomachum.

Aphronitron, Spuma nitri.

Spuma nitri, eiusdē cum nitro tum naturæ tum facultatis est, nisi quod subtilioris est essentia: ac proinde contritum & leuigatum triticeæ farinae speciem exhibet.

Achras, Pîrum syluestre.

¹⁰ **A**chrades uocatæ æqualis cum pîro potentia sunt, sed magis q̃ reliqua aqua pîrorū genera extēse: cuius rei gratia ampliora cōmittit hūlcera Absinthium.

Absinthium ex prima calfacientium classe est, exiccantium uero secundada, stipticamq; & amarulentā, & acrem, uincentes simul qualitates possidet, qua ratione biliosos uentris humores cum per aluū inferiorē, tum per lotiū exhaurit. Quibus uero pituita in uentre retenta redundat, his sanē ob uim adstrictoriā nihil opis præstiterit absinthiū: cremori autē eius quā herbae multū in calfaciendo maior & præstantior uirtus est.

DE HIS QUAE ALITER A B INCHOANT.

Balanus, Myrepfica, Myrobalanum.

²⁰ **A**lani myrepficæ, hoc est glandis unguentariæ internū, puta carnosum, abstergēs & incidēs facultate est, sed admixta quædam est adstrictio. Ob hæc sanē nō uomitiones modò cōcitāt, sed per egestionē quoq; infernā alui excrementa largiter deijcit, cum aqua mulla drachmæ unius pondere sumptum. Cæterum cum posca cōtra uiscerū obstructionē infarctumq; remedium est: Quin foris cutis etiam uitia cum aceto illitum, efficaciter exterit & emendat. Cortex itidem eius uehementem adstringendī facultatem possidet.

Baccharis.

³⁰ **B**accharis perodora & fragrantior est herba, cinnamomū odoratum præferens, coronaria, acrimoniam gustu relinquens: Cuius radix elixa obstructionibus liberat, lotia ducit, & menstruas purgationes promouet. Folia eius herbae propter astringendī qua prædita sunt potentiam, cohibendis fluxionibus accommodata sunt.

Balaustium.

Balaustium syluestris mali Punici flos est ualenter adstringēs, aridae & egelidae cum naturæ tum facultatis. Hūlcera igitur quæ summam occupant cutē cicatrice obducit ocyus, & omne genus profluuiā cohibet.

Balsamum.

⁴⁰ **X**ylobalsamū, id est balsami lignum, calfaciendi & arefaciendi uim habet secunda à medijs distantia, & attenuantium est partium. Cæterum quod opobalsamū, hoc est liquorē balsami uocant, longe subtiliorum est partium quā planta: Carpobalsamū porro, quod est fructus balsami, eiusdē quidē facultatis est, sed multo subtilitate partium inferior.

Xylobalsamū.

Opobalsamū.

Carpobalsamū.

Balote, Marrubium nigrum.

BAloten alij *μύλαν μαύρον*, hoc est marrubium nigrum uocant, acrem & detergentē habet potentiam. Cataplasmatibus itaq; modo cum sale impactum, ictibus rabie perciti canis opitulatur.

Batus, Rubus.

Rubi fruticosum potentē adstringendi uim habet, neq; siccandi obsecuram, quo nomine uulnera conglutinat, & destillationes omneq; genus fluores cōpescit. Radix eius præterquam quod constipat frequentius, non exiguam habet consistentiæ subtilitatem, qua lapides renum confringit. Fructus porro siquidem maturus fuerit, cum moderata quadam adstrictione calidior est, ob hoc itaq; uescus est: Crudus uero & immaturus cōstringit & exiccat, depositus & desiccatus magis ac potentius quàm recens. Eiusdem quoq; facultatis flos est.

Batrachium, Ranunculum.

Quatuor sunt ranūculi herbe speciatim discrimina, omnium uero plus iusto calidior & aridior est potētia, acris uidelicet & urens, adeo ut nō sine dolore exulcerationē inducant. At si intra modū eis utare, cutis tantū uicia abstergunt. Radix autē eius arefacta, ex eorum medicamento rū numero est, quæ sternutationē prouocat, *ῥανυμνὴ* à Græcis appellata.

Batrachi, Ranæ.

Ranæ in iure esculento elixg, à uirulētis ictibus percussis utiliter edūtur: combustarū uero cinis, quoniam deustione siccissimus efficit, nō tam sanguinis eruptiones sistit, q̄ admixta liquida pice alopecias sanat.

Bdellium.

Bdellium tam Scythicum quàm Arabicū, ad indurata emolliendum quodāmodo natum est, præsertim uero recentia. Verum Arabicum urinam quoq; prurit, lapides cōminuit & concoquit.

Betonica.

Vetonica per subtilibus admodum ramulis herba est, frondes pulgrio similes sortita, sed graciliores, & tantum non sine sapore gustantibus, prouenit frequenter locis saxosis, qua maxime in renum afflictionibus utuntur. Est uero apud Romanos etiam alia quædā betonica cognominata, quæ à Dioscoride cestron uocat, ab alijs uero psychrotrophon, eo quod gelidissimis gaudeat locis, excepta efficacia nihil possidens affluente aut simile superiori: ad prouocandum lotium, & ad alia bene multa egregie prodest. Porro radix ipsius uomitiones irritat, si cum hydrome lite bibatur: folia autem aluum deſciunt.

Bechium, Tussilago.

Bechium, sunt qui bechicon nūcupent, inde adeo quod *βήχας*, hoc est tussis, & nō nisi recta ceruice spirandi angustias, quas Græci *ἰσχυρὰς* dicunt, persanandi prærogatiuam quandam habere uideatur suffitum. Composita uero tussilago est calida & aquea substantia.

Blitum.

Blitum.

Blitum esui peridoneum olus est, argenti naturæ & frigoris, in secundo à medijs excessu.

Bulbus esculentus.

Bulbus qui edendo est, leuem quandā amaritudinē, pariterq; adstriktionis pusillum cōtinet, desiccat, abstergit, & conglutinat uulnera.

Bulbus uomitorius

Bulbus aut uomitorius esculento longe calidioris est potentiae.

Botrys.

¹⁰ **B**otrys, quam ambrosiam nonnulli, quidam artemisiā nuncupant, planta est insigniter odorata, quæ cum uino sumpta, orthopnoicis, hoc est, non nisi recta ceruice spirantibus opitulatur.

Bubonium, Inguinalis.

Bubonium aster Atticus nuncupatum est, de quo in eiusdem asteris historia satis memoratum censeo.

Buglossum, Lingua bubula.

Buglossum tēperaturæ calorificæ & humectantis est, quamobrem in uinum deiectum, animi uoluptates lætitiāq; inducere perhibent.

Bunium.

²⁰ **B**unium, quod aliqui arction dicunt, temperaturæ calidæ est, urinam mulierumq; purgationes iuxta promouet. Falso uero bunium, quod *φούδιον* Græci nominant, illi est assimilē.

Buprestis.

Buprestis bestiola est, cantharidi cum forma tum facultatibus nō ab simile, eamq; ob causam haud aliter quā illa reconditur.

Butyrum.

Butyrum facultatis concoquentis & mediocriter distrahentis est, in tenellis & mollibus corporibus. Bubonibus itaq; & abscessibus circa aurem presenti est remedio, gingiuas extenuat, præsertim puerorum ³⁰ dentientium, sed & omnes pectoris affectiones si lingatur, concoquit.

Buphthalmum, Bouis oculus.

Buphthalmum florem gerit chamæmelo similitū, uerum multo graviorē & acriorem: qua de causa discutiendi etiā uim obtinet, ita quidem, ut duritias quoq; cerotæ mixtum curet.

Brathy, Sabina.

Cupresso folijs herba sabina similis est, calfaciendiq; potestatem simul & arefaciendi in tertio à temperatis excessu obtinet, & tenuissimis essentiae partibus constat, extenuantis itaq; potentiae & digerentis pota existit. Sepedonibus cupressi more accommodatur.

⁴⁰ **B**retanica.

Bretanica astringendi pariter & conglutinandi ui prædita est, syluestri rumici facie & figura similis. Expressus ex bretanica succus oris putredinibus subsidio est.

Bromus.

Bromus legumen uiribus hordeo respondet. Arefacit autem, & moderate citra uellicationem distrahit, stipticitatisq; non nihil obtinet, ac proinde uentris fluoribus, quas *diapnoie* appellant, remedio est.

Bryon thalassion, Alga.

Bryon thalassion refrigerantis & astrictoriae est potentiae, feruentibus itaq; inflammationibus cataplasmatibus more illitum, subuenit.

Bryon siue Splanchnon.

Bryon quod splanchnon à quibusdam nuncupatur, in roboribus albisq; populis pariter & piceis repertum, digerentis simul & emollientis mediocriter potentiae est, praesertim illud quod in cedrinis arboribus inuenitur.

Bryonia.

In uitis candidae historia explicata brionia est.

DE HIS QVAE INCHOANT A LITERA G.

Gala, Lac.

Lac omne è tribus conflatum est essentijs, caseosa, serosa ac pingui, qua cum primis abundat bubulum, unde & butyrus efficitur. Serum uero lactis absterforia praeditum est potentia, quae de causa aluum quoq; subducit, si quis decoctione ipsum dispecat: caseosa uero lactis pars, crassumq; emplastris magis congruit, atq; id quidem propterea quod retundit acredinem & hebetat. Lac porro siue cum littoralibus lapillis aliisque decoctum inculpatius quadantenus fit, & praestantissimum intestinorum torminibus, & acerbis uentris fluxionibus remedium. In totum uero lac quantumquantum est, contra acria oculorum rheumata & alias quascunq; acrimonias competit. Temperatissimum autem omnium lac est humanum, mox caprillum, deinde asinum pariter & ouinum, postremo bubulum.

Lac decoctum.

Gale, Mustela.

Mustelae crematae cinis abunde distrahit: cum aceto itaq; illitus, miserum pedum uale tudine arthritideq; oppressos medicatur: torrefactus autem Magno etiam morbo manus porrigit auxiliares.

Galion.

Galion appellacionem suam ab eo quod lac coagulet, obtinuit: eadem uero cum aparina uires, desiccandi nempe cum acrimonia quadam leni coniunctas sortitum est. Flos eius contra sanguinis eruptiones & combusta praesenti & egregio est praesidio.

Galiphs.

Galiphs alij galibdolon nuncupant, ea urticae neuiquam ab similis est herbula, leuorem tamen maiorem, uirosamq; & graueolentem emittit odorem: distrahendi, scirrhusosq; tumores emolliendi facultatem obtinet, opemq; huculceribus quae depascendo serpunt, cataplasmatibus modo illita, eximie confert.

Garus

Garus uel Garum.

GArum uim habet potenter calfaciendi & exiccandi: qua de causa medendis putrescentibus huculceribus foris medici quidā adhibent. Infunditur item utiliter his, qui intestinorum torminibus, & dolore coxendicis tentantur.

Gentiana.

Gentiana radix satis magna quum res postulat efficacia expurgare, attenuare, detergere, & ab infarctu deniq; uindicare potest.

Geranion, Gruina herba, uel Echinastrum.

Geranij una quidem species folijs est anemonæ similibus prædita, ra-
dice esculenta: quæ in uino drachmæ unius pondere sumpta, infla-
tiones uteri discutit & sedat. Altera uero huius herbæ species, cui cogno-
mentum cicutaria est, in re medica censetur inutilis.

ra, Terra.

En Latini terram dicunt, cuius sanè omne genus exiccandi uim ha-
bet, immixtæq; alterius essentia, & sine uellicatione est. Quod si
igneæ quædā illi qualitas accedat, aut quoquo modo admisceat, & hanc
ipsam quoq; elota exuit.

Terra culta.

Terræ agricolarij quælibet pinguitudo, ad cuiusuis membri exicca-
tione opus habentis medelam, utilis est.

Lutum Aegyptium.

Lvi Aegyptij ad aquaticeas & lienosas afflictiones in medicina usus
est, tum ad laxos quoq; tumores cedematæ hæc haud obscure cōducit.

Lemnia terra, Terra sigillata.

Aeterū ex terra medicaminosa, Lemnia rubrica, quæ sphragis, hoc
est sigillum appellatur, exiccando & cōstipando moderate, uenena-
torum medicaminum præsentaneum existit amuletum. Medetur itidem
maleficis huculceribus, quæ appellant cacoëthe, admixto aceto, seu uino.

Adhæc sanguinis eruptiones quascunq; sistit, & intestinorum tormina,
quæ dysenteriam uocant: Quinetiam depascendo serpentia huculcera,
quæ nomas nuncupant, hæc Lemnia multos aqua mulla interiore parte
abluta, mox uero salilagine, sedat.

Rubrica Sinopica, Minium.

Rubrica Sinopica maiore habet uim quàm Lemnia, emplasticis inse-
ritur remedijs, tæniæq; uentris in potu sumpta interficit.

Samia terra.

Samia terra non tam uiolenta, sed mitior longe quàm Lemnia est, ceu
Sglutinosa echiocollæ & uiscofa. Utendū itaq; ea fuerit, quotiescunq;

que res ipsa mitigationem ac ueluti blandimentū postulat. Opem præ-
tere fert quibusuis sanguinis sputationibus.

Selusina, Chiaq.

Selusina terra, Chiaq; uim absterforiam multo potentiorē obtinent,

qua de causa mulierculæ quædam ea ad lenocinium faciei inducendum, ad leuigandum item & erugandum utuntur. Ad hæc hulcera carnibus expleant, atq; restaurant, præsertim igne ambusta.

Cimolia.

CReta cimolia illota mixtam facultatem obtinet, frigorificam uidelicet & diaphoreticam: Abluta uero refrigerandi multo uehementior prædita est potentia, igne q; ambustis nõ instrenue suppetias adfert, si in posca fuerit assumpta.

Ampelitis.

Ampelitis inde id nominis sortita est terra, quod ungendis uitis 10
sit idonea: enecat enim illita innascentes illis uoluces uermiculos, ne gemmas & pubescentes uuas prærodant. Habet insuper arefaciendi & digerendi non instrenuas cum erosione uires.

Cretica.

Cretica terra aërofa est, & citra omnem uellicationem absterforia.

Terra Eretria.

Eretria terra euidentem adstringendi uim possidet. Cremata uero arefacit sine morsu. Probatur magis in cinerem redacta.

Pægnitis, aliàs Pnigitis.

Quæ pnigitis terra appellatur, eadem potest quæ cimolia, sed est 20
non paulo nigrior.

Armenia, Bolus Armenus.

Armenia, quam bolum dicunt, extremum habet arefaciendi effectum: proinde haud immerito tanta solennitate accommodatur profluuijs alui, spuitionibus sanguinis, tabi phthisicæ, difficultatibus anhelitus ex humiditate. Præterea humentibus hulceribus, & pestiferis deniq; affectionibus egregie subuenit. Interdum cum uino tenui diluto: Si febris infestet, cum aqua utiliter potatur.

Alana & Ochra.

Alana uero gleba, similem habet Armeniæ glebæ effectum. At quæ 30
Ochra nomen obtinuit, distrahentis, & putrefacientis, exedentis uel est potentia: Quapropter carnes lasciuientes & hulceri supercrecentes compescit, & uacua explet, si cum cerota mixta adhibeatur.

Geras ophios, Senecta serpentis.

Exuiæ anguis potentem arefaciendi uim habet, quare cum aceto decoctæ, dentium cruciatus adiuvant.

Senecta aspidis.

Aspidis senecta oculorum aciem plus alijs exacuit, offusasq; tenebras arcet, si trita cum melle oculis illiniatur.

Ges enteræ, Lumbrici terræ.

Intestina terræ (uermes terrenos quidam uocant) leuigata, & neruis laucijs impacta, maturrime ad miraculum usq; succurrunt.

Gigarta,

Gigarta, Acinorum uuæ nuclei.

A Cinorū uuæ nuclei exiccāt ordine secūdo, refrigerāt uero in primo:
Quū igitur satis gelidæ facultatis sint, fluxibus quibusq̃ cōueniūt.

Gingidium, Bisacutum.

G Ingidium non admodū euidentis excafactoriæ facultatis est. Exica-
cat autem in tertio à temperatis excessu, atq̃ astringit: proinde utile
atq̃ gratum est stomacho.

Glaucium.

G Laucium astringit cum insuauitate quadam, sed refrigerat non ob-
scure, sacrosq̃ ignes non adeo ualidos sanat.

Glaux.

G Laux herba, temperaturæ calidæ est atq̃ humidæ, & proinde nu-
tricius lactis ubertatem generat, & extinctum reuocat.

Glechon, Pulegium.

P Vlegium uehementē habet excafaciendi attenuandiq̃ potentiam:
quapropter emplastri modo impositum rubrificationem inducit, at-
que ex pectore & pulmone, humidos, crassos, atq̃ tenaces humores, ex-
creatu faciles & ductiles reddit.

Gloxos, Strigmenta balneorum.

G Lleos, hoc est strigentū sordesq̃ balneorum, modice calfaciendi,
emolliendi, distrahendiq̃ uim habet, rhagadibusq̃ ani & naturaliū
mulierum rimis, & condylomatis confert.

Glycyrrizon, Dulcis radix.

G Lycyriza tepida & humida est tēperamento, cum leuiuscula quadā
ui adstrictoria: Qua de causā asperitates lenire solet, neq̃ tantum in
arteria, sed etiā in uelica scabra. Siti extinguendæ appositū est remediū.

Glycyfides, Pæonia.

S Vnt qui glycyfiden pentoboron, & qui pæoniam uocant, cuius radix
sacrimoniam habet, & leuem amaritatē cum ariditate coniunctam, nō
nihil stipticitatis quoq̃ obtinēs. Mouet itaq̃ menses, rēnes iecurq̃ emun-
dat amygdali quantitate ē uino sumpta. Si uero uinum in quo potatur
pæonia fuerit austerū, alui profluvia restringit. Quinetiam collo suspen-
sa, uel aliās alligata, pusionum comitialibus magnopere succurrit.

Gnaphalion, Centunculum, siue Tormentum.

C Entuncularis herba, inde à Græcis nomen sortita est gnaphalion,
quod folijs eius subtilibus, & ob mollitiem sequacibus tormēti loco
utantur. Sunt autē ea colore cādido, & leuiter astringentia. Qua quidem
ratiōe cum uino astringēte cōtra intestinorū tormina efficaciter bibunt.

Gongilis, Rapum.

G Ongilidis non tam radix, quàm semen inflandi uim retinent, semen
genitale procreant, & quod hæc comitatur, Venerem excitant.

Gorgylon, Sefeli.

G Orgylum, sunt qui sefeli appellant, herba est naturæ calidæ, urinam

ciens, & eo etiam nomine muliebria ducens. Radix præterea eius cum melle, linctus modo sumpta, uitiosos pectoris humores educit.

Gyris, Pollen.

Pollen, quod *γύρις* à Græcis uocatur, eiusdem est cum amylo potentia, nisi quod plus caloris habet quadantenus.

Gypsos, Gypsum.

Gypsum præterquam quod exiccatoriæ potestatis est, emplasticam insuper facultatem annexam obtinet. Quo fit, ut sanguinis eruptionibus ceu deus sit. Rigatur uero diluiturque cum oui albore.

Gypsum deustum.

Gypsum præterea *καυρωμένον*, hoc est crematum, neutiquam tantam uim habet emplasticam, sed arefaciendi maiorem potentiam. Quin etiam reuellit & retundit, potissime si maceretur cum posca.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA D.

Dades, Teda.

Ades nonnihil acerbitalis habent, & uim maturandi, concoquendiue, necnon detergendi: Proinde in aceto elixæ, iureque eius, ore dentibusque collutis, cruciatus dentium placant, atque in medio etiam tollunt. Quod si unà cum melle sumantur, caput pituita per nares, palatum uel exonerant, quod *ἀποφλεγματίζαν* Græci nominant. Linctibus porro, quæ eclegmata dicunt, permixtæ, quæ in pectore contumaciter hærent, ductilia excretaque facilia efficiunt.

Damascena.

Damascena, horum uberior fiet in coccymelis mentio.

Damassonium, Alisma.

Damassonium abstergentis est potentia, ac proinde calculos constringit, uentris incommoda emendat, & lotia trahit.

Daucus, Staphylinus.

Dauci (quem & staphylinum nuncupant) duæ sunt species: Domestici radix flatuosum quiddam obtinet, & ob eam caussam nonnullam ad Venerem citandi potestatem: Syluestris uero dauci semen, nihil planè flatuosi habet spiritus. Lotij & mensium proritandi uim obtinet. Eiusdem facultatis ipsa existit etiam herba.

Daphne arbor, Laurus.

Lauri arboris non tam folia quam baccae siccificam & ualde calfactorem obtinet potentiam: sed baccae lauri magis quam folia. At radicis cortici amaritudinis & acerbitalis nonnihil inest, lapillosque comminuit. Si poterit ex uino fragrante triobolari pondere, iocinorosis præsentie egregio est remedio.

Daphne herba.

Daphnes herbae, quæ & daphne Alexandrina uocatur, temperamentum est calidum, & gustus acris pariter & subamarus. Quamobrem menses & lotia proritandi uim possidet.

Daphnoides,

Daphnoides, Chamædaphne, Laureola herba.

CAeterum daphnoides, potentiae per similes daphnae Alexandrinae est, quemadmodum sanè & quæ chamædaphne nomenclaturam obtinuit, quæ utiq; etiam ipsa esculenta est.

Derma probati, Pellis ouilla.

PEllicula ouis recens detracta, & etiam dum calida, his qui quocumq; modo uapulauerunt circumposita, mirifice succurrit.

Pellis Hippopotami.

Hippopotami, hoc est fluuiatilis equi pellis combusta, atq; cum aqua trita, & superinducta, panos discutiunt & dissipant.

Pellis uiperæ.

PEllis uiperina trita & leuigata, & emplastri instar impacta, in alopecie cum admiratione omnium qui id oculis usurpant glabretis, pilos reuocat, facitq; syluescere.

Dermata cattymata. Veteramenta.

SOlearium & ueteramentarium coria igne cremata, cinerem ualde exicatorium relinquunt. Quam ob causam ex calciamenti pedum attritibus egregie medetur, non inflammatis & ambustis: Quin & intertrigines exochadasq; ueterum calceorum cinis sanat.

Dictamus, Vstilago rustica.

Dictamus subtiliore potentia constat quam pulegium, cætera illi similis. Verum quæ pseudodictamos, id est falsa dictamus appellatur, imbecillior & infirmior est in omnibus.

Dionysias.

Dionysias herba superius in dictione Androsæmon explicata est.

Diphryges.

Diphryges mixtam sortita est qualitatem: Complectitur enim in se acerbi non nihil, & acrementi aliquantulum. Quo nomine hulceribus malignis & cõtumacibus, quæ ~~xxxviii~~ uocant, præsentaneum est remedium.

Dipsacon, Labrum Veneris.

Dipsaci spinæ radix temperatura exiccatoria est, in secundo à medijs excessu: cæterum abstergentis non nihil potentia adiunctum habet.

Doryenion.

Doryeniũ frutex papaueri & mædragoræ æquipollentem habet temperaturam, extreme frigiditatis: qua nimirum uel exigua dosi soporem atq; stuporem etiam conciliat: larga uero interitum repræsentat.

Dracontium, Dracunculus, uel Serpentaria.

ARo tum folijs tum radice æquale quiddam possidet dracunculus, cæterum illo acrimoniae plus gustantibus præfert, amaritudinis item, caloris pariter & subtilitatis plusculum quam arum obtinet: Leuiuscula namq; aliquæ astrictoria uel est prædita. Radix dracontij uiscera singulari, si in potu fuerit hausta, expurgat. Saluberrimum itaq; maleficis & morosis hulceribus est præsidium. Folia similem facultatem sortita sunt. Fructus efficacia cum radicem tum folia excedit.

Dryopteris, Filicula.

DRyopteris, quod est si interpretare, querna filix, gustantibus mixta exhibet qualitatem, dulcem uidelicet, & subamarulentam; uerum in radice quoque acerbam. Data est insuper illi munus exedendi, qua nimis facultate glabreta induct, pilisque denudat.

Drys, Quercus.

QUercus non tam folia quam glandes exiccatoria facultate participant, ex eorum classe quae tepidae uirtutis censentur: Ob hoc uulnera non uetera ceu glutino copingere, inflammationes iamprimum inchoantes medicare eximie possunt roboris cum fructus tum folia. Porro membranosum quod sub putamine glandis latet, quod carnem fructus conuestit, quoniam astrictionis multo plusculum continet, medendis superprimendisque foeminarum fluxibus, & alijs quibuscumque profuuiolis aegritudinibus magno cum emolumento exhibetur.

DE HIS QUAE INCIPIUNT A LITERA E.

Ebenus.



EBenus lignum, uim habet excalfaciendi & extergendi, tenuioribusque partibus constat: Quo nomine quae tenebras pupillis offundunt, extergere aestimatur. Inseritur item alijs medicamentis ocularibus.

Encephalum Iagor, Cerebrum leporis.

Cerebrum leporis elixum & leuigatum, si estur, pueris dentientibus prodesse dicitur. Nec defunt, qui id comesum tremoribus succurre-re memoriae tradiderunt.

Cerebrum Gallinaei.

Cerebrum galli gallinaei in uino bibendum utiliter exhibetur contra serpentium ictus, autore Dioscoride. Sanguinis eruptiones à ceteri membrana profluente idem compescit.

Cerebrum Cameli, & Mustelae.

Cerebrum cameli, ut tradit Galenus, aridum cum aceto potui datum, comitialibus laborantes medicatur. Contra quod malum mustelae quoque cerebrum pari utilitate edi perhibetur.

Cerebellum Chelidonis.

Hirundinis cerebellum cum melle temperatum, oculorum suffusionibus manus auxiliares suppeditat.

Cerebrum Ovis.

Ouinum praeterea cerebrum praeparatum, haud aliter quam leporis, aut quicquam aliud, doloris qui dentientes excruciat, curationem absoluit.

Elaea, Olea.

TAm sunt algentis potentiae oliuae germina, quam astringentis. Oluitas uero si quidem exacte maturuit, calorem symmetrum, hoc est ab utroque extremorum pari ad amissim spacio distantem obtinet. Cruda adhuc, stipticitatis plusculum frigiditatisque particeps est.

Oleae

Oleæ Aethiopicæ lachryma.

Lachryma oliuæ Aethiopicæ subtile ammoniacum præferens, naturam habet absterforiã: Hinc est quod cicatricibus medendis, altisq; oculorum maculis, leucomata græce appellatis, obtusæ item oculorum aciei, amblyopiæ uel succurrendæ tam solenniter usui eadem exhibetur. Quin & dentium cruciatus arcet, si cauis ipsorum inseratur. Nonnulli uero hanc oleam syluestrem esse autumant.

Elæon, Oleum ex drupis.

Oleum quod ex oliuis, quas *ἰσχυρὰν* Græci dicunt, Latini drupas, conficitur, dulce calidumq; moderate, magis uero humectans.

Oleum Omphacinum.

Oleum, qd ex crudis & nõdum inchoatæ maturitatis oliuis expressum est, à Græcis *ἀμυγδαλίαι* & *ἰμφοκύναι* nuncupatum, quantũ in se habet adstrictionis, tantæ etiã frigiditatis particeps est.

Oleum ablutum.

Oleum *ἀνδρομείδειον*, hoc est ablutum, minime omnium uellicat.

Oleum uetus.

Oleo ueteri quantum diuturnitatis, tantum illi etiã caliditatis accedit, et potentiores ad discutiendũ uires, potissime si initio ex tenuioribus partibus cõstiterit: ex eo autẽ censu habetur purũ atq; pellucidum, & cuius uel momentũ magnam corporis partẽ inungit, promptissimeq; à cute imbibitur. Huiusmodi autem præcipue Sabinum existit.

Oleum syluestris oleæ.

Ex oleastro oleum, astringit simul & abstergit, & quatenus oleum, inter alia planè squalidissimum.

Oleum Rhicininum.

Veteri oleo uiribus omnino æquipollet oleum rhicininum.

Oleum Sesaminum, Raphaninum.

Reliqua olea, se faminũ uidelicet, & raphaninũ, & si quæ sunt alia, pro cuiusq; unde constant essentia, uaria etiã uirũ discrimina sortiunt.

Elæomeli, Oleomeli.

In Syria oleomeli ex quodam arboris caudice sua sponte manat, melle crassius, sapore dulci, quod cruditates & bilem per alium detrahit, duorum cyathorum mensura cum cotyla aquæ una epotum: Verumtamen qui hauserunt, in ueternum torporem deficientibus uiribus incidunt: quod uerendum tamen non est: uerum à sopore profundiore excidendi sunt crebrius.

Elaterium.

Syluestris cucumeris fructus cremor elateriũ appellat, quod è secundo scalfacientium ordine esse perhibet. Menses prolicit, & foetus in utero necat appositum, extrema qua pollet amaritudine. Expurgat præterea nares cum lacte illitum. Deducit ipsam quoq; pituitã per inferna factus, ex eo clyster, non raro etiã sanguinem.

Elate, Abies.

ELate arbor, quæ latinis abies est, tam calfactoria exiccatoriaq; q̃ ña
Egra existit populus. Resinæ eius inter cæteras resinas fiet mentio.

Elatine.

ELatine uero, herba est helxinæ per omnia similis, quæ mediocriter fri
gefacere & constipare potest.

Elaphoboscos, Ceruiocellus.

Ceruiocellus (si modo apud latinos ea est elaphobosci appellatio) cal
facientis & siccificæ facultatis est, in secundo ab inculcata temperie
excessu, & tenuium præterea partium.

Elenium, Enula Campana.

ENula Campana calfaciendi arefaciendiq; potestatem obtinet, cum
humiditate recrementitia coniunctam: eamq; ob causam linctibus
eclegmatis ue permixta, quæ in pectore hæret exhaurit: Membra quoq;
enulæ Campanæ potentia rubrificat.

Eleoselinon, Apium rusticum.

Eleoselinum, hoc est apium palustre nascitur locis humidis & aquo
sis, satiuo grandius, atq; ad eadem efficax.

Elephas.

ELephantis unguium scobes cataplasmatibus modo impactæ, parony
chijs remedio sunt. Ossium uero eiusdem animantis ac dentium ras
menta arefaciendi & extergendi facultatē obtinent, atq; in id genus me
dicamentis frequentem omnino cum locum tum usum habent.

Helcysmata, Recrementum argenti.

Emplastrum
Phæa.

Helcysmata, argenti recrementa appellantur, ea plumbagini consimi
les habent uires, emplastris nigris, quæ phæas nuncupant, & quæ
Græci ἀργυράκη dicunt, inferitur, ob eam quam obtinet cum stipticandi
tum euellendi potentiam.

Helleborus, Veratrum.

Veratrum tam candidum quam atrum iuxta calfaciendi siccandi
uim in tertio à tēperatis excessu possidet. Est præterea utrunq; acri
monia & astrictione præditum: Quo fit ut ad leprosa cutis uicia emen
danda summopere conueniat. Nigrum adhæc per triduum fistulis indu
ratis infusum, callum detrahit.

Helchryson, Aurei floris planta.

Helichryson à quibusdam chrysanthon, à nonnullis etiam amaran
thon nūcupatur, planta coronaria est, comam aureæ lucis præferens
quæ in uino pota, angustijs urinæ, cōtra serpentium morsus, coxendicū
dolores, ruptaq; præsentī remedio est. Ciet eadem menses, grumos san
guinis cum uentris tum uesticæ soluit & absumit. Ex mulso cenomeli
hausta, à capite in subiectas partes destillationibus opitatur.

Helixine, sunt qui perdicū, sunt item qui parthenion, nec desunt qui
sideris

sideritum, & qui heracleā uocent: uirtus eius plantæ est absterfione purgare & cum subgelido humore leniter ac pedetentim astringere.

Helxine cissampelos.
Helxine alia est, quæ cissampelos appellat, ea discutiendi uim possidet.
Elymus, Meline, Panicum.

Panicum, sunt qui melinen etiam nuncupent, milio simile legumen. tum est, potentia siccatorium & frigorificum foris emplastri modo impositum, exiccat etiam sistitq; nonnihil uentris fluores.

Empetron.

¹⁰ **E**mpetrum etiam prassoides nomen habet, ad purgationes omnino factum medicamentū, pituitæ in primis pariter ac bilis: gustantibus falsum est, ea propter abstergendi quoq; uim habere creditur.

Epithymum.

Epithymum thymo ad omnia efficacious, ex tertio arefacientium & calfacientium ordine censetur.

Epimedium.

Epimedio cū aqueo humore facultas est mediocriter frigorifica, quod Euberibus quidē illitum, eadem recta turgentiaq; tueri & seruire potest: fertur etiam sumentibus ipsum in potu sterilitatem inducere.

Epimelis.

²⁰ **E**pimelis, quæ unedon etiam à colonis Italicis nominat, syluestris potius est, cuius fructus acerbitate linguam quidem tentat, stomacho tamen officit, & capitis dolores infert.

Epipactis, Helleborine.

Epipactis herbula ab alijs helleborina uocatur, quæ in potu sumpta, Eiacinoris quidem uitij, & contra uenena utilis est.

Erebinthus, Cicer.

³⁰ **C**icer legumentum familiare & flatuosi spiritus est, copiosi alimentati, aluo utile, lotio mouendo idoneum, ad genituræ lactisq; creaturam habile, muliebriaq; promouens. Porro quod crium appellatur, hoc est arietinum, cæteris efficacius urinam prolicit. Elixatio eius lapillos in renibus comminuit, præcipue nigri. Reliqua uero cicerum species, quæ orobea uocatur, his calidior est, & amaritatis particeps.

Erebinthus agrestis.

Clceres uero syluestris in omnibus qualitatibus ad omnia efficaciores sunt, quam satui & contubernales.

Eria rhypara, Lanæ succidæ aut sordidæ.

⁴⁰ **A**d irrigationes cum primis accommodatæ sunt lanæ recens ab ouibus de-tonse, necdum à fordibus repurgatæ: pinguetudo namq; earum in lana succidâ collecta, in coquendi munere butyro persimilis est. Mundata uera lana & cefypo spoliata, nihil præterquam materia, excipiendis uidelicet liquoribus idonea est. Cremata porro acris est potentia, calorificæ, exiccatoriæ, unâ cum partium subtilitate. Cum humore itaq; flaccescentes huculcerum carnes maturime eliquat.

Erice.

ERice disijciendi uires ad euaporandū sine erosione possidet, in quem
asum florem eius potissimum ac folia usurpant.

Erinos, Ocimum aquaticum.

ERinos perhumida & aquatica herba est, cuius seminis drach. duæ,
cum mellis drachmis quatuor illitæ, oculorum desillationes sistunt.
Finit aurium dolores instillatus lacteus eius liquor.

Hermodactylus.

Hermodactyli radix ad purgationes facta est, cum ipsa per se, tum
eius quoq; elixatio: Priuatim autē ac proprie articulorū doloribus 10
in ipso fluxus tempore dedicata est, uerum stomacho nimiū incōmoda.

Herpyllon, Serpyllum.

Serpyllū usq; adeo calfactoriū est, ut cum mēstrua, tum lotia proritet.
Erythrodanum, Rubia passua.

EStuero erythrodanum tinctorum rubia radix acerbā & gustui amara,
cum lienem, tum iecur, tum renes expurgans, usq; adeo uidelicet,
ut interdū etiam urinas sanguinolentas proluciat, mensesq; ciat, & quæ
cutem occupant sordes exerat.

Erysimum, Irion.

IRionis semen nasturtio simile est, sapore feruido, facultate calorifica, 20
Iquā de re tostum in fermēto, pectus in eclegmatis expurgat, duritias
emollit, & abditis deniq; cancris cataplasmaus modo illitum prodest.

Euzomon, Eruca.

ERuca quoq; eiusdem cum rubia passua temperamenti est, sed infla-
ciones facit, quamobrem in Venerem stimulat. Semen lotium proli-
cit, syluestris tamen multo quā domestica efficacior est.

Eupatorium.

EVpatorium cum partium tenuitate incidentis est potentia citra fer-
uorem manifestū: proinde iocinoris infarctus expurgat, sed & ad-
strictoriae uirtutis particeps est. 30

Euphorbium.

EVphorbium exurendi uim obtinet, & tenuium partium pariter at-
que reliqui succi, existit.

Ephemerum.

EVphemerum nō letiferum illud, sed cui iris syluestris nomen est in-
ditum, mixtam habet facultatem, & ejicientem.

Echidna, Vipera.

VIperinæ carnes temperamento sunt calido & sicco uehementer, per
cutem uniuersam corporis molem repurgantes: quapropter ali-
quot multi elephantiasis correpti cum in cibo tum in potu sumentes, sani 40
rati restituti sunt. At quæ circa mare alijs que locis aridis degunt, suum
magis inducunt

Echinus.

EChinus herba est acerbā, reperiendi atq; exiccandi uim obtinēs,
Echinus

Echinus terrestris, Erinaceus.

ERinacei bilis defluentes capillos glutinat. Caro eius exiccata & reposita, uehementē habet distrahendi arefaciendiq; potentiam. Quo nomine elephantiaſi correptis, maloq; corporis habitu, quem cachexiam dicunt, oppreſſis, atq; cæteris pluribus malis ſuccurrit. Cæterum cutis eius deuſta; multo ualentius quā uſtionis expers arefacit, acriusq; diſtrahit. Alopecijſ itaq; cum pice liquida illita auxiliatur.

Echinus marinus.

Quicquid in marino echino edendo eſt, urinam trahit, & bonam aluum efficit. Teſta uero ipſius cremata, uſtione æqualem terreſtri ſacultatem induit.

Echion.

EChion alij doriada, alij alcibiadion appellāt: ea ſpinofa eſt herba, quæ non tantum ſerpentium morſus epota cum uino curat, ſed præpota etiam ab eorum morſibus tuetur.

Hepſema.

Muſtum decoctum, quod à quibuſdam ſiræon nuncupatur, modera tam calfaciendi & concoquendi uirtutem, atq; emplaſticam in ſuper abſcq; uellicatione obtinet.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA Z.

Zea.



Ea euſdem planē eſt cum tritico potentia, medium ſerē inter calfaciendum & refrigerandum locum poſſidens: leuiter præterea exiccatur, atq; opplendi uim obtinet.

Zingiber.

Zingiberis radix potenter quidem excalfacit, neq; primo tamen ſtatim occurſu, ineuiſtæ cuiuſpiam humiditatis, & craſſioris eſſentiaſe particeps eſt: ideoq; teredinibus facile tentatur perforaturq;, ſed inmobilem quaſi mordicus ſeruat caliditatem.

Zythus.

Zythus mixtæ conſiſtentiaſe eſt, acrimoniā quādam guſtu præferens, utpote ex putredine cōſtans, & frigidus ratione acidæ qualitatis: proinde ſucci etiam prauī.

Zyme, Fermentum.

Fermentum etiam ipſum ex contrarijs facultatibus temperatum eſt: aciditatis nanq; egelidæ, caloriſq; ex putredine proficiſcentis: præterea etiam ea quæ ſalis atq; farinaſe natura conſtat. Eſt igitur temperate calidum, diſtrahendiq; poteſtate præditum.

Zomos, Piſcium ius.

Piſcium recentium ius uentrem ſubducit, cum per ſe, tum uino admixto epotum: peculiariter uero ex phycidibus, ſcorpionibus, iulidibus, percis, alijsq; ſaxatilibus molliuſculis, cum aqua, adiectis in ſuper oleo, & anetho, & ſale elixis. Eorum iſdem quibus teſta pro cute eſt,

H

tellinarum, hiatularum, cochlearum, & gallinacei antiqui cum magna salis copia elixi, iuscula, subducendi uim obtinet. E diuerso, gallinæ ius continet.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA H.

Hediosmon, Menta satiuæ.

Hediosmum calidi temperamentum est, & essentiae subtilium partium, acre potentia, ex tertia quodammodo diuariantium à media temperie classe, cum humiditate semicocta, qua in Veneræ stigmatibus mulat. Præditum item est amaritudine quadam, ideoque lumbricos interimit. Acerbitatis etiam non nihil habet, qua non inueteratas sanguinis reiectiones sistit.

Hedysarum, Securidaca.

Hedysarum, quæ & pelecynus uocatur, amarum apparet & subacerbum: unde si potetur, accommodatum est stomacho, & uiscerum infarctus oppilationesque expurgat.

Heliotropium, Solaris maior.

Heliotropium maius, quod & scorpiuron appellant, calidæ, aridæ, & detergētis facultatis existit: Cuius decoctio pituitam expellit pariter atque bilem. Quinetiam semen eius instar emplatri superinductum, formicas, & id genus alias uerrucas exiccat.

Heliotropion minus, Solaris minor.

Heliotropium minus ipsidem facultatibus pollet, & lumbricos insuper interficit, cum nitro, hyssopo, & cardamomo potum.

Electrum.

Populi arboris lachryma electrum est, prope flumen Eridanum (ut aiunt) ex ea destillans congelascit, aurum colore præferens: cuius uis est si potetur tritum, stomachi aluique fluxiones reprimere.

Hemerocalles, Lilium syluestre, Bulbum.

Hemerocalles radicem cum lilio æmulam, & uiribus æqualem, nec aliter quam id, igne ambustis succurrit.

Hemionitis.

Hemionitis cum stipticitate qua pollet, similem quoque amaritatem obtinet: quo nomine cum aceto pota, lienosis subuenit.

Hepar rabiosi canis.

Creditur canis rabie agitati iecur tostum, & in cibo sumptum, morsibus quos idem rabiens canis intulit, opitulari.

Hepar Capræ.

Capræ affati iocinoris deciduus aquosus sanguis, oculorum uitium, quod Græci *νεκρόλωπη*, Latini lusciosos & nusciosos appellauere, si oculis instilletur, iuuare creditur. Prodest præterea dum id coquitur & torretur, lusciosorum oculos eius fumo uaporari. Confert ad eadem iecur caprinum mansum. Quo cibo comitiales etiam in primis deprehendi asserunt.

Hepar Capri.

Hepar hircinum congeneram iocinori capræ facultatem habet, & ob id ad eadem consimiliter facit.

Hepar

Hepar Lacertæ.

TRadunt lacertæ iecur ex eorum dentium cauis inditum, dolorem sedare, atq; indolentiam planè inducere.

Hepar Lupi.

LVpinum hepar, addito eupatorio, inter medicamenta quæ iocinorosis adhibentur est certe nulli secundum.

Hepar Asini.

PRodest comitialibus in cibo tostum iecur asininum.

Hepar Apri.

APrugnum, aut si mauis dicere cluninum, recens hepar siccum, si tritum cum uino bibatur, serpentium moribus succurrit.

Hepar Mergi.

CAlculos postremo mergi iecur aridum, potumq; expellit.

Erigeron, Senecium.

ERigeron herba mixtæ consistit potentia, frigorificæ nempe, & moderate distrahentis.

Eryngium.

ERyngium calfaciendi quidè, sed non adeò euidentè potestatem possidet, siccitatis aut neq; clandestinæ neq; etiam exiguæ particeps est.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA O.

Thalassion hydor, Aqua maris.



Thalassion hydor, quam Latini aquam marinam dicunt, acre, calidum moderate, exiccatoriū, stomachoq; noxium, si potest. Aluum turbat, & pituitā trahit. Quo calido quidè utiliter quæ extrahenda distrahendaq; sunt, consperguntur atq; fouentur.

Thaliolum.

Thaliolum herba, uires siccandi absq; erosionē habet: diutina igitur thulcera ad cicatricem perducit.

Thapsia, Ferulago.

ACris & uehementer cum humore calfactoria thapsia est, qua de re è profundo uiolenter euellit, quodq; extrahit, distrahit.

Thaon, Sulphur.

Sulphuri quoq; euellendi calfaciendiq; uis est, cum essentia tenui, usq; adeò quidem, ut aduersus nō pauca animalia uirus eiaculantia resistat, præsertim contra turturem marinū, atq; draconem, siue aridum ictui inspergatur, siue cum salua mixtū, seu pueri urina maceratū, uel cum oleo, uel melle. Quin & psoris portentose succurrit.

Thermus, Lupinus.

LVpinus qui edendo est, opplendi & obstruendi uim habet, quam *Λιπαλυστικόν* appellauerunt medici. Inest illi amaritas, cum extergendi, dissoluiendi, & exiccandi deniq; uiribus absq; erosionē. Lumbricos tum ca taplasmatis modo impactus, tum etiā in potu sumptus interficit. Intestina porro ac uiscera reliqua, cum ruta & pipere potus esculentus lupinus,

emundat. Quinetiam cutis vitia extergit, & tumores deniq; ac tubera cum aceto mulso emplastri more impositus, dissipat.

Thermus agrius, Lupinus agrestis.

LVpinus sylvestris domestico amarior est, atq; ut semel dicam, efficacior ad omnia quam sativus.

Thelipteris, Fœmina filix.

THelipteris, quam aliqui nymphæam, aut pterin cognominant, filici nō tam forma quā uiribus æqualis est: quæ cum uino sumpta, cum latos tum teretes lumbricos interficit. Conceptum uiuum necat, mortuū eijcit. Quinetiam aluum folia thelipteridis esca molliunt.

Thlapsi, Pes gallinaceus.

THlapsi semen tam acrem facultatē obtinet, ut internos abscessus potum cōstringat, mensesq; pellat. Per anū id infusum, coxendicis doloribus auxilio est, & sanguinolenta exhaurit: atq; alioqui nō tam per superna, q̃ per inferna biliosos humores euacuat, oxybaphi mēsurā epota.

Thridax, Lactuca.

Gelidæ quidem ac humidæ facultatis holus lactuca est, nō tamen extremæ, sed secundum aquæ fontanæ temperaturam: Quare inflammationibus calidis appositum præstat remedium. Est præterea siti aduersa. Genituræ profluuium, quam *γασσώλειον* Græci nominant, cōpescit. Et Venereas in somno imaginationes, quos *ἐνυπνίου* gens eadem appellat, eadem herba pota arcet.

Thridax agria, Lactuca sylvestris.

Agrestis porrò lactuca minorem habet quā sativa cum refrigerandi tum humectandi potentiam, uerum multo succulentior est.

Thymus.

THymus calorificæ & exiccatoriæ uirtutis in tertio à temperatis excelsum est: obitq; tenaces ac uiscidos humores incidendi prouinciā.

Thymbra, Satureia.

THymbra agrestis maxime æmula uiribus thymi est: contubernalis uero atq; hortēsis, ad omnia quidē infirmior, sed ad edendū potior.

Thymelæa.

EX planta thymelæa granū cnidium, quod semen eius est, colligitur, cui congenerem atq; æqualem omnino habet potentiam.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA I.

Idæa radix.



Idæa radix non tam gustu quā opere ipso acerba deprehenditur, adq; sanguinis eruptiones, & quascuncq; rheumaticas affectiones idonea est, siue potetur, siue extrinsecus applicetur.

ἰδρωρ, Sudor.

Svdorem per se quidem congregari arduum est, miscetur aut in palæstris exercitatorū sordibus cæromati confusus, acquiratq; multū facultatis digerentis. Proinde inflammationibus uberum hæ sordes impositæ, efficaciori

efficaciori sunt auxilio, & ad extinguendum quod flagrat in ipsis cōducunt. Facit etiā sudor medendis bubonibus. Quod si aridior uidebitur, subigendus est cum cyprino aut rosaceo.

Ixos, Viscum.

Viscum ex eorum classe est, quæ cum acrimonia quadam calfaciunt: eam ob causam uiolenter ex alto humores quosq; tenacissimos euellit, eosq; diffundit ad instar thapsiæ, præterq; quod illa inefficacius est.

Ios, Viola.

In uiolæ folijs aquea & subgelida substantia plusculum pollet.

Ios, Aerugo.

³⁰ **A**erugo gustu acredinem quandam præfert, dissicientis, detrahentis, & secantis naturæ, non teneræ tantum carnis, uerum duriusculæ etiam. Quod si quis plurimæ cerotæ pusillum æruginis confundat, medicamentum absq; erosione absterforium efficiet.

Hippocampus.

Animal marinum perpusillum hippocampus est, cuius combusti cinis cum liquida pice capillorū defluuia ex alopecia instaurat.

Hippolapathon, Grandis rumex.

³⁰ **G**randis rumex, quem hippolapathon græce dicunt, in palustribus nascitur locis, rumici uiribus proxima.

Hippomarathron, Agreste uel erraticum fœniculum.

Hippomarathrū, erraticum fœniculum canchry non est absimile, ualentius arefaciens q; fœniculū: Quo quidem fit, ut aluum lubricam sistat, lapillos cōminuat, & menses deniq; proliciat atq; propellat.

Hippomarathrum aliud.

Est præterea aliud adhuc hippomarathrū, cui semen coriandro simile, uiribus quidē fœniculo erratico minime dispar, uerum imbecillius.

Hippopotamus.

Hippopotami, hoc est fluuiatilis equi testiculus aridus ac potus, serpentium moribus subuenit.

Hipposelinon, Apium grande, & olusatrum.

³⁰ **A**pium satiuo facultate omnino respondet olusatrum, quod Græci dicunt *ἡπποσέλινον*, nisi quod illo est ad omnia imbecillius.

Hippuris, Equisetum, Cauda equina.

Hippuridi cum amaritate qualitas est stiptica, ob quā quidē causam ualentius simul & absq; erosione exiccat: ac proinde grandia quoq; uulnera ceu glutino cōmittit. Præterea uocatas enterocelas iuuat: Et reliquis quibuscuncq; profluuijs & fluxionibus cum uino pota, medetur.

Hippophaës, Lappago, uel lappula minor.

⁴⁰ **H**ippophaës, uel ut alij appellant hippophæos, frutex furculosus est, aqua uestimenta uellicando expoliunt: è cuius radice thapsiæ modo liquor colligitur, qui per se, & cum eruacea farina oboli pondere exhibitus, tum ipsam bilem tum pituitā expurgat. Quin uniuerſa quantaquanta est planta exiceata, purgandi uim obtinet.

Iris.

IRis calidae facultatis tenuiumq; partium est ualde, habet insuper uim cum detergendi tum cōcoquendi: Quamobrem contra tussim remedium peraccomodatum est. Cōtumaces pectoris humores ductiles reddit: torminibus circa umbilicū, quos ^{spasmodici} nuncupant, medetur: huiusmodi sordida expurgat, aluum cum uino sumpta euacuat.

Isatis.

ISatis satiuā quidem, qua tinctores utuntur, arefaciendi potestate con-
tinet, cum stipticitate quadam coniunctam. Spaciosa itaq; huiusmodi ulcera durorum corporum cōglutinat, & sanguinis eruptionibus prodest, tumoribus cedematodes dissicit. Obsistit etiam contumacibus & uitiosa consuetudine huiusmodi ulceribus omnibus.

Isatis agrestis.

Agrestis uero isatis mordax magis est, & ob id aridior. Obsistit igitur ualidissime humidis putredinibus, ad cetera autem deterior, Sed & spleneticis propter uehementem potentiam utilis est.

Isopyron, aut Phasiolum.

ISopyron, uel ut alij uocant phasiolon, semen gerit amarū atq; subacribum. Crassos igitur & glutinosos secat humores, & cōstringendi pariter, corpusq; cōtrahendi facultatē obtinet: quo nomine etiā quae alius hārebant exhaurit atq; repurgat. Neq; hēmoptoicis etiā noxiū est.

Itea, Salix.

Arefaciendi citra morsum potestatē salicis non folia tantum, sed flores quoq; obtinēt: adhuc leuē etiam ac modicā constrictionem. Verum his aridior cortex est, cuius cremati cinis ex eorū censu est, quae potenter adiecto aceto exiccāt. Helos, hoc est clauos, necnō ipsas quoq; formicas cum aceto uerrucas extirpant ac tollunt.

Ichthyocolla, Piscium gluten.

Glutinum piscosum opplendi, atq; obstruendi, necnō exiccandi uim obtinet. Inditur magna cōmoditate emplastris conglutinatorijs, & his quae leprae curandae adhibentur medicamentis, & quae ad faciei eruptionem lenociniumq; faciunt.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA K.

Cancanus.



CAncani radix moderatam exiccandi uim obtinet illita, medicamentumq; interiorum meatus infartendi natum, absq; erosionē efficit. Qua de causa arteriae asperitates linctā cum uino sanat, pariter etiam si quis eam commanducet aut subigat, instar tragacanthae atq; glycyrrizae.

Canchamum.

ARabici ligni lachryma canchamū est, myrrhae aliquam obtinens similitudinem, fragrans, quam ad odorem incendunt & uaporant. Virtutem praeterea crassa & obesa extenuandi, detergendi, & ab infarctu meatuumq; obstructione uindicandi possidet.

Cadmia.

Cadmia.

Cadmia utrâq; species solent arefacere: Sed crassioribus cōstat par-
cibus quę botryitis, quasi acinosa appellatur: Subtilioribus uero quę
placitis, quasi glebosa, est nuncupata. Cremata cadmia exiccādi faculta-
tem, mordacitatis expertē, & abstergendi quandā retinet. Hulnera ca-
ua carne replet, tam ea quę oculos, quā quę reliquū corpus occupant,
uerum præcipue humidiora in corporibus tenerioribus, nam in durius-
sculis uehementioribus & magis efficacibus opus est.

Cacalia.

10 **C**acalia eandem habet cum cancano potestatem, æmulamq; in omni-
bus utilitatem.

Calamagrostis.

Calamagrostis arefaciendi uim obtinet: quamobrem non tam succus
ceius, quā radicum elixatio ocularibus medicamentis inseritur. Se-
men lotium prolicet, & stomacho accommodatum est.

Calamintha, Nepita.

20 **C**alida & sicca temperie calamintha est in tertia distantia, subtiliū nō
sine acredine partium, uiribus longe præstantioribus quā men-
tha: nam instar syluestris menthæ censetur. Facile itaq; in alto hærentia
in summā cutem euellit: Qua de caussa sudores mouet, totum corpus di-
gerit. In febrium accessionibus quę circuitu fiunt cum tremore algores
sedat. Foris cum oleo intrita nepita, nobile coxendicis doloribus subli-
dum præterea, & prauos cutis humores exterit.

Calamus aromaticus.

Calamus odoratus ex secundo est calfacientiū & arefacientiū à tem-
peratis excessu, subtilioris tamen nonnihil & astringentis est poten-
tiæ, urinam adhæc citandi facultatem habet. Medicaminibus deniq; sto-
machicis, & quæ iocinori muliebribusq; locellis dedicata sunt, miscetur.

Calamus phragmites.

30 **A**bstergendi uim habet calamus phragmites, cæterū folia eius uiri-
dia moderate infrigidant. Cortex porro cōbustus, calfacit & exic-
cat in tertio ordine. Neque desunt qui affirmant radicem eius adiectis
bulbis more cataplasmatibus inductam, cum tela tum corpori infixos pa-
xillos euellere & extrahere.

Campæ, Bruchi.

Bruchi, hoc est oleribus innascentes erucæ cum oleo illitæ, à morfu
animalium quæ ictu morfu'ue uirus relinquunt, tueri dicuntur.

Cantharides.

40 **C**antharides quæ in tritico deprehenduntur, lutei coloris, obliquis
czonis insignes, aceti feruentis uapore suffocatæ multiplicē usum ha-
bent: Nam ungues scabiosos cum cerato efficiunt, clauos quoq; & uitia
leprosa curant. Sunt aut erodendi & deurendi uī præditę: nonnulli aut in
medicamenta diuretica aliquid ipsarum immittentes, exhibuerunt.

Cannabis.

Cannabis fructus flatuoso caret spiritu, & exiccatorius est, usque adeo
ut semen genitale arefaciat. Cæterū succus eius uirescens, ad aurium
dolores, quæ ad infarctus originem referunt, inducit.

Canopon.

Canopum sambuci flos est, de quo in historia Actes memoratū est.

Capnos, Fumus.

Capnion siue capnos hinc sortita est nomē, quod eius herbæ cremor
non parum lachrymas cit, speciem oculorū exacuit, acris & amara
est. Vrinam quoque biliosam strenue promouet. Locinoris obstructions
& infirmitates medicatur. Stomachoque robur inducit, & aluum mollit.

Capparis.

Capparis radix detergendi, repurgandi, secandi, distrahendi que facul-
tatem cum quadam amaritate & acredine possidet. Contrahit præ-
terea, stringit, & coagulat sua acerbitate: ac proinde lienes induratos sa-
nat cum pota, tum foris imposita. Menses ducit, & noxios capitis humo-
res purgat ac detrahit. H ulceribus item malignis ac rebellibus quæ ca-
coëthe dicunt, plurimū prodest, & dentium cruciatibus succurrit. Tube-
ra dissipat & uirilignes. Vermes qui in auribus enascuntur, ex alto in su-
perficiem extrahit. Cæterum folia & fructus consimilem quidem, sed in-
firmiorem tamen quàm radix obtinent potentiam.

Cardamus, Nasturtium.

Nasturtij semen, causticæ, hoc est deurentis facultatis particeps est,
modo sinapi, quo nomine cataplasmatibus instar impositū, cum cruen-
to rubore exulcerat, crassos humores admixtis quibusdam alijs incidit.
Herba ipsa arida eiusdem ferè est potentiae, sed humida est moderatæ, &
cruda nonnunquam editur.

Cardamomum.

Acris quoque naturæ cardamomū est, nasturtio tamen non parum im-
becillius: neque illi deest amaritas, qua sanè uermes interficit. Et sca-
biem quam psoran appellant, cum aceto detergit.

Caris.

Caris cōtrita & eliquata, cum bryoniae radice epota, uermes enecat.

Cancri fluuiatiles.

Cancrorū fluuiatiliū crematorū cinis, pari ad unguem modo echia-
norum & cochlearū exiccat. Proprietate uero suæ totius substantiæ,
admirando presentique remedio rabidi canis moribus si potest, succurrit.

Cancri marini.

Fluuiales cancos siccitatis uehementia multis nominibus post se re-
linquunt cancri marini, neque à cane rabioso demorsis quicquid condu-
cunt, sed uiolentius arefacere contenduntibus profunt. Cæterum qui in
perennibus uitam agunt fluminibus, cancri leuigati & cataplasmate im-
pacti, spinas, & quaecumque corpori infixæ ligna telaque euellunt.

Caron.

Caron.

Cari semen calidum est & siccum, secundum tertium quodammodo à temperatis excessum. Flatus discutit, & urinas prolicit, neq; id semen modo, uerum tota etiam planta.

Carpesium.

Cvm tenuitate partium odoratum est carpesium: Ob eamq; causam Cuiuscerum obturationes extergit, lotia promouet, renes insuper purgatione à lapillis uindicat.

Carya, Nuces.

Nvx arbor in ramulis quidem suis stipticitatem continet, cum primis uero nukum putaminibus: Quare succus eorum in melle elixus medicamentum fit, quod ori inseruit, Græci *σπαλινός* appellant. Cortex eius si cremetur, tenuis redditur essentia, & exiccatorius absq; uellicatione. Porro quod esculentū ipsius est, oleosum est, promptissimeq; exprimen- σπαλινός do colligitur. Quod inde fit oleum, subtilibus cōstat partibus, & tumores putredinesq; dissipandi uirtutem obtinet. Cæterum quæ liquore aliquo subacta & condita sunt carya propter antiquitatem, extergendi habent ea quæ in cute oriuntur uitia potentiam.

Carya Pontica, Auellana.

NVcem Ponticam leptocaryon græce, latine auellanam nuncupant, ea frigidior est atq; austera, cætera magnæ nucis æmula.

Caryophyllon.

Caryophyllon perinde quasi dicas nucifolium, non re ipsa atq; essentia sua nomini responderet, uerum ex India arboris cuiuspiam flores stipulæ faciem præferentes, & nigri coloris, longitudine digitali sunt, fragrantiores, acres, atq; subamari sapore, calorifici & exiccatorii quadantenus in tertio à medijs recessu, quorū multiplex & præstātilimus usus est cum in obsonijs, tum in cæteris quibuscuncq; medicamentis.

Cassamon.

SVnt qui fructum esse balsami cassamon autumant, de quo superius in Balsami descriptione satis memoratum est.

Cassia.

Cassia calide facultatis est ac sicca, in tertio ferme ordine, partium ad hæc satis subtilium, acrimoniæ & adstrictionis modicæ particeps: Quapropter simul & incidit, & discutit, & robur præterea organis indit: ducit suppressos deniq; menses.

Castorium, Testes fibrorum.

Testiculus castoris, quod castorium est, cum præpollente & impensa partiū tenuitate calfacit & exiccat: Qua de causa alijs efficacius est, & nervorum ex plenitudine humorum prognatis affectionibus congruit. Perfrigerata facillime recalfacit. Foris adhibitum atq; eporū, nullam parti cuiuspiam noxam adfert, etiam si tepidam homo perpetiatur febrem, qualis accidit in ueterno maxime, & alijs inexpugnabilis somni

soporibus. Mouet præterea menses, & locos à partu morantes expellit. Adhæc in eis quæ cerebrum & pulmonem impetunt affectibus, si quis fustium eius inspiratione hauriat, magnifice iuuat.

Caucalis.

CAucalis, sunt qui daucum syluestre dicunt, calfacit uero quemadmodum daucus, exiccat, & urinam trahit: saleq; ad repositionem condit.

Cenchros, Milium.

REfrigerat quidem milium in distantia prima, arefacit uero in secunda, & subtilitatis possidet perexiguum: extrinsecus in sacculis exalatum, & cataplasmatris modo impositum, exiccat.

Cedrus.

Cedrus alia quidē est fruticosa, iunipero assimilis, alia arbor. Vtræque sunt calidi & sicci temperamenti, secundum utrumque tertij ordinis: uerum cedria (quo nomine cedri gaudet oleum) quantum quoque ordinem uidetur attingere, subtilium satis partium, quo nomine mollem uti que carnē prompte & absque omni dolore liquat, & putrefacit, exedit uero duram uero, atque cadauerum arefacit, & à corruptionibus seruat. Pediculos præterea, lendes, & tineas, ascarades, & in auribus natos uermes interficere ualet, atque infinita ferme alia designat.

Centaurium maius.

GRandioris centaurij radix gustantibus acris apparet, calidæque naturæ, stipticitatis terreæ: qua de causa menstruas mulierum purgationes pellit, foetum uiuum corrumpit, enecat, eijcit, mortuum euellit. Vulnere glutinat, & sanguinem excreantibus, quos hæmoptoicos dicunt, succurrit: Atque ut breuiter dicam, quæcunque thoracem infestant, centaurio maiore leuantur.

Centaurium minus.

Centaurij minoris radix ignaua planè atque inefficax est, cæterum ramuli caulisque summitates, potenter & citra mordacitatem calfaciunt: quapropter ad singula quæ maius centaurium iuuat, accommodatæ sunt. Decoctum insuper eius herbæ coxendicis dolores si immittatur, bilem euacuando curat. Nonnunquam uero tam uiolenter operatur, ut & sanguinem euacuet, atque tum quidem magis proderit.

Cornu caprinum, & ceruinum.

Cornu capræ & cornu cerui crematū, dentibus nitorem, si loco densificij utare, adfert: gingiuas cum humore flaccescētes ac fluidas firmat. Cerui item cornu uino leuigatū, deinde illitū, dentes uacillantes atque commotos stabilis. Post uero unctionē ablutū, dysenteriam, uentrales, & sanguinis sputationes, & morbo regio oppressos curat, si cochliariorum duorum pondere sumat. Ocularibus præterea inditur subinde pharmacis.

Cornu tauri.

TAurinū porro cornu cum aqua haustū, sanguinis eruptiones, quas Græci αιμασφηγας uocant, non instrenue cohibet.

Cerasia

Cerasia.

Cerasiorum dug sunt species, dulcia nancq; sunt quædam, austera alia: Dulcia multo celerius transeunt deijciunturq;: Austera stomacho minus sunt noxia. Acida quippe, quoniam incidunt. Inflammatis pariter & pituitosis stomachis conferunt.

Commi, Gummi cerasorum.

Gummi cerasi arboris ad arterias exasperatas leuigandas ac leniendas accommodatum est, & calculis uexatos cum uino pota adiuuat.

Ceratonia.

¹⁰ **A**refaciendi & refrigerandi facultatis particeps est ceratonia, & fructus eius, quæ ceratia dicunt. Habet in super aliquid dulcedinis.

Capita Menidum.

Menidum sale conditarum & inueteratarum capita cremata siccificæ facultatis uestione redduntur, neq; ualentis acrimoniæ. Rhagadibus sedis, & columellæ longo tempore induratæ succurrunt.

Capita Smaridum.

Smaridis totum caput combustum, capillorum defluuijs cum adipe ursina adhibitum, succurrit.

Caput Muris.

²⁰ **E**adem omnino caput muris crematum, quæ smaridis caput præstat, si unâ cum melle applicetur.

Caput Milui.

Caput milui aridum, deplume, pondo quantum tribus digitis subleuari potest, cum aqua potum, dolore pedum uexatis strenue subuenit.

Caput Lacertæ.

Tradunt uero caput lacertæ, paxillos, aliâq; corpori infixæ ligna euellere, atq; formicas, sessiles uerrucas, et angustiore rotundâq; basi, quas Græci ἀνδροφιδόνας appellant, & helos, quos Latini clauos cognominant.

Cicis, Galla.

³⁰ **M**edicamentum perquam acerbum gallæ ea species est, quæ omphacites dicitur, hoc est immatura: Quo fit ut exiccet, & retudat, efficiatq; rheumata: Colligit præterea & cōstringit artus pensiles, & membra laxa guida, omnibusq; fluxionum affectibus competit. Ponitur in tertio arefacientium, secundo uero refrigerantium ordine. Altera uero gallæ species, flaua illa, & laxa, grandisq; arefacit quidē & ipsa, sed tanto minore q; superior efficacia, quanto minus acerbitate participat. Cocta sedis inflammationibus & procidentijs subuenit. Crematæ aut utraq; & aceto restinctæ, sistendo sanguini utiles & accommodatæ sunt.

Cepæa.

⁴⁰ **P**ortulacæ similis herba cepæa est. Sumpta in uino folia eius, scabiei uesicæ succurrunt. Radix uero eius cum asparago, quem myacanthum appellant, pota, stillicidijs uesicæ, præsertim quæ opplente lotij iter obijce aliquo eueniunt, remedio est.

Cera.

Reliquorum medicaminum materia quasiq; corpus, cera bene existit temperata, atq; ipsa per se ex eorum censu est, quæ lente detergunt. Habet insuper distrahentis nonnihil, & calidæ potentiae.

Buccina.

Buccinorum quidem testa cremata uehementis admodum arefacien di particeps est potentiae, atq; id quidem citra mordicationē: ideoq; h ulceribus contumacibus & malignis, quæ cacoëthe uocant, impendio cōgruit: Adhæc cōtra putrescentia quoq; hulcera, uel adiecto aceto, uel uino, eisdem utendū. Oleum in quo carnes ipsorū etiandum uiuentiū elixatæ sunt, auribus non semel infusum earundem doloribus opitulatur.

Cici, Ricinus.

Vtricini fructus expurgandi, abstergendi, ac distrahendi facultatē obtinet, sic etiam ipsius folium: uerum ad omnia imbecillius, quæ admodum & in oleo præmonstratum est.

Cinnabaris.

Arimoniae pusillū habet facultate cinnabaris, neq; deest illi omni no stipticitas & alstrictio.

Cinnamomum.

Cinnamomum omnium maxime subtilissimis constat essentiae partis bus, neq; interim tamen extremi caloris, sed ex tertio quadantenus ab inculcata temperie excessu & ordine: neq; sanè quicquam omnium quæ in calfaciendo eiusdem classis sunt, tantopere desiccet, ob illam extremam partium subtilitatem. Est præterea in cinnamomorum genere quodpiam ueluti debilius, quod quidem ipsum pseudocinnamomū, hoc est falsū cinnamomum, quasiq; adulterinum uocant aliqui.

Circea.

Circeæ radix calidæ temperaturæ est, & fragrantis odoris, quæ si cum uino potetur, sceminarum locos expurgat. Producit autem generatq; semen eius lac, in sorbitione sumptum.

Cissaris, Pumex.

Pumex non solum potentia, sed asperitate etiam detergentis facultatis existit, atq; in primis dentiū. Inijcitur uero medicaminibus quoq; carne hulcera implentibus, nec non cutis uitia abstergendi uim habentibus. Quod si cremetur, essentiae quidē subtilioris, sed mordax magis efficitur. Pumex aut si abluatur, mordicationem exiit.

Cissos.

Cissos uel cissaros perexiguus est fruticulus stipticus & cōstringens, tepidæ frigiditatis potentia. Folia eius fruticis & germina usq; adeo desiccant, ut & uulnera cōglutinent. Flores uehementius arefaciūt, utpote in secundo quodāmodo gradu cōsistentes. Intestinorum torminibus & alijs fluxionibus medetur pota: Extrinsecus autem emplastri modō impacta, putrescentibus h ulceribus auxiliatur.

Cissos,

Cissos, Hedera.

Hedera ex contrarijs composita est facultatibus: habet enim adstringentis non nihil, refrigerantis item & acris gustu naturæ cum calore cōiunctæ. Neque deest illi substantia aquea, tepida, viridis: cuius folia cum uino elixa uulnera cōglutinant, igne ambustis & lienosis conducunt. Cre-
 mor uero hederae medicamentum præstat errhinon, hoc est quod nari-
 bus infusum, caput euacuat: diuturnis præterea aurium fluxionibus resis-
 tit atque succurrit. Multo acrimonie plus habet ipsius lachryma, pedicu-
 los interficit, atque deglabrat.

Errhinon.

Citrium, Malum Punicum.

Citrium, quod & Medicum malum appellant, medullium eius aceto-
 sum uel nullas habet saporis omnino qualitates: cuius utique semen in
 tertio à temperatis excessu refrigerat & arefacit. Cortex in exiccando se-
 cundi est ordinis, non tamen tantæ frigiditatis, habet aliàs acrimoniam,
 Caro citrei mali crassum humorem generat, & pituitam adauget, refri-
 gerat. Semen distrahit pariter & exiccatur secunda in distantia. Quin &
 folia ipsius arboris siccam & disijcientem obtinent potentiam.

Cichorium.

Cichorium uel picris, hoc est amara, ueluti syluestris seris est, ex pri-
 mo refrigerantium & arefacientium ordine. Habet præterea stipti-
 citatem quandam, qua de causa iocinorosis confert dysenterijs.

Clematidis.

Clematidis, quæ ab aliquibus daphnoides, à quibusdā myrsinoides,
 ab alijs polygonoides, palmites sarmentæue habet prolixa, ad olo-
 choeni iuncus crassitudinē, foliū lauro figura & colore simile, arefacien-
 tis est potentia. Flores alui, quos *λευκίστιος* uocant, & intestinorū tormi-
 na, quæ *σπογγώδης* dicuntur, sedat, & dentium cruciatus mitigat. Contra
 uenenatorum morsus magna cum utilitate imponitur.

Clematidis altera, Ambuxus.

Clematidis altera arboribus, quemadmodum smilax hedera circum-
 funditur, adurentem habens facultatem. Fructus huius cum aqua
 potus, per inferiorem aluium pituitam deducit, atque biliosum humorem.
 Folia eius ritu cataplasmatibus impacta, lepras discutunt.

Clinopodium.

Clinopodium excalfaciendi & arefaciendi uim obtinet, sed nondum
 cadurendi, uerum in tertio ferme ordine.

Cnicus.

Cnici seminis non nisi ad purgationes usus est: si quis extrinsecus ad-
 hibere uolet, tertij fuerit excalfacientium ordinis.

40 Conchylia.

Buccinis consimilem facultatem habent conchylia.

Coelia, hoc est Venter mergi.

Ventrem mergi recens coctum, siue inueteratum & arefactum iuxta

Ventriculi gal-
line tunica.

prodesse stomacho si estur, plures asserunt, quemadmodum etiam de in-
teriore ventris gallinarum tunica siccata & pota perhibent: utrunq; tai-
men hoc mendacium esse Galenus facto periculo deprehendit. Tradit
uero ipse quoq; Dioscorides ventrem palumbi alitis modice potū, per
urinam calculos expellere.

Cœlta gales, Venter mustelæ.

Mustelæ ventriculus in potu sumptus, adiuuans amuletum, quod
Μελισφάρακος dicunt, contra bestias uenenatas esse putatur.

Coccus cnidius, Granum gnidium.

Granum gnidium fructus est non chamælaæ, ut quidam autuma-
e 10
eunt, sed thymelææ, acris adurentisq; facultatis. Purgat per infer-
na aquam, si potetur.

Coccus baphicus, Granum tinctorium.

Granum tinctorium quoniam citra erosionē desiccatur, grandibus ual-
e
neribus competit, & neruorum uulnerationibus cum aceto & oxy-
melite, quod est aceto mulso tritum & leuigatum.

Coccymelea, Prunus.

Coccymelea, hoc est pruni fructus, aluum recens quidem uehemen-
e
tius & copiosius, mitius uero ac minus etiā arefactus subducit. Pru-
norum porro decocto inflammationes gurgulionis utiliter colluuntur. 10
Gummi arboris secante, & paruum non crassarū, sed subtilium potentia
constat. Id sanē potum cum uino, nōnulli lapides affirmant confringere:
cum aceto uero puerorum lichenas, hoc est impetigines sanare.

Coccymelea agrestis.

Syluestris coccymelea fructus haud obscure stipticus est, & ad cohi-
e
sendam aluum aptior. Appellatur autē hæc planta in Asia prumnum.
Porro satiuæ coccymelea assimilatur his, quæ nunc Damascena appel-
lantur, ut Galenus asserit.

Colla, Gluten.

Gluten similagineū siue ex polline factū, meatus opplet ac obstruit 10
e
illitum, sed concoctrice adhæc facultate præditum est.

Colocynthe, Cucurbita.

Cucurbita humidi & frigidi temperamenti est, utrunq; in secundo a-
e
temperatis recessu. Ob quam rem tota ritu cataplasmatibus illita, fer-
uentiores refrigerat inflammationes.

Colocynthis.

Colocynthis purgatoriam facultatem oppido quā ualidam possidet.
e
Viridis ipsius liquor infricatus, coxendicum dolores adiuuat.

Comarus, Arbutus.

Arbutus arbor ipsa pariter cum fructu qualitatem acerbam obtinet. 40
e
Memecylū autem hunc ipsum nominant. Est autem is nō solum no-
cuius stomacho, sed capitis etiam dolores inducit.

Commis.

Commī, Gummi.

Gummi exiccatoriam habet naturam & emplasticam, atq; ob id scilicet aasperitates medicatur.

Conia, Lixiuum.

Conia græce, lixiuum latine dicitur, utraque appellatio; quod uelut absolutio cineris sit, est indita. Caterum omnium extreme absterforum, exiccatorumq; maximum est lixiuum, cum id quod ex ficulneorum lignorum, tum quod ex tithymallorum cinere conficitur, & tantum non iam septica seu putrefacientis est potentia. Quod si calx quoq; cineri adijciatur, deurens inde reddetur lixiuum, quod *μυρσάνθη* Græci nuncupant. Clysticis id frequenter cōmiscetur pharmacis. Omnium uero maxime uehementissimū est, quod ex sola calce constituitur.

Conyza, quæ non paucis Pulicaria est.

Conyza & grandior & exiliior, sicifica & excafactoria sunt temperaturæ secundum tertium a medijs excessum. Proinde oleum in quo elixæ fuerint, febrium cum tremore algores per circuitum redeuntessedant. Flores quoq; utriusq; similem effectum possident, quorum elixationes menses prouocat, & scetum ejicit. Tertia porro conyzæ species, quæ in locis humidioribus nascitur, utrisq; superioribus tetriorem de se emittit odoris fluxum, & uires continet multo inferiores debilioresq;.

Copros, Stercus.

Stercus quidem omne genus calidæ, & aridissimæ, atq; extreme distrahentis est potentia. Permutatur autem unumquodq; secundum excernentis animalis cum temperaturam, tum uictus quoq; rationem.

Copros cynan, Stercus caninum.

Stercus canum, qui ossibus uescuntur, desiccatum, & cum lacte fissili potum, dysenteria laborantibus succurrit. Commode porro medicaminibus contra hucera inueterata factis miscetur. Præter hæc caninum stercus melle exceptum, anginae, tonsillarumq; & glandularum inflammationibus utiliter illinitur.

Stercus infantum.

Eisdem malis præsentiore remedio succurrit oletum puerorū, qui non excrementosa uictus ratione utuntur.

Stercus luporum.

Stercus lupinū albidius quidem, & quod nō humi, sed in quibusdam Suepribus fruticibusq; reperitur, colicis præsentaneo interdū est remedio, non solum epotum, sed etiam impositum, uel pro amuleto alligatum & appensum. Suspendi aut ex uinculo è lana confecto, non quauis, sed ouis à lupo laniatæ expedit, uel ex pelle ceruina.

Stercus caprillus.

Caprinus deinde simus (quem Græci *αυράδης* proprie uocant) maioris acrimoniae, uehementioremq; dissipandi facultatē continet, adeo ut tumores scirrhi instar induratos, distrahat emplastri modo impositus,

potissimum in his qui duriores sunt carne: mulieribus enim ac pueris, tenerioribusque omnibus minime congruit. Baccę porro caprinę cōbustę abstergunt uehementius, & partiū multo magis subtilium efficiuntur.

Stercus bubulum.

Stercori bubulo uis quaedā attrahēdi inest. Morfibus igitur uespārū sac apum pulchre medet. Hydropicorū corpus uniuersum si quis stercore bubulo perungat sub sole, magnam ac presentaneam opem sentiet.

Stercus ouillum.

Fimus ouium cum aceto, uerrucis, quas formicas dicūt, et acrochordo nibus, carnosarum partium abscessibus, quos Gręci *συσθλιμας* appellant, & Clauis denique medetur.

Stercus columbinum.

Stercus palumbinum plus acredinis quā reliqua habens stercore, si quis id cum nasturtij semine applicet corpori, puniceum colorem cum exulceratione ferme inducit, & rubificat.

Stercus alitum domesticorum.

Merda uero auium contubernalium, puta gallinacci, anseris, gallinę, cum oxymelite, uel aceto, uel cenomelite haustu, facit ut quis suffocantes fungos uomitu eiciat, sitque alexipharmacū, quod est primi auxilij amuletum. Colicis præterea nonnulli potandum ministrant medici.

Stercus ciconiarum.

Sunt qui ciconiarum alui excrementū non nisi recta ceruice spirantis bus, quos orthopnoicos gręce appellant, sanare asseuerant.

Stercus murinum.

Muscerda abstergendi maiorem uim quā cæterorum animalium finis obtinens, alopecij subuenit, & puerorū ano applicatum, ad excretionem proritat.

Stercus sturni.

Fimus sturnorum, quum oryzam comederint, absterforiæ facultatis efficitur, tantę quidē, ut contractas uelut ex sole maculas, quas *ιχθυος* gręce nominant, exterat.

Stercus crocodilorum terrestrium.

Fimus præterea crocodilorum terrestrium impetigines, quos Gręci cognominant, exterit.

Corallium.

Corallium lapidea quaedā arbor est, arboris namque modo crescit, & in duritiem lapidis duratur, non in continente, sed in imo maris, colore rufo, lapidi simili, ualenter siccandi, & mediocriter constipandi uim obtinens. Quo quidem nomine sanguinem eiectantibus, & intestinorū torminibus pulchre conuenit.

Coris.

Coris animalia acris sunt potentę. Sunt qui hæc hircines eicere, si cum aceto potentur, literis & memorię cōmendarint.

Coris

Coris herba.

COris, sunt qui corin herbā hypericon uocent, acris ea est, boniq; odō
Cris. Fructus autem eius potus, menses urinasq; prolicit, opitulatur
phalangiorum moribus. Opisthotonicis præterea, hoc est in scapulas
rigentibus cum oleo utiliter illinitur.

Corianon, Corion, Corian drum.

COrianum siue corion ex contrarijs constituitur facultatibus, subtili
Crioris nanq; essentia cum terrea quadam amaritate existit, & aquei
humoris tepidi, habet præterea stipticitatis pauculum. Quamobrem in
10 inflammationibus, & ignitis cum phlegmone ruboribus (quæ erysipelata
dicuntur) non admodum feruentibus succurrit. Teneriores quoq; tumō
res distijcit, adiecto sibi quopiam accommodo & congenere. Seminis co
riandri uel momentum quidem cum passo arcendis lumbricis præsentī
cum remedio bibitur. Largius tamen quā par sit sumptum, mentem
non sine periculo commouet.

Corydos, Alauda, siue Galerita.

ALauda, quam Græci corydon uel corydalon uocant, auis elixa cum
A simplici iure colicis subuenit. Profuerit autem plurimum, si assidue
& identidem quis ipsum cum iure comedat.

Coronopus, id est Cornicis pes.

Coronopodis quoq; radix colicos dolores mansa sanare creditur,
Costus.

Costus paucula admodum prædita est amaritudine, plurimæ uero
Cacrimonix & calidæ qualitatis particeps est. Quapropter in quibus
aliquam corporis partem re postulante calcæcere, uel ex profundo in sum
mam cutem humorē quempiam euellere instituiamus, ad costum consu
giendū. Vrinam itaq; ciet, & menstrua ducit, & lumbricos perimit. Ha
bet uero & flatuosi spiritus nō nihil, quæ de causa in Venerem stimulat,
cum cœnomelite potum. Coxendicū doloribus & resolutis, & cum tre
30 more per circuitum algoribus congruit cum oleo intritum.

Cotyledon, Umbilicus Veneris.

Cotyledon mixtæ facultatis est, refrigerantis uidelicet, & reperiens
Cris, repurgantis, & distrahentis. Folia uero eius unā cum radice co
mesta, lapillos atterere, & lotium mouere creduntur.

Cochliæ, Līmaces.

Cochliæ crematæ strenuam arefaciendi uim, calcaciendi mediocrem
Cobtinent. Contra dysenteriam nondum putrescentem plusculum
opis tulerint, si ad quatuor cochlearū partes miscueris piperis albi par
tem unam, & gallarum partes duas. Sed quæ exustionis omnino exper
40 tes, sunt cochliæ ad unguē leuigatæ, & uentri impactæ hydropicorū, &
in arthriticis articularū tumoribus donec iam ultro deciderint, plurimū
expediunt. Et funditus omnino humorē quencuncq; ualenter exiccant.

Crania, Cornus.

Corni arboris fructus acerbus est, & uesulentus, ac proinde aluum potenter admodum compescit & restringit. Folia quoque & ramiuli sua acerbitate impensius arefaciunt, ita quidem, ut grandia etiam uulnera durorum corporum conglutinent.

Crambe, Brassica.

Brassica, ea nempe quae edendo est, exiccatoriae facultatis est, non solum dum estur, sed etiam si extrinsecus imponatur, non tamen acris manifeste. Vulnera ob id & ulcera conglutinat extreme malefica, quae caecothae appellant, & egerrimae solutionis tumores instaurat & curat. Habet uero abstergentis potentiae non nihil, qua leprae medetur. Semen eius herbae in potu sumptum lumbricos interficit, & potissimum brassicae Aegyptiae. Caulium porro crematorum cinis deurentis est potentiae. Caeterum cum adipe laterum doloribus diuturnis & peruetustis admodum praesenti remedio succurrit.

Crambe agria, Brassica agrestis.

Brassica syluestris ad omnia praedicta, quam domestica & sativa brassica potentiolem uim possidet. Quae de causa intro in corpus citra noxam sumi non potest.

Crambe thalassia, Brassica marina.

Brassica marina aluum subducit, eo quod gustui subsalsum atque subamarum quippiam habere uideatur.

Crataegonios.

Crataegoni herbae fructus gustantibus acrimoniam praefert, estque temperatura frigidus, milio consimilis.

Cretum, Batis.

Cretum una cum exiguo amaroze subsalsum quodammodo est, ideoque uires repurgandi & arefaciendi possidet.

Critic, Hordeum.

Hordeum calidum & siccum habetur in ordine primo. Habet etiam aliquiddam sed pauculum modo abstersionis: arefacit uero paulo plus quam farina fabuli, flatuosum uero minus. Polenta autem, quod *ἀρρυ* Graeci uocant, uehementioris multo quam hordeum exiccatoriae est potentiae. Caeterum pituitosa magis humectoria, magisque absterforia est.

Crimmon.

Crimmon non paucam in se habet crassam substantiam, quo quidem nomine & farina tritici, & ex zea farina gaudet. Nutrit ualidiusque polenta, renititur uero concoctioni crimmon. Appellatur autem sorbitio ex eo confecta, puls, graece uero *σολίτιον*.

Crinos, Lilium.

Lilij porro flos temperamentum habet mixtum ex subtilitate partium, & terrea essentia, & aqua, eademque temperata. Propter hoc, quod

ex

ex eo conficitur oleum, distrahentis & emollientis est potentia, Mulierumque locorum inflammationibus est perquam idoneum. Radix & folia lilij siccant, & detergunt, atque discutiunt mediocriter: ideoque ambustis perutilia sunt. Vulnerationi porro neruorum opitulatur cum oxy-melite sumptus eorundem succus.

Crocodilum.

Crocodilij cum semen tum liquor facultatem calorificam, exiccato-
riam, & digerentem possidet. Lotium itaque pariter & menses pro-
ritant. Radix thoracis excreationibus egregie subuenit. Cæterum per
10 nares quoque trahit sanguinem.

Crocus.

Crocus in calfaciendo secundum, in exiccando autem primum sortitus est
Cordinem, habetque stipandi concoquendique potentiam.

Crommyon, Cepe.

Cepa in extremo à temperatis excessu calfacientium est, & crassarum
partium essentia. Quapropter hæmorrhoidas applicata aperit. Has-
beta autem etiam uim absterforiam, albasque cutis notas, quos *ελκός* nominant,
cum aceto emaculat & expungit, & ex alopecij glabreta pilis alcyonio-
citius instaurat. Succus postremo ipsius suffusus, uel ob humorum crassi-
tudinem oculorum speciem hebetatam adiuuat.

Cyamus, Faba.

Faba in utroque refrigerando uidelicet & exiccando non procul à me-
dia ad unguem temperie abest. Caro autem eius abstergentis poten-
tiæ particeps est: Idcirco excreationes, sputa item pectoris & pulmonis
medicat. Putamen astrictionis quippiam habet, celiacis & dysentericis
fabulum uniuersum cum oxyrato elixu peritoneum est præsidium. Infla-
mationibus præterea & tumoribus cataplasmatibus instar impositum auxi-
liatur. Quin & lac quoque in uberibus ab eo cataplasmate extinguitur.

Cyanos, Cœruleus.

30 Euceruleo uis & natura acrior, tum detrahendi etiam (quam *καταρ-
τιος* appellant) tum discutiendi ualentior quam cinnabari. Astrictio-
nis quoque particeps est.

Cyclaminos, Rapum, Umbilicus terræ.

Cyclaminus uariam potestatem obtinet, abstergendi uidelicet, inci-
dendi, aperiendi, attrahendi, & discutiendi. Ac proinde succus ipsius
hæmorrhoidas interrumpit, si oris earum ad glutinetur, duritias cum alijs
quæ ad eandem rem faciunt, appositus discit. Suffusus porro cum melle
illius succurrit, & per nares caput expurgat, tantæque est potentia, ut eo
abdomine uncto, alium subducatur, & conceptu interficiat. Viribus aut
40 radix multo quam succus inferior est, tamen ipsa quoque adeo uehemens
sit, ut cum aqua multa trium drachmarum pondere sumpta, corporis ui-
scera expurget, cutisque cuncta ferme uitia strenue detergat.

Cyclaminos altera.

Est & alterum terræ rapum siue umbilicus, quod cissanthemon uocant, cuius utiq; radix admodū inutilis & superuacanea est. Fructus uero cyclamini tam efficax, ut in potu sumptus, superiori operi cōparia,

Cyminum, Cuminum.

Cyminum calfacientis est potentiae secundū tertium quadantenus à temperatis excessum & ordinem. Lotium præterea prouocantis, & flatum peditusq; discutiens, & penitus extinguens.

Cynos batus, Sents canis.

Cynosbati fruticis fructus haud segniter stipticus est, folia uero moderate astringentia sunt: Atqui uitandum atq; fugiendum est etiam illud, quod in medittullo fructus eius lanæ præfert faciem, tanquam id quod arteriam uitiat & afficit.

Cyparissus, Cupressus.

Cypressi arboris galbuli & ramuli exiccatoriam uim obtinent, citra euidentem tamen magnumq; calorem: Ac proinde grandia admodum conglutinant in durioribus corporibus uulnera, & in flaccescentibus cum humore putredinibus humiditates in profundo latentes innoxie tutoq; depascuntur atq; absument. Quin & enterocelcis, id est intestinorum ramicibus cupressi cum pilulae tum germina succurrunt.

Cyperus, luncus quadratus.

Iuncus odoratus angulosus, quem cyperum græce appellant, calidus pariter & siccus temperamento est, neq; in sui muneris functione uel tantillū uellicat. Qua de re h ulceribus præ nimia humiditate ægre cicatricem admittentibus mirabiliter conducit. Prodest pariter ad oris h ulceria. Inest præterea cypero secandi quædam facultas, qua lapillos atterit, & loria simul, ac menstruas mulierum purgationes prolicit.

Cypros.

Cypri arboris folia atq; uirgulta ramique mixtam facultatē possident, diaphoreticam nempe & stipticam, innoxie & citra erosionem exiccatoriā. Quapropter decocto eius igne ambusta conspersa foraq; sanantur. Utuntur item aduersus igneas corporis inflammationes: Et oris h ulceribus, quas aphthas cognominant, prodest cōmansa. Lienosis adhæc remedijs non absurde commiscuntur.

Cytisum.

Cytisi folia leuiusculam ac lentam discutiendi facultatem obtinent, & tepidam temperaturam, sicuti etiam maluæ.

Conion, Cicuta.

Cicutam extreme refrigerantem natura habere potentiam lippis fermeton soribusq; ut ita dicam, perspicuum est.

Conos.

Coni quidem cum cortex tum folia uiribus pino sunt similia, acrimonie

monia uero plus efficaciaeque possident. Fructus autem quem strobilorum quidam nominant, si uiridis quidem sit, habet cum humiditate amarorem quempiam & acredinem, ideoque affectionibus pectoris purulentis, quae expuitionis facilitatem efflagitant, apprime congruit: ductilem enim & excreatu facilem reddit quantumuis tenacem materiam: Sed esculentus in aqua maceratus tantisper dum omnem inculpati temperamenti acorem exuerit, minus mordax, & emplasticus magis efficitur, & medicamentum denique asperitati leniendae accommodatissimum.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA L.

30



Lagopos, Leporinus pes.

Agopus desiccantis est potentiae, usque adeo ut alui fluxiones non segniter exiccando sistat.

Ladanum.

20

Ladanum ex cistho frutice, quem ladana uocant, prouenit & colligitur. Caprae namque ipsum depascentes, pinguitudinem atque succulentum ipsius herbae, barbis & femoribus suis auferunt. Collectum uero ladanum medicamentum est calidum, secundum a temperatis excessum attingens, essentia subtili, moderate emollientis potentiae, pariterque distrahentis, & concoquentis maxime. Proinde nihil mirum quod locellorum afflictionibus peculiariter dedicatur. Praeter haec stipticitatis paululum quiddam continet, quocirca fluentes capillos retinet.

Lathyrus.

Lathyrus tithymalli species est, sunt qui succum eius pariter cum tithymalli lacte purgare affirmant. Semen uero summam facultatem purgatoriam possidet.

Lapsane.

Lapsane esca quidem uiciosum humorem generat. Caeterum cataplasmatismodo adhibita, abstergendi nonnullam, disijciendi quoque potestatem obtinet.

30

Rumex herba moderate discutiendi facultatem in se complectitur.

Oxylapathon.

Oxylapathon, quasi acuta rumex dicitur, praeter digerentem uim, repperit percursoriam quandam facultatem sortitum est. Semen utriusque rumicis, sed potissimum acutae stipticitatem quandam obtinens, diarrhoeis & dysenterijs medetur. Contrario autem modo, diuersis quoque uiribus quantenus folia & semen inter se constant: Folia namque esca aluum commouent: semen potum lubricam cohibet ac sistit.

Limonium.

40

Limonij fructum utpote acerbum & austerum, coeliacis, & dysentericis, & sanguinem sputo eiectionibus, haemoptoicisque cum uino exhibet. Quin ad fluxum quoque muliebrem oxybaphi mensura peraccommodus est.

Lichen.

Lichen qui in petris adinstar musci prouenit, abstergentem possidet

pariter & modice frigoricam, exiccatoriamq; potestatem. Porro lichenas curat, & inflammationes arcet, teste Dioscoride. Adhæc hæmorrhagias, hoc est sanguinis eruptiones comprimit ac sistit.

Lichenes caballorum.

Lichenes equorum leuigatos cum aceto, perhibent aliqui comitalem morbum, mox bestiarum morsum ictum uel sanare.

Leontopetalon, Papauerculum.

Leontopetali radix in arefaciendo tertij ordinis censetur, & digerentem obtinet potentiam.

Lepidium.

Lepidium, quam & hiberida nūcupant, ex quarta calfacientium à temperatis est distantia, nasturtio uiribus, præterquam quod minus eo siccatur, uicinum ac simile existit.

Lepis, Squama.

Squamarū omne quidem genus potenter exiccatorium est, astrictorium item, & strenue mordax.

Lepis chalcis, Squama æris.

Squama æris non paulo maiorem arefaciendi uim obtinet, & subtiliorum magis est partium, habens nonnihil etiam rubiginis, præsertim ea quæ ex Cypriorū decutitur clauis, quos ἄλυσζ Græci nominant; propter hoc Heletim, id est clauarem eandem uocitant.

Squama ferri.

Squama autem ferri stipticitate copiosiore participat, & hac etiam maiorem habet astrictionē squama stomomatis: Qua de causa ad extreme maligna hucera, quæ cacoethe uocantur, præstantius est purgatorium. Carnem quoq; ualidius liquefacit, quàm quælibet squama æris.

Leucacanthos, Spina alba.

Sunt qui leucacanthum polygonaton, neq; defunt qui ichiada nuncupant. Eius plantulæ radix incidendi & arefaciendi facultatem habet in tertio ordine, ex calfaciendi uero in primo.

Leucas herba.

Leucas ex tertia quidem calfacientium & exiccantium classe censetur, sed acriorem possidet qualitatem exuperantem.

Leucoion, Viola, uel Viola alba.

Violæ, quam λευκίον Græci dicunt, frutex uniuersus extergendi habet potentiam, & ex tenui constat essentia, plus tamen flores, atque inter hos aridi impensius etiā quàm uirides. Idcirco sanè menses prouocant, foetum perimunt, & peremptū efficiunt. Verū si quis eius uehementiam aqua admixta hebetauerit, & mitigauerit, ad inflammationes quoq; appositissimum efficiet pharmacū, potissimū ad phlegmonas uulvæ. Radices proxime & æqualis facultatis sunt, nisi quatenus crassiorū sunt partium, & magis terrene quodammodo substantiæ. Quin & cum aceto inflammationibus scirrhis induratis identidem succurrunt.

Leuce,

Leuce, Populus alba.

Leuce, quam candidam populum Romani dicunt, arbor mixti temperamenti est, ex aqua, tepida, & terrea substantia cōstans: absterforiæ facultatis particeps est.

Libanotides, Rosmarinum.

Libanotides tres sunt, sterilis una, ferentes fructū duæ. Extergendi, incidendi, distrahendi, emolliendiq; uires obtinent. Quorum succus melle mixtus, hebetibus ex humorum crassitudine oculis auxiliatur.

Coronomentariæ uero libanotidis decoctum suffusos felle, hoc est aurugine laborantes, si potetur, adiuuat.

Libanotus, Thus.

Libanotus excalfacit ordine secundo, arefacit uero in primo. Habet autem minimū quiddam astrictionis. Cortex eius euidentius astringit & desiccatur in secundo à temperatis excessu complete. Est præterea crassioris substantiæ quàm ipsum thus, & minus habet acrimoniæ.

Præsenti itaq; remedio hæmoptoicis est, dysentericis item & coeliacis, stomachicisq; non modò foris applicatus, sed intra corpus etiam sumptus. Ramus eius calfaciendi & exiccandi potestatem in tertia distantia habet: Inest pariter ei detergentis naturæ nō nihil: unde ea quæ in oculis consistunt hucera, expurgare & implere pulcherrime potest.

Lignys, Fuligo.

Fuligo ardentium quarundam specierum tanquam cinis est, puta libanoti, myrrhæ, terminthi, styracis, picis liquidæ, & cedri. Siccificæ, & terrenæ, ac tenuis essentia. Cæterum quæ speciatim ipsius sunt differentia, pro cremata fiunt materia. Vtus uero eius cum primis commendatur in remedijs ocularibus, & honestandis palpebris inferuentibus, quæ Græcorum medici καυστικήρα appellitant. Fuligo autem libanoti commoditate palmam facile cæteris omnibus præripit, utpote mitior. Vehementior cōtrā fuligo pini, & coni, & piceæ. Quapropter ad uitia superciliorum, quæ πτερυγίαρα, hoc est glabras simulq; nascentes alias palpebras uocant, & ad oculorum humentes hircuos, & undiq; erosos lachrymantesq; utilis est.

Ligusticum.

Ligustici cum radix tum semen ex numero calfacientium tam impense habentur, ut menstrua prouocent, flatusq; strenue extinguant.

Lithargyros, Argenti spuma.

Lithargyros medium inter metallica tenet ordinem: quamobrem eo licet materia subinde utimur, alijs remedijs commiscendo. Obtinet aut facultatem siccantem leniter, detergentemq; atq; stipantem: ideoq; scemorum intertriginibus cōmodissimum præstat subsidium.

Lithi, Lapides.

Omnino quidem genus lapides, perinde atq; ipsæ etiā terræ, exiccandi uirtutem obtinent.

Hæmatites.

CAeterū hæmatites stipticam & potenter exiccatoriam uirtutē sortitus est. Cuius gratia asperitatibus quoque oculorū competit, his qui nullam inflammationem sentiunt, admixta aqua: qui inflammatione infestantur, cum ouo. Prodest similiter & sanguinē sputo reijcientibus si potetur, & carnum immodicas excrescentias reprimat.

Schistos, id est Lapis scissilis.

Schistus uero lapis consimilem quidem habet hæmatiti potentiam, scæterum ad omnia imbecillior.

Galactites, Lactarius lapis.

Lapis galactites easdem ad amussim habet quas schistus facultates.

Melitites.

Melitites præterea lapis nonnihil etiam caliditatis possidet.

Myroxos, uel Morochthos.

Lapis myroxus seu morochthus, quē nunc leucographida nomināt, quanto superioribus existit mollior, eo quod nullam penitus euiden-
tem ac strenuam qualitatem habet, tanto temperatior, magisque indolo-
rius est. Quocirca in corporibus teneris ipso unā cum ceroto ad hūlerū
sanationem utuntur.

Iaspis.

Svbuiridis iaspis quum potentiorē habeat facultatem, cicatrices &
Spterygia attenuat. Virēs autē omnino iaspis stomacho prodest, nō so-
lum pro amuleto appensus alligatus uel, sed uel in annulo quoque gestatus.

Lapis Iudaicus.

Lapis porro qui appellatur iudaicus, renū calculos comminuit, qua-
de re *πυκνολιθ* eum recensiores nuncupant.

Pyrites.

Pyrites ex eorū censu est, qui strenue tumores, & in minimos globu-
los sanguinem concretum disijciunt. Qui si forte in procinctu adq̃
manum non sit, myliten eius loco usurpant.

Phrygius.

Phrygius lapis cum ualida qua præditus est siccandi facultate, stipti-
catis quippiam & mordicationis obtinet: quo quidē nomine ejicit
ac discutit, proinde ocularibus miscetur medicaminibus.

Ageratus.

Ageratus stipticam & diaphoreticam sortitus est potentiam, guttu-
ris inflammationibus optime conducit.

Lapis Asius.

Asiae petrae flos adeo subtilium est partium, ut citra uellicationē cum
humore flaccescentes carnes liquefaciat.

Gagates.

Gagates lapis admodum exiccatorius existens inflationibus diutur-
nis cumprimis accommodus ac utilis est.

Magnites.

Magnites, Magnes.

Magnites, qui & heraclia nuncupatur, lapis, consimilem planè hæmatiti potentiam obtinet.

Arabius.

Arabius præterea lapis ebori assimilis, arefacientem uim & repurgantem possidet.

Alabastrites.

EX lapidibus etiā alabastrites est, quē in cinerē crematū nonnulli potandū stomachicis, id est cibū in stomacho nō cōtinentibus exhibēt.

Smyris.

¹⁰ **S**myris lapis abstergentis est potentia, dentesq; puros reddit, & ceu dentifricium exierit.

Lapides qui in spongijs.

Lapides qui in spongijs reperiuntur, renum lapillos confringunt.

Lapides in Argeo Cappadocia.

Caeterū uiribus hisce ad unguem respondent lapides qui in Argæo Cappadocia monte proueniunt.

Lapis Ophites.

²⁰ **P**ari præterea modo etiam ophites nomen obtinens lapis adalligatus, contra uiperæ morsus utilis est.

Ostracites, & Geodes.

Ostracites & geodes lapides, siccificam omnino uim habere dicuntur, adeò potentem, ut phlegmonosos tumores medeantur.

Naxias.

Naxie cotis detrimentū frigorificę esse facultatis asserūt, quapropter uirginū mammas, & puerorū testiculos contrahit & componit.

Olearea cotis.

Oleareæ aut cotis detritum, absterforium quum sit, contra capillorū defluuia, quas alopecias dicunt, plurimum opis contulerit.

³⁰ **L**apis Hieracites & Indicus.

Inter lapides frugi hieracites recenset & Indicus, qui pro amuleto ad alligati, sanguinem ex hæmorrhoidibus destillantem compescunt.

Saphyrus.

Prodest contra scorpionum ictus saphyrus lapis in potu sumptus.

Aphroselinus.

Aphroselinus lapis comitialem morbum arcere creditur.

Armeniacus.

Armeniacus lapis per inferna aluum quidem emundat & euacuat, sed perinfectus ac noxius est stomacho.

⁴⁰ **L**ithospermon, Miliū solis.

Lithospermon alij liosporon, alij uero heraclion, Latini miliū solis nuncupant, herbæ Aetonychi (ab aquilarū unguibus id appellatio nis sortitæ) semen candidū & lapidosum est, quod cum uino albi coloris epotum, renum & uesicæ lapides attrit, & lotium prolicet.

Linospermon, Lini semen.

Lini semen caliditatis primū fortitū est ordinē, humiditatis & ariditatis mediū. Atqui comestū flatus generat, etiam si frigatur in sartagine.

Linozostis, Mercurialis.

Sciendum est, quod semen mercurialis herbæ contritū, corporis præster naturam excrecentias (quæ naphia vulgus ineruditum cognominat) exploratum est demoliri. Semen autem uiride sit, necessum est, quo per sæpe exochæ cōfricentur. Mercuriali quidem herbæ præcipua ferē in deſcienda aluo naturæ uis inest, sed cataplasmate impacta, distrahendi facultatem exerit.

Litrum, Nitrum.

Litrum in medio aphonitri & salis uires obtinet. Quū crematur nitrū, multo subtiliorum partium, magisq; distrahentis potentiae efficitur. Intro in corpus si fuerit sumptum, crassos & tenaces humores incidit & attenuat. Porro acrimoniæ & ariditatis plus alijs habet chalaſtreon, à Chaleſtra uico Theſſaloniç, ubi prouenit, id appellationis sortitum est. Quamobrem ad capitis rheumata atq; catarrhos, & ad articulorum uexationes, quæ *ἀφρονία* dicuntur, chalaſtreo litro utuntur.

Lonchitis, Venerea, Lanceola.

Lonchitidis herbæ, eius nempe cuius semen triquetrū, lanceæ cuspidi similem habet imaginē, radix syluestri pastinacæ, quā daucū nominant, æqualis est; urinā mouet. Eius uero quæ scolopendrio similis est uiridia folia glutinant uulnera. Sicca uero induratis lienibus medentur.

Lycapſos, aliàs Lycopſis, Anchusa.

Lycopſidis lycapſiue radicem astringentis qualitatē esse, & cataplasmatō modo cum polenta impositam, sacris ignibus subuenire, triamq; oleo exceptam; sudores prolicere tradit Dioscorides.

Lycion, Buxea spina.

Lycium ex diuersi generis substantijs, quos Græci *ἐνδορῆμα* uocant, compositum est: alia quidem calidæ, tenuiumq; partium, & distrahentis facultatis est: alia terrestris & gelida, ex qua lenem quandam adstrictoriam quoq; obtinet qualitatem: ac proinde arefacere in secundo ab inculcata temperie excessu termitur. In calore uero & frigidityte medijs & symmetris adscribitur. Ob quam sanè rationē tam uarij usus est: nam ob uim eius adstringentem, eo ad discutien das quæ oculis offunduntur tenebras, & pupillis officiant, utuntur. Ratione uero astringentis potentiae, contra malū cœliacū, dysenterias, hulcera extreme maligna, ad inflammationes deniq; propter uim distractoriam adhibent.

Lyſimachium.

Lyſimachia herba præpollentē habet qualitātē, stipticam, per quam hulcera cōglutinat, & sanguinem undecunq; erumpentem, tum ipsa tum succus ipsius reprimat. Pota subinde uel clyſtere immiſſa, dysenteria laborantibus præſentaneo succurrit subsidio.

Lychnis.

Lychnis.

Lychnidis, cuius usus corollis est accommodus, semen secundum ex-
calfacientium ordinem ad unguem absoluit.

Lotos domestica.

Lotus sativa, quam aliqui triphyllon, hoc est trifolium nuncupant,
ut moderate detergendi, ita & arefaciendi uim obtinet: sed caliditate
utrumque uitans excessum, temperata est.

Lotos syluestris.

Loti agrestis semen calidum est in ordine a temperatis secundo: ceterum
nonnihil interim habet absterforium.

Lotos Aegyptia.

Loti Aegyptiae semen praeter haec, eiusmodi est, ut habilem satis praeparat
beatificiendis panibus materiam.

Lotos arbor.

Lotus arbor ex subtilibus constat partibus, moderatam exiccandi
astringendiq; obtinens potentiam: Quapropter cum uino uel aqua
epota, seu etiam iniecta, mulierum profluvia, affectus coeliacos medicatur,
capillosq; defluentes corroborat & instaurat.

DE HIS, QVAE INCHOANT A LITERA M.

Macer.

Macer cortex est, qui ex India importatur: Arefacit is quidem
secundum siccantium ordinem tertium: in caliditate uero & frigida-
tate symmetris ac medijs proximus est. Est insuper cum te-
nuitate partium astringens. Coeliacis itaq; ac dysentericis ac-
commodatur summopere.

Malabathron, Folium.

Malabathri folium spicae nardi uiribus est proximum.

Malache, Malta.

Malua, syluestris quidem, distrahentem paululum, & emollientem
leuiter habet facultatem: domesticam uero, quanto est humidior, tan-
to etiam uiribus inferior & debilior. Semen eius in tantum habetur ua-
lentius, in quantum fuerit etiam siccius.

Mamiras.

Mamiras, ueluti paruula quaedam herbae radícula est, digitali crassi-
tudine, quae oculorum cicatrices & leucomata attenuare creditur,
euidentes admodum detergendi uires possidens.

Mandragoras, Mandragora.

Mandragora frigida est temperamento in tertio ordine. Pomis ue-
ro eius caloris quiddam et humiditatis inest: qua ratione soporem indu-
cendi facultatem obtinet. Cortex uero radice mandragorae quam sit ualens-
simus non tantum refrigerat, sed etiam deficcatur: Arbor aut ipsa debilior est.

Manna.

Manna thuris aequalem libanoto facultatem possidet, inefficaciorem
tamen, atq; leniter paulatimq; constringentem.

Marathrum, Foeniculum.

Foeniculum tam potenter exalfacit, ut tertiæ calfacientiū classis esse censetur: in siccando uero primum ordinem promeretur. Ideoq; lac generat, & suffusos adiuuat.

Mastiche Chia.

Mastiche Chia calfacit & exiccat in prima à medijs distantia, ex diuersi generis facultatibus constans, obstringente pariter & emolliente: Quocirca stomachi, & alui, & intestinorum, & iocinoris inflammationibus opitulatur.

Mastiche Aegyptia.

Mastiche uero nigrior quodammodo, quæ Aegyptia cognominat, deficcat uehementius, & discutit magis, sed minus astringit. Quæ ratione dothienas furunculos uel discutit.

Melan Indicum, Atramentum librarium Indicum.

Atramentum Indicum, autore Dioscoride, ex facile refrigerantium assensu est, & rumpentium phlegmonas & oedemata, Hulcera præter hæc sordida egregie expurgat.

Melanteria, Atramentum metallicum.

Atramentum metallicum, quod græce melanterian dicunt, cum tenuitate partium astrictionis plurimæ particeps est.

Melan graphomenon, Atramentum scriptorum.

Atramentum quoque scriptorium arefaciendi uim non instrenuam sortitum est, & in posca contritum igne ambustis succurrit celerrime.

Melanthium, Nigella.

Melanthium calfacit & exiccat tertio à temperatis excessu, & est tenui essentia. Hac ratione destillationibus à capite in subiectas partes succurrit. Intra corpus assumptum flatus plus alijs carminatiuis discutit. Habet præterea quandam amaritudinem, lumbricos latos enecat & expellit, extergit & incidit. Idcirco orthopnejs, quo malo obnoxius non nisi recta ceruice spiritum trahit, pro amuleto competit, lepras extergit, postremo formicas exterit, & menses cit.

Mel.

Mel calfacit & arefacit iuxta secundum ordinem. Est autem ex ualde extergentium numero. Porro coctum non adeò acre, absterforiumq; efficitur. Alium præterea lubricum reddit atque subducit, sed alias plurimum alimentum confert.

Mel amarum.

Cæterum si quod mel amarum est, quemadmodum Sardoum, mixtæ facultatis esse liquido constat, terreæ nempe & calfactoriæ.

Sachar.

Quin etiam sachar quod uocant mel, quod ex felici Arabia inuehitur, non tam dulce quam nostras est, sed æquales ei uires possidet, neq; stomacho molestum est, neq; sitim conciliat.

Melia.

Melia, Malus Persica.

Melia nobilis arbor, cuius folia pota uiperarum moribus medentur. Cortex huius arboris crematus, atq; cum aqua inunctus, lepras eximit. Cæterum ligni ramenta pota aiunt pernicioſa exiſtere.

Mellotum, Serula campana.

Mellotum mixtæ facultatis eſt, habet etenim nonnihil astringens, Muerum adhæc etiam diſtrahit & concoquit.

Meliſſophyllon, Citrigo.

Meliſſophyllum marrubio aſſimile eſt facultate ad omnia.

Memæcylos.

Memæcyſus corni arboris fructus eſt, de quo ſuprà memoratum eſt in litera K.

Mefpila.

Mefpila, quæ & tricoeca dicuntur, acerbis admodū hic fructus eſt, & uix eſculentus, uentrem compescens. Germina item & folia acerbam hanc qualitatem non paucam obtinent.

Medion, Trifolium odoratum.

Medij herbæ radix diuerſam omnino à ſemine facultatem ſortita eſt: Illud enim uero conſtringens, & fluxus reſſumit, cum alios quoſcunq; tum uero etiam ſceminarū ex locorū deſtillatione fluxionē humoris ſiſtit. Semen tantum abeſt ut eiufmodi quid deſignet, ut etiam menſes prouocet: ſubtilis nimirum eſſentiæ, & incidendi facultatis.

Mecones, Papauera, Papauer domeſticum.

Plura ſunt papauerum genera, uerum hortenſis, cui etiam thylacitis nomen inditum, eſui idoneum eſt ſemen, ſi cum panibus eſtur, mode rate ſomnum conciliat.

Mecon rhœas, Papauer rhœas.

Eſt præterea papauer rhœas, eo quod celeriter deſluat cognominatū, cuius ſemen uiolentius agit quàm domeſticum: ne utiquā igitur per ſe innoxie editur. Cæterum momentum eius, hoc eſt uel exigua portio, non pauculo melli inſparſum, edendo eſt.

Papauer nigrum.

Alterū item papaueris genus eſt, quod capite quidē ſuo ſemē atri coloris cōplectitur, admodū medicamentoſum, & uehemēter frigori ſicū. Tertio loco poſitū papauer eſt perprocero & impolito capite præditū, omniū ſanè medicaminibus appoſitiſſimū, facileq; medicatiſſimū, uſq; adeo ut uel ad mortē uſq; ſtuporē inducat: Ex quarto nanq; & ultimo refrigerantium ordine cenſet: neq; tam ipſum, q̃ ſuccus eius, quem per hyperbolen & nimiam excellentiam opium cognominant.

Opium.

Mecon ceratitidis, Papauer corniculare.

Papauer porrò corniculatū uim habet abſterſoriam: qua de cauſſa radicis eius pota elixatio, præſentaneo iocinoroſis eſt remedio. Folia itidem floresq; ſordida hulcera expurgant, & cruſtas detrahunt.

Mecon Heraclea, Papauer Heracleum.

Super hæc papauer quoque Heracleum est, cui & aphrodes, hoc est spiritus
smosum nomen est inditum, cuius utique semen pituita strenue exhaurit.
Mela, Mala.

Pomis omne genus excrementitius egelidus humor inest, & sunt exo-
luta quaedam & aqueae essentiae, frigidiora quoque & humidiora alijs: Quae-
dam uero dulcia, aquosa quidem, sed obscurius frigida: Quaedam austera,
suauibus illis frigidiora quidem, uerum non humiditatis tantae: Nonnulla
acida, & ipsa quidem naturae frigoris, sed in uentre humores incidunt:
Alia denique acerba, ueluti cydonia, & mala struthia, gelida & terrena 10
substantiae: aluum itaque exolutam cohibere, uulnera glutinare consue-
runt. Pari quoque modo folia, succi, corticesque arborum mutuo inter sese
discrepare consequens est.

Melea Persice, Malus Persica.

Mali Persicae ramuli quidem & folia uincentem habent qualitatem uale-
de amaram: Vermes proinde mala Persica leuigata, uentrique super
umbilicum uidelicet impacta, perimunt. Porro fructus ipsius, nempe hoc
quod edendo est persicum, humidius & frigidius est temperie, iuxta se-
cundum a temperatis gradum.

Melea Armeniace, Malus Armeniaca.

Mali Armeniaca fructus, quem hac aetate prococcia indigitant, ean-
dem habet cum pomis Persicis facultatem.

Meon, Meu.

Mei radices calidae sunt tertio ordine, aridae uero secundo: Quocir-
ca lotium menseturque proritant. At si plusculum sumpseris, caput tentat.
Milax.

Milax non modo leuissimum, hoc est leuissimum, uerum etiam asperum, id est asperum,
marboribus suisque deperque circumuoluitur, usurpantibusque calidae, gu-
stantibus acrioris est potentiae.

Misy.

Misy ex eorum medicaminum censeri promeretur numero, quae cum
ualida adstrictione crustam inducunt, atque deurant. Minus tamen
corpori applicatum misy chalcitide erodit, idque subtilitatis beneficio. Por-
ro chalcitim & sory Galenus tradit uetustate in misy hoc alterari, a su-
perficie statim inchoante mutatione.

Molybdena, Plumbago.

Plumbago, ut spuma argenti praese fert specie, ita etiam simile ei habet
potentiam, nisi quod a media temperie ad frigidius paucillum declinat.

Molybdos, Plumbum.

Plumbum argenti est potentiae, multam uero habet substantiam hu-
midam a frigore congelatam atque coactam. Quocirca si triueris in pi-
la plumbum uel cum uino uel cum oleo ex immaturis oleis expressio, aut
quopiam alio succo frigorifico, ad h ulceratas pudorum sedisque inflam-
mationes

mationes habebis medicamentum longe probatissimum & utilissimum. Adhæc lamina etiā plumbacea lumbis tum illigata tum substrata Veneris insomnia, & libidinis in somno imaginationes arcet. Quin & glandulas, neruorū præter naturā cōcretiones, quas ganglia græce appellant, tenuis plumbi bractea imposita dissipat.

Molybdos cecaumenos, Plumbum crematum.

Plumbum crematum siccus est, & habet nonnullam acrimoniam. Vbi uero lotū fuerit, citra uellicationē exiccatoriū, & hulceribus extreme malignis multo præstantissimū præsentissimūq; efficit remediū.

Morea, Morus.

Mori fructus, maturus quidemalui deiectionem molitur, & stomachicis cibum non retinentibus, & quibuscunq; eius uisceris affectionibus, quæ mediocri egent astrictione, accommodus est. Intempestius uero quū aruerit, medicamentū præstat admodū astrictorium. Cortex præterea huius arboris cum quadā amaritate purgatorius est, ac proinde latum etiam lumbricū enecat. Folia porro ac germina mediā quodāmodo subducentium & retinentium habent facultatem.

Myagros.

MYagri herbæ semen pingue est, qđ uero in se cōplectitur oleosum, Mopplendi obtinet potentiam, quam uulgò appellant emplasticam.

Myaces, Mituli, Murices.

Mituli pisces cremati, buccinis possunt eadē: Peculiariter uero eloti, scabriciem palpebrarū, oculorūq; albugines cum melle exterūt. Caro insuper myacum canum ictus imposita egregie medicatur.

Myaros herba.

MYaron, quam aliqui melampycon siue melampyron uocant, herba ferulacea & furculacea est, & pinguis: cuius pinguitudine scabriciæ corporis omnes leuigari atq; expoliri creduntur.

Myelos, Medulla.

MEdulla emolliendi indurata, et scirrho infestata corpora uires obtinet. Primæ uero bonitatis prærogatiuam habet medullā ceruinat: proximum bonitatis honorem utulina: taurorum nanq; atq; hircorum medullis plus acrimoniæ & ariditatis ineſt. Cæterū medulla ex ossibus pinguior & mollior est: spinalis autem durior, squalidior ac siccior.

Mycetes, Fungi.

FVngi frigidi admodū acudi temperatura sunt, & sanè inter eos sunt, qui comesti enecant, atq; in primis quicunq; eorum naturam mixtam habent qualitate putredinosā.

MYos otis, qđ est auriculæ muris historiā explicauimus in uoce asine.

Myza.

MYza arboris cuiuspiam fructus est, exiliior quidem prunis corpore, multibus uero proximus, atq; omnino etiam æqualis.

Myrice, Tamarix.

MYrice secantem & detergentem potestatem sortita est, citra perspicuam tamen desiccationem, accedit illis nonnulla quoque stipticitas: Eamque sanè ob causam decoctum ipsius lienosis subuenit potum, medeturque dentium doloribus. Fructus porro eius & cortex gallæ uiribus per omnia respondent. Cinis postremo arboris huius multo exucrior est.

Myriophyllum, Mille folium, Supercilium Veneris.

Millefolium tam ualidam habet arefaciendi potentiam, ut uulnera glutinet, Myrrha, seu Myrrhis.

MYrrha, quæ myrrhis quoque dicitur, secundum est calfacientium ordinis, 10 partium quandam subtilitatem annexam habens. Radix eius iuncundo naribus odore, gustu dulcore blandit. Eadem non solum cit menstrua, uerum etiam pectus atque pulmonem expurgat.

Myrrhine, Myrtus.

MYrtus, ex diuersi generis substantijs composita hæc planta est, exuperat tamen in ea frigidum terreum: inest etiam tenuis quiddam 15 Myrris. calidus: cuius ergo arefacit impensus. Cæterum myrtula adnascens myrti ramis ac truncis soboles tumens, quam myrtida appellari solent, multo maiore in exiccatione & astringendo ui reliquis myrti partibus est. Folia item arida ualidius quam uiridia desiccant. Porro fructus atque succus eandem 20 habent facultatem, tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus.

Moly, Ruta syluestris.

MOly, quod peganon agrion, hoc est rutam agrestem uocant aliqui, nonnulli uero armanam, Syri besalan, ea sanè herba in calfaciendo in tertio censetur à media temperie excessu, cum subtilitate essentia: Quare 25 crassos, uiscidosque ac lentos humores incidit ac discutit, lotiaque prolicet.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA N.

Nascaphthon.



Ascaphthon, alij nacaphthon uocant, odoramentum est Indicum, aduersus constrictiones muliebrium locorum, ad suffutius 30 praesenti & egregio praesidio uaporatur.

Napy.

NApyn in calfaciendo & arefaciendo in quartum usque recessum peruenit. Nardustachys, Spica nardi.

NARDi spicae radix excalfacit quidem excessu à medijs primo, desiccatur uero secundo: habet autem & astringentis quiddam substantiae, cum acrimonia nonnulla et amaritudine leuiuscula: Eamque ob causam iocinori & stomacho eximie conuenit. Foris porro adhibita, uel intra corpus sumpta, lotium quoque proritat, in uentre & intestinis consistentes fluxiones arefacit. Maiorem uim habet ad omnia nardus Indica, & nigrior 40 quam Syriaca.

Nardus Celtica, hoc est Gallica.

NARDus Gallica praedicte iam pridem similis quodammodo facultatis est, cæterum in omnibus debilior, praeterquam ad ciendum lotium. Caloris enim uero plus quam dicta spica, minus uero astrictionis à natura sortita est. 45 Nardus

Nardus oreæ, Nardus montana.

Nardus, quæ in arduis locis ac montibus (unde & montana uocatur) prouenit, quæ & chylatilis atq; pyritis nuncupata est, his quæ memorata modo sunt, uiribus est ad omnia inferior.

Narthex, Ferula.

Ferulæ semen attenuandi calfaciendiq; uim obtinet. Ceterum ea quæ interius cōplectitur medulla uiridis, etiam astrictoriæ qualitatis particeps est: Cuius rei gratia sanguinem per sputa eiectantibus, & his qui diutina stomachi infirmitate alui fluoribus uexantur, remedio est.

Narce thalassia, Torpedo.

Torpedo marina uiuēs adhuc, dolentibus capite scite adhibita, capitis indolentiam conficit, eodem illo uidelicet torpore, quo membra hominis solo contactu suo torpescere facit. Cæterum uiuus etiamdum pisciculus Narce in oleo elixus, reddit sanè id ad uehementes articulorum dolores mitigandū, si illo inungantur, optimum. Sedem præterea inuersam aut procidentem etiam coercere torpe dinem appositam asserunt.

Narcissus, Bulbus uomitorius.

Narcissi radix exiccatoriæ facultatis est, usq; adeò ut uulnera etiam grandia cōglutinet, usq; ad pæcisiones, quæ circa tendones contingunt. Habet uero nonnihil absterforiæ & euulsuæ insitum potentiæ.

Neuras, Poterium.

Neuras, aliqui poterium nūcupant, uim arefaciendi citra erosionem tantā obtinet, ut præcis nervis glutinatis sufficiat. Ceterū radices ea potissimū prouincia regnant, cum impositæ, tum in potu sumptæ.

Nerium, aut Rhododaphne.

Nerium uel rhododaphne foris corpori cataplasmatis modo illitū, distrahendi facultatē possidet: intra uero corpus sumi letale est.

Nymphæa.

Nymphæa desiccantis est potentiæ absq; morfu: Ventris itaq; flumines reprimat & compescit, semenq; desiccet, & profluuiā eius quæcumq; retinet. Porro nymphæa candida radice prædita, in cunctis ualentior est, adeò ut muliebri quoq; medeatur profluuiō, si cum uino nigro austeroue potetur. Cæterū cui atrii coloris radix est, habet ea quidam absterforium, ac proinde uirilgines, quos *αλγες* Græci uocant, aqua admixta exterit. Capillorum defluuiā, quæ alopeciæ dicuntur, illita cum pice liquida refarcit & instaurat.

Nymphæa
alba.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA X.

Xanthion, Lappa.

Xanthion herbam nonnulli phasganion uocant, eius semen distrahendi prædium est potentia.

Xiris, Iris syluestris, Gladiolus' ue.

Xiris, siue xyris cum tenuitate partiū, distrahendi euellendiq; facultatē obtinet, nempe siccam, multo etiam amplius semen, quod quidē & lotium ciere, & lienem induratū sanare potis est.

Xiphion, Gladiolus.

Xiphij radix attrahendi, disijciendi, & exiccatoriam denique facultatem sortita est.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA O.

Sorbis.



Orbus arbor, cuius fructus græce ὄβη, & à quibusdani ὄβη, hoc est sorba nuncupantur, astringentis quidem facultatis, sed longe imbecillioris quam mespilus.

Othonna.

Sunt qui othonnā herbæ cuiuspiā succū esse affirmant, nasci in Arabia quæ ad Aegyptū est: alij lapidē Aegyptiū esse credūt. Habet hæc plantula uirtutē abstergendi & erodendi: atq; ob hanc causam cuncta quæ oculis tenebras offundunt, aciei officiunt, haud instrenue exterit.

Oenanthe.

Oenanthe, multiplex sanè atque plurifarius floris labruscæ usus est. Hæc uero oenanthe ualidam habet astringendi potentiā, & humectandi, maxime ea quæ circa aluum. Cæterum aliam huic potestate contrariam describit Dioscorides, quam ejicere secundas, & urinæ stillicidio, morboq; regio mederi asserit.

Ocnos, Vinum.

Vinum calidum est & siccū in secundo à temperatis ordine: sed ualde antiquum in tertio: mustum uero in primo.

Ocypos, Lana succida.

De lana succida ac sordida in sermone de lanis explicatum est.

Olynthi, Grossi.

Grossi acrem habent & distrahentem potentiā, ratione succi totius arboris quæ in se cōtinent. Qua de re elixi, duros tumores dissipant: crudi uero formicas & thymos ejiciunt.

Olostium.

Olostium cum stipticitate sua exiccatoriae facultatis est, cuius nomine medendis ruptis eo subinde utuntur.

Omphacion; Ex acerbis uvis succus.

Omphacion succus est ex intempestiuis, hoc est immaturis uvis expressus, acerbum ualde, & desiccans secundum tertium excessum. Quamobrem affectibus cum fluxione coniunctis, præsertim stomacho cibum non continenti succurrit.

Onagra.

Onagran, sunt qui onotheran, & qui onothurim appellāt, frutex est arborosa, cuius radicē si ad morem cataplasmati imposuerit quis, immania ulcera mitigabit.

Onoma seu Onosima.

Onomia, uel onomis, uel phlomitia, uel ononis, ex acri & amara confata est qualitate. Quare folijs eius è uino potis, fœtus in utero interficit, & mortuos expellit.

Onobrychis.

Onobrychis, Opaca.

Onobrychis rarificet & absterforiae facultatis est. Panos itaq; dissicit, stillicidijs urinae medetur, & sudores elicit.

Oni, Millipedæ.

Millipedæ (quos ~~inter~~ Græci appellant) quæ in gyrum se conuoluunt, distrahendi & arefaciendi vires obtinent. Quocirca cum uino epotæ, mictionis angustiae & morbo regio opitulant. Angina uexatis cum melle illiniuntur. Cæterum cum rosaceo tritæ, & calfactæ in cortice mali Punici contra aurium dolores instillantur.

Onyches, Conchulae Indicae.

Onyches testæ sunt conchularum Indicarum, quæ suffitu adhibitæ, præfocatione uteri concidentesceminas excitant, pariter & morbo comitiali oppressos: Potæ uero uentrem turbant.

Ononis.

Ononis radix in calfaciendo tertij quodammodo ordinis est. Cortex uero eius repurgat & dissecat: quo nomine calculos cõminuit.

Oxos, Acetum.

Acetum mixtam habet facultatem, nempe argentem pariter & calidam, utranq; rararum partium: Vincit autem caliditatem frigiditas.

Sed arefaciendi tantam facultatem obtinet, ut in tertio desiccantium ordine censeripromeruerit.

Oxycanthos, Oxycantha.

Habet hæc arbor oxycanthus ut agresti piro figuram similem, ita & facultatē neutiq; ab similem, tenuium partium. Fructus nō piro syluestri, sed myrtis forma & figura, ne & uiribus dicam, respondet.

Opos, Succus.

Opus siue succus, quem ueluti per excellentiam tum Cyrenaicum, tum Medicum, tum Syriacum nuncupant, singuli quidem calidioris admodum sunt potentiae, & flatuosi: omnes tamen caliditate & partium

subtilitate exuperat Cyrenaicus.

Origanus.

Origani omnes species incidendi, extenuandi, desiccandi, calfaciendiq; potentiam sortitæ sunt, in tertio à medijs recessu.

Oreoselinon, Apium montanum.

Apium montanum consimilis ad unguem apio est potentiae, cæterum ualentioris interim.

Orobanche, Eruangina.

Orobanche aridam & egelidā habet temperiem in ordine primo.

Orobus, Eruum.

Eruum in calfaciendo ordinem sortitur primum, in desiccando uero secundum, & est gustantibus amarum atq; ob id quidem dissecat, & abstergit, & ab infarctu obstructione uel liberat. Plusculum uero assumptum, languineum humorem per lotium agit.

Orminon, Geminalis.

ORminon affimilem habet marrubio cum formam tum caliditatem, Modice uero desiccatur atque detergitur in concubitum proinde incitat, oculorum crassitudines cum melle illitum expurgat, cedemata difficit, paraxillos infixos spinasque euellit. Cæterum orminon syluestre satiuo non parum est ad omnia potentius.

Oryza.

ORyza stipticitatis alicuius est particeps: quam utique ob causam uentrem solutum leniter astringit atque compescit.

Orchis, Testiculus canis.

10

ORchis herba, appellatur etiam cynos orchis, hoc est testiculus canis, bulbo æqualem & geminam radicem obtinet. Maioris quidem facultas, est humida & calida, ideoque in Venerem stimulat: Minoris uero radicis temperamentum calidum est & siccum. E diuerso igitur tantum adest ut in Venerem succedat, ut eam potius extinguat.

Orchis serapias.

ORchis, quem & serapiada cognominant, aliqui uero triorchim, uehementiorē habet quam superior arefaciendi potentiam. Quapropter tumores discutit, hulceraque sordida & putrescentia egregie expurgat. Serpentes item hulceribusque, quos herpetas nominant, idem orchis medetur. Siccatus multo impensius desiccatur, eo quod subastringat, Quin & uentrem eadem ui cum uino pota sistit.

Osiris.

OSiris herba, ex qua scopi neuntur, amara: obstructiones iocinoris & adiacentium partium expediens.

Ossa.

OSsa cremata uehementiorē habent difficiendi arefaciendique potentiam, in primis uero, quorundam sententia, hominum.

Ossa suum.

TAlum suillum combustum, inflationibus & strophis mederi quidam asserunt. Est qui quum ossa deusta potui exhibuisset comitali morbo oppressis & articularum doloribus obnoxijis, sanitati eosdem restituit.

Talum bouis.

SVnt qui talum bubulum crematum labefactos dentes constabilire asserunt: Cum melle uero sumptum, rotundos lumbricos profligere. Adiecto oxymelite lienem induratum liquat. Leucisque illitum prodest. In Venerem excitat.

Ossa femoris bouilli.

FOemora porro bouis cremata, inque potu assumpta, sanguinis quascunque eruptiones, & cætera quocunque alui profluvia reprimunt ac sistunt.

Ostraca, Testæ.

TEstæ ex fornacibus leuigatæ siccificam & absterforiam facultatem obtinent. Quocirca dentes exterunt, illitæ cum aceto, pruriginibus, & quæ

& quaecumq; pueris in capite erumpunt huculceribus ac pustulis, quæ græce exanthemata dicunt, & misera pedum ualitudine laborantibus podagricis ue opitulatur. Cum cerota strumas, quæ chceradas Græci, hoc est scrophulas nuncupant, ostraca disijciunt.

Ostrea.

Ostreorum testa cremata congenerem habet cum buccinorum testis effectū, subtilioris tamen est essentiae. Quæ igitur in facie oboriuntur uitia, & quascumq; uultus notas exterit, dentes dealbat. Eadem si lauetur, mordacitatem amittit. Ad humida corporis huculcera carne implenda, inducendæq; cicatrici optimum medicamen habetur.

οὐρῆς, Lotium hominis.

Urina quælibet temperamento calida est, & acris potentie. Cæterū humana omnium ferme cæterorum animalium impotentior, adq; omnia debilior est, præterquam porcorum testes exectos habentium: ualentius uero abstergit, quam in peste aliqui potantes, seruati euaserunt. Lepris præterea & putrescentibus huculceribus, scetidisq; capitis huculceribus, quæ achoras dicunt, fursuribusq; medetur. Pedum postremo offensionibus attritibusq; nisi inflammatis opitulatur.

Urina impubis puelli.

Inter mortalium lotia primas omnino tenet in efficacia, urina impubis pueri, ex qua & chrysocolia efficitur.

Urina muli.

Urina mulorum remedijs quibus morbo articulari mederi consueuit, egregie conuenit.

Urina caprarum & camelorum.

Lotium caprinum, atq; chamelorum uentrem subducendi facultatem obtinet: Qua quidem ratione potissimum aqua inter cutem laborantibus potui utiliter præbetur.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA P.

Pancration.

Pancratium scyllæ imaginem refert ac uires, præterquam quod ad omnia imbecillioris est affectus.

Paliurus.

Paliuri cum folia tum radix acerbescunt: quocirca uentrem solum sistunt, & panos non admodum calentes discutunt. Fructus insuper tantam habet dissecandi uim, ut lapillos atterat, & pectoris pulmonisq; excreationibus subueniat.

Panax Heracleum.

Panax Heracleū, unde fit succus, qui appellatur opopanax, tertij calfacientium a temperatis excessus, exiccantium uero secundi, emolliendi distrahēdiq; facultatē obtinet. Cæterū cortex eius uiribus inferior est q; succus: habet uero absterforium quiddam, & carnem sufficientem procreat. Fructus mensibus proripandis medicamentum appositissimum.

Panaces Aſclepion, & Chironion.

PAnaces Aſclepium, atq; Chironiū dicto panace calidiora ſunt: quæ propter floribus eius & ſemine medendis h ulceribus extreme malignis, quæ cacoëthe dicuntur, & ad panos curandos utuntur.

Papyrus.

PApyrus per ſe quidem inuſta materia quædā eſt: cremata uero arefaciendi uim habet, quemadmodum & charta deuſta. Ad ſingula ta-

men papyri cinis uiribus multo inferior eſt.

Paronychia, Vngualis herba.

PAronychia herba ab effectu nomen ſortita eſt, qd uidelicet abſceſſui 10 qui ad humani unguis radices coit, paronychie præſenti remedio eſt. Facultas eius tenuē habet eſſentiā, & ſiccificā, & mordacitate uacantem.

Pentaphyllos, Quinquefolium.

Quinquefolium herba deſiccatur quidē in tertio à medijs exceſſu, cæterū minime acris eſt, ob eamq; cauſſam multiplicis admodū uſus eſt.

Peplos herba.

PEplos quidā, alijs mecona aphrode, hoc eſt papauer ſpumofum appellant, & hic fruticulus lac obtinet, atq; tithymallorū modo expurgat.

Peplion.

PEplion, & hæc quoq; plantula lac poſſidet, prouenitq; magna ex parte maritimis locis. Cætera quidem ſuperuacua & inutilis, ſemen uero 20 eius ſeruens, haud aliter quā pepli ſemen euacuans atq; emundans.

Peperi, Piper.

Piperis quidem radix uiribus ſuis coſto aſſimilatur: cæterum fructus eius, recens quidem ſuppullulantis, piper longum eſt: ualenter cum calidum tum humidum eſt, ſicuti omphax.

Piper longū.

Piper album.

Pipere atro acrius piper candidū eſt: nam illud iam quaſi peruſtū eſt: ambo autem excalfaciendi arefaciendiq; ualidam uim obtinent.

Pepon, Caro cucumeris.

PEpon abſtergentem uim participat: quamobrem eius ueluti caro diſcolorem ueluti à ſole cutem, atq; conſimilia cutis uitia exterit. Cæterum ſemen peponis renes obturatos obſtructione uindicat.

Periclymenon, Inuolucrum maius.

Periclymeni tum ſemen tum folia incidētis pariter & calfacientis ſunt potentia, tantę quidem, ut quadraginta diebus pota, lotium cruentū prolīciant & educant: Ad minuendos tienes, & ægre ſpirantibus iuuan-

dis, totidem diebus utiliter ē uino potatur.

Perſtereon, Verbenaca.

Perſtereon hætenus arefaciendi aſtringendiq; potentiam habet, ut uulnera conglutinet, & ſanguinis eruptiones ſiſtat.

Perſæa.

Perſæa arbor eſt Aegyptia, cuius folia tantā deſiccandi & conſtipandi uim obtinent, ut queant ſanguinis eruptiones compellere.

Petalites.

Petalites.

Petalites tertij à tēperatis in arefaciendo recessus est, quo fit ut aduersus cacoëthe, & hulcera phagedænica tātoperere usus eius cōmendet.

Petrofelinum.

Petrofelini semen calfaciendo & exiccando in tertio censerio ordine promeretur, unā cum in cidendi effectu : inde menstrua & lotia assāsim promouet, & minime spirituosum est.

Peucedanum.

Peucedani quidem cum succum tum liquorem potenter caloricum, dissicientem, & attenuantem usurpamus: Olfactu nanq; & in potione intra corpus sumpta, iuxta morbis in pulmone ac pectore ex crassitudine & tenacitate humorū prouenientibus prodesse credunt. Porro lenibus etiam induratis auxilio sunt. Sæpe etiam dentium perforatorum cruciatus, cauitati exesse impositus liquor extemplo placauit. Quin affectibus etiā cunctis circa neruos cōsistentibus impēdio cōgruit, Sed & radicis cū adhæc, tum ad squamas ossibus detrahēdas usus est. Hulceribus ipem dolosis, quę cacoëthe uocant auxiliū pręsentaneūq; remediū affert. Excalfaciens quidē atq; desiccans gradu à media temperie secundo.

Peuce, Picea.

Picea unā cum pino similem quidem, sed in omnibus temperatiorem facultatem sortitur.

Peganon, Ruta.

Ruta syluestris quartæ calfacientiū & desiccantium classis censetur: domestica uero tertiæ. Ex qua sanè caussa crassos tenacesq; humores dissecare & dissicere potis est, & lotia quoq; ciere. Sed & subtilium est partium, & aphyson, hoc est citra sufflationem. Hinc est quod extinguendo spiritus, Veneris appetitum cohibet.

Pissa, Pix.

Pix arida quidem desiccatur, distantia à temperatis secunda, minus uero est calida q̃ sicca. Liquida cōtrā pix habet nōnullam abstergendi, concoquēdi, distrahendiq; potentiā, & in gustu acrimoniā. Quāobrem leprosos ungues eximunt, impetigines detergunt, & tumores maturant duriores: ad ea omnia liquida potentior ualidiorq; est: quocirca suspiriosos, & pectore suppuratos, quorum hos gręce *ἰσπυρίους*, illos *ἀδυσπυρίους* uocant, linctā adiuuat. Sicca uero pix uulnera eximie conglutinat.

Pisselæq̃.

Pisselæon liquide picis proles est, sed essentia multo subtiliorū partiū.

Pissacium.

Pissaciorum fructus commansus, nō stomacho tantum amicus & utilis mediocriter est, uerum præter hæc iocinoris quoq; obstructions expedit, atq; in primis summorū, beneq; fragrantīū eorundē operimentorum in uino elixatio. Ad hæc aduersus serpentium etiam morsus accommodatus est.

Pityides.

Pityides fructus est picearum aut pinus mixtam habens facultatē, partim uidelicet acrem, partim uero acerbescentem. Quare promanantibus ex pectore spuitionibus, plurimum ad iumentum confert.

Pityocampæ, Picearum erucæ.

Picearum erucæ, quas ~~versuocampæ~~ Græci appellant, iisdem ad unguem uiribus, quibus cantharides & buprestes præditæ sunt.

Piceæ cortex.

Piceæ cortex tantam habet astringendi facultatem, ut intertriginibus igneque ambustis ad morem emplastri impositus opem non infrenue ferat. Ventrem insuper lubricam cohibet si potetur. Cortici uis quedam inest hulcerum conglutinatoria.

Pityufa.

Pityusan nonnulli cithymalli speciem esse autumant, eo quod lac perinde atque ille habeat, & similem in purgando uim obtineat.

Platanus.

Platanus humidiores & frigidiores facultatem possidet, hinc & folia eius uiridia inflammationibus nascentibus auxilio sunt. Cortex autem & galbuli seu pilulæ siccioris sunt potentia, adeo quidem ut in aceto elixi, dentium cruciatus leniant, ambusta uero cum adipe sanant. Cortex porro crematus, desiccatorius magis & abstergetior redditur, hactenus quidem ut lepris hulceribusque per humidis medeatur.

Pneumon, Pulmo agninus & suillus.

Pulmo agninus & porcinus in pedibus calciamentorum attritus pulchre sanare creditur.

Pulmo uulpinus.

Pulmo uulpeculæ inueteratus si in potu sumatur, anhelos ac suspiriosos sanitati restituit.

Pulmo marinus.

Pulmo marinus recens cocifus, podagricis & pternionibus oppressis præsentaneo est remedio.

Polemonion.

Polemonium, sunt qui phileteron aut philetæron nominant, tenuis est essentia & exiccatoria: quo quidem nomine aliqui curandis coxendicis doloribus, dysenterijs item & indurato lieni medendo radicem eius cum uino potandam magna utilitate exhibent.

Polium.

Polium exilius gustuque amarius, quo ad antidota subinde utimur, in tertio est calfacientium & arefacientium à symmetris censu ac ordine. Laxat igitur ab obstructione intestina omnia, lotium & menstrua trahit, grandia conglutinat hulcera uiride; aridum uero rebellia, quæ cacœthæ dicunt, hulcera conglutinat.

Polygalon.

Polygalon.

Polygalon modice austera habet folia, hæc quidem si in potu sumatur herba, lac procreare uidetur. Temperamentum habet haud obscure calidum & humidum.

Polygonaton.

Polygonatum mixtam non potentiam solum, uerum qualitatem quoque sortitum est: constat enim astrictione, acrimento, amaritudine, & insauitate quadam fastidiosa, explicatu difficili, unde non admodum ad multa est usui, præterquam quod radicem eius nonnulli emplastri modo illiniunt, & faciei neuos eadem detergunt.

Polygonon, Seminalis.

Polygonum habet quiddam astringens quidem, sed uincit in eo aquosum, frigidū, in excessu à mediocribus secundo. Quāobrem eos quibus æstuat & flagrat stomachus, ad morem cataplasmati impactū adiuuat, & sacros ignes, & feruentes inflammationes, & si quid est aliud eius generis affectionum. Profluvia retundit, adhæc siccificum esse apparet. Est denique mas quàm mulier ad omnia ualentior.

Polycnemon, Putealagonthria.

Polycnemū calidum est & siccum in secundaria distantia, in tantum ut uulnera conglutinet.

Polypodium, Filicula.

Polypodium citra mordacitatē impensius desiccat, idem in potu haustum purgat per inferna.

Pompholyx, Bulla, Spodium, Cinerula.

Pompholyx arefacit absque mordacitate, ita quidē ut carnositas atque alij omnibus extreme malignis hulceribus succurrat. Inditur ob hoc etiā collyrijs ocularibus.

Porphyra, Purpura.

Purpuræ crematæ æqualem habent ostracis potentiam, cæterum earundem testæ in oleo decoctæ, capillos fluentes roborando seruant; sed cum aceto sumptæ lienes turgentes sanant. Eadem suffitæ, mulieres ex uteri strangulatione concidentibus excitant, secundasque expellunt.

Potamogeton, Fontinalis herba, Betæ folium.

Fontinalis herba, quæ græce potamogetona uocant, refrigerat & adstringit proxime seminali, uiribusque omnino respondet polygano.

Poterrhion, Poterium.

Poterrhium, sunt qui uocent phrocnion, huius fruticis radices concisæ, neruorum præcisiones & uulnera illitæ conglutinant. Quinetiam potum herbæ eius decoctum, neruorum reliqua uitia adiuuat.

Prasion, Marrubium.

Marrubium calidū quidem est in ordine secundo, siccitate uero huius ordinis limites excedit, iocinoris & lienis obstructions expellit, & quæ circa thoracem & pulmonem impetunt, expurgat; mensesque retentos prouocat. Cæterum ad cataplasmati morem impositū abster-

gēdi discutiēdiq̄ uim obtinet, uel ut alij sentiūt, abstergēdi & dissecādi.
Prason, Porrum.

PORRUM prauum succum generat, & acrimoniam possidet, ut autor est Dioscorides, graueq̄ & tumultuosum parit insomnium, aluo ac commodatur, urinam ciet, & attenuat. Habet præterea nonnihil absterforium. Idem cum pisana decoctū, pectoris uitia per excreationes emendat. Porri præterea semen renum inditur remedijs. Folia nonnulla sunt astringendi facultate prædita: Qua ratione expressus eorum liquor, sanguinem erumpentem reprimat ac sistit.

Prinus, Ilex.

PRINUS cōgenerem & æqualem cum robore habet facultatem, multo tamen in omnibus ferme ualentior est.

Propolis.

PROPOLIS (est autem ea sordes, quæ legi in aluearibus potest) in calfaciendo quidem tertium sortita est à symmetris recessum & ordinem, neq̄ tamen abstergit ita multum, atqui moderate interim: non paucam ad hæc habet substantiam in se tenuē, & ab infarctu, obturationeq̄ uindicandi asserendiq̄ potentiam.

Parmice, Sternutamentaria.

STERNUTAMENTARIÆ herbæ folia, odore sternutamenta proritant. Vniuersus uero breuis fruticulus, uirēs, sugillata liuoresq̄ alios ex sanguine in loco contuso collecto prouenientes disijcit: Est etenim caloricæ & exiccatorie facultatis: Viridis quidem in secundaria à medijs distantia: desiccata uero in tertia.

Ptelea, Vlmus.

VLMUS exiccantem & absterforiam uim obtinet: quo fit ut uulnera conglutinet. Multo uero amplius cortex, si recens ligaminis instar uulneribus circumligetur: lepris præterea cum aceto opitulatur. Radices eadem potestate regnant, quarum decocto rupta, quæ topho calloue egerit, aspergenda & fouenda sunt.

Pteris, Filix.

FILIX siccificam habet potentiam, gustuiq̄ amaram. Quamobrem foetus in utero interficit, & latos lumbricos enecat & ejicit, quatuor drachmarū pondere in aqua mulla sumpta. Quoniam autem paulum habet astrictionis, fit ut hulceribus imposita uim ualenter desiccandi, citra tamen ullam uel mordacitatem aut erosionem obtineat.

Pycnocomon.

PYCNOCOMUM distrahentis & acris est potentia: proinde folia ipsius panos & furunculos discutiunt. Semen uero ad hæc etiam infixum corpori extrahit. Radix autem flauam bilem exhaurit.

Pyrethrum, Salutaris.

PYRETHRI radix deurentem seu causticam sortita est facultatem, qua sanè deniq̄ perfrigatorū cruciatibus subuenit, succurrendisq̄ cum tremore.

tremore algoribus sub circuitū cum oleo infricat. Cōtra corporis partes torpentes atq; flaccidas & resolutas, eximīū hęc radix præstat remediū.

Pyros, Triticum.

Triticum primi est ordinis ex calfacientiū. medium aut̃ inter utrunq; ariditatis scilicet & humiditatis excessum, locū possidet: adhuc lento ris non nihil, & uirium ab obstructione liberantium sortitum est.

Pityæ, Coagula aliquot animalium.

Coagulū in uniuersum quoduis acrem, attenuantē, dissicientē item, & nimirum exiccatoriam quoq; facultatem habere consuevit. *Coagulū les porinum.*
 10 **P**oris uero coagulum, comitialibus, si cum aceto potetur, & sceminarum fluxionibus succurrere traditur. Quin & lac quoq; in uentre in grumos concretum soluere consimiliter, & ex pectore prouenientes sanguinis excreationes compescere affirmant. *Coagulū equi.*
 De equino autem coagulo proditum est, cœliaciis, intestinorumq; torminibus cum primis succurrere. *Phocæ coagulū.*
 Phocæ postremo coagulum pares castorio uires obtinet.

DE HIS QUÆ INCHOANT A LITERA R.

Rhacos, Pannus.

Rhacula quælibet (aut si maior pannus) combusta, si quidem fuerit lanea, pares lanæ crematæ ex qua textitur uires possidet. *10*
 Linteum uero deustum tenuis essentia, fumum exhalat emit, usque adeo ut destillationes à capite in subiectas partes in factū & obturatione laxet, & muliebrium locorum suffitibus accommodetur: iam etiam (ut semel dicam) pannus quilibet combustus proximam lanæ facultatem obtinet.

Rhamnus, Spina alba.

Rhamnus frutex arefacit quidem distantia secunda, refrigerat uero in prima. Qua ratione herpes unā cum ignibus sacris non admodum feruentibus curat. Cæterum ad hæc tenerorum eius foliorum usus summopere commendatur.

30 Raphanos, Radicula.

Raphanus quidem ex eorum numero est, quæ excessu tertio calfaciunt, desiccant uero secundo: syluestris aut̃ in utroq; efficacior est. Ambarum semen, planta ualentius est: habet insuper discutiendi sugillata, & cæteros id genus liuores potestatem.

Rheum, Rha.

Rheum nonnulli rhā nuncupant, cōstat terrena, frigida, subtiliumq; partium essentia, aërea item, calida & leuiter acri. Quamobrem non conuulsis modò, sed fracturis etiam & orthopnœæ eximie conducit, liuida q; partim dissicit, partim constringit: quo nomine sanguinē expuentibus, cœliaciis, & intestinorum torminibus prodest. *40*
 Vtriusq; porro ratione iocinorosos maxime adiuuat.

Resinæ, Resinæ.

Resinæ omne quidem genus caloricam habent & exiccatoriam na-

Resina terrea
binthina.

tura & acuitatem. Cæterum primas non iniuria meruit, aut certe bonitate nulli secunda est resina terebinthina, siquidem multifarijs dotibus est prædita: non enim distrahit modò, sed emollit etiam, & tenuem habens insuper essentiam, abstergit: quo utiq; fit, ut pforis quoq; medeat. Acrior porrò quodammodo est resina pinea, & hac quoque magis strobolina, neq; tamen quàm terebinthina magis distrahunt, neq; etiam uiolentiùs euellunt. Mediæ omnino inter illas habentur tum temperaturæ tum facultatis picea & abietina.

Pinea.

Strobolina.

Picea, abiegna

Rhoda, Rosa.

Rosarum uis atq; natura cõflata est ex aquea substantia, calida & adstringente atq; amara. Ceterum flos rosarum adhuc ualidiùs astringit, & eam ob causam desiccandi quoq; facultas inest.

Rhodia rhiza, Radix rhodia.

Rhodia radix in calfaciendo inter ea quæ secundi eiusdem qualitatis ordinis sunt censenda est, quæ ut tenuium partium existit, ita distrahentis etiam facultatis est.

Rhœa, Malum granatum, seu Punicum.

Mala Punica
dulcia.

Mala granata, quæ & citrea, & punica dicuntur: Dulcia in totum adstringentem qualitatem obtinent prædominantem, quapropter non refrigerant solum, uerum etiam desiccant: Cæterum ut breuiter dicam, dulcia reliquis quibusuis minus utriusq; dictæ facultatis possident. Austera aut maiorem quidem refrigerandi uim habent, sed sicciora sunt, & stomacho minus noxia, & eundem etiam oblectantia. Mala porrò granata acida, præterquam quod refrigerant, ampliorẽ quandam habent incidenti facultatem. Quin & acini ipsius succo astringentiores & exiccantiores sunt. Iam uero & malicoria, quæ lemmata sidia, hoc est putamina & cortices mali Punici uocantur, his omnibus multo amplius tum acerbescunt tum arefaciunt. Proximam atque comparem etiam his naturam habent Cytini, qui mali punici flores sunt.

Cytini.

Rhus.

Rhoos, qua coriarij utuntur, & ob id à Grecis *Βυρος*, à Romanis coriaria nuncupata est, tum fructus tum succus medicis in usu potissimum sunt, ualde astringentis quidem & siccificæ qualitatis in excessu tertio, abstergentis autem secundo.

Rhypos, Sordes, Strigmenta.

Strigmenta sordes uel ex ære statuarum & uasorum in palestris in quibus largum oleum inhæret, continens aliquid gruginis, distrahendi, & moderate arefaciendi, emolliendiq; uim obtinet, atq; ob id quidem immaturos panos dissiciunt. Cæterum de strigmentis ex palestra una cum puluere & deciduo ceromate collectis, quæ *πύρις* à quibusdã uocantur, iam pridem de sudore traditum est. Sordes postremo quæ in auribus colliguntur, rediuiuis, quas paronychia græce nuncupant, optimum remedium esse perhibent.

Sordes aurium

De his

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA S.

Sagapenum.

Sagapenum liquor est ferule, calidae & subtilis admodum essentia. Habet autem aliquid absterforium, quo oculorum quidem cicatrices exterit, suffusionibusque eorum accommodatur.

Salamandra.

Salamandrae combustae cinerem nonnulli medicaminibus, quae erodendi uim habent, & quibus succurritur leprae, ac psoricis denique facultatibus confundunt.

Samsychon, Maiorana.

Maiorana calfaciendi & arefaciendi uim habet in tertio excessu. Constat praeterea ex tenuitate partium, & distrahentis est potentiae.

Sandaracha.

Sandaracha deurentem & causticam, perinde atque auripigmentum, facultatem obtinet.

Sandix.

Sandix tenuium quidem est partium, & temperaturae exicatorig, non dum tamen exalfaciens.

Saprotes xylon, Caries lignorum.

Caries lignorum, potissime quae ex ulmo colligitur, humoribus infarcta hucera expurgat, & carne implet.

Sapon, Sapo.

Sapon absterforia facultate praedita est.

Sarcocolla.

Arboris in Perside nascentis lachryma sarco colla est, quae uim & naturam habet opplendi & obstruendi, quam Graeci uocant emplasticam, citra mordacitatem desiccans, atque ob id uulnera quoque coaglutinare potis est.

Saxipiragos, Saxifraga.

Saxifraga non urinam solum proliciendi, sed calculos etiam comminuendi praedita est potentia.

Satyrion, Triphyllon.

Satyrion, uel ut alij quidam nuncupant triphyllum, temperaturam habet humidam & calidam, & spirituosum est ac flatulentum: Quamobrem impetus ad Venerem incitat atque adauget. Tradunt aliqui id ipsum cum uino astringente haustum, non nisi recta ceruice spirantibus succurrere. Atqui Galenus in eo, quod nonnulli uisum sapientius, hoc est, de theriaca inscripsit, triphyllum inquit, hyacintho quadantenus simile est, aere praegnans & intumescens, semen habet syluestri cnico simile: Elixae huius herbae decoctum phalangij quidem aut uiperae morsui, si eo foueatur, opitulari. Sane non autem ait, eiusdem potio exhibita, consimilem affectum his qui ab aliis quo horum demorsu sunt, inducit.

Saura, Lacerta.

Dilacertae iocinore quidem ac capite, suo explicatum est loco: ceterum uersa lacerta dispalata & imposita scorpionis ictibus, remedio est.

Selinon, Apium.

A Pium tāto calore præditū est, ut locia, muliebresq; purgationes pro
aritet, flatulentos spiritus exstinguat, atq; semen potius quā herba.

Seris, Cichorium.

Seris holus subamarum est, frigidi admodum ac humidi temperamen
ti, sed astrictoria quoq; qualitatis est particeps.

Seriphum.

Seriphum calfaciendi in secundo excessu, arefaciendi uero in primo sa
cultate præditum est, absinthio quidem cum forma, tum sapore re
spondens, præterquā quod non æque ut illud acerbescit & astringit, im
pensiusq; calfacit, & magis quā absinthiū lumbricos interficit. Stoma
cho adhæc nonnihil infesta ac noxia est.

Sefeli.

Sefeli cum radix, tum, & maxime quidem, fructus tantopere cum par
tium quibus conflata est, subtilitate pollet, ut urinam cieat, aduertum
comitiale præterea morbum, & orthopnoeam opem conferre assolet.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa cōsimili quidem ostreo prædita est potentia, sed tenuiori
bus cōstans partibus, maiore abstergendi uim obtinet. Qua de caus
sa si cremetur cum sale fossili, oculorum unguis extenuat. Inusta uero &
intrita palpebris ficosis, exterit uicia. Aspredinibus item quæ reliquā cu
tem impetunt ac uexant, abstersione egregia medetur.

Sesamoides.

Sesamoidis candidi semen, in calfaciendo, abstergendo, atque in rum
pendo triumphat.

Sesamum.

Sesamum pinguitudinis plusculum, uiscosiq; non parum cōtinet. Eam
sobrem emplasticam, hoc est opplendi uirtutem, emolliendi item, cal
faciendiq; non in summo potestatem obtinet.

Seps, Lacerta chalcidica.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam appellauerunt, in uino bibita,
à se illatis mordicibus succurrit.

Sialon, Saliua.

Sialon, saliuæ hominis ieiuni distrahentem & abstergentē obtinet po
tentiam. Quocirca puerulorum lichenas exterit illita, furunculos con
coquit, cum tritico ore premāso imposita, sugillata expūgit: homicidisq;
feris omnium aduersissimū & infestissimum existit sputum humanum.

Sideritis Heraclea, Solastrum.

Sideritis Heraclea, quæ & helxine dicitur, in Helxine explicata est.

Sideritis Achillea.

Porrò quam achilleā sideritim appellant, ea superiori uiribus est non
dissimilibus, nisi quod astrictione exuperat: Idcirco ad fluxiones uno
uerbo, omnes oppidoquam egregie competit.

Sideros.

Sideros, Ferrum.

Ferrum aqua sapenuiterno extinctum, siccificam suam potestatem in ea deponit, pota idcirco hæc aqua lienosis expedit. Atsi in uino candens ferrum extinguitur, coeliacos id uinum, & intestinorum tormina, cholicosq; stomacho dissolutos, qui per inferna multum bilis deijciunt, & per superna euomunt, præsentia auxilio sanat.

Sicyos, Cucumis.

Cucumis qui edendo est uiridem colorem præfert, refrigerandi & humectandi facultate in secundo censetur excessu. Caro quidem eius elixa inflammationes mitigat. Semini uero abstergendi & incidendi facultas inest: Quocirca urinas cit, & corpori uenustat & splendorem inducit. Siccus porro arefacientis nature in primo ordine est, sed maior abstergendi facultas cum semini tum radici, quam carni inest.

Sicyos agrios, Cucumis syluestris, Elaterium.

Elaterium uulgo nomenclaturam obtinuit qui è syluestris cucumeris fructu exprimitur liquor. Radicis uero foliorumq; succus, haud disparem quidem elaterio facultatem, sed debiliorem tamen sortitus est: Ipsa namq; radix abstergendi, distrahendi, atq; emolliendi deniq;: succus uero non impotenter arefaciendi potestate regnat.

Sillybon.

Sillybum plantula spinosa est, folijs chameleonem candidum referens, esculenta interim. Radicis uero liquor drachmæ unius pondere cum aqua mulsa sumptus, uomitiones prolicit.

Silurus.

Silurus muria salæue conditus atq; deglutitus, fauces humidæ expurgat: ad modum uero cataplasmatis impositus, furculos, & quæq; alia corpori infixæ euellit.

Silpha, Blatta pistrinaria.

Blattæ eius quæ circa molas & in pistrinis reperitur interanea elixa & contrita, aurium doloribus medentur.

Silphium, Lasepitiū.

Laser (sic enim Latini silphium appellant) præualidâ calfaciendi uim habet, & flatulentæ magis essentiæ est, & concoctioni renitens. Foris autem adhibitum corpori laserpitium, efficacius, & omnium maxime succus trahentis est potentiæ, habet etiam uim quandam amoliendi.

Sison.

Sison calidū adeo est, ut lotia cieat, & cōcoctiones adiuuet, muliebriq; conciet, & interaneorum oppilationes laxet.

Sion.

Sion excalfacientis est potentiæ, urinas mouet, distrahit, calculos in renibus confringit, & menses deniq; trahit & expellit.

Sisaron.

Sisari radix elixa stomacho amica & salutaris est, uires meendi, secundum excessu calfaciendi obtinet. Tenuium præterea partium est, &

diffipandi naturam habet, potentius tamen semen: Quamobrem non solum gultientibus solum, sed torminibus circa umbilicum laborantibus cum uino utiliter exhibetur.

Sisymbrium.

Sisymbriū, quod & cardominen nūcupant, eo quod cardamo praefatur quippiam simile: aridum id quidem ex eorum censu habetur, quae calfaciunt & desiccant ordine primo: uinum uero sisymbriū, gradu secundo.

Scammonia, Colophonium.

Scammonia calidam habet & dissicientem, & abstersoriam biliosorum humorum potentiam, sed omnium potissimum liquor, qui & panos disscutit, & partus in utero interficit appositus, lepras praeterea eliminat. In diuturnis capitis doloribus coccinnata inde aspergine cum oxyrhodino magna cum utilitate inspergitur, quod medele genus Graeci *καλὴν* cognominant. Ceterum scammoniae radix per se pota, uentrem subducit & expurgat, tum eius etiam decoctio. Cum admixtione postremo aceti potentius hordeaceae decocta, coxendicis laboribus ad morem cataplasmatis superinducitur.

Scandix.

Scandix est syluestrium holerum censu est, calidae & siccae facultatis iuxta secundum a symmetris excessum. Vrinam ciendi, & ab infarctu & oppilatione uiscerum afferendi uires obtinet.

Scingus, Terrestres Crocodilus.

Quae propinque scingi renibus carnes sunt, in potu sumptae mentis iam arrigere, & libidine accendere creduntur. Contrariam omnino affectionem lactuce semen cum aqua potum inducit, cupiditatesque Veneris penitus uidet extingueret. Idem praestat lentius elixatio cum melle.

Scilla.

Habet scilla dissecandi facultatem, calfacitque & desiccant ordine secundum. Satius autem fuerit eam aut elixam aut assam sumere.

Scolopendra, Centipes ut marina.

Centipes marina, quam *σκολόπενδρα* Graeci uocant, oleo elixa, & pilosis corporis partibus illita, glabreta inducit. Si uero combusta fuerit, praeter haec (uel inusta contactu solū) pruriginem quoque excitat.

Scolopendrium.

Scolopendrium foliosus cespes est, quem uno ore cum Graeci tum Latini asplenon nominant.

Scolymon, Carduus.

Scolymon, quem carduum Latini uocant, in calfaciendo & exiccando in secunda classe censeretur. Radix in uino elixa potaque, graueolentem urinam affatim efficit, hircumque alarum, uniuersique corporis uirosos odores emendat.

Scordium.

Scordium ex diuersis saporibus potentiusque constat, quando amarum quid in se, acerbum item & acre continet. Expurgat itaque pariter & calfacit

calfacit uiscera, urinam præterea muliebriâq; promouet, omniâq; perfrigerata calore instaurat ac reficit, deinde uulnera quoq; conglutinat, sordidaq; expurgat, ac deniq; sanat.

Scorodon, Allium.

Allium excalfacit & arefacit quarta distantia. Syluestre porrò alliū, quod ophioscordon nūcupant, multo efficacius quàm latium est.

Scorodoprason.

Scorodoprasum porri & alliij simul mixtas habet qualitates, pariter atque uires, quod naturæ monstrum appellationis coalescentia insinuat, *σκόρδον* enim allium, *πράσον* porrum significat.

Scorpioides, Scorpion.

Scorpioides herba in calfaciendo quidem tertium, in desiccando secundum ordinem sortita est.

Scorpius terrestris.

Scorpius terrenus, crudus impositus, uel tostus in cibo sumptus, contra proprios ictus suâq; uulnera præsentis est remedio.

Scorpius marinus.

Scorpionis marini sel suffusionibus oculorum bellissime subuenit.

Scoria, Recrementum metallorum.

Scoria, hoc est metalli cuiusuis recrementum, in uniuersum impense desiccatoria est, cum primis autem ferri, quod decoctum atq; cum aceto leuigatum, auribus quæ aliquandiu pure fluxerunt, præsentissimū ac prodigiosum est remedium: uerum his etiam qui aconitū hauerunt, ferri sterco cum aceto mulso potum, succurrit.

Scoria plumbi.

Recrementum plumbarium cremati plumbi uiribus proportionē respondet, uehementius tamen astringit.

Smilax, Taxus.

Smilax uel cactus uenenosæ letalisq; facultatis arbor est.

Smyrna, Myrrha.

MYrrha cum in calfaciendo, tum in desiccando in secundo censetur excessu. Capitis igitur uulnera, si eis illiniatur, glutinare solet. Inest etiam myrrhæ quidam amaror, per quem lumbricos nimirū, foetusq; in utero occidit. Adest præterea ei & abstergēdi facultas: quo nomine oculis collirijs subinde inferitur, & quæcunq; pectori officiunt expurgat, non tamen abstergentium more, arteriam exasperat.

Smyrna, Boeotia.

MYrrha bæotica uires calfaciendi, emolliendi & dissoluēdi obtinet.

Smyrnium.

SMyrnium, sunt qui hipposelinum, aliqui uero selinon agrium, hoc est Sapium syluestre nūcupant, habet calfaciendi & arefaciendi secundū tertium ordinem potentiam. Est autem selino ualentius, petroselino debilius, urinas igitur mensesq; agit.

Sonchus, Cucurbita aspera.

Sonchus acerbescit pariter & manifesto refrigerat, quum uel estur, uel cataplasmatibus more illinitur. Vbi autem arefacta fuerit, mediocrem calfaciendi facultatem induit.

Sparganion.

Sparganio quoque herbae, uis & natura desiccandi praestitum est.

Spartos, Genista.

Spartus lentus frutex quo uites uinciunt: huius seminis una cum floribus oboli quinque in aqua multa epoti, purgant per superna, ueratri candidi modo sine periculo. Semen seorsim deiectionem molitur, uirgultula eius coxendicis doloribus opitulatur.

Speclarion.

Speclariū, aliqui uero per ph, speclarion scribunt ac proferunt, quod deo speclorum uice in fenestris nonnulli utantur: qua de causa diaphanes quoque appellatur: gypsosum est substantia, habet crematis testis, siue ostreis proximam in omnibus potentiam.

Spongos, Spongia.

Spongia noua maris etiam dum odorem spirans ac seruās, cum aqua uel uino uel posca superinducta, uulnera conglutinare potest. Cremata autem acrem & distrahentem obtinet potentiam, atque cum bitumine liquida uel pice arefacta, sanguinis eruptiones cohibet.

Spodium.

Spodium cōgenerē planē ac similē habet cum pompholyge potentiā.

Staphylinus, Pastinaca.

Pastinaca urinam agit, mentesque sollicitat, praecipue radix & semen. Folia autem abstergerendi uis praedita sunt: ideoque affectionibus quas committantur phagedenae, recens adiecto melle utilis est. Porro staphylinus syluestris, qui daucus est, ad omnia ualidior, satius imbecillior.

Stachys herba.

Stachys frutex spicatus marrubio compar, calfacientium tertij ordinis est, eapropter muliebria ducit, & foetus occidit, & muliebres a partu locellos morantes expellit.

Steara, Adipes.

Adipes omnes quidem hominis corpus pariter humectant & calfaciunt: pro diuersa uero animantium unde sumuntur temperatura, eandem facultas quoque uariat.

Stear hyem, Adeps suillus.

Svillus igitur adeps nulli est in humectando secundus, uicinamque oleo sortitur potestatem: Quare uellicationes & erosiones omnes mitigat atque obtundit. Adeps porro caprillus aridioris naturae est, oculusque congelascit: Qua ratione ad mitigandum recti intestini morsum, adipem caprinum inijcimus. Caterum anserinus adeps calidior, subtiliorumque partium est. Sed in medio horum adeps gallinaeorum atque gallinarum creditur. Leonum praeterea adeps omnium facile calidissimus est, tenuissimus.

Adeps caprinus.

Anserinus.

Gallinaceus.

Leoninus.

tenuissimisq; essentiæ partibus constat, ac proinde cæteris omnibus multo magis digerit. Bubulus adeps mediâ inter hos temperaturâ, porco- Bovinus.
rum nempe atq; leonum adipēs sortitus est. Vrsinus capillorum ex alo- Vrsinus.
pecia defluuijs medetur. Vulpinus otalgia, hoc est aurium doloribus Vulpinus.
succurrit. Viperarum adipem atrichum esse, hoc est pilos pariter eu- Viperinus.
lere, & ne renascantur prohibere, oculorum item suffusiones sanare re-
funt. Porro in omnibus calidior semper ac siccior est marium, atq; ho- Masculi pes
rum eorundem testiculorum magis, quàm reliquorum omnium. coris.

Adeps quoruncq; pecudû inueteratus temporis diuturnitate, seipso
redditur indies magis magisque calidior.

Simmi.

Stimmi præterquam quod exalfacit, astrictiōis etiam plusculû ob-
stinet: quapropter ocularibus subinde confunditur collyrijs.

Sicebe herba.

Stcebes cum semina tum folia cum astrictoria qua prædita sunt facul-
tate, desiccât in tertio excessu: Qua ratione uulnera peringentia quæq;
conglutinant, eorumq; elixatio intestinorum torminibus dysenterijs ue-
sanguinis eruptionibus, & auribus purulenti auxiliatur. Præterea o-
culos ex percussu sanguine suffusos, in morē cataplasmati impacta iuant.

Sicechas.

Stcechas obstructions laxare, crassa attenuare, extergere, & exta-
domnia, totumq; animalis habitum roborare nata est.

Stratiotes aquaticus.

Stratiotes, qui in humidis nascitur locis, frigorificâ uim obtinet: Ter-
restres uero stratiotes nonnihil astrictiōis habet: quo nomine & hui-
cera conglutinat. Nonnulli uero ad sanguinis eruptiones compescendas
eo solenniter, atq; ad fistulas utuntur.

Strychnon, Solanum.

Solanum, quod in hortis nascitur, & esculentum est, astringit & refri-
gerat excessu à medijs secundo. Cæterû cui nomen est Alicacabum,
facultate hortenli solano simile, fructum gerit ciendę urinæ idoneû, uua-
rum acinis neutiq;uam absimilem.

Strychnon hypnoticon, Solanum somnificum.

Solani uero hypnotici radices cortex, in uino drachmæ pondere sum-
ptus, somnum accersit. Semen uim proritandi urînam obtinet, quum
ex tertio censeatur ordine frigorificorum: Proinde si plus duodecim co-
symbis hauriatur, furorem adscisset.

Strychnon manicon, Solanum furiosum.

Quarta solani species (furiosi nomine gaudēs) ad medicinas quæ in-
tra corpus sumuntur, inutile minimeq; innoxium est: Foris aut si cata-
plasmatis instar imponat, hucera depascendo serpentina, quibus à re no-
mę appellatio est indita, curat. Excessu secundo desiccans & refrigeras.

Stypteria scissile, strongile, & hygra, Alumen fissile, rotundum, & liquidum.

Aluminis ferè omne genus astringtionis uehementissimæ est, crassiusq; partium, reliquis tamen, subtilioribus cõstat partibus quod appellat scissile: proximũ est rotundũ & stragalote. Cæterũ spissæ admodũ essentia est stypteria, Liquida, Placitis, & Plinthitis nuncupata.

Syrax.

Syrax calfaciendi, emolliendi, & cõcoquendi facultatẽ obtinet: quocirca tussibus, destillationibus à capite in subiectas partes, & coryzis denique succurrit: Fœminarũ præterea purgationes menstruas urget, si uel potetur, uel aliàs applicetur.

Syca, Ficus fructus.

Ficus, aridæ quidem caliditate sua secundum ordinem leuiter attingunt ceterum pinguiore, duos tumores ualide ad maturationem suppurationemq; sollicitant & impellunt. Gustu porro acriores, absterforia & distrahentis sunt potentia. Elixatio uero ficuum melli consistentia similis, quam sireon pleriq; nominant, facultatẽ melli respondet. Iam uero uirides imbecillioris sunt potentia, utræq; tamen aluum subducunt. Ad postremum autem ficus caprificæ cum quadam acrimonia distrahendi quoq; uires obtinent, perinde atq; satiuarum *ἰαυδοί*, hoc est grossuli.

Syce, Ficus arbor.

Ficus arbor calidam subtiliumq; partium temperaturam sortita est, adedò ut liquor eius, & foliorum suorum succus non uellicare, uel abstergere, sed exulcerare etiam, oraq; uasorũ referare, & uerrucas (quas *μυρμικιαι*, id est formicas dicunt) eiicere satis bellissime queat. Quin & purgandi uis fico arbori inest. Porro syluestris ficus, quam Græci *ἰγυρία*, Latini caprificum indignant, ad omnem usum non parum efficacior est quàm domestica.

Sycomorus, Ficus Aegyptia.

Sycomorì arboris fructus præterquam quod alimenti ne tantillum squidem præstat, stomacho quoque noxius est. Liquor uero sycomorì facultatẽ qua præditus est, emollire, uulnera glutinare, & tumores distrahere potest. Bibitur præterea, illiniturq; contra serpentium ictus, duritie infestatos lienes, stomachi dolores, febriumq; horrores.

Symphyton petraum, Consolida.

Symphyton petraum ex contrarijs constatũ est facultatibus. Habet enim aliquid quod incidat, quo nimirum quæ in pectore & pulmonibus purulenta concreuerunt, renesq; expurgat. Habet item quampiam in se astringendi contrahendiq; potentiam, qua sanguinis excreationibus, conuulsis, ruptis, fluxionibus fœminarum rufis, descendentibusq; intestinorum ramicibus, quas *ῥιζορροιαί* uocant, medetur. Obtinet ad hæc symphytum calidam humiditatem, qua sitim arcet, & arteria denique medicatur asperitates.

Symphy

Symphyton mega, Consolida maior.

Symphytum alterū, nempe grandius uiscidū quendam lentorem & smordicationem obtinet, scyllæ simile. Utendum est eo ad omnia, quibus superiorem consolidam conferre tradidimus.

Sphondylion, Herba rutinalis, uel Verticillum.

Sphondylii quidē fructus atq; radix, acrimoniam habent, & incidunt facultatem: suspiriosis itaq; & comitialibus, regioq; morbo succurrit. Cæterum radix eius circumrasa fistulis imposita, callos earum eximit ac tollit. Floris porro succus in aluum contra diuturniora hulcera
10 utiliter instillatur.

Schinos, Lentiscus.

Lentiscus secundum omnes suas partes desiccatur secunda distantia completa, in caliditatis uero frigiditatisq; qualitate medium quadantenus locum obtinet, eo usq; astringens, ut astrictione sua succo hypocrisis stidis propē admodum accedat.

Schinu anthos, Lentisci flos.

Lentisci flos calfaciendi mediocrem, astringendi minorem facultatē obtinet, neq; à tenuibus essentię naturæq; partibus alienus est. Quibus nominibus urinam prolicit, mensesq; proritat, & ab infarctu oppilationibusq; liberat, tum in suffutibus, tum potionibus, tum in cataplasmatibus adhibitus. Flore porro magis astringit radix, hac uero ille calidior est.

Schoenos, luncus rotundus odoratus.

Rotundi odorati iunci leuis (quem schoenon leian Græci uocant) gēminæ species sunt. Cæterum alterius quidem speciei oxyschoeni appellatæ fructus somnum cōciliat, minus uero oligoschoeno: Altera iunci species caput tentat. Ambæ si frictæ cum uino potent, uentris fluores exiccant, & muliebri profluium cohibent.

Sory.

Sory eadem ferme cum misyi efficacia præditum est; multo crassioribus tamen constat partibus quam misy.

DE HIS QVÆ INCHOANT A LITERA T.

Tarichorum piscium caro.

Tarichorū caro acris est, & exiccatorię facultatis: quā ob causam à prestere uipera demorsis exhibēda est, ut quāto plus percussus ederit, uinumq; potarit, tanto maiore copia uomitu reddat. Ad drymiphagias item cōgruit. In modū porro cataplasmatibus aduersus canū morsus utiliter illiniunt, nec nō & aliorū serpentiū.

Taurocolla, Tauri gluten.

Taurocolla, quasi taurinum glutinū dicas, sunt qui xylocollam, id est ligni glutinū uocant, ex boum corijs confecta, impenitē absterforię facultatis est: Quocirca potest solutū aceto glutinum hoc, impetigines & summæ cutis lepras exterere, neq; sinit igne ambusta inflāmari, cum calida aqua eliquata. Est præterea gluten hoc uulnerarium (hoc est mendicandis uulneribus utile) oxymelite maceratum.

Tellinæ.

Tellinæ sale conditæ, crematæ, deurentē reddunt cinerem. Qui cum cedrio liquore confusus, euulsos radicitus palpebris pilos nasciturum in locum alios prohibet.

Terminthos, Terebinthus.

Terebinthus excalfacit in tertio excessu. Desiccatur si quidē uiridis sit primo, si aridus, secundo à temperatis ordine. Fructus porro aridus tertiæ est arefacientium distantia, propter hæc utiq; urinam prouocat, & lienes egregie iuuat.

Tettiges, Cicadæ.

Cicadas quidam medici crudas exiccant, colicisq; potui treis aut quatuor, aut quinq; aut septē, cum paribus numero pipēris granis exhibent: aliqui uero assas edendas offerūt his quibus male affecta est uesica.

Teulon, Beta.

Beta nitrosam quandam uim obtinet, per quam tum abstergit, tum discutit, caputq; naribus expurgat: prærogatiuam uero habet in his facultatibus candida, quæ decocta induit uirtutem aphlegmanten, hoc est inflammationibus aduersam, clementer admodum dissipantem.

Teucrios.

Teucrium calidi quidem temperamenti est excessu secundo, sicci autē in tertio, dissecantisq; & tenuium partium facultatis. Eamq; ob causam lienes affectos sospitati restituit.

Tephra, Cinis.

Non quiuis cinis eandem ad amussim temperaturā obtinet, sed pro combustæ materiæ diuersitate uariatur. Acerbarū namq; materialium cinis, utpote quercuū & prinorū, astrictione nō modica præditus est: q̄ sit ut sanguinis eruptiones supprimat, quū aliud eiusdē facultatis ad manum nō est. Acrium uero materialium, puta ficus & tithymallorū, hoc est herbæ lactariæ cinis, acrimoniæ plus abstergentisq; facultatis induit.

Telephion, Illecebra.

Telephium censetur in primo calfacientium, secundo autem arefacientium ordine, detergendiq; interim facultate præditum est: Quare ad putrida exedentiaq; hulcera accommodatum est. Leucas & uutiligines medicatur, si adhibeatur cum aceto.

Telis, Fœnumgræcum.

Fœnogræcum in calfaciendo ex secūdi ordinis censu, in desiccando primi habetur: Quamobrem feruentes phlegmonas irritat, ceterum non adeo calidas, & quæ duræ sunt inflammationes, distrahendo sanat.

Tithymallus, Herba lactaria.

Tithymalli ad unum omnes quidem species ex tertio sunt calfacientium ordine, cum acrimonia & amaritate intensa. Eiusdē facultatis particeps quidem radix est, sed non ex equo: nam imbecillior quadantenus existens, cum aceto elixa erosorum dentium cruciatus mitigat. Liquores porro

Trigle piscis, Mulus.

Mylorum piscium assiduus esus aciem oculorū hebetat, idem piscis marini draconis, scorpionisq; & draconæ moribus subuenit, si crudus concisusq; adhibeatur.

Tripolium, Calumares.

Tripolium radicem habet calidæ facultatis secundum tertium à temperatis excessum, cum acrimonia coniunctæ.

Triches, Psili.

Pilli cremati consimilē, ne eandē dicā sortiunt lanis cōbustis facultatē.

Trigon thalassia, Psalinaca marina.

Pastinacæ maringē radius denti affecto impactus, frāgit eū & excutit.

Tryx centi, Fex uini.

Sedimentum uini nondum crematum uarijs conflatū est facultatibus & essentijs: uis enim illi ualidissime desiccandi & distrahendi. Cæterum astrictiōe, qua prædita fex est, è uino cuius sedimentum est, adipiscitur. Utendum igitur fece uini nondū combusta in affectionibus humidoribus & fluidis. Phygetla dissicit, stillicidiumq; lactis mammarum extinguit. Cæterum quæ priuatim σφιγξ, hoc est fex cremata appellatur, deurendi uim induit, atq; ob id deurentibus etiam medicaminibus inditur. Scabros ungues cum resina excutit, & ex oleo lentiscino totam noctem illita, capillos flauo colore inficit. Lota igitur sphede, oculorum absteruis medicamentis inferitur.

Trix oxus, Fex acetii.

ACeti porro fex per omnia ualentior & astringentior quàm uini est.

Troglodites, Passer.

Troglodites passer est, omniū auium minima, dempto eo cui inditū nomen basilisci, hoc est reguli: degit frequenter uitam in sepibus. Is profecto siue assus, siue crudus sale conditus atq; comesus, calculos in renibus confringit. Cinis item deusti passeruli potus, eadem designat.

Tyros, Caseus.

Caseus recens & nuper compactus ac mollis, reperfusoriam habet facultatem refrigerantium lente: quocirca & uulnera cōmittit impositus. Qui autem oxygalactinus nuncupatur caseus, præter hæc distrahendi etiam lenem quandam uim sortitus est, uulneraq; ualidius conglutinat. Inueteratus autem atque in primis pinguis, distrahendi uiperæ datus est: qua quidem facultate ad arthriticorū tophos, quos οὐροποι Græci appellant, salubre est remedium, atq; potissimum addito decocto carnis suillæ cum salsæ cum pinguis.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA Y.

Hyacinthus.



Yacinthi radix bulbosa primi ordinis exiccantium, refrigerantium uero secundi: Atq; ob id quidem pueros diutissime imberes feruare creditur, cum uino cataplasmatibus modo imposita.

Fructus

Fructus eius leuiter extergit et astringit: Cuius gratia aurugine laborantibus offertur in uino, arefaciēs quidē impensius, minus uero refrigerās.

Hyalos, Vitrum.

Vicrum in puluerem friatum, cum uino tenui candidoq; sumptum calculos uellicae comminuere perhibetur.

Hydnon, Tuber terræ.

Hydnon essentiam terrestriorem exuperantem possidet, cum exigua quadam partium subtilitate coniunctam.

Hydargyros, Argenti uinum.

Argenti uinum haud ita multum momenti in re medica præstat, quum sit letale uenenum: sunt tamen qui id comburentes ueluti in cinerem redigūt, quem alijs speciebus permixtum, colicis & ileosis potandum exhibuerunt

Hydropiper:

HYdropiper temperaturæ admodum calidæ est herba, uerum neuiquam tam impense calida atq; piper existit, uirens hydropiper cum semine in morem emplastri superinductum, non sugillata solum, sed induratos etiam tumores discutit.

Hydron, Aqua optima.

Aqua saluberrima & impermixtæ consistentiæ, propria sua natura frigida est & humida: quæ uero acquisitiâ caliditatē assumit, tantisper dum eam seruat, calefacit: simul atq; aduentitium calorem amiserit, refrigerat. Quæ porro commercium habet cum aliquo, quemadmodum quæ nitri uel bituminis particeps est, mixtæ sortitur essentiae facultatem. Pluuiialis uero aqua etiam astringentis quippiam obtinet, eapropter collyrijs oculorum inferitur. Cæterum cuiusmodi aquam inculpatam esse oporteat, primo uolumine explicatum est.

Hyoscyamos, Altercum, Herba Apollinaris.

Altercum, quem *υοσϋαμος* Græci uocant, nō modò id cui atrum, sed & cui flauum inest semen, uenenosum est. Cæterū ad medicationes non nisi quod flore ac semine candido præditum est, expedit, id quod ex tertio refrigerantium ordine existit.

Hypericon.

Hyperici duo sunt genera, alterum nanq; andrasæmon & astyron appellatur, super quibus in superioribus est proditum. Alterum uero calfacit & siccatur ob subtilitatem partium suæ consistentiæ: qua facultate totus herbæ fructus urinas & menstrua iuxta prolicit, cum folijs uero, uel ridis cataplasmatibus modò impositus, uulnera sanat. Arida uero in morē emplastri impacta, huiusmodi medentur: Exhibentur in super coxendice laborantibus in potu.

Hypecoon.

Hypecoon refrigerandi facultatem obtinet in tertio eiusdem qualitatis gradu: quo sic ut parum absit à papauere.

Hypoglosson.

Hypoglossum fruticulus est, cuius cum radix tum fructus emollienti di facultatem obtinent.

Hypocistis.

Hypocistis succus est, ex cisthi cithariq; fruticis radice expressus, ueluti cytinorum, admodū efficax remedium contra omne genus fluxionum affectus, eximie desiccando, robur item & firmitatem strenue corporis partibus indendo.

Hypophæston.

Hypophæstum fulloniæ sping cardui ue species est, quemadmodū et hypophæes. Huius plantæ capitis, & foliorum, aridarumq; radicū triobuli pondus cum aqua multa sumptū, aquam & pituitam exhaurit. Prærogatiua uero quadā facultate prædita est, medendi orthopnæas, morbos comitiales, & quæ neruos tentant affectiones.

Hyslopum.

Hyslopum calfaciendi & exiccandi nim habet in tertio ordine calfacientium & arefacientium, constatq; ex raris & subtilibus admodū essentia partibus.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA PH.

Phaci, Lentesc.

20

PEntes desiccandi uim habent tertio arefacientium ordine, medium uero inter calorem ac frigus locum obtinent. Habet præterea nonnihil astrictionis: quo fit ut corpus earum exiccet, & uentrem solutū compescat. Cæterū earundem elixatio prouocat: proinde prior aqua abijcitur, quando retentionis gratia adhibent.

Phacos, Lenticula palustris.

Lenticula quæ in lacustribus coenosisq; locis inuenitur, udi ac gelidi temperamenti est, utrinq; excessu secundo.

Phalaris.

Phalaridis tum succus, tum folia, tum etiā semen in potu sumpta, uelut sicæ languoribus manus præstāt auxiliares: cōstant etiā quadantes nus ex partibus substantiæ tenuibus, & calorem nō nullum participant.

Phalangites.

Phalangites, id nominis quidē sortita hæc herba esse creditur, quod à phalangiorum ictu petitis opinuletur: numeratur autem inter ea quæ tenuium sunt partium: Qua facultate his qui strophis, hoc est circa umbilicum torminibus uexantur, subuenire creditur.

Phelli.

Phelli, præsertim qui ex uasis uinarijs colliguntur cremati, siccificissimum cinerē efficiunt, qui dysentericis maxime permisceat remedijs.

Philyra, Tilia.

Tiliæ arboris folia, ut forma & figura oleæ propius accedunt, ita & facultate quoq; astrictionis agrestem oliuam ad unguem referunt, præcipueq;

cupueq; oris h ulceribus remedio sunt, in quem usum commanducantur, & decocto eorum colluuntur. Quod etiam potum, lotium ac menstruas purgationes prouocat.

Phlomos, Verbascum.

Verbasci plura sunt genera, inter quæ numerat & thryallis nomine, omnium uero folia arefaciendi & mediocriter abstergendi ut prædita sunt, & potissimum quæ aurei coloris flores possident, & acerbi saporis sunt. Fluidis itaq; affectionibus competunt. Colluunt quidam istud quoque in dolore dentes.

Phoenix herba.

Phenix, quam aliqui rhin appellat, herba lolio non absimilis potestatem habet astringendi. Quare cum uino hausta austero, omnes fluxionum affectus compescit.

Phoenix, Palma.

Phenix arbor fructum quidem iam maturum calidum mediocriter habet, robur indere ualentem, & stomacho utilem, siue intra corpus sumatur, siue foris adhibeatur. Quod reliquum est palmæ, astrictioris plurimum obtinet: qua de causa stomachicis & hepaticis facultatibus confunditur. Omnium autem maxime astrictoria est, ea quæ fructui circumfunditur membranula.

Phormion.

Phormium cum partium tenuitate abstergendi & attrahendi facultatem possidet. Leucomata igitur, hoc est oculorum albugines semen eius cum melle attenuat, & stipites euellit.

Phu, Valeriana.

Phu herbæ radix uiribus nardo similis est, sed tamen ad plerumque debilior: uerum urinas propellit ualentius quam uel Syriaca uel Indica nardus, perinde atq; Celtica.

Phycos, Alga.

Phycos refrigerandi & arefaciendi uim habet in secundo ordine, acerbitate item leuiuscula quadam præditus est.

Phyllitis.

Quum phyllitidi acerba quædam qualitas insit, non temere neq; absurde profluus siue diarrhoeis pota succurrit.

DE HIS QUAE IN CHOANTIA LITERA CH.

Chalbane, Galbanum.

Chalbane, quod Romani galbanum uocant, tantum non tertij excalfaciendum ordinis est. In desiccando autem attingit gradum secundum, cum facultate molliendi & distrahendi.

Chalcitis, Lapis ex quo aes coquitur.

Chalcitis cum acrimonia qua prædita est, astringendi, deurendi, & crustas generandi facultatem obtinet. Partium autem subtilitate media est, inter misy & sory. Si uero comburatur, tenuioris redditur substantiæ.

Chalcanthos, Atramentum futorium.

A Tramentum futorium, aqua est congelata in metallis Cypri, cum calore quodam minime oblcuro, summā habens ac ualidissimam adstringendi potentiam, neq; quicquā est quod æque humiditas, carnes condiat atq; desiccet. Cæterū longo temporis progressu in chalcitidem tranfit atramentum futorium.

Chalcos cecaumenos, Aes ustum.

A Es crematum habet & acrimoniam quandam, & astrictiōis particeps est. Inducendis itaq; cicatricibus bellissimum ac optimum præstat medicamentum, potissimum aridiore corpore. Quod si ablatur, in molliore carne multo commodius efficitur.

Chalcu anthos, Flos æris.

F Los æris subtiliorū est partiū potentia, quā uel æs ustum, uel squama eius. Quocirca mixtum in collyria cum aspredines reliquas, tum asperas & ficosas palpebras, quas *συνόχες* Græci uocant medicatur.

Chamædrys, Trixago.

P Onitur trixago in tertio gradu calfacientium & arefacientium: quæ ratione non iniuria, lienes liquefacit, lotium ac menses trahit, extrinsecusq; obstructiones referat ac purgat.

Chamæcissos, Hedera terrestris.

C Hamæcissi, quā Romani hederam aquaticam nominant, flos quū uehementer amarus sit, iocinoris uicinarumq; partium obstructiones laxat. Exhibetur magna item cum utilitate ex coxendice laborantibus, quos Græci dicunt *ιγναδύκτες*.

Chamæleuce.

C Hamæleuca uis & natura est calfaciendi iuxta ordinē tertium, exicandī uero secundum ordinem primum.

Chamæleon melas, Carduus niger.

C Hamæleontis nigri quidē radix calida est & licca tertio ferme à temperatis excessu. Habet præterea facultatem detergendi ea quæ summam cutis superficiem occupant, dissoluiendi item & emolliendi duros tumores. Quin & phagedænica cataplasmatismodo illita medicatur. Cæterum intro in corpus sumpta, uenenosa & letalis creditur nigri chamæleontis radix.

Chamæleon leucon, Carduus albus.

P Orrò candidi chamæleontis radix uiribus atro cōiungitur, efficacior tamē est, quæ utiq; cum uini austeri oxybapho pota, latos lumbricos interficit. Conducit sanē eadem aqua inter cutem laborantibus.

Chamæmelon, Anthemis.

C Hamæmalum uel anthemis calfaciendo & desiccādo primū sortitur calidorum & arefacientium ordinem, & tenuis particeps est essentia, discutiendi item, & laxandi, & rarefaciendi potestate regnat.

Chamæ-

Chamæpitys, Aluga, Humilis picea.

Aluga, quam uulgò græce chamæpityn nominant, exalfacit quidem secundo à medijs excessu, exiccat uero in tertio : Idcirco non solum expurgat, sed etiam abstergit corporis exta, & potissimū iecur. Vrinæ præterea agit ac menses, & uulnera grandia quæq; conglutinat, hucera putrescentia exedentiaq; medicatur, duritias discutit : conducit decoctū ipsius impendio ex coxendice laborantibus.

Chamædrops.

Chamædrops, sunt qui chamædryn, hoc est trixaginē, nec desunt qui cturion, teurcion uel appellitēt, trixagini cōsimilis omnino est potētig.

Chamæsyce, Terrestris ficus.

Chamæsyce, hoc est humilis ficus, detergentem pariter & acrem obtinet potētiā : Proinde teneriores eius ramuli caules uel atq; liquor, uerrucas quas myrmecias dicūt, & acrochordonas auferunt. Crassas uero oculorum cicatrices cum melle admoti exterunt, & aciei oculorum hebetudinem, suffusionumq; principia adiuuant.

Chamelæa, Oleastellum, Oleago.

Oleago detergenti facultate prædita est : quocirca hucera fordida & quæ crustas habent cum melle expurgat.

Chelidonium, Hirundinaria, Maius fabium.

Chelidonium maius quidem calorificum est secundum tertium à medijs excessum, habetq; uim detergenti potētiem. Succus porro chelidonij grandioris ad oculorū speciem exacuendā accōmodus est. Radix aut auruginosos obstructione liberat, cum uinō siue aniso pota : quod si eadem ore fuerit commansa, dentium cruciatus mitigat.

Chelidonium minus, Hirundinaria minor.

Chelidonium uero minus ex quarta censetur calfacientium classe, tanta acrimonia excedens maius, ut cataplasmatibus modo impositum cutem ilico exhulceret, unguesq; scabros excutiat. Porro succus minoris hirundinariæ per nares quocq; expurgandi uim obtinet.

Chelidones, Hirundines.

Hirundinum crematarum cinis cum melle illitus anginosus inflammationibus succurrit, & oculorum claritatem adiuuat.

Chole, Fel.

In animalibus humorum omnium calidissimum fel est, sed colore inter se dissident. Siquidē quod rufi coloris, pallido calidius est : & rufo, quod æruginem colore præfert. Differunt præterea pro animalium eadem habentium discrimine.

Cholehyon, Fel suillum.

Fel porcinum omnibus quidem alijs imbecillimum est : Quamobrem contra aurium hucera absq; uellicatione egregiū præstat remedium.

Fel ouillum & caprillum.

Ovinum fel non paulò maiore habet quàm suillum acrimoniam, cæterum ouillo caprinum ad omnia efficacius est.

Fel urforum, boum, tauri, hyenæ, callionymi, scorpionis,
testudinis marinæ, & capræ.

VRsinum fel pariter & bubulum uiribus caprino respondent: tauri-
num his omnibus potentius, ab hyenarū tamen felle superatur: hoc
rursum à felle piscis callionymi appellati uincitur, & scorpionis pariter
marini, quod suffusionibus & oculorum hebetudinibus, albuginibusq;
congruit, & fel testudinis marinæ. Cæterū capræ fel his qui noctu acu-
tius quàm interdiu prospiciunt, quos Græci *νοκταλπιες*, Romani nu-
scitiosos uocant, eximie conferre perhibetur.

Fella autum.

Omnium uolucrum fel plus acrimoniæ, & in arefaciendo potentio-
rem quàm quadrupedum efficaciam obtinet. Inter hæc uero etiam
ipsa gallinaceorum atq; perdicum præstantius alijs est. Accipitrū por-
ro pariter & aquilarū maiore quodāmodo acredinem & exedendi uim
possidet, uiridiq; & atro quandoq; colore præditum est.

Chondrilla.

CHondrilla seris species quū sit, subamarū quiddā in se cōplectitur:
quocirca uiribus est quadantenus siccantioribus q̃ seris prædita.

Chondros, Alica.

CHondrus temperie ac uiribus non multum discrepat à tritico, præ-
terquam quod illi plus uiscosi lentoris quàm huic inest.

Chryfocolla.

CHryfocolla in metallis reperitur, & in pila ex ære rubro, è lotio im-
pubis pueruli præparatur, lotio sub ardentissimo caniculæ æstu in
mortario ut diximus æreo cōcleari trito, quo sanè pacto confecta chryso-
colla abstergendi uim obtinet, diaphoreticā & siccificam facultatē alijs
metallicis uehementiorem sortita, hætenus ut carnē citra uellicationem
colliquet: quamobrem cōtumacibus & uiciosa consuetudine hūcibus
commodissimū est remedium. Quod si ipsam chryfocollā comburas, ab
omni mordicatione multo alieniorem efficies.

Chryfocome, Barba iouis.

CHryfocome, quæ & chrysites appellatur, acriorem pariter & astrin-
gentē potestatem obtinet: quapropter haud ita multiplicis in medici-
nis usus est, nisi quod in peripneumonijs & iocinorosis affectibus in a-
qua malsa elixa administrat, prouocandiq; menses uim quandā possidet.

DE HIS QUAE INCHOANT A LITERA Y.

Pseudobunio, Mentiens bunium.

Pseudobuniū tum ideam tum efficaciam quoq; bunio æqualē ha-
bere credit, calfacitq; ac discutit & detergit: idcirco à tormini-
bus circa umbilicū, urinæ stillicidio, laterūq; doloribus asserit
distrahit & scrophulas cū sale uinoq; cataplasmatibus modo superinducta.

Pseudodictamon.

Pseudodictamum, hoc est falsū dictamū, assimiles, ne easdem dicam,
habet dictamo uires, non adeò tamen efficaces,

Psimythion.

Psimythion, Cerussa.

Cerussa refrigerandi, opplendiq; & obstruendi facultatem suæ naturæ aptitudine sortita est.

Psyllium, Pulcaris herba.

Pulcaris herbæ semen ex eorū albo esse censet, quæ refrigerant ordi-
ne secundo: in arefaciendo aut & humectando mediū locū obtinet,
Pforicon.

Psoricum, præparatur id medicaminis hoc modo ex chalcitide: dua-
bus eius partibus spumæ argenti uni permixtis, antea tamen utrisq;
in aceto temperatis atq; solutis, deinde in aululā nouā coniectis, quam hī
mo sub sole obruere ac sepelire quadraginta diebus expedit. Ea ratione
confectio, quæ maiores in siccando uires habebit, in attenuando trium-
phabit, & in mordicando mitior chalcitide efficietur.

DE HIS QVÆ INCHOANT A LITERA Æ.

Æu leucon, Albor oui.



Vi quidem albumen ac tenue ex censu medicaminum minimè
uellicantium arbitrari promeruit, temperatura moderate sym-
metro frigidius. Utendum est igitur oui albore non modo ad
oculos, sed etiam ad pudendorū hulcera, & ad alia omnia con-
tumacia uitiosæq; cōsuetudinis hulcera. Miscetur præterea medicamen-
tis profluuiū sanguinis supprimētib; emplasticisq; medicaminibus.

Oui lecithos, Oui uitellus.

Oui uitellus assimilis est potentia, ideoq; inferitur remedijs inflā-
mationes extinguētib; . Assus uero uitellus paulò maiorem de-
siccandi uim quàm crudus induit ac habet, sed minorem in mitigando
facultatem. Porro in aceto coctum ouum si edatur, uentris fluxiones de-
siccāt: Quod si etiam quippiam eorum quæ astringunt adiunxeris, puta
gallam, aut rhin, uel balaustium, efficacius multo medicamentum red-
ditur, ambustisq; protinus præsens tulerit auxilium, totum crudum im-
positum. Sorbile autem ouum si exhibeatur, lentorem humorum in pe-
ctore pulmoneq; maturat, incidit, atq; solatur. Cōuenit idem ad leuigan-
dum placandumq; asperitates arteriæ ac gutturis. Præferendum uero
semper recens ueteri, atq; ex his gallinarum salubritate reliquorum anti-
malium ouis palmam præripit.

Ocimon.

Ocimum ex eorum numero est, quæ calfaciunt excessu à symmetris
secundo: habet uero recrementiciam quandam humiditatem. Quæ
quidem ratione si intro in humanum corpus assumptum fuerit, præter
quam quod inutile est, noxam affert. Extrinsecus aut ad morem cataplā-
smatis partibus afflictis impositum, non solum maturat & cōcoquit, uerū
etiam distrahīt ac disijcit.

Ocimoides, Ocimastrum.

Ocimoides herba, quæ à plerisque alijs philetæron nuncupata est, nullius planè frugis radice prædita est. Semen tamen eius ex tenuibus essentiae partibus constat, habetq; idem ocimoidis semen nonnullâ citra omnem mordacitatem & erosionem desiccandi facultatem.

De medicamentis simplicibus purgandi uî præditis, primiusq; de ijs quæ flauam bilem agunt. Cap. 1111

Bilem flauam optime prolicit atque educit aloës drachma una cum melicrato matutino tempore adhibita: cæterû qui uespere eam propinant uel post cibum, lædunt: quoniam alimentum distrahit. Flauam porro bilem minus extrahit, stercoreq; solum non instrenue exonerat. Quum uero laxatiua corpus purgantia omnia stomacho noxia sint, sola uentriculo amica & utilis est aloë: Verum his qui amaritatem ipsius sustinere nequeunt, conformata inde cata potia deglutienda præbeantur. Sciendum quidem quod pharmaca purgandi facultate prædita, non simplici quadam temperatura, uerbi causa caliditate, euacuant: oporteret alioqui cuncta calidi temperamenti euacuari uim obtinere, uelut piper, sed insita quadam totius essentiae proprietate, quemadmodum magnytes lapis ferrum ad se, ceu demonstratum est, trahit. Porro inter hæc quæ in numero catharticonum habentur, de his quæ solum alui emolliendi facultatem sortita sunt, primo operis huius uolumine mentionem fecimus. Efficacioribus uero ipsorum uel ad materiam subducendam, uel ad affectionem indurâtam mouendam, uel ad exhauriendum transmutandum uel corpus, & temperamentum ipsius alterandum, aut humorem deniq; officium facientem educendum utimur. Nonnulli uero modi ex prædictis mixti inter sese inuicem & implicati sunt. Iam uero in uniuersum expurgandi uim habentibus medicamentis non nisi in quibus ualidum robur, ac sanis quibus promptitudo expedita inest, & in his qui primas ætates quidē egressi, nondum tamen ad extremum ætatis peruenerunt, & quibus stomachus potens, quiq; multam in corpore inutilem accumularit materiam, neq; adeo sanguinolentis, utendū. Tempus in quo molienda corporis expurgatio est, nisi materia turgeat, uernum maxime est, & autumnale.

De his quæ bilem proliciunt atq; educunt.

Cholagogis, hoc est medicaminibus quæ bilem proritant & educunt, Cutendum quouis tempore, excepta hyeme: in ætate uero uigente & iam declinante: constitutionibus porro siccis & musculosis & atricolis, uel rufis: & maribus potius q̃ mulierculis, & continuo alimenta corumpentibus, uentreq; constrictis, amara item bile præditis, iracundis, neq; multū urinæ emingentibus, & ijs qui alimenta usurpant arida & calida. Cæterum in felle suffusis, & iocinorarijs affectionibus, laterum doloribus, phrenitide dementiæue, angina, infania, cephalæa, ophthalmia: igne

laxatiua
sola aloë amica
stomacho.

Qui quomodo
purgandi.

igne sacro, lepra, febribus, & qui bilioso humore redundant. Porrigitur præterea aloë in grauedine capitis, oculorum morbis, sitibundis, & qui phantasijs nescio quibus, in somno absq; febre uexantur. His autē qui horridam ultro citroq; agitationē, quasiq; cursationē quandam sentiunt, & qui peditus acres excernunt, quibus mordicantur exta, & ipsi qui circa stomachum ob ardorem subuersionis cōmotionem sentiunt, & quibus clyster ob excrementorū copiam injici nequit: satis namq; euacuat (neq; tamē uniuersum cōmouet corpus, nisi multo plus quā par sit, offeratur) hærentem in uisceribus uentreq; & stomacho bilem ducens.

Helleborus, Veratrum.

10

A Commodatum autem est ueratrum in ægritudinibus tum acutis, tum etiam diutinis, quæ bilis euacuationem efflagitant: uerbi causa, in infania, & heterocrania affectis, oculorum destillationibus, & thoracis quibuscunq; affectionibus, cæterū uisceribus in primis: locellis item sceminarum, uesicæq; pharmaco bilem propiciente & ducente opus habentibus, appositissimus helleborus est. Vtilis porro etiam asperæ arteriæ affectibus, felle suffulis, atq; his pariter qui exanthematis, lichenis, aut herpetibus, uel igne sacro infestantur.

Helleborus melas, Veratrum nigrum.

10

Veratrum nigrum bilem educit, maxime flauam, ex singulis hauriendo corporis partibus, exceptis scemoribus: Quapropter nō grauius febrientibus præbetur, & febre uacantibus magis, pondere drachmæ unius, radicibus nempe in aqua mullā leuigatis & aqua, his qui antē ieiunant: uel cum melle in forma catapotiorū. Sunt porro qui pulegium atro admisceant ueratro, aut saturiam, aut eorum quippiam quæ stomachum iuant, neq; diutius morantur, sed ocysime transeunt.

Scammonia.

30

Scāmōnia similes habet in purgādo helleboro uires, & uehementiores ad flauam bilem euacuandam. Sed omnium certe quæ purgatoriam uim habent, stomacho infestissima pestilentissimum existit medicamentum scammonia: Quocirca febre carentibus, stomacho nō imbecillis exhibeatur pondo obolorum quatuor cum sale, aut pipere, aut zingibere, uel aliquo stomachū iuante & celeriter transeūte, uel cum melle deniq;. Conficiunt etiam ex scammonia catapotia, adiecto gummi,

Colocynthis, Syluestris cucurbita.

40

Colocynthis meditullium, hoc est interius sacrum, bilem non instrenue quidem euacuandi uim habet, sed mucosa à sanguine, non eo quo ueratrum & scammonia modo, separat, atq; latera & neruosa purgat corpora drachmæ unius pondere, in melicrati cyathis duobus, si quis cum eo rutam decoxerit. Dissoluatur autem & maceretur diutius, quoniam asperitates ipsius, interaneas exulcerationes & neruales inducunt affectiones. Dari porro colocynthis utiliter potest dolentibus caput, uel ubi meninx tunicula fuerit, aut pericranium male affectū, uelut

& uertiginosis, heterocranicis, à dolore capitis commotis, sacro morbo, & syderatione languentibus, cynice conuulsis torturæ oris, diuturnis oculorū destillationibus, nō nisi recta ceruice spirantibus, longo tempore tussientibus, præterea arthriticis circa renes atq; uesicæ affectionibus.

Elaterium.

Elaterium paribus cum scāmonia uiribus euacuare potest: Creditur omnium probatissimū elaterium, quod uirescit & leuitatē habet, neq; antiquius uno anno est, pondo trioboli tritum cum lactis hemina una.

Tithymallus, Herba lactaria.

Tithymallus eadem planè facultate, qua uel elaterium uel scammonia to-
bilem prolicit atque educit. Exhibentur autem lactei eius liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta hordeacea trita & macerata: & celerrime epotæ, & contentæ in ore, linguam plerunq; & circumiacen-
tes partes contrahunt.

Lathyrides.

Lathyrides naturam habent & uim expurgandi, quemadmodum & ueratrū & scammonia: Dandæ sunt itaq; una dosi septem aut octo, & usq; ad quindecim ad summum: robustis nempe & multa egentibus euacuatione mandere præcipientes: imbecillioribus autem & malo sto-
macho præditis integras deglutire mandantes.

Peplium.

Peplij fruticis germina arida semper existentia, octo obolorum pon-
dere in aqua mulsa exhibita, bilem ad hellebori instar expellunt, fla-
tulentosq; spiritus bellissime dissipant atq; infringunt.

Agaricum.

Agaricum in euacuando cōpares colocynthidi uires obtinet, absq; di-
latione quidē operari incipiens, neq; admodū officit stomacho. Do-
sis agarici est drachmarū duarū pondus, triti & macerati in melicrato.
Esto præterea frugi agaricū candidissimū, ualde friabile, nō admodum
linosum, & teredinibus minime corrosum.

Iris Illyrica.

Iris illyrica similem purgandi prædictis facultatem habet, octo obo-
lorum quantitate in aqua mulsa propinata: cæterum potior est mini-
me antiqua, & teredinibus expers.

Centaurium minus.

Centaurium minus quoniam bilem mucumq; expurgat, coxendice
laborantibus peculiariter succurrit. Bibetur aut decoctionis cen-
taurij sesquidrachma, in aquæ cotyla una usque ad medietatis consum-
ptionem decoctæ.

Tragoriganum.

Tragorigani flores cum fructu duarum drachmarū pondo in aqua
mulsa potui dantur his, quibus & ueratrum: cæterum utiliores sunt
stomacho quàm helleborus, minus uero expurgant.

Chamelæa.

Chamelæa.

Chamelææ drachmæ quatuor in melicrati heminis duabus ad quartam usque partem elixg, similem helleboro purgandi uim obtinent. Sunt autem qui chamelææ & absinthij duplum, formatis inde pilulis deglutendum exhibuerunt.


Aristolochia, Malum terræ.

Viticulæ aristolochiæ fructus in mulso si potetur, modo colocynthidis corpus emundat.

Polypodium.

¹⁰ **A**Rida radix polypodij leuigata, cum mulso præparata, uel cum eo friata, eadem omnino quæ colocynthidis perpetrare consuevit.

Quæ atram bilem proliciunt & euacuant.

 Tram bilē expellentibus medicamentis utendū potissime in melancholicis, cōcitatis, iracundis, homines odio prosequentibus, uel in solitudinē secedentibus, in refectione opus habētibus purgatione, in autumno calido, in cōstitutionibus aridis parūq; musculosis.

Epithymon.

Epithymum præstantissimum est omnium, quæ atram bilem prolicere & euacuare nata sunt. Dandæ autem sunt drachmæ quinq; cum ²⁰ lactis hemina contritæ.

Epithymbron.

Epithymbrum, quod supra thymbram nascitur, haud secus quàm epithymum euacuat, nisi quod imbecillius est.

Pulegium.

Pvlegiū oxybaphi mensura in melicrato epotū, atram bilem deducit.

Tragoriganon.

Tragorigani heracleoticæ, hoc est nucis auellang tantundem, æqualem habet cum pulegio euacuandi facultatem, utrunq; aut aridum.

Alypon.

³⁰ **P**Rædictum est alypi semen purgandi uim habere per inferna atram bilem, pari eodemq; epithymi pondere, a diecto sale & aceto: cæterum interanea procliuiet (ut autor Dioscorides est) trahit. Est autem ut ego quidem arbitror, hodie alypias appellata. Offerendū id quidem quum res exigit, in mulso.

Parthenion.

PArtheniū consimiliter aridū in potu sumptū, eadem quoq; exhaurit.

Alysson.

ALysson cum sale haustum, non aliter quàm superiora expurgat.

Quæ pituitam exhauriunt.

⁴⁰ **V**Tendum est pituitudinis medicamentis in complexionibus frigidis, senio confectis, & hyeme, inq; languidis & flaccescentibus, & attonitis, corpore tumidis: in his quoque usurpanda sunt ea quæ pituitam euacuant, qui eiusdem humoris magnam uim in

uentre, uel in pectore & pulmone, uel in stomacho habent, & muliebribus denique fluxionibus, quinetiam his qui multa emungunt, & crassa excreant, cibumque horrent, & coxendice laborant, quum articulus uel mucosus, uel elephantiasti infectus fuerit, maxime uero aqua inter cutem laborantibus, quae appellatur anasarca.

Syrax.

Syracis candidi drachma una cum aequali resinæ terebinthinæ ponere pituitam euacuat. Oleæ radices corticis pondo drachma una cum uino seu aqua. Pyrethri oboli nouem cum aqua eundem humorē agunt. Lychnidis feminis drachmæ duæ, cyclamini radices drach. una cum hydromelite. Allij drachmæ duæ admixto melle. Chamæpitys leuigata & in globulis deuorandū exhibita. Squamæ Cypriæ drach. dimidia, cum resinæ tantundem in catapotijs deglutita, ualentius pituitam exhaurit. Daphnidis foliorum uiridum drachma una cum dimidia. Corticis radices syluestris cucumeris oboli duo. Ricini grana quadraginta. Crotones appellati, ad summam sinceritatem perpurcati eduntur, atque pariformiter agunt. Apij pondere dimidium quod circa radicem comestū est, quod quidam chamæraphanon nuncupant. Bdellij drachmæ duæ cum hydromelite. Commi autem peculiariter destillationibus oculorum accommodatum est.

29

Quæ aquam proliciunt & educunt.

Medicaminum quæ aqueum humorē educunt (quæ ὑδαρύγια Græci, quasi aquiduca dicas, appellant) usus est, tum in aqua inter cutem affectis, ascite scilicet hydropse laborantibus, tum in mulieribus quæ alio uexantur profluuiō, tum in his qui huiusmodi infestant fluidis, Cæterum aquagia hæc sunt. Lepidis Cypriæ drachma una cum mulso pota aquam prolicit atque educit. Acetum uero continuo sorbeat, ne uomitu ejiciat. Granum cnidium repurgatum & leuigatum cum melle desputato epotum, ne ingluuiem gutturue adurat, aquam educit. Præbeantur autem grana decem, uel quindecim, uel triginta: robustioribus uero 30 quadraginta. Euphorbij drachma una cum melle decocto pota, pituitam quidem, impensius uero aquam proritat atque deducit. Lonchitidis feminis oboli octo cum melicrato aqua agitant. Cneorū similiter aqua expurgat, cum farina potum. Cnici feminis drachmæ quinque simul leuigatae, coquantur cum psisana & sale modico, atque in eundem usum sorbentur. Guttæ ammoniacæ thymiamatis drachma una ex melicrato epota, aquagium est minime ficulneū. Quidam uero idem medicamentum quū poscam admiscuissent lienosis propinauerunt. Quin & sambuci radices corticis succus duarum unciarum mensura potus

cum uino, aquam proliciendū educendūque potesta.

40

tem obtinet. Hactenus de simplicium medicamentorum uiribus.

DE COM

Cataportia quæ conglomerantur ex aloë.

Anterioris colocynthidis farcti (quæ Græci *πρῶτον* uocant) partem sumito unam, succi absinthij, aloës, singulorum partem unam, scammoniae partes duas, redige cum aqua in pilulas quæ ciceris quantitatem æquent: quarum pro dosi exhibendæ sunt undecim.

Oxymel Iuliani.

Oxymel quod ad Iulianum refertur, accipit rutæ, origani, uniuscuiusque uncias treis, comæ thymi uncias quatuor, anethi sesquialteram, iridos unciam unam, mandragoræ radicis unciam unam & semissem, agarici uncias duas, tedarum pinguium uncias duodecim, cocci cni-
 dij uncias quatuor, lathyridum uncias treis, alypiadis tantundem, polypodij uncias duas, folij, costi, spicæ nardi, singulorum unciam unam, rheu pontici unciam unam & semissem, scillæ uncias treis, sambuci uirgultorū uncias treis, canopi, quod est sambuci corticis uncias treis, asari unciam unam, pulegij uncias treis, epithymi, ueratri, aceti, cuiuslibet uncias duas, sij unciam unam, ammonij, hyperici, cymini, uniuscuiusque
 10 unciam unam, anisi uncias duas, aceti xestam unam, mellis xestas quinque. Herbas in aceto per triduum macerato, deinde usque ad consumptionem plus quam dimidiati decoquēs, inijce mel, & ubi siccaueris adhibe lathyridas (quam nonnulli tithymallum nuncupant) & costum, & granum cnidium, & spicam nardi contritam & leuigatam, & si uideatur, post exactam concoctionem oxymel. Absoluta dosis est uncia una, uel pro cuiusque uiribus. Confert autem afflictionibus podagricis, & epilepticis, & quos crassus humoribus euacuare, & ab infarctu ac obturatione liberare oportet.

Purgatorium aquagium, quod Græci hydragogon appellant,

ex caryophyllo contextum.

Aniducum medicamen efficiunt, aloës, epithymi, caryophylli, grani cni-
 dij, petroselinij, rheu pontici, singulorum uncia semissis, euphorbij dioboli quatuor, mellis quantum satis est. Cuius confectionis
 30 deitur cochliarium unum.

Purgatorium ex rhodomelite Alexandri.

Sumito succi rosarum xestas duas, mellis xestam unam, scammoniae uncias quatuor. Dosis eius summa, cochliaria quinque: uel minima, cochliaria duo: media, cochliaria tria. Aliter: Accipiaturs mellis, rosarum succi, uniuscuiusque libra una, piperis drachmæ duæ, scammoniae
 40 drachmæ octo, mastiches drachmæ quatuor, & zingiberis drachmæ duæ. Aliud, quo ipse utor. Spicæ nardi, asari, epithymi, singulorum uncia semissem irrigato in aquæ cotyla per triduum, & moderate elixans, aquæ, succi rosarum xestam dimidiam confunde, mellis xestæ se-

missum, & ubi decoxerit ad concretionem & crassitudinem, sesquiu-
ciam scammoniae immitte.

Purgatorium ē malis cotonijs confectum.

MAlorum cotoniorum decoctorum unciae quatuor, piperis unciae
sex, scammoniae drachma una, mellis unciae quinque: quibus cōtritīs,
exhibe cochliarium unum, uel pro ualitudine ac robore cuiusq̃.

Medicamentum ē malo citrio salubre stomacho.

Corticis pomi citrij, & carnis libram unam, in aquae xesta una & di-
midia decoquito usq̃ ad tertias, deinde mellis xestam dimidiatā im-
mitte, atq̃ ubi probe decoxeris ad mellis crassitudinē, infere leuigata, lon-
gi piperis unciam unam, scammoniae assatae in fermento unciam unam.

Bucellatus catharticus.

Scammoniae coctae unciam unam, piperis & apij seminis, singulorum
diobolum unum, sceniculi, anisi, uniuscuiusq̃ unciam unā, mellis librā
unam, quum moderate assaueris, dato in condito unciam unam.

Oliuae catharticae.

Oliuae purgatoriae constant scāmoniae uncia una, piperis uncia una,
epithymi, cymini fricti, petroselinī, rutae foliorū, mentae uiridis, sin-
gulorum drachmis quatuor, laserpitij drachma una, palmularū, mellis,
cuiuslibet uncij quinque, aceti cotylis duabus, oliuarum salutarum xe-
sta una, fissilium uidelicet: quidam gari etiam symmetrū adijciunt. Do-
sis quinque, uel septem, uel nouem.

Pastillus purgandi ui praeditus.

Pastillus catharticus praeparatur ex scammoniae, euphorbij, singulo-
rum drachmis quatuor, folij drachmis duabus, piperis drachmis to-
tidem, mellis libra una. Dosis eius est uncia una.

Phusca cathartica, & stomacho grata.

Fusca purgandi uim habens accipit cymini, sceniculi, singulorum un-
ciam unam, pulegij, apij, anisi, uniuscuiusq̃ unciam dimidiam, epithy-
mi, scammoniae, cuiuslibet unciam unam, salis uncias duas. Datio expe-
dita & quam transgredi nefas est, sunt dioboli duo in posca: uerum non-
nulli etiam euphorbij grammata quatuor exhibent.

Vinum purgandi facultate praeditum in laborantibus hydrope.

Scillae unciae sumuntur tres, apij seminis unciae sex, piperis drachma
una, radicis capparis drachmae quatuor, grani cnidij cortice extiti
drachma una, folij malabathri pilulae duae, uini heminae duodecim, mel-
lis xestae tres: Conscinde in exigua frustula scillam, & irrigato cum ui-
no, reliqua uero leuigata misce.

Halatia purgantia.

Salis communis assati unciae sex, seminis apij, zingiberis, panis ari-
di, singulorum dioboli sex, anisi, piperis, uniuscuiusque drachma
dimidia, scammoniae, epithymi, cuiuslibet uncia una. Datio conueniens
cochliarium unum.

Podagrica ex hermodactylis.

Hermodactyli unciae tres, anisi, cymini Aethiopici, ameos, thymi, co-
rymborum, piperis candidi, zingiberis, uniuscuiusque dioboli tres,
epithymi uncia dimidia. Dantur conuenienter pro una quidem dosi,
dioboli quatuor, idque matutino tempore cum condito, siue melicrato, uel
si uidetur, cum zesta crato.

Aliter eadem purgans medela.

Hermodactyli uncia una, cymini Aethiopici, anisi, agarici, zingibe-
ris, singulorum dioboli sex, mastiches duo, spice nardi dioboli duo,
10 moschi ceratium unum, cnici dioboli duo. Dosis dioboli quatuor cum
hydromelo. Scammonia porro eo quod stomacho noxia est danamus.
Quod si aut copiosior euacuatio fuerit necessaria, admisce dationi com-
muni scammoniae ceratia tria. Exhibeto autem post lauacrum.

Catapotia ex Harmenico lapide conglomerata, quae in morbo arti-
culorum ut plurimum locum habent.

Aloes unciae quatuor, scammoniae unciae sex, agarici uncia una, epi-
thymi tantundem, lapidis harmenici dioboli duodecim, cassiae un-
cia una, spice nardi una, scillae assatae unciae duae, croci grammata duode-
cim, rhodomelite excipiantur. Datio eius dioboli duo.

Confectura ex coronopodio, conducentis iisdem quibus

& hermodactyli, & stomacho salubris.

Accipit zingiberis diobolos duos, piperis diobolum unum, agarici de-
cem, cnici interanei diobolos quatuor, coronopodii radices dio-
bolos sex. Datio dioboli octo. Ceterum si difficilior est aluus, ceratia ui-
ginti tria. Conducunt summopere septem aut octo adhibita uentri: &
post euacuationem ubi laueris, ouis nutrirī satis est.

Medicamentum ex succo Cyrenaico ad quartana laborantes.

Sumito succi cyrenaici, piperis, rutae foliorum, cuiuslibet drachmam
unam. Dosis est nucis Ponticae magnitudo.

Puls cathartica turgidis elephaniasi laborantibus eximie con-

ducens, & quibus commouere quis crassum & uis-

cidum humorem queat.

Colocynthidas duas amputando, semen euacuato, medullam uero si-
cens, impleto ipsas oleo dulci, & operculans proprijs operculis, si-
nito per diem ac noctem. Deinde autem oleo euacuato, colocynthidas
in aqua elixato, tantisper dum subigant: postea easdem abijce quidem,
sed oleo aquae permixto ueratri nigri triobolum infice, scammoniae dra-
chmam unam: decoquēs uero cum his puliculam ex similagine, uel pa-
nem aridum contritum. Post haec partem illius laboranti propinato, qui
40 frugali antea uictus ratione usus sit, quantitate nucum ponticarum, hoc
est auellandarum octo aut decem, uel ad summum quatuordecim: Et po-
tui aquam calidam praebeto.

De obseruatione eorū qui catharticū medicamentū sumunt, & quid faciendū
his qui in potione non purgantur. Cap. vi

IN omnibus, ut summatim dicam, qui strenuam & efficacem
purgationem sumunt, homini prius uictus rationem præscri-
bens, ieiuno, & ei qui probe concoxerit pharmacum præbe-
to, somnumq; usq; ad consummatam purgationē prohibeto:
motionem uero moderatam, si fieri possit, subire, & ab omni cibo potiq;
abstinere, quoad purgatio fuerit suo munere perfuncta, mandato.

Ex monumentis Philagrij.

AT qui si quis genium ad cōsummatam usq; purgationē cibo defra-
dari non sustineat, uel propterea quod os uentris ualde biliosum ha-
beat per longam inediam que præcessit, uel quampiam aliam istiusmodi
causam, dandus est ipsi ex aqueo uino panis, uel ex ptisana succus chon-
dri nondum inchoata purgatione, quo minus eam corrumpat, sed pro-
tinus à sumpta medicamenti potione: sic enim ad celeriore quando-
que motum pharmaci sua grauitate cooperatur. Si porrò quispiam post
sumptam medicinarum potionem non purgatur, nec euacuatur, si nul-
la quidē inde ingruat molestia, nullo auxilio opus est: Sin autem urgea-
tur propter morbi uehementiam, aut dilanietur, distendaturq; & quasi
dissecetur languens, clysterem confestim iniicere necesse est. Quod sine
tum quidem obtemperet alius, corpore quidem uellicato, & tanq; per-
uerso, lauandi sunt ungendiq; assatim. Quod si autem corpus reuer-
atq; grauatum fuerit, sanguinem uena secta detrahe, potissimum si homo
sanguinolentus existat, oculosq; rubeo colore infectos, & petulantes,
exertos ue non secundū naturam, sed ex aduentitio propter epotum me-
dicamentū habeat. Si horum uero nihil, morsus autem & laniatio infe-
stet, à balneo quamprimū nutrito, & uinum liberaliter & prolixius pro-
pinato: atq; inter hæc clysteribus utere, nisi dolores placati sint, & de-
nuo lauato. Esto autem oleum clysmatis rutaceum, uel ex alio quocunq;
flatus extinguente præparatum.

De his qui plusquam expediat purgantur. Cap. vii

Qui immodice plus iusto perpurgantur, eorum cutis perfican-
da est, lauandiq; calido ante balneū, exhibendo uinum tene-
rum, & flauū: extemplo namq; uinū huiusmodi ad digestio-
nem concitat: panem item maceratū, & malā Punica. Perseue-
rante autem his etiam peractis purgatione, uincire membra fascijs à sum-
mo deorsum distributis & constrictis expedit, & recuperantibus ali-
quid tum sanguinis tum spiritus. Propinato præterea ex carnibus con-
fectæ theriacis symmetrū, pellit enim in cutem, & celeriter reuellit in al-
uum humorum delationem, hebetatq; id quod in purgatorio tanq; ue-
nenosum & medicamentosum existit: qua deficiente theriacis pastillis,
præterea confectione *Anticathartica*, & ea cui cognomen est Philo-
nium; cucurbitulis ad hæc secundū stomachū utendum. Cataplasmatibus
item

item contextis ex farina hordeacea & cenomelite : Post quæ astringentia sequantur epithemata. Præstantissimum porro auxilium præstant totius corporis frictiones, & pharmacorum potiones. Ad hæc aërem non modo frigidum, sed admodum etiā calidum uident cane peius & angue : ille enim materiam ab exterioribus pellit ad interna fluxum, quæ adauget, hic uero distrahit & uires dissoluit. Quod si autem propter extorum irritantium uellicationē augeatur euacuatio, cataplasmatibus instar impone prædicta. Immittantur pariter quæ retūdendi & hebetandi uim obtinent : Adeps anferinus, uinū dulce, nardus, & id genus alia.

De sacris antidotis, quas græce hieras dicunt.

Cap. VIII

Hiera Antiochi.



Ccepit Sacra Antiochi trixaginis, agarici, colocynthidis interanei, stœchados, singulorum drachmas decem, succi panacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ clematidis, piperis candidi, uniuscuiusque drachmas quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglitidis, croci, foliorum, cuiuslibet drachmas quatuor, mellis quantum satis est. Alia: Colocynthidis intranei drachmæ uiginti, scillæ tostæ, agarici, guttæ ammoniaci thymiamatis, corticis ueratri nigri, scammoniae, hyperici, singulorum drachmæ tres, epithymi, polypodii sicci, bdellii, aloës, trixaginis, marrubij, cassiæ, cuiuslibet drachmæ octo, myrrhæ troglitidis, opopanax, sagapeni, piperis communis tum proceri tum candidi, petroselini, cinnamomi, croci, castorei, aristolochiæ longæ, uniuscuiusque drachmæ quatuor, mellis quantum res ipsa postulat.

Hiera lusi.

Sacra quæ ad Iustum refertur medicum, constat ex epithymi drachmis duodecim, marrubij, stœchados, trixaginis, hellebori atri, scammoniae, agarici, piperis longi, scillæ assatæ singulorum drachmis sedecim, euphorbij, colocynthidos interanei, aloës, croci, gentianæ, petroselini, guttæ ammoniaci thymiamatis, sagapeni, uniuscuiusque drachmæ octo, opopanax, polij, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, floris rotundi odorati iunci, pulgæ, cuiuslibet drachmis quatuor, aristolochiæ cum longæ tum rotundæ, singulorum drachmis duabus, mellis quod satis est. Dantur iusta dosi graminata duo, aut tria, aut quatuor, cum melicrato & salibus.

Hiera Galeni.

Habet Sacra Galeni trixaginis, piperis longi, piperis albi, stœchados, ueratri nigrioris, scammoniae, spicæ nardi, scillæ assatæ, & (ut quibusdam placet) epithymi, uniuscuiusque drachmas sedecim, myrrhæ, croci, guttæ ammoniaci thymiamatis, euphorbij, cuiuslibet drachmas octo, quæ cuncta melle excipiuntur.

Hiera Rupi.

Rupi medici Sacra habet sicyoniæ siue colocynthidos interanei drachmas octo, trixaginis drachmas decem, sagapeni drachmas octo, petroselini drachmas quinque, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singu-

lorum drachmas quinque, cinnamomi drachmas quatuor, uel cassiae drachmas octo, spicae, croci, polij, myrrhae, uniuscuiusque drachmas quatuor, mellis quantum satis est.

Archigenis Hiera.

MArrubij, agarici, trixaginis, colocynthidis medullae, stoechados, singulorum drachmae decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiae rotundae, piperis albi, uniuscuiusque drachmae quinque, cinnamomi, spicae nardi, myrrhae, polij, croci, cuiuslibet drachmae quatuor: arida simul contunde & attamina: succum uero panacis atque sagapenum, myrrhamque, fracta in pila, melicrato per noctem unam infunde, deinde leuigato & extenua, atque iniice arida, & interposito tempore melle optimo in uitreum aut plumbeum uas reconde: Hic sane modus communis est omnibus hieris. Dosis eius ad summum drachmae quatuor: assumantur etiam salis drach. una, mellis heminae duae, aquae quantum satis est. Quod si purgatorium scammoniam non habens efficacius reddere uouerimus, admiscendus etiam ipsius est obolus.

Perunctiones sedis & umbilici, purgantes. Cap. 1X

Vngentum quo sedes peruncta pedibus proritat: Ruta melle conteritur, ita quidem ut unus succus efficiatur, atque in intimum ani illinitur: efficacissimum autem fuerit, si momentum cymini, & nigri, uel cyclamini succi adiiciatur. Porro id quoque unguentum crocydi, hoc est floccis exceptum sedi ad laxandam aluum inferitur: Vel glanis affabre cum melle facta inditur, flatus enim egrediuntur sufficientes, leuanturque male affecti.

Diactrisma sedis quod uentrem mouere dicitur,

& oletare faciens.

ALumen cum melle leuigatum decoquitur donec rubescat, atque cum hoc inungitur sedes: prompte nanque multa quidem, non tamen citra laborem extorquet.

Epomphalon aluum subducens.

Cyclamini (quae Latinis rapum, aut terrae umbilicus est) drachmae quatuor, nitri drachmae tres, hellebori nigri, & candidi, uniuscuiusque drachmae duae, colocynthidis drachmae tres, scammoniae drachmae duae, elaterij succi drach. quatuor, grani cnidij drachmę totidem, nucum pinguium unclae duae, fellis taurini uncia una.

Elaterij, lathyridum, galbani, cyclamini, hellebori nigri, singulorum drachmae quatuor, colocynthidis interanei drachmae octo, cucumeris syluestris recentis, scammoniae, grani cnidij, uniuscuiusque drachmae duae, tithymalli drachmae dug, resinae terebinthinę drachmae tres: Haec accurate contusa felle taurino excipe, & perinde atque ungento utere. Quidam uero adiectis insuper cerae drachmis septem, & oleo cucumerino sufficiente, ad morem emplastri re postulante imposuerunt.

Medica

Medicamenta uomitoria, & modi helleborismi.

Cap. x



Omitionibus non tam secunda ualitudine fruenter nimia alimen-
ti humorum uel copia grauati utantur, quam morbis op-
pressi acutis, quum à pituita uel id genus aliquo infestantur.

Cæterum neq; sospites, neq; grauiter languentes uomitorijs
medicaminibus prolicere uomitiones consultū ac tutum est, sed in ægri-
tudinibus diuturnis, præsertim cum scirrho coniunctis, & quæ ualidiore
opus habent cōmotione: Verbi causa, podagra, comitialibus à stoma-
cho prouenientibus, elephante, aqua inter cutē, melancholia, atq; id ge-
nus alijs. Aduersantur uero sanguinis expuitionibus, & malum stoma-
chum habentibus, & qui suffocantur. Expeditissimum itaq; promptissi-
mumq; omnium quæ uomitū prouocare & educere solent, censetur oleū
cyprinū, irrigatis in eo uel digitis, uel pennis, & in gurgulionem inser-
tis, & radicū spicæ nardi drachmæ septem melicrato potæ, per super-
na purgāt ualentius: & betonica drachmæ quinq; aut sex in aqua mul-
sa potæ: & daphnoidum folia uiridia tria, macerata & comesta: necnon
& elaterij obolus in aqua potus per uomitum cum pituitam, tum bilem
exinanire consueuit: idem præstant uuarum passarum grana quindecim.
cum mulso crassiore. Bulborum porro, & sculentū quidem crudi deuorati,
uomitorijs uero cum narcisso decocti per superna euacuant: & apij radi-
cis id quod ad aërem est comestum, consimiliter uomitum cit, appellant
autem nonnulli idipsum chamæraphanum: uniuersa uero radix comesta,
tam per superna quam per inferna agit. Raphani in super prædictis mi-
nus quidem uiolenter, sed maiore emolumento expurgant: oportet aut
eisdem acres admodum & recentes adhuc, in pertenuia frustula secare,
& madefacere: uel tribus horis in oxymelite maceratos accipiant quan-
tum possunt, uomētes ter aut quater à coena, semel uero ieiuni. Sæpe etiā
numero absorbeāt oxymel. Cæterū per duas horas inambulantes tepi-
da aqua epota, digito uel penna immixtis gutturi, uomitiones irritent.

Quæ citent
uomitum.

Quibus dandus sit helleborus, & quibus non.

Veratrum porro exhibendum est diutinis pariter & grauibus ægri-
tudinibus correptis, ubi reliquorum adminiculorum spes sublata
fuerit, quū omnibus morbus superior medium unguem porrigat. Of-
ferendum idcirco iugiter aqua inter cutem laborantibus, elephantien-
tibusq; cachexia item, paralytiq; & id genus alijs languoribus correptis,
& in his affectionibus, quæ per circuitum temporis paroxysmū habent:
cuius generis est epilepsia, podagra. Quum autem complures sint hel-
leborismi rationes, simplicior quidem præparatio, & magis ad hellebo-
rismum idonea ratio, hæc est.

Præparatio raphanidum ex helleboro.

Concinnentur autem raphani hoc modo: cōpungendo prius rapha-
nidas, quas quidam radículas uocant, calamo: hellebori albi optimi
radicū segmina experiri stimulis oportet, & ubi ea per noctem integrā

Hellebori decoctio.

manferint, fequenti die auferant, ipfas uero raphanidas fruftulati-
 cis cum oxymelite manducandū ciendi uomitus gratia exhibeto mo-
 do prædicto, procliuiori uidelicet ad uomitus languenti: & interpoſitis
 memoratis horis ad uomendū cogito. Helleborifmi porro modus pri-
 uatim ac proprie ſic habet. Veratri optimi uncias duas in aquæ hemina
 prius diebus quinque maceratas, donec aquæ pars tertia relinquatur deco-
 quito: expreſſo deinde helleboro, aquæ tantundem mellis admifceto,
 coque denuo tantisper dum craſſitudinem induat: et ubi ſe ad ciendas
 uomitiones præexercitauerint, laboranti ieiuno, & ei qui probe conco-
 xerit, & qui per inferna uel ſua ſponte uel per clyſterem excernit, ad de-
 monſtratum antea modum præbeto ſemel atque iterum, pro patientis uir-
 tute & robore.

Qui ſit optimus præparandi modus hellebori.

Hellebori decoctio ſumptis quando operetur.

Efficaciſſimus uero omnium modus eiſmodi eſt: Incidendo ueratri
 radices in quantitates ſeſamis æquales, nam in puluere contuſæ ſuffo-
 cationes efficiunt magna efficacia: In imbecillioribus quidē cum ſucco
 ptiſanæ aut haliæ, aut id genus aliquo duas drach. ad ſummū, ad mini-
 mum autē drach. unam ueratri elixans, potui dato: In robuſtionibus ue-
 ro in aqua calida ſiue mulſo. Incipit aut helleboro irritata purgatio poſt
 treis aut quatuor horas: at qui lentius inchoant, melius purgantur. Cum
 ſtantibus autem nimium uomitibus, melicratum potui exhibens ad uo-
 mendum impelle, irritando immiſſione pennarum in oleo infectarum:
 quod ſi ne tum quidē euomat, in balneum ita habens abducendus eſt.
 Cæterum ubi eicere iam per uomitionē auſpicauerint, ſi quidem ſecun-
 dum rationem fuerit euacuatio, nihil afficiuntur uomentes: ſin autem an-
 gantur & conuellantur, hydreleum potui dato: pariterque per inferiorem
 uentrem ipsis ſubducendi hoc modo uis quædam accedit, & alioquin in
 his qui helleboro utuntur, quandoque medicamine etiam accedente, accu-
 mulationem longe facilius egerunt. Porro eos qui animo deficiunt, odo-
 ramentis atque his ſimilibus refocillato, atque alijs quæ plerumque ſuper-
 ueniunt ſymptomatis conſimiliter ſuccurre. Quum autem purgatio im-
 modica ſit, non alere modò, uerum ſomnum etiam conciliare expedit, &
 alia, quemadmodū de his qui nimium purgantur explicatum eſt, agenda
 ſunt. Perſiſtente autē eadem, cucurbitula præter hæc ſtomacho applican-
 da, membraque ſunt uincienda. Si ſecundum rationem fiat euacuatio, me-
 licrati ipsis potandum ſymmetrum exhibeto, quo abluantur pharmaci
 excrementa, & paulò poſt cibus coctus facilis eſt offerendus. Cæterum
 in his, quorum ualetudo ſuſpecta eſt, euacuatione per os, egentibus autē
 omnino helleboriſmo, Antyllus uſus eſt eiſcemodi quoſiam lauamine,
 irrigando ueratri candidi drachmas duas in aquæ xeſta una, & ſinendo
 manere per diem ac noctem, poſtera die ueratrū ad dimidiatum uſque in
 aqua decoquendo, deinde hanc immittendo per ſedem, quo uomitione
 ſuprà purgat, parū imbecillius hellebori potionē, ſam uero poſt exactā
 ſufficientem

sufficientem purgationē, glandem acrem apponentes irriteremus egestio-
nem, ita quidē ut infusum reddatur, & uomere desistant: Post deiectionem
aquam mulsam semel aut bis pro ablutione intestinorum immittere-
mus. Idem uero tradit, glandem ex helleboro candido contuso & cri-
bellato, deinde melle despumato excepto concinnatū, pari modo supe-
riorem aluum, quemadmodū & clyster ex ueratro confectus, purgare:
Verum præ omnibus alijs cōmendatur, multisq; præconijs effertur hic
præparandi modus: nobis enim reponere & quasi in futurum rejicere
purgationē licet. Pondus igitur esto hellebori drach. duæ, circumlinia-
tur uero aut circumligetur stappa solidiore balanus, principiumq; stup-
pæ foris per sedem recipiatur, ut post sufficientem purgationem foris de-
ferat nobis glandem: hic sanè tropus expurgat ad unguem & exactissi-
me, neq; tamen uel strangulatum, neq; aliquid aliud periculi infert.

De differentia antidotorum. Cap. x1

Præfatio Galeni de antidotis.

E Acutates quibus morbis succurritur, non quæ extrinsecus
imponuntur, sed quæ intro in corpus sumuntur. Prisci antido-
tos appellabant, quarum treis enumerant differentias: quæ-
dam enim letalium medicamentorum gratia offeruntur: quæ-
dam propter feras ictu morsuue uirus iaculantes: quædā deniq; affectio-
nibus ex praua uictus ratione prouenientibus opitulantur: nonnullæ
uero treis commoditates promulgant, è quorum numero etiam antido-
tus quæ theriaca uocatur, esse creditur.

Hedychros in theriaca præparatio.

A Spalathi radicis corticis, calami odorati, costi, a sari, xylobalfami,
aphu, maioranæ, mastiches, singulorum drachmas sex, fructus bal-
fami drachmas duas, mari drachmas sedecim, floris rotundi iunci odo-
rati drachmas duas, cinnamomi drachmas uingintiquatuor, amomi, cas-
siæ, rhei, uniuscuiusq; drachmas octo, nardi Indici, folij, cuiuslibet dra-
chmas duodecim, myrrhæ drachmas uingintiquatuor, croci drachmas
duodecim, uino bono excipe, & redige in pastillos, succū balsami (quod
opobalsamum dicunt) contundens.

Pastillorum scilliticorum præparatio.

P Astillos quos scilliticos appellant, hoc modo confice: Scillam argilla
seu adipe obducto, & moderate elixato, sumendoq; interanei ipsius
partes duas, & farinæ orobi partem unam, contere, & cōsimiliter pastil-
los concinnato.

Pastillorum theriacalium præparatio.

P Astillos theriacos cōcinnaturus, sumito uiperas quatuor aut quinq;
perfuluas, recens admodum captas, amputa ipsis circa caput & cau-
datenus partem utrinq; quatuor digitorum mensura, detractisq; squa-
mis omnibus, & exemptis interaneis, reliqua in aula noua addito sale
& anetho mediocri coquenda sunt, tantisper dum spinæ à carnibus se-

parantur, deinde eximēs, & à spinis exacte carnes repurgans, admiscendo eis tantundem panis puri, & dissoluendo pariter semel reformato, & orbiculos opoballami accende, & frigefacito in umbra.

Theriaces antidoti præparatio,

Theriaca antidotus conficitur ad hunc modum: Pastillorum scillitarum drachmas quadraginta octo, pastillorum theriacalium drachmas uigintiquatuor, unguinis hedychroi drachmas uigintiquatuor, cinnamomi, piperis communis, succi papaueris, uniuscuiusq; drachmas uigintiquatuor, rosarum aridarum drachmas quindecim, purgamentorum alij, napi seminis, iridis Illyricæ, agarici, glycyzises, succi balsami, singulorum drachmas duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rhei pontici, radices quinquifolij, nepitæ, floris iunci rotundi odorati, petroselinæ, stœchadis, costi, piperis candidi, & longi, dictamni, florum thuris masculi, resinæ terebinthinæ, mastiches, cassiæ nigræ, spicæ nardi, florum polij, styraçis, apij, seminis seseleos, thlaspeos, ammeos, trixaginis, succi hypocistidis, malabathri, nardi Gallicæ, mei, gëtiænæ, anisi, sceniculi seminis, Lemniæ sigillatę, chalcitidis assæ, amomi, acori, balsami, phlopi, hyperici, acaciæ, commeos, cardamomi, singulorū drachmas quatuor, seminis dauci, galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castorij, centaurij, aristolochiæ clematidis, cuiuslibet drach. duas, mellis Attici libras decem, uini phalerini xestas duas: Mittens in mortarium opium, hypocistida, myrrham, sagapenum, styraçem, acaciam, opopanacem, instillans mellis pusillum, et cōtundens dissolue: postea uini tantum infundendo, ut id cætera superet, per triduum ita macerato, mox reliquas species frustulatim incisas contunde, & mel despumato. Reponitur autem in uase argenteo aut uitreo non admodum referto, & circumquaq; operculatur. Cæterū usus ipsius, si quidē nihil cunctetur, in ferarum moribus commendatur, uenenisq; sumptis post septennium ponticæ nucis quantitas cum uini cyathis tribus bis in die pota: Pariformiter etiam his qui citra manifestam occasionem periclitantur, corporis corruptione letalis medicamenti qualitatem imitante, ueluti in pestilentialibus plerunq; accidere consuevit, semel in die. Porro in alijs affectionibus usus ipsius est, à decennio ad annum uigesimalium usque. Contra tussis autem, & pectoris pulmonisq; dolores seu lateris, febre quidem carentibus cum cœnomelite, febricitantibus uero cum hydromelite subnotem fabæ Aegyptiæ magnitudo magnopere conducit. In sanguinis insuper eiectionibus cunctis recentibus, in posca utilitate magna præbetur: diuturnis uero in elixatione consolidæ, fabuli Aegyptij quantitas, tum matutino tum uespertino tempore: Inflatis autem, & his qui circa umbilicum torminibus infestantur, aut eccliacis, mane in aqua calida eiusdem fabæ quantitas. Appetentiam præterea prostratam reuocat & excitat: Rigore adhæc, algoreq; accessionū intenso, uomitioneq; bilis præpota theriaca liberat. Menses porro cit, & foetus mortuos expellit, fabæ

In quibus utitur
theriaca.

fabæ Aegyptiæ magnitudo cum melicrato, uel passo, in quo ruta atque dictamnus elixa sit, pota. Aduersus autem extremam raucedinem cum seorsum per se, tum addito tragacanthæ duplo, ex cenomelite aut passo sumpta, retentaq; sublingua & colliquata, lienosis & iocinorosis iuxta cum posca præbetur. Quod si quis scirrho infestetur, cum oxymelite uel aceti scillitici sesquicyatho. Datur nephreticis, hoc est renum incommodis oppressis cum oxymelite fabæ Aegyptiæ magnitudine: dysentericisq; cum decocto rhu, tam mane q; sero. Medendis præterea uisus habitudinibus, quas Greci *ἐκφυσις* dicunt, summum præsidium confert.

- 10 Antidoti itidem & opobalsami uncijis duabus mellis cyathum miscens, paulatim illinito: exerit porro dentes. Pleriq; uero præseruationis gratia fabæ græcæ instar theriacam circa neomeniam sumunt, quum iam coëctrix facultas probe officium peregerit, cum mellis cochliario uno & aque cyathis duobus. Pari quoq; modo circa opodemian eadem utuntur, ubi pestilentes quaspiam auras olfacere suspicantur, uel ubi aquæ fluunt.

Sal theriacum.

AD mithridatium in præsens sales theriaci ordinandi sunt: comprehenduntur autem in calce septimi uoluminis, post ea quæ de mensuris ac ponderibus tradidimus.

Mithridatidis ex scingo.

- 20 **M**Yrrhæ trogloditidis, zingiberis, cinnamomi, singulorū drachmæ decem, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, opobalsami, floris rotūdi iunci odorati, costī, stœchadis, seseleos, galbani, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorij, hypocistidis, styracis, malabathri, foliorum, uniuscuiusq; drachmæ quatuor, cassiæ nigræ, polij, piperis candidi, scordij, seminis dauci, carpobalsami, cipheos, bdellij Celtici, cômeeos, petroselinij, opij, cardamomi, seminis fœniculi, gentianæ, foliorum rosarum, cuiuslibet drachmæ octo, dictamni, anisi, acori, phu, singulorū drachmæ tres, mei athamantici, acaciæ, uentris scingi, hyperici seminis, uniuscuiusque
30 drachma una cum dimidia, uini mellisq; quod satis est: præparato instar theriacæ, inquit Galenus. Ad quæcunq; illa conducit, ad eadem hanc quoq; prodesse idem asserit, præterquā ad uiperæ morsus: ad hos namque illa efficaciores uires obtinet.

Confectio ex sanguinibus confecta, ad omnia quæ uirus eiacculantur, & ad letalia medicamenta.

- A**Ccipit hæc confectura piperis cãdidi, & longi, costī, acori, phu, anisi, dictamni Cretici, singulorū drac. duas, amomi, opobalsami, seminis rutæ syluestris, fœniculi seminis, cymini æthiopici, anethi, sanguinis masculi anatis aridi, sanguinis hœdi, sanguinis anserini, fœminæ anatis sanguinis, buniadis syluestris seminis, uniuscuiusq; drac. ij. gentianæ radice, trifolij, floris iunci odorati rotūdi, libanoti, rosarū aridarū, cuiuslibet drach. iiii. cinnamomi drach. duas, scordij drach. octo, petroselinij, polij, myrrhæ, nardi, singulorum drachmas sex, cassiæ drachmas treis,

fucci cyrenaici drachmas treis, stoechadis drachmas quinque, asari drachmas duas, guttae ammoniaci thymiamatis drachmas treis, mei Arhamantini drachmas duas, agarici tantundem, carpobalsami grana uigineti, mellis despumati quantum res ipsa postulare uidetur.

Oxymel, hoc est acetum mulsum, simplex.

Oxymel, cui cognomentum simplex, constat ex acerrimi aceti canididi xesta una, aquae xestis duabus, mellis xesta una: quae ad mellis usque liquidioris crassitudinem & concretionem decoquenda sunt, despumando subinde mel.

Acetum scilliticum.

Habet acetum scillite, scillae candidae in minutias concisae, & in umbra diebus quadraginta exsiccatæ, & rursus purgatæ minas sex, aceti boni xestas xij. finito dies sexaginta, operculatoque uase ponito sub sole: quibus transactis scillam expressam abijce, acetum uero excolatum in uase reponito. Quidam uero scillae minam unam in aceti xestis sex, alij aut uiridis scillae idem pondus in acetum recondunt, etiam usque ad minas sex, atque adhuc acutius. Prodest aut acetum illud ad oris fluxiones, si eo coluantur, & ad multa mala interanea, quae ex hulceratione uacant, potum. Caeteris itidem compluribus acetum scilliticum subuenit.

Oxymel scilliticum.

Oxymel scilliticum accipit scillae interaneorum mollium libras duas, aceti acrioris albi xestas quindecim, piperis, petroselini Macedonici, singulorum uncias duas, dauci Cretici, ammeos, anisi, nardi Gallicae, lybistici, asari, cardamomi, spicae nardi, amomi, rheu pontici, uniuersumque semissem, fœniculi, feminis cymini, laserpitij, zingiberis, pyrethri, hyssopi Cretici, costi, pulegij, cuiuslibet unc. unam, mentae uiridis fasciculum unum, rutae uiridis teneriores caules quinque, mellis Attici xestam unam, hepsenatis xestas duas, apij uiridis fasciculū unū: interanea scillae candida concisa coniice in acetum, & per dies septem sub ardentissimo canis aestu macerari finito: deinde scillam subleuans, arida quidem iam concisa, uiridia uero integra aceto inferre, & post septem dies rursus omnia extrahens, aceto immitte mel cum hepsenate, quibus decoctis usque ad crassitudinem, in uasculo uitreo reconde. Vtere autem eius praesidio cum ante prandium, hoc est ieiunus propinationis loco, tum sumpto cibo, ueluti in balsamento: nam multo utilissimum est.

Medicamentum Galeni est scilla contextum, comitali morbo oppressis in primis conducibile.

Scillam manibus in puluerem friatam uasi Melitæo injice, strenueque operculans in locum ad meridiem uergentem sub ardentissimo canis aestu siste: post quadraginta inde dies canis, summam eius superficiem soluens, corpus scillae effluxisse offendes. Auferes itaque succum ipsius condulcatum melle praestantissimo, comitali laborantibus singulis diebus cochliariū unū praebeto: pueris quidem parū: adultis uero liberalius: atque

atque scillæ ipsius substantia leuigata cum melle, cochliarium exhibeto. Secundum uero locum potentia hoc obtinet.

Philonis antidotus.

Antidotus quæ ad Philonem refertur medicum, constat ex piperis albi drachmis uiginti, alterci drachmis octo, succi papaueris drachmis decem, croci drachmis quinque, pyrethri, euphorbiæ, spicæ nardi, singulorum drachma una, mellis Attici, uel alius boni despumati quantum satis est. Dato adultis nucis auellanæ (quam ponticā dicunt) quantitatē, minoribus natu fabuli instar, pueris ciceris magnitudinem. Est autē hoc maxime indolorium & somnum concilians medicamentum.

Athanasia anodyna. Pleurentica Oribasij.

Athanasia (quæ ab immortalitate nomen sortita est) dolorem costalem placans, conflata est ex cassiæ drachmis octo, spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi, singulorū drac. iij. mellis despumati quod satis est. Dosis eius cum Philonis antidoti datione coniungit.

Antidotus ē duobus piperibus, uiribus athanasie consimilis.

Διὰ τοῦτο *recipit* cardamomi, castorij, opij, uniuscuiusq; drac. iij. myrrhæ, costi, piperis tū longi, tū cādidī, galbani, cuiuslibet drac. treis, croci drac. totidē, excipe melle decocto, quantitatēq; fabæ exhibe.

Διὰ τοῦτο hoc est ex capitibus papaueris, & elixatione contextum medicamentum.

Capita papaueris uiridia in aquosa octo aut decem decoquito ubi suspenderit diem unū, & glycyrizæ unciam unam macerata in decoctionis xesta una simul elixato quoad liquefiant, atq; quamprimum meridiocrem induerint crassitudinē, remouens ab igne reponc. Vtere in his qui febre oppressi uigilijs infestantur, & quando ex capite tenuis in pectus se insinuat fluxus.

Διὰ τοῦτο id est ex papauerum capitibus, & melle confectio.

Papauerum capita, & glycyrizæ unciam unā (quemadmodum prædictum est) cocta in aqua pluuiæ siue fontana, mensura xestæ unius usque ad colliquationem, & ubi expresseris, proijce in decoctum mellis xestam dimidiam, & elixans ad concretionem atq; crassitudinem. Dato his qui cum dolorum mitigatione, somni conciliatione, ad hæc amplius perpurpatione & absterfione humorum pectoris, & eorum qui pulmonem infestant atq; renes, opus habent.

Diacodium compositum.

Aquæ in qua papauerina capita decocta sunt, iuxta memoratā cōuenientiam xestam unam, uini passi heminas duas, mellis librā unam, croci, succi hypocistidis, singulorū drach. quatuor coquito ad spissitudinem. Stomacho autē salubrior ea est confectio, si ex melle conficiat, & capitū papauerinorū decocto, & malorū coroniorū: Efficacior autē multo euadit, si cum capitibus papaueris aqua melilotū et glycyrizā decoquas,

Διά μαρρίσις τελευτήρ, hoc est ex marrubio linctus, siue ut uulgò dicunt, electuarium, phthisicis in primis conferens.

Marrubij comarum libram unam in aquæ cotylis sex donec tertia pars relinquatur elixās, herbam quidem porrige cito, inijciendo aut aquæ mellis crassitudinem, exhibe cochliarium unum.

Διάπρασις συνθητόν, id est ex marrubio confectura composita.

Marrubij comæ, ireos Illyricæ, hyssopi, pulegij, glycyrizæ, apij, singulorum uncias duas, ischadum pinguium uncias treis, nucleipinei resinati uncias treis, contunde obiter: arida cum ischadibus in aquæ xestis tribus irrigato, & coquito ad tertias: deinde aquā colans, mellis 19 libras duas infunde, & ad melleam crassitudinē decoque.

Διά ιερώνυμον, hoc est medicamentum ex cruvis.

Amygdalorum amarorum uncias duas, farinæ erui uncias quatuor, hyssopi tantundem, ireos uncia semissem, nucleorum pineorū frictorum uncias duas, mellis xestam unam, uel quantum res exigit.

Medicamentum, quod Διοσκουρίδης inscribitur.

Ireos Illyricæ uncias quatuor, eruorū tantundē, hyssopi uncias duas, seminis urticae, glycyrizæ, scenogræci, uniuscuiusq; uncias duas, bulborū unc. quatuor, seminis lini fricti uncias totidē, nigellæ, quod græce melanthion dicunt, diobolos duodeuiginti, pulegij grāmata sex, nucleo 20 rum pineorū tostorum unc. ij. piperis grāmata sex, mellis quod satis est.

Antidotus Sotira, quasi seruatrix dicas.

Spicae nardi diobolos undequadráginta, myrrhæ diobolos uiginti septem, croci diobolos totidem, castorij diobolos duodequadráginta, opij diobolos triginta sex, petroselini diobolos quadráginta quinque, anisi octo, apij septem, iunci rotundi odorati florum diobolos triginta sex, cassie diobolos duodecim, piperis longi tantundem, seminis linonis grāmata sex, styraçis grāmata octodecim, amomi duodecim, hedychroi, costi, asarci, singulorum grāmata duodeuiginti, mellis quantum satis est.

Διά στυρακίς bechicæ, hoc est medicamentū ex styraçe, tussi medendo utile. 30

Amomii, cassiæ, singulorum uncias duas, styraçis, spicae nardi, uniuscuiusq; sesquiunciam, croci, piperis albi, cuiuslibet unciam unam, mellis xestam unam: detur cochliarium unum.

Medicamentum ex collectaneis Philoxeni, cuius usus est in Empyicis, & diutinis rheumatibus obnoxijis.

Resinae terebinthinæ drachmas octodecim, nardi drachmas sedecim, myrrhæ stactes drach. sex, cardamomi, bulborū, uniuscuiusq; drach. sex, croci drac. xij. galbani drach. sedecim, amygdala amara octoginta, mellis heminam: ex aqua potatur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

Eisdra πολύχρως, hoc est quæ multis affectibus congruit, est enim ex eorum numero, quæ nimium siccificant.

Amomii scrupulos sex, croci scrupulos duodeuiginti, seminis dauci sesquiscrupulum, seminis sceniculi scrupulos treis, cassie scrupulum unum

unum & dimidium, florum iunci rotundi odorati scrupulos quatuor & semissem, cinnamomi scrupulos treis, succi hypocistidis scrup. quatuor & dimidiū, sulphuris uncias quinque, seminis papaueris scrupulos quinque, pyrethri scrup. treis, petroselini scrupulū unū & semissem, ireos lilyricæ scrupulos septem & semissem, herbæ Apollinaris seminis scrupulos tredecim & dimidiatū, spicæ nardi scrupulos septem & dimidiū, pegani seminis scrup. unum & semissem, anethi scrup. treis, cardamomi unc. treis, rosarum exiccatarum scrupulos quatuor & dimidiatū, nerij floris scrupulū unum cum semisse: Est aut ueluti lobus ac siliqua unde
 10 oritur rosa: rhododaphnes, & rosæ ipsius singulorum scrup. tres, rheu, gentianæ, uniuscuiusque scrupulos sex, hedychoi ungenti sesquiscrupulū, tragacanthæ scrup. quindecim, lycij sex, foliorum citri tantundem, seminis ocimi scrupulū unū cum dimidio, anisi scrupulos tres, costi, myrrhæ, cuiuslibet scrupulos sex, bdellij sedecim, succi artemisiæ tredecim, rhu Syriaci uiginti quinque & dimidiū, asari, uetris mergi, lapidis iaspeos, singulorum scrupulos treis, piperis scrupulos quindecim, castorei sesquiscrupulū, cretæ cimolizæ scrup. sex, sisonis, styracis, uniuscuiusque scrupulos nouem, opobalsami xij. sereos seseleos ue herbæ scrupulū unum & semissem, mellis uncias uigintiocto, uini quantum sufficit.

Medicamentum ex malorum carnibus.

10 **P**Ræparatur etiam confectura ex pomorum carnibus hoc modo: Malorum cotoniorum purgatorum libræ tres decoquuntur in uini peruetusti xestis tribus, deinde teruntur & injiciuntur ipsis piperis, anisi, lybistici leuigatorū uniuscuiusque uncia una. Sunt qui zingiberis unciam dimidiam, nec desunt qui pro uino acetum affuderunt.

ῥίζα τοῦ χυλίου μέλαν, hoc est ex succis malorum medicamentum, appe-

tus a cibis auersionibus, & nullis ægris ue cibi in stomacho

concoctionibus aptum & utile.

30 **S**ucci malorum cotoniorū maturorum, mellis boni, singulorū xestas duas, aceti xestā unā, zingiberis unc. treis, piperis albi unc. duas, conquito ad crassitudinē: hoc Galenus frigore inhorrentibus præparabat. Ceterū in quibus bilis, inquit, abūdat, abscq; pipere & zingibere cōfice.

Meloplacuntij præparatio.

Pomorum cotoniorū mundatorum libræ sex elixantur in uino tantisper dum colliquantur, deinde colato & conterito. Nonnulli uero affundunt mellis libras octo, & decoquunt elementi ac debili igne, mouentes subinde ferula, donec impollutum quodāmodo totum reddatur, & tum assumūt concussa, piperis uncias treis, anisi tantundem, petroselini unciam unam: Quidam etiam zingiberis unciam, & mastiches un-
 40 ciam unam adiiciunt: mox commixta linguntur ad semiuncizæ quantita-

Malorum cydoniorum purgatorum, & in frustula exigua concisorū

librae octo decoquantur in uini xestis octo moderate, ne dissoluantur: deinde miscentur ipsis mellis despumati librae octo, piperis unciae octo, petroselinī, anisi, singulorum unciae tres, zingiberis unciae quinq, spicae nardi uncia una & dimidia, caryophyllorum uncia una: Omnia confusa, & mediocriter decocta ad iuris esculenti crassitudinem, remoue, & refri gerans pariter cum iure fragmenta compone.

Διὰ τριῶν πικρῶν, hoc est tribus piperū generib. cōstans medicamentū.

Piperis cōmunis, candidiq, & longi, singulorū drach. septem, zingibēris, anisi, thymi, corymbi, cuiusq, drach. ij. mellis quod satis est.

Aliud Oribasij.

Ad diatrion pipereon confecturam sumebat Oribasius piperis can. didi uncias duas, piperis nigri, & longi, spicae nardi, cinnamomi, ameos, nucis caryiue, hyssopi, seseleos, dauci, petroselinī, singulorū unciam unam, zingiberis drachmas quatuor, mellis libras treis.

Aliud Aesculapij.

Piperis id habet cōmunis uncias treis, piperis albi unciam unam, longi tantundem, petroselinī, cinnamomi, uel cassiae duplū, zingiberis, uniuscuiusq, uncia unam, mellis unc. unā & uiginti, uel quantū satis est. Ego uero etiam thymi corymborū unciam unam admiscere solitus sum.

Diospolites.

Cimini in aceto macerati ac fricti unciam unam, piperis, zingiberis, singulorum uncias duas, rutae uiridis unciam unam & semissem, nistri drachmas duas cum dimidia, melle excipito.

Διὰ κριπί, id est ex malo citrio concinnatum, pro his qui aegre

& uix tandem concoquunt.

Aceti cotylae tres, carnis citri libra una, hyssopi, rutae, origani, singulorum fasciculus per diem ac noctem aceto maceratus coquitur donec euanescat pars tertia: mox expressa abijciuntur simplicia, aceto affunditur mellis xesta una, & denuo decoquitur ad mellis crassitudinem: ubi autem constiterit, adfin guntur asari, mei, piperis albi, singulorum drachmae duae. Datur coctare unum tum matutino, tum sub decubitum, & lectum petenti.

Picra, id est Amara Galeni.

Picra Galeni accipitaloes drachmas centum, ligni balsami, mastiches, peroci, spicae nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmas sex: Sunt qui etiam iunci rotundi odorati floris, & cassiae, uniuscuiusq, drachmas sex admisceant. Exhibe drachmam unam in hydromelite.

Picra quae ex oxymelite conficitur, ad stomachicos, hoc est cibum nō cōtinentes, feminarumq, locellos, & aquā inter cutem conducibilis.

Accepitaloes uncias quatuor, folij uncias duas, costi, cassiae, amomi, aireos, singulorū drachmam unam, radice corticis sceniculi libram unam, mastiches, nardi Celticae, zingiberis, uniuscuiusq, drachmā unā, piperis drachmam unam, mei drachmam unam, aceti xestam unam cum semisse.

semisse, mellis tantundem: Foeniculum decoctum prius in aceto proijci-
tur, deinde infunditur mel, & ubi decoctū fuerit ad crassitudinem mel-
leam, reliqua trita & leuigata insparguntur.

Medicamentum *ἑστὸν*, id est ex lupino iocinore, opti-
mum & utilissimum.

Dialycium conficiendo, gentianæ, chamæpityos, petroselinī, marru-
biij succi, arcij, napyos, scolopendrij, panacis radicis, misti, rubiæ
passiuae, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi,
costi, seminis erucæ, radicis eringij, polij, echij, eupatorij, baccarū iunipe-
ri, lupini hepatis, enulæ campanæ, æquas portiones melle decocto exa-
cipe. Dosis est auellanæ quantitas cum melle decocto.

Theodoretus *Ἀντικαρδίου*.

ANacardiorum unciam unā & dimidiatam, croci, cassiæ, folij, spicæ
nardi, caryophylli, mei, agarici, rotundi odorati iunci florum, rheu,
epithymi, singulorū drachmas quatuor, acori, piperis, uniuscuiusq; ses-
quiunciam, aloës uncias treis, sarxiphagæ, mastiches, ireos llyricæ, cu-
iuslibet unciam unam & semissem, myrobalanorū unciam unam, mellis
libras sex, uel quantum res ipsa postulare uidetur.

Theodoretus *Ἱπιδία ἀντικαρδίου*.

ALoës drachmas sexaginta, agarici drachmas uigintiquatuor croci,
cassiæ, rheu pontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum dra-
chmas decem, costi, seminis rutæ, piperis albi, uniuscuiusque drachmas
octo, spicæ nardi drach. treis, ligni balsami, asari, trixaginis, mei, unius-
cuiusq; drachmas quatuor, mellis quod satis est. Quidam his etiam anā-
cardia duo adiiciunt. Dosis drachmæ duæ cum aqua mulsa.

Cyphoides iocinorosos adiuuans, & quæcunq; thoracis
incommoda emendans.

Væ passæ carnis drachmæ suscipiuntur uigintiquinq; croci dra-
chma una, calami drachmæ duæ, bdellij drachmæ duæ & dimidia,
cinnamomi triobolus, nardi triobolus, lentisci drachmæ duæ, myrrhæ
drach. quatuor, resinæ terebinthinæ tantundem, ramenti aspalathi obo-
li duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantum satis est.

Ala cyphoides Alexandri.

Habet croci, & cinnamomi, & bdellij, singulorū drachmas quatuor,
mirrhæ, calami, uniuscuiusq; drach. duas, bituminis, florum rotun-
di iunci odorati, cuiuslibet drach. treis, cassiæ, nardi, singulorū drach. i.
resinæ terebinthinæ drach. sedecim, uæ passæ carnis drach. centū sexa-
ginta, mellis cotylam unā & semissem, uini Chij quod satis est.

Διὰ τὸν ἥπατιν hepaticum.

BAcani unciam unam, costi unciam unam, folij scrupulos octo, piperis
albi scrupulos sex, spicæ nardi grāmata sex, mellis quantum suffi-
cit. Datur iusta dosi cochliarium cum temperatura conditi.

Zopirus.

Mirrhæ drachmas quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmas quatuor, cinnamomi drachmas treis, spicæ nardi drachmas duas, rotundi iunci odorati floris drachmas duas, piperis albi drachmam unam & dimidiâ, thuris drach. unam, costi drach. unam, mellis quod facis est.

Præonia antidorus.

Styracis calamitæ drachmas sex, thuris, amomi, croci, singulorum unciam unam & semissem, spicæ nardi drachmas sex, folij drach. duas, piperis candidi drachmas sex, & communis drachmas octo, myrrhæ unciam unam, mellis quantum opus est.

Dosiâhei catapostia secoraria.

Aloës unciam unam, spicæ nardi, folij, costi, singulorum grammata duo, agarici grammata octo, mastiches grammata tredecim, epichymi quatuor, rheu scrupulum unum.

Oxymel splenicum.

Oxymel lieni dedicatum concinnatur ex corticis radicis capparis, scolopendrij, spicæ nardi, asari, ireos, florum iunci rotundi odorati, florum cyperidis, anisi, cymini, feniculi, acori, erices fructus, singulorū unciâ i. foliorū tamaricis, foliorū salicis, apij radicis, dendrolibani, scilg, uniuscuiusq; unc. duas, aceti xesta i. mellis xestis tribus, guttæ ammonia cithymiamatis, præpara ad modum scilliciti. Offer cochliaria duo.

Oxymel conducens calculo laborantibus.

Saxifragæ, betonicæ, graminis, adianti, spicæ nardi, carpesiæ, asari, Seringij, singulorū unciam unâ, petroselinî Macedonici, seminis rutæ, uniuscuiusq; uncig semissem, feniculi uiridis, ireos, scillæ assatæ, chamædaphnes quam uulgò uocant uincamperuincâ, cuiuslibet uncias duas, corticis radicis capparis uncias treis, siorum uncias duas, aquæ, aceti, mellis, singulorum sextarios duos.

Fusca lapides confringens.

Pvlegij, mastiches, apij seminis, alterci aridi, singulorū unciam i. salis cōmunis fricti lib. i. seminis corij, spicæ nardi, anisi, ammeos, uniuscuiusq; scrupulos sex, folij scrup. quatuor, piperis candidi unc. semissem, uel cōmunis unciam unam, lithospermatis (quod uulgò milium folis dicunt) uncias sex, betonicæ tantundem, aceti boni xestas quinque, omnia concisa & cribellata & trita maximeq; eliquata per dies treis, misce aceto, insolato dies quadraginta. Quū uero consilium est uti, decoctum cicris nigri, & radicis asparagorū, apij item & adianti faciens, iniice in mixtionem ipsius binas heminas aceti, & in calido balnei alucolo laboranti posiro potui præbeto. Cæterum ex prædictis speciebus quidam aridi diobolos duodecim cum posca elixatione memoratarū herbarum temperata exhibuerunt, neq; quicquā minus propter pharmacum.

Conditum calculos atterens.

Cominuit lapillos uesciæ renumq; piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi,

nardi, lithospermi, betonicæ, singulorū unc. una, petroselinī, folij, uniuscuiusq; se squiunea, seminis rutæ sylvestris semuncia, mellis xesta una, uini ascaloniti sextarij sedecim, redacta in conditum.

Medicamentum ex sanguine hircinō.

Quando uua præ maturitate nigrore suffundi cœperint, hirci ætatē adolēcentis sanguinē colligito, & in sole exiccātū, calculo laborantibus pondo cochliarij unius cum passo Cretico præbeto. Sunt uero qui amomi, et folij, singulorū unc. iij. cōmisceāt: alij myrrhē etiā grāmata iij.

Medicamentum *ἄλ τριγών*, hoc est ex cicadibus confectum,

10

renum doloribus infestatis expediens.

Dlatettigon accipit lithospermi, raphidos piscis cremati, se selecos, uniuscuiusq; unciam unā, ammeos, cucumeris satui, seminis saxifragæ, uuarū passaru acinis exemptis, seminis althææ, phaseli candidi, lyncurij, singulorū unciam dimidiam, spicæ nardi, phu, mei, lapidum ex spongijs cuiuslibet drach. unam, adianti, seminis paliuri, interanei siorū aridorū, radice rubi, graminis, polypodij, uniuscuiusq; drac. treis, sanguinis hircini exiccati, ut dictum est, diobolos sex, cicadarū aridarū, amputatis & abiectis capite, alis & pedibus, unc. iij. piperis albi drach. sex, mellis decocti quod satis est. Datur iusta datione nucis ponticæ, hoc est auellanæ

20

quāritas in cōdito, uel decocto tribuli, uel saxifragæ, uel sinorū, uel radicis asparagorū, uel graminis, aut quinque folij, aut radice deniq; struthij.

Διὰ τὸ λιβοσπέρμα, id est ex milio solis pharmacum.

Lithospermi, betonicæ, saxifragæ, petroselinī, piperis albi, equas portiones melle excipiuntur.

Διὰ πρηνόσπρμα, hoc est ex semine marrubino

sarcinatum medicamentum.

Piperis albi & atrī, dauci Cretici, cucumeris domestici, seminis scenici, culi, marrubij seminis, petroselinī Macedonici, pyrethri, zingiberis, folij, singulorum unciam unam, mellis quantum exigit incorporatio.

30

Διὰ τὸ καλίδον,

Spicæ nardi, hyssopi, tecolithi, uniuscuiusque grammata octo, piperis grammata duodecim, zingiberis, petroselinī, costi, saxifragæ, singulorum grammata sex, cassiæ, seminis apij, cuiuslibet grammata tria, cyperei grammata sex, scobis eboris grāmata quatuor, ligni cardamomi grammata sex, lithospermi grammata quatuor, mellis quod sufficit.

Medicamentum ex semine sylvestris maluæ.

Seminis cucumeris hortulani drach. duodecim, semini herbæ Apollinis, quem hyoscyamum dicunt, drachmas sex, seminis cicutæ drac. treis (alij uero sumunt drach. sex) opij, sceniculi, maluæ sylvestris seminis, croci, cuiuslibet drach. treis, seminis apij drach. sex, cassiæ drach. quatuor, amygdala basilica decem, nuces ponticas decē, asari drachmas quatuor, passo Cretico excipe, & triobolū exhibe febre carentibus cum decocto: Neq; tamen defunt qui melle excipere malint.

Διὰ πρᾶγματις, id est ex bellarijs, renum doloribus dedicatum, & ad uesciæ renumq; exulcerationem conductibile.

Varum candidarū exemptis acinis, nucleorū pineorū recentium, uniuscuiusq; uncias duas, seminis cucumeris ex corticati, myrtorū ex ossium, amygdalorū amarorum, dactylorū palmularū pinguium, seminis apij, seminis papaueris, croci, singulorum drachmam unam, myrrhæ uncias duas. Passio potandum exhibe sobrijs pondo drach. unius, Satyriaca antidotus.

Antidotus, cui nomen Satyriaca obuenit, constat zingiberis, satyrj superioris, singulorum drachmis octo, caudæ crocodili terrestres (quem Græci scingum appellant) mei, asari, petroselinj, cardamomi, sceleris, uniuscuiusq; drachmis quatuor, seminis erucæ, cinnamomi, cuiuslibet drachmis tribus, geminalis, quod orminon græce dicunt, piperis albi, seminis cnici, uniuscuiusq; drach. duabus, florū rotundi odorati iunci, spicæ nardi, singulorū drach. una, sanguinis hirci mystro. Dosis huius confecturæ est drachma una: Imbecillioribus aut cum lacte offeratur.

Globuli, quæ Græci catapotia dicunt, *ὀστὰς φυλακτικὰς*, hoc est ex ligno maceris effigij, intestinorum torminibus seu dysenterijs utiles.

Xylomaceris, opij, rheij, uniuscuiusq; grammata sex, gallæ, myrrhæ, singulorum unciam unam uino spathire excipito.

Διὰ κοράλλια, hoc est ex corallio antidotus podagrica.

Antidotus, cui nomen diacorallion, habet rheu barbarici, præoniæ, myrrhæ, spicæ nardi, singulorū uncias duas, folij unciam unam, caryophyllorum grana quindecim, anagallidos florē habentis *ῥόσιον* (hoc est colore corallio rubro similē) quem nuncupant corallium, semunciam: mali terræ longi, & rotundi, cuiuslibet uncias quatuor. Huius dosis est diobolus unus cotidie post cibi concoctionem. Auspicandum autem est ab æquinoctio autumnali, quod est circa uicesimum quartum diem mensis septēbris, atq; diebus deinceps quinquaginta cōtinuis accipito: & unde uiginti intercallatis diebus, ad eandem te antidotū eodem ritu cōuerte, atq; ita donec dies quibus accipis, trecenti sexaginta quinque impleantur, peragito. Sub cane aut omnes dies uacato, hoc est à uigesimo quarto die lunij, usq; ad Augustum completū. Auenere porro & carnibus, maxime porcinis, et balsamēto, garoq; et beta, dauco item, & menta, lactucis crudis, & peponibus abstinentū est: Ex piscibus uero, capito his uiscidis & mollibus, & quibus cutis est testacea, atq; à leguminibus cunctis, & omnibus, ut summatim deniq; perstringā, quæ crassum humorem generant. Vino itidem secundo, nigroq; & multo. Lauandum insuper cotidie, & exercitationibus indulgendum, uel pedum officio, uel per equum, uel lectica, uehiculoue. Cæterū qui habitu sunt aridiore, & qui uberiore uictus ratione utuntur, nullo neque incommodo neque offensione afficiantur.

Acquinoctium autumnale.

Antidotus Agapeti Podagrica.

FOlj, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglitidos, costi, trixaginis, singulorum uncias duas, aloës hepaticæ uncias quinque, hyperici, pæoniæ, uniuscuiusque uncias treis, mali terræ longi, & phu, mei damafonij, anagallidos, cuiusque uncias quatuor. Modus autem utendi idem omnino est cum Diacorallio.

Antidotus Atactos podagrica.

FOlj, mei damafonij, anagallidos cyaneū florem habentis, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ, aloës hepatitidos, gentianæ, trixaginis, uniuscuiusque unciam unam, caryophyllorum, a fari albi, & atri, singulorum unciam & semis, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, radicis pæoniæ, mali terræ longi, & rotundi, cuiuslibet uncias duas. Vsurpatio eius superioribus similis est.

Procli podagrica, & aduersus coxendicis dolores antidotus.

TRixaginis uncias nouē, centaurij uncias octo, mali terræ, quam aristolochiam uocant, uncias septem, gentianæ uncias sex, hyperici uncias quinque, petroselinij Macedonici uncias quatuor, mei uncias treis, agarici uncias duas, phu unciam unam, mellis Attici cotylas duas.

Διὰ τῆς ζ, id est ex septem concinnatum, ad eadem.

HYperici, aristolochiæ longæ, singulorum unciam unam, centaurij, chamæpityos, agarici, uniuscuiusque uncias treis, trixaginis uncias sex, gentianæ uncias quinque. Sunt uero nonnulli qui inferunt petroselinij quoque unciam unam, mellis uncias quinque. Dosis est drachma una.

De Pastillis. Cap. XII



Pastillos Græci ab efformationis figuræ προίκοις, id est orbiculos appellunt. Sunt autem pastillorum genera tria, alij nantes ποταμοί, hoc est potabiles, alij ψυγτικοί, id est infusiles, qui per anum immittuntur, alij uero κατάρχιστοι, quod est inungibiles. Potabilium itaque quidam dicuntur ιατρικηνοί, quasi dicas latine retentiu, eo quod alui, uel sanguinis uel alias quasque fluxiones refrigerando, uel astringendo, inspergendoue, aut desiccando cōpescant: cuius farinae sunt, pastillus ex acantha Aegyptia effigiatus, & δία καρπούμενος, id est ex seminibus concinnatus, atque id genus alij. Quidam uero anodynij, sedandi dolorem uim habentes, uel quod sensum stupefaciendo torporum inducant, ueluti Crocodes, uel quoniam dissipant atque diffundunt: cuius generis sunt pastilli qui conficiuntur ex aromatis. Quidam uero ιαπορετικοί, qui ab meatuum farctu oppilationibusque omnibus iocundis, splenis, & renum uindicant, & obturationes laxant: e quorum classe sunt, qui ex amygdalis amaris formantur. Ex his autem quæ infunduntur, aliqui sanæ acrimonias obtundendi hebetandique potentiam habent, ueluti in intestinorum torminibus, quas dysenterias uocant: cuiusmodi sunt pastilli ex pompholyge, & amylo, & terra Samia, & ex succo prisanæ, uel eiusdem fortis, nonnulli qui clystere immittuntur. Aliqui uero

styplici, astringendi facultate præditi, uentris & sanguinis fluxiones sistunt, ueluti qui ex alumine, acacia, & omphacio fiunt: uerbi causa, pastillus Philippi, uel ex acantha Aegyptia cum succo rosarum, uel plantagine clysteres. Aliqui præterea deurendi uim obtinent, quorum usus in hulceribus depascentibus & serpentibus, intestinorumque torminibus probatur, ex sandaracha, auripigmento, calce, charta combusta compositi. Cum succo uero lentium aut oryze immittuntur ablutis prius muria extis, ubi mādūcauerint antea, & cōcoxerint languētes, ita ut nihil quicquam uirium medicamenti ad stomachum rapiatur. Conducunt autem hi de quibus nunc agitur, qui per inferna in aluum infunduntur pastilli, affectionibus, quæ circa fumen sub umbilico ingruunt: supra enim umbilicum uires eorundem non perueniunt. Catachristi autem uocati pastilli, uiribus quidem illis qui infunduntur, conueniunt. Cæterum styplici opem ferunt in herpetis, exanthematibus, intertriginibus, sanguinis eruptione, destillantibus ac fluidis hulceribus: è quorum numero est, Andronis & Polyidæ. Qui uero hebetant, carbunculis, quos anthraces appellant, & uitiosa consuetudine hulceribus competunt, tum etiam albus, tum qui ex lotarijs constat. Deurentes autem orbiculi, perinde atque prædicti (cuiusmodi censentur Phaustiani) medendis sanandisque uerendorum sedisque depascendo serpentibus hulceribus, pterygij item, & carnosis narium uicij impediō expediunt.

Pastillus Aster.

T Rochiscus, cui cognomen Aster, accipit croci, opij, castorij, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, Lemnij sigilli, quam *σφαγγιδία* Græci appellant, corticis mandragoræ, singulorum uncias quatuor, dauci, apij, anisi, feseleos, feminis alterci, styracis, uniuscuiusque drachmas octo: in uino diligenter contere & leuigato.

Pastillus Trigonis.

S Eminis apij, feminis herbæ Apollinaris, quam hyoscyamum dicunt, uniuscuiusque drachmas duas, anisi drachmas quatuor, opij drachmas treis: simul aqua liquefacito.

Pastillus ex feminibus.

O rbiculus ex feminibus recipit feminis anisi, ammeos, sceniculi, singulorum drachmas quatuor, feminis apij, opij, feminis hyoscyami, uniuscuiusque drachmas duas, quæ omnia leuigato in aqua.

Pastillus Crocodes.

A nisi, dauci Cretici feminis, uniuscuiusque drachmas quatuor, myrrhæ, castorij, singulorum drachmas duas, croci, opij, cuiuslibet drachmas treis, feminis apij, styracis, uniuscuiusque drachmas quatuor, feminis alterci drachmas sex aqua conterito.

Pastillus diarrhodos.

A caciæ, commeos, rosarum, floris balauftiorum, hypocistidis succi, gallarum, uniuscuiusque drachmas treis, succi rosarum uiridium, feminis

minis plantaginis, cuiuslibet drachmā unam, lycij Indici drach. unam.

Pastillus Diacorallius, id est ex corallio.

SEminis alterci, thuris, singulorū drachmas octo, terræ Samiæ, coral-
lii, rubricæ sinopidis, opij, uniuscuiusq; drachmas quatuor, amyli, ba-
laustiorum, cuiuslibet drachmas duas succo polygoni excipe.

Pastillus ex electro.

SEminis herbæ pulicaris (quam græce *φύλλα* uocant) uncias quinque,
Smastiches uncias quatuor, scobis electri, ireos, croci, singulorum un-
cias quatuor, opij uncias duas.

Pastillus ex acantha spināue Aegyptia.

ACanthæ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis fissi, succi hypoci-
stidis, gallæ, Lemnij sigilli, corallij, cō solidæ, qd symphyton Græci
uocāt, Samij asteris, aloës, ladani, singulorū partes equales excipe uino.

Pastillus alius, quem Galenus Aphrodisiasticon
clidion inscripsit.

FLorum mali Punicæ satiuæ, quos cythnos dicunt, florum mali Puni-
cæ agrestis, quæ balaustia uocantur, succi hypocistidis, acaciæ, singu-
lorum drachmas sex, lycij, rheu Pontici, opij, uniuscuiusq; drachmas qua-
tuor, myrrhæ drachmas duas excipe uino ex baccis myrti, uel elixatio-

ne rosarum, aut myrtorum.

Clidium Orisafij dysentericum & coeliacum.

GAllæ omphacitidis drachmas octo, opij drachmas quatuor : aqua
Geffingens pilulas, quæ Græci catapotia nominant, deglutendum
treis aut quatuor exhibeto.

Pastillus e cornu cerui, dysenteria & sanguinis excreatione
laborantibus accommodatus.

COchlearum drachmas duodecim, cornu ceruini deusti, gallæ exic-
catæ, acaciæ arefactæ, uniuscuiusq; drachmas quinque, myrtorum ni-
grorū drachmas quindecim, opij torrefacti, succi hypocistidis, singulo-
rum drachmas quinque, cenanthes drachmas sex, succi radice mandra-
goræ, terræ asteris, cuiuslibet drachmas duodecim, rhu obsoniorū dra-
chmas quatuordecim, malicoriorum exiccatorū drachmas septem, thu-
ris drachmas octo, corticis pini arefacti drachmas quatuordecim, hyo-
scyami tosti drach. decem, rhu coriarij sextarios duos, uini nigri quan-
tum ad elixandum rhum, ut crassissimum reddatur uinum, satis est : quo
percolato, cætera excipiens, pastillos effigiat.

Pastillus Amazonum.

SEminis apij, anisi, uniuscuiusq; drach. sex, comæ absinthij drachmas
quatuor, myrrhæ, piperis, opij, castorij, singulorum drachmas duas,
cinnamomi drachmas sex aqua excipito.

Pastillus ex amygdalis amaris.

ANisi, seminis apij, asari, amygdalorum amarorum, absinthij comæ,
eodem cum aqua pondere. Pange pastillos drachmæ unius : exhibe
non febrientibus cum cœnomelite, febricitantibus uero cum hydromelite.

Pastillus ex erice splenicus.

ERices fructus drachmas quatuor, piperis albi, nardi Syriacæ, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum drachmas duas: Guttæ ammoniacæ aceto dissoluit, & aridis inijcitur. Effigiantur pastilli singuli singulis drachmis. Dosis orbiculus drach. unius, cum oxymelitis cyatho uno.

Pastillus *εστὶ φουκαλιδίου* inscriptus.

Seminis cucumeris sativi pelle exuti uncias quatuor, feminis alterci, Scicutæ, singulorum uncias duas, fœniculi, feminis rumicis, croci, nucleorum pineorū, amygdalorum amarorum, opij, uniuscuiusq; unciam unam, physalidis sextarios treis, uini quantum opus est.

Pastillus Philippi.

BAlaustiorum, acaciæ, hypocistidis succi, opij, rhu, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloës, rhu Pontici, maliciorū, myrtorum, uniuscuiusq; drachmas quatuor excipe uino austero, & compinge orbiculos triobolares. Dato aut febre uacantibus cum uino, febrientibus cum hydromelite.

Pastillus Musæ.

ALuminis, aloës, myrrhæ, atramenti futorij, quod *χαλκίδιον* Græci appellant, uniuscuiusq; unciam unam & semis, maliciorū, croci magmatis drachmas sex excipe uino.

Præparatio crocomagmatis, hoc est recrementi olei crocini.

CRoci uncias duas, rosarum, amyli, myrrhæ, aloës, thuris, commeos, uniuscuiusq; unciam unā, costi, spicæ nardi, singulorum drachmam unam excipe uino. De crocino oleo etiam altera crocomagmatis dicitur concinnatio.

Nera pastillus ex collectaneis Heræ.

MYrrhæ, aloës, croci, uniuscuiusq; drachmæ octo, aluminis fissilis drachmæ centum aqua excipiuntur.

Polyidæ Sphragis.

ALuminis fissi drachmas quatuor, myrrhæ drachmas octo, atramenti futorij drachmas duas, cytinorum drachmas duodecim, fellis taurini drachmas sex, uel ut alijs placet, drachmas sedecim, aloës unciam unam uino austero & astringente excipito.

Pastillus Pasionis.

SQuamæ æris denarium pondo duodecim, æris costi, aloës, guttæ ammoniaci, aluminis rotundi, fruginis rasilis, thuris, uniuscuiusq; denarium pondo octo, uini quantum satis est.

Pastillus Andronius.

FLorum mali Punicæ hortensis denarios decem, myrrhæ denarios quatuor, gallarum denarios octo, mali terræ rotundi denarios quatuor, atramenti futorij, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, myrios, thuris, cuiusq; denarios duos uino austero, acetōue diluito.

Pastillus

Pastillus Phaustini.

AVripigmenti denarios duodecim, sandaraches denarios sex, calcis aquæ nō extinctæ denarios octo, chartæ crematæ denariū unū succo myrtorum uel decoctione excipiens, cōforma pastillos, & per anum cum decocto myrtorū, & lenticularū, & rubi radicū immitte.

Pastillus *ſicæ & æris*.

CHartæ cōbuſtæ libræ duas, calcis, auripigmēti, sandaraches, unius cuiusq; unciam unam succo plantaginis excipe.

Thronus Marcellius.

CHartæ crematæ denarios decem, sandaraches, auripigmenti, squamæ gris, aluminis ſciſſi, cuiusq; denarios quatuor, balausti denarios treis, opij denarios duos calcis uiuæ denarios decem, omphacij denariū unū, succi hypocistidis denarios treis uino ex myrti baccis excipiens, orbiculos drachmas quatuor pondere æquantes conformato, & in uino malicoria, myrta, & rosas elixās uſq; ad tertias, exhibe in uini cyathis sex, pastillum unum, uel ſimpliciter quatuor.

Pastillus *ſicæ & melle*.

GAllarum crematarum, chartæ combuſtæ, ſphædi deuſti, & panis de uini uſti denarios quindecim, auripigmēti denarios duos, sandaraches, calcis, unius cuiusq; denarios quindecim, acaciæ, ceruſſæ, cuiuslibet denarios quinque, ſpumæ argenti denarios treis uino ſubige & eliqua.

Pastillus cognomento bithynus.

MAlicoriorum denarios decem, cadmiæ uncias treis, mali terræ, gallarum, panacis, radicis ireos, chalcanthi, quod atramentū ſutorium. Latini dicūt, aluminis ſiſſi, chalcitidis, miſyos, ſquamæ æris, mannæ (nō nulli adijciunt etiam coſti) cuiusq; unciam unā & ſemis: aceto præpara.

Pastillus *ſicæ & nepsis* ad hucera, & nomas, & fluxiones, quæ rhēumata Græci appellant.

CRoci, aloës, thuris, ſingulorum unciam unam, cytinorum, aluminis ſiſſi, caſtorij, mannæ, æruginis rafa, cuiusq; unciam unam, rubricæ ſinopidis libram unam uino ueteri excipito.

Pastillus alius *ſicæ & nepsis*, hoc eſt ex fibri testi culis conſectus.

MYrrhæ, caſtorij, cuiuslibet dioboli ſex, croci, opij, ſingulorū grammata nouem, aniſi, ſeminis apij, dauci ſeminis, unius cuiusq; uncia ſemiſſis, alterci ſeminis ſerupuli duodeuiginti ſumuntur.

Pastillus ex cœnelæo, ano & pudendis dedicatus.

Ceruſſæ uncia decem, ſpumæ argenti uncia quinque, thuris, ſtercoris plumbi, aluminis ſciſſi, ſingulorum uncia duæ uino procul à mari nato ſubiguntur. Cæterū quum uſus exiget, cœnorhodino, hoc eſt uino roſaceo, uel cœnomyrſino rurfum diluuntur.

Pastillus *ἔσθ' λίθου φρυγίου*, id est ex lapide Phrygio, pro his
qui genitalibus afficiuntur.

L Apides Phrygios combustos & extinctos treis, primū quidem bus
tyro, uel rosaceo, secundo uero uino, tertio aut melle, uncijs duabus,
rosarū floris uncias quatuor, corticum mali granati unciam unam.

Pastillus *ἔσθ' λατρίων*, sed i atq; uerendis consecratus.

Cerussæ, amyli, glaucij, croci, aluminis, æquales portiones succo lo-
cutorum uinōue dilue & contere.

Pastillus candidus.

Terre asteris uncias quatuor, bullæ (quā Græci pompholyga dicunt) 10
cerussæ, amyli, uniuscuiusq; unc. duas, opij diobolos iiii. aqua cōtere.

Pastillus *ὀλίαν κακίαν*, id est ex uescariā.

Spumæ argenti denarios uiginti quatuor, cerussæ denariū pondo duo-
decim uel uiginti unum, alicacabi radice pondo denarium octo, chal-
canthi atramentiue futorij denariū pondo quatuor, aluminis fissi tantun-
dem, rubricæ quantum ad colorem inducendum sufficit, aqua excipe.

Pastillus ex uiroq; ueratro, & idem ex duobus uescarijs.

Acaciæ nigræ & rusæ, glutini fabrilis, aliās ichthyocollæ, singulorū
unc. quatuor, guttæ ammoniaci thymiamatis, glaucij, aloës, cuiusq;
uncias duas, thuris masculi, ueratri nigri, & candidi, uniuscuiusque un- 20
ciam unam aceto scillitico excipe. Quum utendum erit, ipso uel commu-
ni dissoluens, cum sub balneum, tum à balneo rursum illinito.

Pastillus Criogenes.

MYrrhæ, æris cremati, mali terræ rotūdi, eruginis rasæ, squamæ sto-
momatis, uerbenacæ rectæ, aluminis rotundi cuiusq; unc. unā, aceti
quantū satis est. Decerpere aut oportet uerbenacā, quū sol fuerit in arie-
te. Format aut in emplastrū etiā hoc modo. Pastilli huius, rubecæ Colo-
phonix, olei, æquas partiōes, aceti quantū satis est ad eliquandū pastillū.

Pastillus melanchlorus, hoc est niger seu pallidus.

MYrrhæ, aloës, squamæ æris crematæ, auripigmēti, aluminis fissilis, 30
& rotūdi, ireos, chalcitidis, mysios, salis folli, chalcanthi, cerussæ, ni-
tri, spumæ argēti, panacis radice, cadmiæ, malicioriorū, gallarū, mali ter-
ræ rotundi, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, uniuscuiusq; unc. unā,
aceti quantū res ipsa & cōfectio postulat. Pangitur item emplastrū ad
hunc modū: Sumuntur pastilli unc. duæ, Colophonix ceræ, olei, singu-
lorum uncia sex, aceti quantum sufficit ad pastilli subactionem.

Pastillus pantolmios, ad chironia, & uitiosa consuetudine, quæ cacoëthe
dicuntur ulcera, & ad rheumata.

CAsiæ, æris cremati, cerussæ, spumæ argenti, ferruginis rasilis, alumi-
nis fissi, & rotundi, & liquidi, & plenthytidos, panacis radice, mali 40
terre longi, & rotūdi, malicioriorū, chalcāthi, portulacæ, ireos, astragali-
tidis, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci,
squamæ æris, aloës, diphyrgis, thuris, gallarū, sarcocollæ, plūbi deusti,
foliorum

foliorum oleæ, foreos, myrrhæ, atramenti metallici (quam melanteriam uocant) liquidi, balauftiorum, acanthæ Aegyptiæ, sulphuris ignem non experti, nitri, rhu rubei, rhu Syriaci, chryfocolle, aluminis, rhu coriariæ, acaciæ, falis spumæ, omphacij, auripigmenti, æquas portiones, sub ardentissimo caniculæ æstu cum aceto per dies triginta dilue & macera.

Pastillus Nymphodoti.

Spumæ nitri uncia unā, nitri Alexandrini, saponis Gallici, uniuscuiusque unciam unā, falis Cappadocici, mastiches, gallarū, cuiuslibet denarios quatuor, rhodophyllorū, hoc est foliorū rosarum, amomi, amyli, cuiusque uncia unā, folij denariū unum, fissilis aluminis, costi, singulorum denarios duos, uini ex baccis myrti quantum satis est.

Pastillus *off. thesias* hemicanicus.

Liquoris thapsiæ denarios sedecim, myrrhæ denarios octo, opopana-
cis, euphorbij, singulorum denarios sex, nitri, succi parthenici, cuiusque denarios quatuor, piperis, sagapeni, uniuscuiusque denarios ij. aceti quantum dicta effragitant simplicia. Quum autem usus est, aceto illitos post horas sex lauato: uerum si cessim ac remissius uti fuerit consilium, cerotæ pari mensura excipiens, cataplasmatibus modo impinge, atque per diem ac noctem finito.

Hypothesis ad dysenteriam & anj coronæ dolores.

Terræ alteris, amyli, singulorum uncias treis, croci uncias duas, acaciæ, tragacanthæ, uniuscuiusque unciam unam, castorij, thuris, lycij, cuiuslibet semiunciam, in natura calidioribus etiam opij unciam dimidiatam, succo pulicariæ excipito, & effigato in longū corylam dimidiam.

De Aridis & Smigmatibus. Cap. xiii



Aridorum medicaminum, quæ & cataplasmata uocantur, alia quidem affectibus hulcerū conueniunt, alia uero cuti admo-
uentur: & quæ hulceribus competunt, quædā sunt *σφραγιστικά*, id est quæ cauitates carne replent: quædā uero tumentia sup-
primunt, & excrecentias carniū reprimunt, quæ *κατασκλητικά* uocant: quædā *κεκολλητικά*, quæ cicatricē inducunt: quædā *κωστικά*, id est deurentia: & *συνήκτικά*, id est quæ exedūt: & quædam denique *ὑγαινα*, id est sanguinem comprimentia. Quæ igitur cauorū hulcerum sunt pharmaca, & *σφραγιστικά* ut dixi, uocantur, uel sordida expurgando incantant, uel uti quæ ex eruo componuntur & malo terræ (quæ græce aristolochia dicitur) iride, pahnace, myrrha, thure, aloë: aut infestantē humiditatem exiccando, quem admodū quæ ex ære, diphryge, squama, charta combusta, cortice pinus, acantha conficiuntur: eadē uero ipsa cicatricē quoque inducunt: aut acres dines & erosiones hebetādo, uerbi causa, quæ ex pōmphylyge, amylo, cerussa, fece uini, lapide speculari, ostreis crematis, terra Samia, & id genus alijs, & quæ ex his cōponuntur, easdē habent potentias. Cæterū ex his quæ suppressendi excrecentias uim obtinent, mitiora quidē censent ex squama gris, misyos, chalcitide tostis, & galla, cōcinnata medicamina.

Valentiora autem, quæ sunt ex atramento futuro (quod Græci χάλκιδας uocant) ærugine, misyos, chalcitide, non deustis contexta. Quæ autem deurendi facultate sunt prædita caustica appellata, & quæ citra morsum exedunt, tum ex calce, tum ex auripigmento, tum sandaracha, tum sphecle, quæ est fex uini, crematis cōstant. Cæterum hæc omnia in minutissimum quidem puluerem friata, huiusmodi affectibus subdita impositæ, multo minus mordacia euadunt: Quæ ex solidissimis contrā ac plenioribus conflata sunt partibus magis, mordicant. Quæ porro sanguinem cohibent, uel astringendo, uel desiccando, uel refrigerando, uel in integrū restituendo, obstruendūue, uel deurendo, & crustā inducendo comprimunt, quorum materiam iam pridem de pastillis docuimus. Præterea ex his quæ cuti adhibentur, aliqua sanè detergunt & exterunt: cuius farinae sunt, conflata ex creta cimolia, pumice, siliqua fermenti, hordeo, peponum carne, flore salis: Aliqua uero attenuant & distrabūt, quemadmodū ea quæ ex ueratro, alcyonio, sulphure, uua passa syluestri, sinapi napy'ue, pyrethro, hordeo, lemnitide, sepiæ testa: his præterea si calx adijciatur & auripigmentum cum aliquo liquore, psilotica redduntur, & smegmata fiunt: Quædam capiti denique admouentur, quo fluxum ex eo manantem arefaciant: cuiusmodi sunt contexta ē nitro, sale, gallis, mali corijs, & id genus alijs. Smegmata postremo omnia sunt corpori refocillato & ex morbo conualescenti adhibenda.

Aridum cephalicum.

ERui uncias quinque, ireos, mannæ, mali terræ, squamæ æris, uniuscuiusque unciam unam cum dimidia. Aliud: Sumantur corticis pinini denarij sex, thuris denarij quatuor, pumicis tantūdem, ireos denarij duo, resinæ aridæ denarij sex, mali terræ denarij duo.

Medicamentum δι' αλοιῆς, id est ex aloë confectum.

ALoës denarios sex, erui denarios octo, mannæ denarios quatuor, gallæ denarios treis, aluminis fissi denarios duos Dialoës accipit.

διὰ σφικλῆς, id est ex fece uini cremata confectio.

ſcio Manethonis.

CAdmiæ combustæ atque elotæ unciam habet unam, terræ asteris unciam unam, fecis uini cremati uncias quatuor, diaphanis uncias tantūdem, thuris unc. iij. quidam his amyli quocūque unc. quatuor adijciunt.

Melitera Oribasij.

Habet chalcitidis, squamæ æris, gallæ, balauſtiorū, cæræ, uniuscuiusque uncias treis, mali terræ longi unciam unam, corticum mali Punici, fissilis aluminis, singulorum unciam dimidiam.

δι' ὀρίων.

EX octreis confectio recipit cadmiæ, thuris, cuiuslibet unciam unam, costreorum combustorum uncias treis.

Medicamentum, quod dialibanum appellationem obtinuit, constat ex squamæ

Smegmatum
usos.

30

40

ex spumæ argenti, thuris, squamæ æris, rhoidarij, amyli, cerullæ, singulorum partibus æqualibus.

Aphroditarium.

Accipit Aphroditarium thuris, squamæ æris, rhoidarij, amyli, cerullæ æquas portiones.

Rhodia comprimens sanguinem, & ad nomas, & carnis
excreſcentias conducens.

GAllæ crudæ denarios sex, gallæ crematæ, & uino extinctæ, aridæ denarios duodecim, squamæ æris atræ, sin minus, rubræ denarios octo, chalcantli denarios uigintiquatuor, aluminis fissi denarios uiginti septem: maceratio dies quot satis est.

ῥουδίον, hoc est flammum.

Accipit chalcitidos crematæ denarios quadraginta, atramēti sutorij, quod chalcantliū est, denarios octo, misyos cōbusti denarios decē, æris deusti denarios quinque.

τὸ ψαρόν.

SVmuntur misyos uncia quinque, gallarum uncia quatuor, chalcitidis uncia duæ, squamæ æris uncia duæ, chalcantli uncia una, ferruginis rasilis uncia duæ.

Heliocaës causticus.

AVripigmenti libram unā, calcis aqua nō extinctæ libras duas aqua in diebus canicularibus eliquato, deinde ubi arefeceris, utere.

Antherum.

SVmit cyperi denarios octo, myrrhæ denarios duodecim, sandarachæ denarios treis, floris rosarum denarios duos, croci denariū unū, crocomagmatis, aluminis fissi, treos Illyricæ, singulorū denarios duos.

ἀνὰ χάρτην, ad nomas oris potissimum, & affectus qui
exoriuntur in pudendis.

SQuamæ æris, chartæ combustæ, uniuscuiusq; denarios octo, auripigmenti, sulphuris ignem non experti, cuiuslibet denarios duodecim, plumbi deusti denarios sex: Quo medendis humidioribus sepedonibus utere. Aridis uero curandis rosaceo confundens, interdum etiam melli unā cum rosaceo.

Dia oxymyrsinis ad eadem.

SVmantur rhoos coriariæ uncia duodecim, aceti myrtitis, foliorum, sandarachæ, uniuscuiusque denarij octo, aridorum foliorum salicis, maliciorum, cuiuslibet denarij sex, aluminis fissi, chryfocollæ, aloës, chalcitidis crudæ, squamæ auripigmenti, salis communis, singulorum denarij quatuor.

Aridum Massaliotæ.

Nltri, opij, chryfocollæ, lapidis Asij, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissilis, diphyrgis, æquis portionibus: Arido utere.

Q

Smegma aridū, quod refertur ad Asclepium.

B Accarum lauri, nitri Alexandrini, salis fricti, salis Cappadocici, guttæ ammoniaci thymiamatis, spumæ nitri, pumicis, cuiuslibet libram unam, ueratri nigri, struthii, pyrethri, sphecles (quæ est uini fex) deustæ, uuæ passæ syluestris, napyos, cyperi, aluminis scissilis, floris rotundi iunci odorati, ireos, gallarū, cuiuslibet uncias sex, sampfuchi libram unam, uiticis seminis, pulegij, cucumeris farinæ, & lupini, singulorū uncias sex, chamæleontis nigri, sulphuris, cōmeos, thuris, piperis, radices cucumeris agrestis, marrubij, cretæ cimoliæ, pæoniæ, sepia testæ, scœnogræci, folij, costi, cymini, euphorbij, spicæ nardi, singulorum uncias treis. 10
Cæterū Alexander hæc insuper adhibuit: salis nitrosi, & tragetsij, cuiusque libram unam, adarces libram unam, aluminis liquidi Celtici, cnici, grani cnidij, graminis aridi, bryoniæ siccæ, uniuscuiusque uncias treis.

Smegma Peponatum.

T Huris, mastiches, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorū unciam unam, tragacanthæ sesquiunciam, succi omphacis uncias nouem, recentis seminis peponis uncias treis, similaginis sextarios quinque, ouorū unum & uiginti albumina, ireos uncias quatuor. Sunt autem qui hellebori nigri uncias quoque duas inferant.

Aliter Critonis.

S lliquæ modiū unū, siliginis sextarium unū, trifolij, myrobalani, ireos Illyricæ, uniuscuiusque libras quatuor, guttæ ammoniaci thymiamatis, costi, singulorum libram unam, ouorum tenues albore, peponum carnis sextarios duos, omphacis succi tantundem. Irrigato, & conformatis pastillos arefacito, deinde concisis & attaminatis utere. Aliud: Tragacanthæ, thuris, mastiches, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum denarios decem, succi omphacis, siliginis, uniuscuiusque denarios quinque, alboris ouorum unciam unam, carniū peponum uncias decem. Præparato quemadmodum prædictum est.

Smegma caput, catarrhofum exiccans.

H abet nitri Alexandrini, tritici uncias quinque, salis communis fricti, salis Cappadocici, singulorū unciam unam: hæc contrita & macerata acerrimo aceto insijce lineo sacculo, & in camino donec redigatur in carbones comburito: deinde refrigerans, leuigatis extere, cum uino instillans in balneo. 30

Sapo Constantini.

R osarum aridarum, aloës, gallarū, malicoriorum, scœniculi, sarcocollæ, uniuscuiusque uncias treis, balaustiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorū uncias duas, costi unciam unam, saponis gallici libram unam, excipe lupinorum decocto. 40

Aridum psilothrum podagricum.

M astiches, thuris masculi, uuæ passæ syluestris, ueratri albi, spumæ argenti, cuiusque uncias treis, folij, amyli, ueratri nigri, lapidis Asij floris,

floris, singulorum unciam unam, alcyonij, pumicis affati, cretæ cimolig.
 sampfuchi, uniuscuiusque uncias treis, spicæ nardi unciam unā: aliqui ue-
 ro indunt etiam aloës unciam unam: Aridum concisum in uase contine-
 quum utendum erit, proſice succū oryzæ & ptisanæ in aululam: ubi ma-
 cerata fuerint, immitte atidi unciam unam & dimidiatā, saponis Galli-
 ci, auripigmenti scissi, sandarachæ, uniuscuiusque sesquiunciā, calcis aqua
 non extinctæ recentis libram unam. Utendum autem istiusmodi un-
 guento ter in mense, nono uidelicet lunæ die, & unde uigesimo & un-
 detriceſimo in annum. Post hunc uero semel in mense, luna uigesiſimum
 10 nonum diem agente.

De unctionibus quæ ori inseruiunt, & gutturi, ac
 faucibus. Cap. XIII



Vanto summa cutis rariore mollioreque est tunica, tantum
 etiam usus stomachicorum medicaminum uariat. Ab initio
 igitur inflammationis, pharmacis quæ id quod se in eam par-
 tem insinuat ac influit, expellunt & reperiunt, opus est: cuius-
 modi utique sunt, Arida quidē, & omphacium, & galla omphacitis, id est
 immatura: succus item rhu. & hypocistidis, & aluminis, piniq; & thuris
 20 cortex: præterea flores mali Punici, quæ balauſtia dicunt: atque ut summa
 tim expediam, quæcunque astringendi uim obtinent, excepto amaro & tri-
 rulento remedio. Liquida uero eiusdem facultatis sunt, succus mororum
 atque battinorum, & eorum quæ appellantur sicamina, uiridiumque nucum
 corticis, & malorum granatorum, præsertim acidorum, malorum cotoneorum,
 mustum & Amineum. Cæterum mel circa principium conseruationis phar-
 macorum, & eius solius gratia admiscetur. Quum autem liquidum cõstitit,
 quæ cõcoctionem promouent atque adiuuant, neque mediocrem etiam dis-
 sipandi ac digerendi uim obtinēt, admiscenda sunt: cuius generis censen-
 tur crocus, myrrha, & glycyriæ succus: Et uniuerſo quod inter uigorē
 30 & decrementum est tempore, mixto quopiam ex utrisque, reſiciente uide-
 licet & discutiente opus est: & primo quidem reperiſſiua, mox uero
 distrahentia apprehēdito, ac utere. In uigoris uero remissione solis abs-
 que aſtrictione diſſipientibus utendum est: cuius farinæ sunt, nitrum, &
 spuma eius, organumque, & hyſſopum, atque thymus, nepita præterea, &
 iris, beſaſa, & conſimilia. Porro liquidum aliquando *origanum* esto, tum id
 quod à musto decocto, tum quod à ſicibus aridis & dactylis: atque ipsum
 etiam mustum dulce, cum melle. Quando uero inflammationis quip-
 40 piam deceſſerit, sulphuris etiam ignem non experti aliquid admiscen-
 dum est. Coquendus autem est ante omnia succus cum melle, ad mellis
 usque liquidioris consistentiam: mox arida leuigata inſpergito: deinde
 tantisper dum omnia ad unguem & exacte coeant, moderate elixato, ac
 tum denique in uitreis uasis accurate recondito.

Simplex *διὰ μόρων*.

Diamoron simplex cōficitur ex mororum succi sextarijs tribus, quibus antea decoctis ad consumptionē tertiæ partis, inijce mellis sextarium unum, & denuo ad mellis usq; spissitudinem decoquito.

Διὰ μόρων compositum.

Coquito mororum succi cotylas sex ad strigmenti balnearū crassitudinem, deinde admisce contrita, croci denarium unum, myrrhæ denarios duos, omphacis denarium unū, schisti lapidis triobolum, mellis cotylam unam, atq; donec crassitudinem induat, decoquito.

De Batinis moris.

Caeterum ex moris quoque batinis diamoron hoc consimiliter præparatur, & astringentius est.

Διὰ κερύων simplex.

Necum uiridium corticis contusi succus pondo cotylarum quinque, mellis cotyla una, coquitur ad diametrum.

Διὰ κερύων compositum.

A B initio quidem statim & in uigore, in oris inflātionibus misceare oportet croci & aluminis, uniuscuiusq; denarium unum, myrrhæ denarios duos, in declinatione aut propter dissipationē, nitri denarium unum, sulphuris tantundē, prædictorum quantū cum succi tum mellis.

Διὰ χύμους τῆς πομπῆς, id est ex succo mali Punici.

Malorum granatorū apyrinorū dulcium succi sextarios quatuor, malorum Punicorū acidorū succi sextarios duos, mellis sextariū unū, myrrhæ Hemineæ denarios octo, crocomagmatis, gallæ, uniuscuiusq; denarios octo, aluminis scissi denarios quatuor, ireos Illyricæ denarios octo, omphacis denarios octo. Præpara quemadmodum Diamoron.

Idem aliter.

Succi malorum Punicorum dulcium cum testis combustorum sextarios sex, mellis boni sextarium unum, aluminis fissilis unciam unam, myrrhæ unciam dimidiam.

Διὰ γλυκύων, hoc est ex musto medicamentum.

Musti sextarios sex, gallæ, aluminis fissi, singulorum denarios duos, croci, myrrhæ, uniuscuiusq; denarium unum, si quidem mitigare uolueris, mullum dulce esto, si uero retundere ac rescere, austerum, mēdium uero inter utrunq; quodammodo consistit.

Aegyptia ori inseruiens.

Mellis libra una, olei uncia octo, resinæ terebinthinæ uncia duæ, croci denarij quatuor, in diplomate (uase fictili seu æneo) eliquant.

Διὰ τῆς βοτάνης, id est ex ruta syluestri.

Seminis anisi, apij seminis, floris rotūdi iunci odorati, seminis ammeos, aluminis scissilis, ireos Illyricæ, besafa, quod nonnulli harmala nuncupant, est autē ruta syluestris, cinnamomi, myrrhæ troglitidos, croci, gallæ, singulorū unciam unā, mali terræ longi, cassiæ, crocomagmatis, rolarum aridarum,

aridarum, cuiusq; unciam unam, costi, hyrundinum stercoreis seu cineris recentis, cuiuslibet uncias treis, nardi Indicæ, amomi, uniuscuiusque unciam dimidiam, mellis quantum sufficit.

Suaves & frugi potiones. Cap. xv



Vlcium pariter & utillum potionū aliæ quidem ex uino com-

- ponuntur, missis in ipsum quibusdam dulcibus: uerbi causa, pipere, absinthio, casamo, & alijs cōpluribus, ex quibus nomenclaturam nonnunquam mutant, quandoq; melle quidem admixto, quandoq; uero nō: aliæ uero ex aqua, in qua elixantur mala uel rosæ quædam, puta omphacis, malorum granatorum, myrtorum: Cōmiscetur ob hoc melle optimo despumato cōseruationis gratia & dulcoris, interdum etiam utile, præterquā quod à Cībyra paruīs uasculis importatur austerū & uinosum hydromalū: hoc etiā potest sine melle confici, quemadmodū ē diuerso apomel ex solo melle & aqua, citra aliquam aliam essentiam. Cæterū ex uino quidem composita, quæ & propomata uocant, mellis despumati sextarium unum, ad uini sextarios quatuor assument, & componuntur incocta. Quæ uero ex aqua & succo, si quidem coquantur, unam mellis partem ad treis accipito, liquore in concoctione ad duas ferme partes consumpto: quod si non decoquatur, unam mellis ad duas liquoris. Quæ autem non elixantur omnino, quantum satis est insolanda sunt, præsertim omphacomel: decoquere autem congruit ex aqua, quoniam propter imbecillitatem facile alteratur. Omnia porro exiguis testaceis uasis incrustatis reponenda sunt, accurateq; & tuto operculantes, in coenaculis usq; dum decoquantur locabimus. Attenuandi insuper uim habētibus, egregie aqua temperatis utere. Omphacomel aut, postquā efferbuerit instar musti, & cōstitit, tum operculato. Quocirca quæ ex uino cōsistunt, in his qui à febre omnino immunes sunt, maxime utimur, uel solius uoluptatis gratia, nisi ex scammonia, aut cocco cnidio, aut id genus purgandi uim habentibus fiant: & propter istiusmodi affectiones, in quibus etiam efficiētib; medicamētis per os aliquis uti queat. His uero quæ ex aqua aut liquoribus quibusdam confiunt, in febrientibus utendum, nunc quidem tanquam cōdimentis, quū morbus languentibus uini usum non permittit, nunc uero etiam alteratiū affectionibus, puta ex melle quidem, ad sputum agendum, uel ad lotium ciendum, uel uentrem laxandū, uel humorem crassum attenuandū cōgruit. Hydromalo autem & hydroroso cum in sitibundis, tum in ambustis, tum dissolutis, tum stomacho deniq; imbecillis. Omphacomelite autem & myrtite, & rodostacto, & rhæte, non in coeliacis solum, sed & dysentericis, tum euomentibus, tum alijs fluxionum morbis, his denique lauaminibus, quæ Græci διακλίσματα appellant, subinde in oris affectionibus utimur.

Apomel.

Propomata.

Hydromalum.

Omphacomel.

Hydromalum ex succo malorum.

Svmuntur succi malorum cotoneorum mundorū contusorū sextarij

duo, mellis sextarii treis, aquae sextarii sex: coquito identidem despumans usque ad tertias. Aliud: Malorum cydoniorum concisorum purorum librae quinque, in aquae fontis sextariis decem tantisper elixato, dum eliquata subiuga reddantur, & ubi exemeris, refrigerata tandem cola, & expresso cremore mala proijce, aquam uero metiens, mellis quantitate dimidia aquae admisceto, & rursus assidue despumando donec octava pars euanescat, decoque. Sunt uero nonnulli qui hydromalum ex malis dulcibus consimiliter composuerunt.

Hydrosolati compositio.

Conficitur hydrosolatum e rosarum detractis unguibus libris quatuor, aquae sextariis quinque, mellis sextariis duobus.

Rhodomali preparatio.

Accepit rhodomali confectio succi pomorum cydoniorum sextarium unum, rosarum libras treis, mellis sextarios treis, aquae sextarios quinque. Ceterum quoniam tempore quo rosarum copia ad manum est, coctonea mala haberi & reperiri non possunt, necessarium fuerit easdem suo tempore melle conditas referuare, & quamprimum mala apparuerint, uniuersam compositionem absolueret.

Omphacomelitis concinnatio.

Omphacomel si conficere fert animus, omphacis succi sextarios tres, mellis sextarium unum miscens, per quadraginta dies in solem exponito, siue igne decoquito.

Myrteti preparatio.

Myrretum, hoc est ex myrtis confectionem effigiabis, si succi myrtili sextarios treis, mellis sextarium unum identidem despumando, ad consumptionem usque tertiae partis decoxeris.

Apomel ex monumentis Philagrii.

Accepit apomel albescantium fauorum melle infartorum libram unam, aquae fontanae libras treis cum dimidiata: fauum in minutas portiones dissecando, emolliendo, & uniendo, aquam cum melle decoquito, tantisper dum spuma eius & ueluti crispum cereum uel plenum ex parte relinquitur, atque tum refrigerans denique, summa cura in uase conuenienti reconde.

Rhodostacti compositio.

Succi rosarum unguibus detractis sextarios duos, mellis sextarium unum, decoquito usque despumando, donec pars quarta coctura euanescat.

Rhoei preparatio.

Decoquito ad tertias succi rosarum sextarios treis, mellis sextarios quinque.

De collyriis, & his quae fronti in oculorum fluxionibus applicantur medelis, quae uisumque medicantur pellant. Cap. xvi

Ocularium



Cularium medicamentorum materia diuersi generis est, li-
quores namq; & succi, & semina, fructusq; & plantarum par-
tes, atq; metallica oculis laborantibus adhibentur & inferun-
tur: ē quorum numero quidem censentur, quæ acedines &
asperitates mitigant, & ueluti ab obstructione uindicant, quemadmodū
pompholyx (quam Latini bullam appellant) cinerula, amyllum, plum-
bum, Samius aster, cadmia, omnia abluta, & oui albumen. Quibus utiq;
non nisi capite prius euacuato utendum: nam si id refertum humoribus
fuerit, ne distentione oculorum tunicæ rumpantur, periculum est. His
10 uero contraria, acri uidelicet natura prædita, oppilationes laxant, & eua-
cuant cōstrictiones: ueluti liquores, cum Cyrenæicus uidelicet, tum Me-
dicus, & sagapenū, & euphorbium, & id genus alia. Quædam uero for-
dida abstergunt hulcera: uerbi causa, squama æris, æs, chalcitis, misy,
fori, flos æris, & stibia cremata. Cæterum his finitima *οφθαλμικά* uocata,
nempe auripigmentum, sandaracha, lapidis alij flos. Alia stiptica, & ex
his quædam sanè moderate astringunt, quæ multiplicis usus, ophthal-
mij, & hulceribus, & fluxionibus auxilio sunt: cuius farinae sunt, rosarū
folia, flores item, & fructus spicē nardī, soliumq; & crocus, glauciū item,
& hypocistis. Alia uero stipticitatem potentiorē obtinent, potissimum
20 quum medicaminibus, quibus oculorum speciem acueniendi prouincia de-
legata est, implicantur: ē quorum classe sunt, omphacium, acacia, balau-
stia, cytini, gallæ. Alia uero cōcoquendi & distrahendi uim obtinent, ut
myrrha, crocus, castorium, libanotus, scœnogræci succus. Ex composi-
tis autem ophthalmicis, quædam sanè plastica sunt, & simpliciter dicun-
tur, quædam uero *σπογγώδεις*, id est arida collyria, quædā item *υγρὰ καὶ ὀσμώ-
δια*, hoc est liquida collyria: proinde plastica quidem omnem prædictam
materiam admittunt, & omnibus conueniunt affectionibus. Præpa-
rantur maxime uere: æstate etenim uirtus ipsorum perit & exhalat,
hyeme uero speciebus rigentibus neque coalescunt, neq; temperari pos-
30 sunt. Terito præterea, humorem impurū affundendo, ne metallica qui-
dem subsidant, odora menta autem emergant: cæterum paulò post tan-
quam strigmentosum conteratur. Aqua porro pluuialis esto, tum quod
tenuium parū est, tum quod mediocriter astringit: si quidem uino, aut
quopiam succo eliquantur ipsa & conteruntur, metallica longo quideri
tempore, per succum uero breui. Postremo autem post exactam colla-
uationem gummi adijcito, & ubi conformaueris, uasis æreis maxi-
me & uitreis reposito: satius uero fuerit humore maceratis protinus uti,
metallica uero sinere. Ex aridis porro collyrijs, quæ Græci *σπογγώδεις*
appellant, alia quidem eliquandi & exterendi callos, ficationes (quas
40 *σκληρόσεις* dicunt) pterygia, & scabiem facultatem obtinent, ex chalcidi-
de, & ferrugine, & milyos composita. Alia uero apodacrytica, id est la-
chrimas prolicientia, quæ oppilationibus, & oculorum hebetudinibus

*Locellis non ad-
hibenda oculis,
nisi capite eno-
cuiato.*

Aque celestis.

conueniunt, & ex his pipere & spicanardi: Alia uero *προφυλακικά*, id est præsueratiua præarcendo ac prohibendo instillationes: qualia sunt conflatata ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stibio, & croco. Omnia in minutissimum puluerem trita, applicentur oculis. Alia autem hygrocollyria, hoc est liquida collyria, præparantur quidem ex melle Attico, & opobalsamo, & oleo tenuium partium propter uetustatem, succo item sceniculi, & fellibus diuersorum animalium, succo Cyrenaico, & alijs quamplurimis. Opitulantur autem oculorum hebetudinibus, & inchoantibus suffusionibus, extenuantia, excalfaciencia, & expurgantia. Vt re præterea his & omnibus acribus, capite iam innitito, tum in sereno, tum puro, tum boreali, neq; supra modum gelido, neque nimium calido aëre circumfuso. Quæ autem anacollemata, id est res glutinatiua uocatur, ex his quæ opplendi, glutinandi, cōstringendi, uel refrigerandi, uel constipandi, uel arefaciendi deniq; potestate sunt prædita, contextuntur: uerbi causa, polline, manna, terra Samia, myrrha, cochleis, acacis succo, cum albore oui. Adglutinantur autem anacollemata fronti, in quibus non abditus humor, sed in aperto existit.

*Ανακολλημα
tum locum.*

Monemeron ad auspicantes primum & inueteratas iam oculorum dolores, quas *ἐφελμίες* uocant.

A Caciae denarios triginta sex, commeos denarios triginta duos, *κα* 20
Admia denarios uiginti quatuor, æris deusti atque abluti denarios octo, opij denarium unum, uino austero dissolue. Distrahit & desiccatur.
Chiacum collyrium.

R Vbricæ Sinopicæ, gallæ omphacitidis, id est immaturæ, croci, rosæ
rum recentium detractis unguibus floris, quem thylaca uocamus, commeos, singulorum uncias treis, opij unciam unam, uino Amineo, uel Phalerno, uel Chio astringente eliquato & conterito, Esto autem uinum minime maritimum.

Cygnarium.

C Admia combustæ atq; ablutæ uncias sex, cerussæ lotæ uncias qua- 30
tuor, pompholygis uncias quatuor, amyli uncias duas, tragacanthæ, opij exiccati, comeos, uniuseuiusq; uncias duas, aqua cœlesti contere.

Κυβέρος κύκνος, Flauus cygnus.

M Edicamentum cui nomen indicū est Giluus cygnus, accipit cadmiæ
crematae ablutæ uncias duas, terræ asteris uncias duas, cerussæ uncias quatuor, pompholygis uncias octo, amyli, opij, cuiusq; uncias duas, acaciae, tragacanthæ, singulorum unciam unam, commeos uncias quatuor, quæ omnia in aqua pluuiali leuigantur.

Λευκός κύκνος, Candidus cygnus.

C Admia uncias quindecim, cerussæ uncias septendecim, opij dena- 49
rios octo, thuris denarios septem, amyli uncias septem, comeos denarios tredecim, aqua cœlesti eliquato.

Pellarium

Pellarium ad hucera.

CAdmiæ, cerussæ, uniuscuiusque denarios uigintiquatuor, acaciæ, opij, singulorum denarios octodecim, commeos, tragacanthæ, amyli, cuiuslibet denarios octo, myrrhæ denarios treis, æris, croci, cuiusque denarium unum & dimidium, aqua dissolue.

Phœum ad hypopos & ingentes affectus.

CAdmiæ tenerioris denarios uigintiquatuor, cerussæ uiginti sex, fruginis rasæ denarios duodecim, stibij denarios octo, aluminis fissi, chalcitidis combustæ, singulorum denarios treis, nardi Indicæ denarios quatuor, omphacij denarios duos, æris denarium unum, squamæ æris denarios octo, crices fructus denarios tredecim, succi papaueris denarios uigintiquatuor, croci denarios quatuor, castorij denarios treis, myrrhæ denarios sex, lycij Indicæ, acaciæ, commeos singulorum denarios quatuor, rosarum recentium denarios duos & dimidium, uino Phalerno, aut Surrentino, aut Amineo, aut Chio austero leuigato & eliquato. Illini tur ter in die aquosum, infusum per succum fœnogræci, deinde oui, & lactis, postremo aqua, & crebrius.

διακρίτωρ.

CAdmiæ uncias sedecim, cerussæ uncias octo, amyli, opij, tragacanthæ, acaciæ, singulorum uncias duas, commeos uncias sex, eliqua decocto rosarum aridarum, melilotorum, papaueris, capitum papaueris, glycyrrizæ, æquali singulorum portione.

αυτὸς reperculsiuorum.

POrri, qui in cerealibus uasculis reperitur, libras treis, cadmiæ crematæ & ablutæ libram unam, cerussæ lotæ, pompholygis lotæ, terræ asteris ablutæ, singulorum uncias sex, thuris, myrrhæ, uniuscuiusque unciam unam, succi seminis lini, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnogræci, cuiuslibet libram unam, tragacanthæ uncias sex, comeos libram unam.

λάμβονς.

CAdmiæ unc. unam, pompholygis uncias quatuor, cerussæ lib. unam, tragacanthæ, comeos, opij, cuiusque uncias iij. aquam pluuialem.

Spodiaceū ad inflammationes & fluxiones & chymoles.

THuris, stibij, singulorum drachmas centum, cadmiæ, cerussæ, uniuscuiusque drach. uigintiquatuor, terræ Samiæ, succi papaueris, cuiuslibet drach. treis, comeos drach. quindecim, cōterito & eliquato in succo thalissæ, quæ est summus colliculus in noua germinatione oleæ. Cæterū succum hoc modo facito: molliora oleæ folia lota, in mortariolo aquā affundens contundito, & per linteum exprimito.

αὐτὸς ἰσχυρὸς mollis ac tenerum.

THuris denarios quatuor, stibij denarios quindecim, cadmiæ denarios duodeuiginti, cerussæ denarios undequinquaginta, terræ Samiæ denarios octodecim, opij denarios sex, comeos denarium unū, plumbi combusti & abluti denarios octo, excipe succo thalissæ.

Aeris cremati denarios duodecim, sandycis unc. uigintiquatuor, fo-
liorum oleæ, opij, singulorum uncias duas, commeos unciam unam,
uino spathite uel Amineo contere.

κλαυδιαν Claudiacum.

Glaucij, sarcocollæ, singulorum drachmas quadraginta octo, croci
drachmas uigintiquatuor, opij, myrrhæ, hæmatitæ, uniuscuiusq; dra-
chmas sex, tragacanthæ drachmas duodequinquaginta, commeos dra-
chmas sedecim, uino Italico excipe. Vfus eius ex ovo.

Aliud *Αἰδορμυρρῶν*, ad rhyadas oculorum uitia, quibus obnoxij cantu lachry-
mas continere nequeunt, & ad Aegylosas.

10

Cadmia lotæ, lapidis hæmatitæ abluti, singulorum drachmas uigin-
tio octo, myrrhæ, cinerulæ, quod spodion græce uocant, cypriæ,
uniuscuiusq; drachmas uigintiquatuor, opij drachmas octo, croci dra-
chmas quatuor: sunt qui accipiant drachmas octo, piperis candidi gra-
mæ triginta, commeos drachmas sedecim, uino Italico excipe. Vfus eius
confecturæ cum ovo in recenter aqua inter cutē laborantibus probatur.

στακτικὸν Prosechij.

Cadmia, commeos, singulorum denarios uiginti, stibij, chalcanti,
cuiusq; denarios octo, opij denarios quatuordecim, ferruginis rasilis
drachmas decem, piperis albi denarios sex, croci denarios octo, misyos
crudi denarios octo, opobalsami denarios quatuor, cum aqua.

ὕψιδιον Ammonij.

Cadmia, aeris, uniuscuiusq; denarios sedecim, cerussæ, castorij, aloës,
croci, cuiuslibet denarios quatuor, squamæ denarios quinque, florum
rosarum, plumbi cremati, singulorum denarios octo, lycij denarios treis,
lapidis schistes denarios quatuor, opij denarios decem, acaciæ denarios
quadraginta, commeos denarios duodequinquaginta, aquæ quantum
fatis esse uidetur.

Ὀλύμπιος siue olympiacum.

30

Acaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorum denarios octo, aeris com-
busti & abluti, stibij cremati & colluti, cerussæ tostæ & lotæ, cad-
miæ, uniuscuiusq; denarios duodecim, myrrhæ, opij exiccati, cuiuslibet
denarios quatuor, croci denarios quinque, æruginis rasæ denarios treis,
lapidis scissilis, squamæ rubeæ, lycij Indici, omphacij, cuiusq; denarium
unum, castorij, florum rosarum, uniuscuiusq; denarios duos, phœnico-
balanorum denarios quatuor, consimiliter etiam ossa dactylorum cre-
matorum numero quinque, commeos uncias quinque, aquæ pluuialis quan-
tum sufficit, irrigatur autem & macerantur in aqua dies naturales treis:
calami odorati, alterci seminis, rosarum andarum, cuiuslibet denarios qua-
tuor, folij denarium unum.

40

Ναρδινόν.

Cadmia, croci, commeos, singulorum denarios triginta sex, aeris cre-
mati

mati denarios octodecim, stibij, acaciæ, singulorum denarios triginta, nardi Syriacæ denarios duodecim, opij, myrrhæ, uniuscuiusque denarios sedecim, cum aqua.

Theodotium paruum.

Accipit stibij, acaciæ, singulorum denarios uiginti, æris tosti denarios octo, cerussæ denarios quatuor, myrrhæ tantundē, æruginis denarios duos, aloës, meconij, lycij, singulorum denarium unum, aquæ pluuiæ quantum satis est.

Rhinarium.

Lapidis hæmatitæ, lapidis schisti, uniuscuiusque denarios sedecim, æris cremati, cadmiæ, ferruginis, cuiuslibet denarios octo, opij denarios quinque, chalcitidis denarios duos, commeos denarios octo, uino conterito.

Oxyfter.

Smit pumicis combusti, misyos cremati, ostrij tosti, singulorum untiæ sex, cadmiæ, opij, chalcitidis deustæ, croci, aloës hepatitidis, castorij, solij, cuiuslibet denarios duos, stibij, acaciæ, uniuscuiusque unciam unam, æris usti uncias quatuor, myrrhæ troglitidis denarios quatuor, spicæ nardi denarium unum, cerussæ denarios octo, cōmeos unciam dimidiatam, aquam pluuiam. Quidam uinum quoque admiscunt.

Hecatombe ad cicatrices crassas.

Constat cadmiæ crematæ atque ablutæ, æris combusti pariter & abluti, uniuscuiusque denarij octo, stibij deusti, acaciæ, cōmeos gilui, singulorū denarij quindecim, aloës, gallæ, uermicularis æruginis, castorij, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ, cerussæ, scobis hebeni, chalcitidis, singulorū denario uno, rosarū denarij sexaginta, aqua pluuiæ sufficere.

Διὰ καύσεως, ex monumentis Galeni.

Plumbi combusti, cornu ceruini cremati, singulorum uncias duas, cerussæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ deustæ, æruginis, myrrhæ, commeos, uniuscuiusque unciam unam, & aquam pluuialem.

Διὰ λιβάνου, id est confectio è thure.

Habet thuris uncias sex, cadmiæ, pompholygis, terræ asteris, amyli, commeos, singulorum quadrantem, cerussæ felibram, squamæ æris uncias quatuor, tragacanthæ quadrantem, opij uncias sex, aquæ pluuiæ quantum satis est.

Libanium.

Cadmiæ lotæ, amyli, singulorum denarios duodecim, cerussæ tantundem, spodij, pompholygis, asteris, plumbi cremati & abluti, tragacanthæ, uniuscuiusque denarios octo, opij denarios duodecim, commeos denarios quatuor, aquam pluuialem, & ouorū uiginti albore. Quidam etiam adiiciunt myrrhæ denarios quatuor.

Aster Magni.

Pompholygis, cadmiæ, cerussæ, singulorū denarios sedecim, plumbi

denarios octo, amyli denarios octodecim, thuris denarios decem, terræ asteris denarios duodecim, myrrhæ denarios duos, tragacanthæ, com-
meos, uniuscuiusq; denarios octo, cum aqua.

Vranium.

Habet terræ asteris, piperis, cuiusq; quadrantē, cinerulæ lotæ unc. i. commeos uncias iij. stibij cremati atq; abluti uncias duas, squamæ lotæ unc. i. opij denarios sex, cadmiæ combustæ & elotæ denarios ij. aquam pluuialem. Quod quidem incarnat, atq; reperiendo reijcit.

δια χυλῶν τέλει, id est ex succo fœnogræci.

Contere & eliquato in succo fœnogræci, cadmiæ, tragacanthæ, sin-
gulorum uncias octo, cerussæ, amyli, uniuscuiusque uncias triginta, opij unciam unam.

Collyrium Cleonis.

Habet pompholygis, plumbi, singulorū uncias quinq; croci sesqui-
unciam, squamæ stomomatis unciam unam, commeos uncias duas, & aquam pluuialem: Aquosum illinito.

Diarhodon collyrium ē septuaginta duabus.

Rosarum uiridiū uncias septuaginta duas, cadmiæ combustæ & elo-
tæ denarios uigintiquatuor, eruginis rasæ denarios duos, spicæ nar-
di denariū unū, squamæ aeris lotæ denarios duos, stibij tosti atq; abluti,
opij, myrrhæ, uniuscuiusq; denarios treis, croci unciam unam, amyli dena-
rios duos, cōmeos denarios uigintiquatuor, & aquam pluuialem.

Diarhodon album.

Cadmiæ deustæ atq; ablutæ, cerussæ elotæ, singulorum librā unam,
amyli, opij, tragacanthæ, uniuscuiusq; quadrantē, aloës unciam unā
& dimidiam, commeos uncias treis, croci sesquiunciam, rosarum ad un-
guem exquisitarum uncias sex, & aquam.

αλοῦς, id est ex aloë collyrium.

Dialoës compositio habet cadmiæ, cerussæ, aloës, singulorum uncias
decem, rosarū uiridium uncias sex, amyli quadrantem, opij unciam
unam, tragacanthæ uncias duas, commeos uncias treis, aquæ pluuiæ
quantum satis est.

Crocinum diarhodum.

Δ*ιάρροδον* cognomento crocinum constat ex spicæ nardi, rosarum ari-
darum, aloës, singulorum denarijs duobus, alterci albi denario
uno & dimidio, croci denarijs quatuor & semisse, glaucij uncij sex, sar-
cocollæ uncij sex, opij denarijs duobus, tragacanthæ uncia una, & aqua
denique pluuiali sufficiente.

Diarhodon Nil.

Habet rosarum tenellarū denarios quatuor, croci denarios duos, pa-
paueris obolum unū, cōmeos denarios quatuor, & aquā pluuiam.

δ λυλῶν oxydorcicus, id est Lynceus uisum acuens.

Cadmiæ, aeris cremati, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum
denarios

denarios duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitæ, opij Thebæi, uniuscuiusque denarios sex, aloës hepatitidis, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum denarios quatuor, ferruginis rasilis, succi panacis, salis ammoniaci, cuiuslibet denarium unū, cōmeos denarios sex, & aquam pluuialem.

Proteus ad eadem, & cicatrices extenuans.

CAdmiæ, cerussæ, chalcitidis crudi, singulorum denarios quadraginta, piperis sesquidrachmā, succi Cyrenaici denarios octo, croci denarios duodecim, opij Thebæi denarios decem, sagapeni sesquiunciā, oliuæ Aethiopicae tantundem, auripigmenti, aluminis fissi, singulorum unciam unam, myrrhæ unciam unā cum dimidia, guttæ ammoniaci thymiamatis denarios uiginti, opopanacis denarios sedecim, opobalsami denarios decem, commeos denarios uiginti, aqua pluuiali excipito.

Medicamentum ex succo fœniculi.

CAdmiæ denarios sumit septendecim, atramenti librarij Indici denarios sedecim, piperis longi denarios tredecim, & albi denarios duodecim, succi Cyrenaici unciam unā, opobalsami, spicæ nardi, singulorum denarios sex, sagapeni, opopanacis, cuiusque denarios quinq̃, opij denarios quatuor, euphorbij denarium unum, commeos denarium unū, leuigato in succo fœniculi.

20 Medicamentum *ἡ ἀπὸ πικραλῶν*, id est ex succo balsami confectum.

CAdmiæ, cerussæ, cuiusque denarios octo, omphacij denarios quatuor, piperis albi uncias sedecim, opij denarios quatuor, opobalsami, cōmeos, singulorum denarios sedecim, & aquam pluuialem.

Thalasserus.

CAdmiæ uncias octo, æruginis uncias duas, atramenti librarij Indici uncias octo, piperis albi uncias quatuor, succi Medici unciam unā, opobalsami uncias duas, commeos uncias sex, admixta aqua.

Harmation.

30 **G**uttæ ammoniaci thymiamatis, gris combusti, corticis thuris, singulorum denarios quatuor, æruginis denarium unum, commeos denarios quatuor, cum aqua coelesti.

Malabathrinum, quod etiam appellatur Isotheum.

CAdmiæ denarios sedecim, gris cremati atq̃ abluti denarios quatuordecim, opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indicæ, croci, aloës, singulorum denarios duos, castorij denarios octo, myrrhæ denarios quatuor, acaciæ, stibij, uniuscuiusque denarios quadraginta, aqua excipito.

ἡ χυμὸς δι' αὐτὸν παχύνεται δι' οἶνον.

40 **C**Admiæ, lapidis hæmatitæ & scissi, singulorum denarios quadraginta, æris cremati denarios triginta, chalcitidis denarios triginta duos, papaueris seminis denarios tredecim. Aqua decoquēs meconium & succum exprimens inijce, & eliquato in uino spathite, seu Aminæo.

Aliud dicitur.

Aeris combusti, cadmiæ placidæ, singulorum uncias nouem, lapidis hæmatitæ lotæ uncias sex, croci, myrrhæ, aloës, guttæ ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque quadrantē, lycij Indici, spicæ nardi, cuiuslibet unciam unam & dimidiam, piperis albi grana sesquicentena, acaciæ giluxæ uncias nouem, commeos uncias treis, uino Phalerno aut Amniæo contere.

Medicamentum ex duobus lapidum generibus trachomaticum.

Lapidis hæmatitæ, & schisti, cassiæ, singulorum denarios duodeviginti, æris, cadmiæ, opij, æruginis rasæ, uniuscuiusque denarios nouem, cōmeos tantundem, chalcitidis tostæ denarios sex: adijce aquam.

* Xerocollyrium Galeni præseruans.

Lapidis Phrygij in tennes partes dissecti, & in aulula donec ignitæ reddantur deusti, & butyro recente extincti, deinde denuo cōsimiliter tosti, & uino Phalerno extincti, atque tertio combusti, melleque extincti & exicati libram unam, æris cremati, piperis albi, folij, singulorum unciam unam, stibij unciam unam cum dimidia: & ubi singula leuigata & eliquata fuerint, & quum tollere medicamentum uolueris, succum balsami non crassi sed pellucidissimi unciam unā inijcias: prohibet enim illud ne aridum reddatur medicamentū. Vtere autem illo circa solas palpebras, adhibendo melam instrumentum, tunicas nō attingens, uerum ut solis palpebris diductis immitatur pharmacum. Illinito autem non semel modò, uerū sæpius cum ante, tum post cibum, & potissimum quum iam senserint oculorū dolorem, quem ophthalmiam appellant: mirifice namque & plus quouis alio medicamento præferuat.

Aridum Diacrocum.

Glutini carnis, quam sarcocollam dicunt, denarios octo, croci denarios quatuor, glaucij tantundem, illinito sæpius in die. Nonnulli uero aloën quoque adijciunt.

Aliud aridum ad aridam lippitudinem, sicationem, sepedonas, & hyperfarcomata, id est super crescentias carnis.

Sumit cadmiæ denarios decem, chalcitidis denarios uiginti, piperis & grana quindecim, nardi Gallicæ denariū unū. Cadmiā cōterito chalcitidis cum uino, & ubi aruerint, reliqua immitte, & redige in puluerem.

Liquida dicitur a cornu ad id os, hoc est ex pede gallinæ.

Cauliculi (quem pulli pedem uocant) succi, trixaginis, coronopodis, id est pedis cornicis, interdū uero etiam succi othonnæ æquales portiones. Est autem othonna chelidonium mega, hoc est hirundinaria maior.

Alia ad sicationem, & encathidas, & farcomata.

Misys affati denarios sex, chalcanthi denarios quatuor, mellis Attici sextarium unum.

Eras-

Erasistrati multiplicis usus liquida, admirandi effectus, cum in oculorum, tum glandularum, tum genitalium affectionibus, tum purulentis & saniem stillantibus auribus.

Aris denarios sex, misyos assati, myrrhæ, singulorū denarios treis, croci denariū unū cum dimidio, piperis denariū unū, uini Chij, & passi Cretici, cuiusq; sesqueminā. Cōterendo omnia in uino donēc aruerint, infunde passum & coque, quatenus mellis nanciscat spissitudinem.

Medicamenta quæ fronti, dum oculi fluxione laborant, imponuntur, ἀποκλυσματα à medicis appellata.

- 10 **T**erræ Samiæ, manna, thuris, myrrhæ, æquas portiones oui albo re excipiens, in linteolum impactas fronti imposito. Aliud: Seminis herbæ apollinaris, quam hyoscyamum dicunt, denarium unū, opij tantundē, myrrhæ denarios duos, croci denarium unū, pollinis denarios quatuor, ouorum assatorum lutea duo, oui candido excipito.

De emplastris, & ijs quæ in decoctiones eorū inferuntur, ex monumentis Antylli. Et de symmetria ceræ ad oleum. Cap. xvii

Ex medicaminibus quæ emplastris induntur, alia quidem terrosa sunt: uerbi causa metallica, quæq; è lapidibus terræq; sunt genera, feces, cineres, & cōchylia, alia uero oleosa, alia lachrymæ, alia liquida, alia liquores, alia succi: semina præterea ac

- 20 herbas, radicesq; pauca accipiunt. Emplastrorum porro, quædam sunt uulneraria, quæ σίματα, hoc est sanguinea (quæ cruentis uulneribus imponuntur) & cōglutinatiua, & catagmatica (quæ fracturis adglutinant) appellamus, eo quod arefacientiū summū excessum nō habent, sed oportet simplicia secundi à temperatis excessus completi, & tertij inchoantis cōponere: cuius farinae sunt, salix, quercus, cupressus, pini & piceæ cortices, myrrha, libanotus, bitumen, aloë, malū terræ, quam aristolochiam dicunt, cinis clematinus, cerussa, spuma argenti, atq; innumera quædam metallica. Decoquuntur aut usq; ad concretionem & consistentiam non inquinantem. Quædam uero ἐφολυτικὰ, concinnantur quidem & ipsa

- 30 ex arefacientibus, magis uero quàm cōglutinatiua: cuius utique generis sunt, æs ustum, & squama cum ipso, tum ferri, ærugo, chalcitis, flos æris crematus, alumen, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostrea. Quædam item diaphoretica, hoc est dilijciendi & distrahendi uim habentia, quæ ex calorificis & mediocriter siccificis constant: exempli gratia, malo terræ, thapsia, oleo ueteri & raphanino, melle, opobalsamo, pice terebinthina, salibus tostis, salis flore. Quædam emolliendi uim obtinent, & ob id μαλακτικὰ dicunt, ea sanè ex spuma argenti fiunt, & adipibus, & medullis, oleo ueteri, propoli, gutta ammoniac, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel radice althææ, et cucumere syluestri. Quædā uero siccifica, quæ sulphure, nitro, sale, cinere, bitumineq; constant. Quædā uero ἀποσπαστικὰ, id est attractiua sunt, ea ex salibus & nitro, propoli, ærugine, fermēto, stercorebus, sulphure, resina terebinthina conficiuntur. Concoquendi præterea munere prædita συμπερικτὰ

nuncupata, ē cera, ladano, uua passa, fatiua, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, hyssopo, adipe, ferugine præparantur. Sunt porro quæ suppurationem inducunt, quæ Græci *ὑπερβολικά* uocant: ea ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chondro, butyro, adipe porcino & uitulino, thure, pice, resina fiūt. Neq̃ defunt ex emplastris quæ à re & affectu *ὑποκρικά*, id est consolatoria & mitigatiua nomenclaturam obtinuerunt: confarcinantur autem ex spuma argenti, cerussa, oleo, anetho, chamemelo, amylo, ceraq̃ dealbata. Sunt aut̃ ena, ma emplastra recentibus etiamdū uulneribus et fracturis applicāda, quæ suppetias conferunt ipsis præsentissimas: super emplastella, quæ Græci *παραλυσία* uocant, spongiās posca irrigatas pariter alligātes, soluendāq̃ rursum ter eadem splenia, neq̃ alia iniicienda. Malactica aut̃ & epispastica, & diaphoretica, sympeptica præterea, & empyetica accipiuntur post ca taplasmatum & cerotarū usum. Paregorica uero circa principia statim, in extremis corporis partibus magis quadrant. Cæterum super decoctione eorum deinceps uerba faciemus.

Βασιλινὸν τετραφάρμακον, hoc est regale ē quatuor constitutū medicamentū,

Conficitur tetrapharmacum regale ē ceræ, colophoniar, picis, adipis taurini portionibus æquis.

Emplastrum ex succo seminis lini, distrahens & abstergens.

Accipit olei ueteris libras duas, ceræ uncias uiginti, colophoniar, adipis porcini, singulorum libram unam & dimidiam, spumæ argenti libram unam, cerussæ uncias sex, succi seminis lini tantundem, polinis unciam unam, thuris uncias quatuor.

αἰὲ μύλιτος, hoc est ex melle contextum,

Spumæ argenti, ceræ, olei, singulorum libras quatuor, resinæ terebinthinæ lib. duas, mellis, adipis porcini, uniuscuiusq̃ librā unā. Aliud: Spumæ argenti libras sex, olei libras quinq̃ & dimidiam, colophoniar libras septem cum dimidia, ceræ libras treis & semissem, mellis lib. treis.

Exemplum *ἡ χυλῶ*, id est ex succo.

Spumæ argenti libras sex, olei æstate quidem libras septem, hyeme uero libras nouem, scenogræci sextarium dimidiatum, seminis lini sextarium dimidium, althææ libras treis. Althæam ac semina coquito in aquæ sextarijs uiginti, donec parū relinquat̃ ex ipso, libras quatuor admiscens oleo decoque, tantisper dum bullæ sedantur, deinde leuissimā argenti spumā inspergēs decoque igni clemente usq̃ dum syncerū reddat̃.

αἰὲ γύριος, id est ex polline.

Pollinis, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum libram unam, pityinæ, ceræ, adipis porcini, uniuscuiusque libras duas, succi seminis lini quantum satis est.

Botanicum, id est herbaceum.

Rvmicis, olei squallidi, anchusæ chæropelethi, est autem onoclea, serpinerui, plantaginis singulorū unc. treis, olei libras sex, adipis porcini libras sex. Herbæ in oleo coctæ abijciunt̃, cætera cum oleo eliquant̃.

διασφοδ'ιλαρ, id est ex albucis.

A Sphodeli radices succi libram unam, rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum uncias duas, adipis porcini uncias treis, ceræ uncias quatuor.

Emplastrum ex fermento rumpens abscessus.

F Ermenti, axungiae, uniuscuiusque uncias sex, salis uncias iij. resinae pini uncias treis, ceræ uncias quatuor, spumæ nitri unc. unā, guttæ ammoniaci thymiamatis uncias duas, mellis uncias sex, saponis unc. duas, Dothienē.

G Vttæ ammoniaci thymiamatis libram unam, nitri Alexandrini uncias sex, spumæ nitri tantundem, adipis porcini, ceræ, singulorum libras duas, resinae terebinthinæ libram unā, olei ueteris unciam unam, aceti quantum satis est.

Emplastrum *εἰς σφοδ'ι* discutiens scrophulas, quas choeradas dicunt Græci.

Spumæ argenti, struthij, mali terræ, singulorum uncias quatuor, galbani, squamæ æris, aloës, uniuscuiusque unciam unam, mannæ uncias duas, guttæ ammoniaci thymiamatis uncias sex, pityinæ uncias sedecim, aceti scillitici sextarios quatuor, aridis contritis immitte.

Smilicum ad abscessus.

Olei ueteris librā unā et dimidiā, spumę argenti, nitri rubei, salis ammoniaci, lixiuij siculnei protofacti, resinae, cuiusque librā unā, galbani, guttę ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque uncias treis, atramenti sutorii uncias quatuor, cerę uncias sex, gruginis, opopanax, cuiusque unciam unam, aceti quantum satis est. Coquito spumam argenti & ferruginem in oleo quousque purgetur, deinde sic reliqua inijcito.

ἀπὸ σκόρδ'ι, id est ex allijs ruprium.

Ceræ uncias sex, colophonix uncias quatuor, pityinæ uncias treis, adipis taurini uncias quatuor, nitri rubei unciam unam & semis, alia purgata uiginti, olei sextarium dimidium. Alia in oleum inijciens decoquito, & reliqua admisceto.

διασποδ'ι, distrahendum habens.

Habet adipis anserini & phasianorum, uniuscuiusque uncias treis, olei ueteris uncias uiginti sex, pulicaris herbe uncias treis, cnidos semen radices apyrani uiridis librā unam, ceræ dealbatæ uncias decem, confectiois *εἰς χυλ'ι* uncias duas, resinae terebinthinæ unciam unā. Radicē in tenuia frustula concisam in oleo cum herba pulicari, & cnidospermum per noctem atque diem macerato, tum uero elixans ipsa quidem porricito, eliquata autem oleo miscens, resolutio.

Pyrine ad duritias & scirrhomata.

Althęæ, dactylorum palmæ, uniuscuiusque libras duas, scenograeci, seminis lini, singulorum sextarium dimidium, chamæmeli, meliloti, elatæ, cuiuslibet uncias sex, uini, Aminæi, cuiusque sextarium dimidium, spumæ argenti libram unā, cerussę, colophonix, singulorum libras

duas, cere, resinae terebinthinæ, cuiusq; libram unam, olei ueteris libras quinque, aquæ libras duas, panis aridi contusi & attaminati libras quinque. Herbae in uino decoctæ in succum rediguntur, & in succo, panis irrigatur, postera uero die spuma argenti & cerussa in aqua leuigantur & resoluuntur: deinde oleo infuso coquitur donec impollutum euadat, tum deniq; cætera insciuntur, sublatis autem ab igne immittitur panis, strenuèq; rudicula despumant. Postremo æruginis quoq; rasæ, & florum salis, uniuscuiusq; uncia sex, ireos, mali terræ, singulorum uncia sex, resinae terebinthinæ libra una, insciuntur.

Pelarium *δι' ἀλυσματός*, hoc est ex argenti recreamento, ad desquamationem.

CEræ, adipis taurini uncias quinque, recrementi argenti (quod appellatur helcysma) uncias sex, colophoniar uncias quatuor, picis, olei, singulorū uncias duas. Helcysma aridum dissoluitur uino, uel succo scœno græci: ubi uero ad manum helcysma non fuerit, plumbagine utimur.

Emplastrum *δι' ἀλυσματός*, podagricis & alijs duriciis utile.

SVcci scœnogræci, & seminis lini, & althææ, singulorū libras treis, olei libras duas donec succus euanescat decoquens, deinde inferere colophoniar libram unā, resinae terebinthinæ tantundē, hederæ lachrymæ uncias treis: quando autē resoluta fuerint, tollens ab igne, cere libram unā, galbani uncias quatuor insice, utraq; aut simul contusa soluendo, rudicula moue.

Emplastrum hederaceum siue cissinum, ad neruorum uulnerationes

& puncturas tnygmataue maxime uetera.

SQuamæ rubræ uncias quatuor cum dimidia, thuris, misyos, singulorum unciam unā chalcitidis denarios quatuor, aceti sex. Leuigato sole æstiuo donec consumatur, deinde soluens ceræ uncias octo, olei uncias duodeuiginti admisce: si uero diducat, & neruum denudet, pro galbano resinae terebinthinæ uncias duas insice.

Melanchlorum ad eadem, & Enæmon.

MAlicoriorum, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi, & liquidii: alij uero pro liquidio rotundum accipiunt, ireos, misyos, chalcanthi, chalcitidis, æruginis rasis, cadmiæ, aloës, myrrhæ, thuris, radices panacis, spumæ argenti, cerussæ, pari omnia pondere eliquantur, & leuigantur sub sole æstatis tempore cum aceto ad sufficientes dies, & finguntur pastilli. Emplastrum inde fit hoc modo: pharmaci uncias duas, cere uncias sex, olei uncias octo, in neruis quidem sauctis perantiqui, in reliquis uero communis, adijce:

διὰ νηριγίαντος, hoc est ex senectione coniectionum.

SEnetionis succi libras duas, olei ueteris libram unam cum dimidia, olei cyprini uncias quatuor, axungia ueteris libras octo, resinae terebinthinæ unciam unā, galbani unciam dimidiam, resinae piceæ uncias sex, æruginis, thuris, hyssopi, pharmaci, uniuscuiusq; unciam unā, squamæ æris diobolos octo, ceræ uncias decem, apochymatis uncias quatuordecim.

cin. Coquito autem oleum ad strigmenti usque crassitudinem, cum suilla axungia, & arida cyprino eliquato, galbanum uero contunde cum cera, & injice cacabo, & ipsum apochyma si quidem aridum fuerit, tritum cribrans ponderato, & impinge. Quod si nequeat leuigari, cum parte olei dissoluti colato & extrahito, & tum omnia commisceantur.

Mnaſai emplastrum diaphoreticum.

Accipit ceræ, axungię porcine, singulorū libram unam, colophonię uncias sex, spumę argenti libras duas, uini boni libras quatuor.

Ariobarzanius ad easdem affectiones.

Spumę argenti unciam unam & dimidiam, cerussę libram unā & uncias quinque, aquę marinę uncias uiginti quinque, olei ueteris libram unam & dimidiam, buccinorum crematorū uncias septem & dimidiam, cerę fuluę uncias nouem, resinę terebinthinę uncias sex, thuris uncias treis & grammata tria cum semisse.

Emplastrum ex dracontio.

Cerę, colophonię, picis aridę, axungię, resinę singulorū libras quatuor, guttę ammoniaci thymiamatis libras duas, dracunculi radices libras quinque. Radix arida leuigata alijs inspergitur dissolutis.

Plitacium.

Habet cerę, colophonię, adipis porcini, alterci foliorū tenellorum, uel succi ipſorum æquale pondus. In Alexandria uero cerę sesqui libram, alterci libras duas, axungię libram unam cum dimidia, colophonię libras decem sumunt, & uehementius disijcit.

Myrsinatum.

Spumę argenti, cerussę, sandycis, plumbi combusti & abluti, singulorum unciam unam, cerę uncias sex, olei myrsinati libram unam, uini quantum res ipsa postulare uidetur.

Medicamentum *ſiſt. 4. ſeu 5. id est ex cerussa, uel*

ſi 6. hoc est ex ouis.

Habet cerę dealbatę uncias sex, rosacei libram unam cum dimidia, spumę argenti, cerussę, singulorum uncias duas, amygdali uncias treis, albores ouorum quinque.

ſi 7. hoc est medicamentū liquidum Orisaij.

Spumę argenti unciam unam & dimidiam, cerussę sesqui unciam, cerę uncias quatuor, pinguetudinis suillę uncias septem, colophonię uncias nouem, succi feminis lini, olei, singulorum uncias decem. Mirifice conducit ad calcaneorum rimas. In huiusmodi autem inquit, præseruat, graueolens etenim redditur.

Emplastrum *ſi 8. ad ſuillę aphuloticum.*

Chalcitidis crematę uncias duas, cadmię, mannę, singulorum unciam unam, cerę, colophonię, olei myrsinati, uniuscuiusque libram unam, uini quantum satis est.

Emplastrum Phoenicine, hoc est ex dactylis.

Accipit axungiae ueteris libras duas, olei libras treis, spumae argenti tantundem, chalcitidis crudae uncias sex. Ante omnia quidem chalcitis cum oleo eliquetur, & leuigetur in mortariolo mundo, uel etiam in sole: ubi autem strigmentosum redditur, tum spumam quoque argenti, ante contritam inijcito, deinde uero adipem: & ubi iam egregie leuigata & emollita fuerint, clementi igne decoquito, donec impolluta redantur, rudicula subinde agitans. Esto aut rudicula, uirgultu palmaru.

Emplastrum *duyxxvov*, id est ex anchusa confectum, ad igne combusta.

Habet cerae dealbatæ uncias nouē, rosacei uncias octodecim: quibus reliquatis, impinge purpureæ anchusæ radicis aridæ leuigatissimæ uncias quatuor. Aliud: Anchusæ radicis uiridis, marrubij, comneos, singulorum uncias treis, decoquito in olei uncis nouem, & abijciens immitte oleo cerae dealbatæ uncias quindecim, & dissolue semissem.

Emplastrum Pompholygeron.

Bvllæ, quam pompholyga appellant, uncia duæ, spumæ argenti uncia tres leuigantur cum succo seminis lini, & inijciuntur liquefacta & refrigerata cerae uncis sex, adipis anserini, uel gallinacei uncis duabus, chamæmeli uncis sex.

Philocotyche indoloria, sedî destinata.

Continet thuris uncias septendecim, myrrhæ uncias septem, opij denarios quatuor, aluminis scissi denarios duos, butyri denarios quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmiæ crematæ atque ablutæ denarios quatuor, pompholygis denarios sex, cerae Tyrrenicæ denarios octo, adipis anserini denarios sedecim, medullæ cerui denarios undecim, plumbi combusti & cloti denarios octo, lapidis hæmatitæ denarium unum, hyssopi liquidî denarios quatuor: Arida cum uino conterito ita lico, & eliquata admisce.

Amythaonis ad angylas & articulos conuulsos: est autem etiam euulsium, quod dicunt Græci *ἀμυθαονίς*.

Gvttæ ammoniaci, cerae, bdellij, uniuscuiusque uncias octo, resinae te- grebinthinæ, ireos Illyricæ, galbani, singulorum denarios uiginti.

Aristophanium mollificans, quod *μαλακυνόν* Græci indignant.

Habet picis libras quatuor, apochymatos libras duas, cerae libram unam, opopanacis unciam unam, aceti uero cotylam unam.

Emplastrum ex plumbagina, ad calidos affectus.

Plumbaginis uncias quatuor, spumæ argenti, cerussæ, singulorum uncias duas, cerae uncias octo, myrti libras duas: arida uino dissolue.

Coracum ex aceto mulso, genitalibus destinatum, & ad nomas accommodatum.

Gallæ uncias duas, squamæ unciam unam & dimidiatam, chalcitidis, thuris, singulorum unciam unam, macerato in aceto dies quot res ipsa

10

20

30

40

ipſa expoſtulat, deinde admiscens mellis uncias quinque. Seorſim præte-
rea cōpingens cerotā ex myrtei uel roſacei uncijſ duabus, et adipis tauri
ni unc. octo, ceræ unc. iij. reſinæ terebinthinæ uncia una, quibus mixtis
ſimul leuigato & eliqua. Vtere perinde atq; *ſὴ χάρτο*, cum per Pyulcum,
tum per Motum, id eſt linteolum conceptū quod intra hulcera cōditur,
αὶ ὀφθαλμοῖς, hoc eſt ex oleo & aceto.

Habet ſpumæ argenti partem unam, olei, aceti, ſingulorum partes
duas, ſecundum nonnullos uero treis.

10

αὶ τὸ χάρτο, id eſt ex achate lapide, uim diſtrahendi
& emolliendi obtinens.

Conſtat ex achate lapidis ſemiſti uncia una & dimidia, ceræ uncijſ
quinque, phryctes uncijſ tribus, olei uncia una.

ἰſὶς πύμας, hoc eſt ſanguinea, conglutinans, in-
carnans & expurgans.

20

Accepit ſquamæ æris, æris cremati, mali terræ rotundi, uniufcuſque
denarios octo, aluminis fiſſi denarios ſex, ſalis ammoniaci denarios
octo, thuris tantundem, guttæ ammoniaci thymiamatis denarios octo,
myrrhæ, aloës, galbanī, ſingulorū denarios duodecim, ſucci radicis dra-
cunculi unciam unam, ceræ libram unam, colophonix libras duas, olei
ueteris uncias treis, aceti quantum ſatis eſt.

Athana ad hulcera ſordida, ſphenofes, hoc eſt denſitates & cuneæ
tiones, neruorumq; uulnerationes.

Malcoriorum, æris cremati, gallarum, mali terræ rotundi & longi,
aloës, guttæ ammoniaci thymiamatis, ſquamæ æris, aluminis fiſſi,
atq; rotūdi, ireos, miſyos, chalcāthi, chalcitidis, æruginis rafilis, cadmig,
aloës, myrrhæ, thuris, propoleos, galbani, uniufcuſq; unciam unā, ce-
ræ, picis, ſingulorum denarios ducentos, colophonix denarios centum,
olei uncias ſex, aceti quantum ſatis eſt.

Emplaſtrum *ſὴ δ' ἰκτάμω* conglutinatum, ad morſus
canum, & omne genus hulcera,

30

Spumæ argenti libras duas, ſquamæ æris unciam unam & dimidiam,
Solei ueteris ſextarios duos, diphyrgis uncias treis, gentianæ ſeſquiun-
ciam, ariſtolochiæ ſciſſilis uncias duas & ſemiſſem, dictamni tantundem,
colophonix libram unā, mannæ uncias treis, guttæ ammoniaci thymia-
matis uncias ſex, propoleos unc. duas, ceræ uncias ſex & dimidiā. Opor-
tet principio oleum cum ſpuma argenti donec ſyncerū reddatur deco-
quere, deinde exemptis hiſ æruginē & ſquamas injicere, ac denuo tantū
ſper dum ab inquinamētis uindicetur decoquere, quibus rurfum ſubla-
tis, immittere reſinam, guttam ammoniacam, attaminata, & cōmouere
quoad ceſſet feruere, denuoq; imponere, et ubi puſillū ſerbuerint, & atq;
diphyrges inferere, & tertio dum inquinetur decoquere, mox ceram &
propolim donec purum fiat, decoctam injicere, & paulò poſt aloën, man-
nam, dictamum, malum terræ, gentianam inſpergere, & admodum qui-
dem ſed paulatim refrigerare.

40

Emplastrum barbarum *ῥῆμαρ*, & poros fracturæ
rum demonstrans.

Bituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resing, uniuscuiusq; libram unam, resinæ terebinthinæ uncias duas, spumæ argenti unciam unā, cerussæ unciam unā & dimidiā, mannæ, opopanax, zingiberis, singulorū uncias duas, olei uncias treis, aceti quantum satis est.

Emplastrum *ῥῆμαρ*, id est ex salicibus, conglutinatum, & ad hæmorrhoidicos, empyos, thoraci impositum utile.

Misys, chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallæ, aluminis fissi, & rotundi, atramenti metallici, singulorum uncias sex, ceræ, pityinæ, picis, cuiusq; libras duas maliciorū uncias sex, bituminis libras duas, foliorū salicis tantundem, olei rosarū uncias quatuor, chalcanthi uncias sex, aceti quantum sufficit: quidā resinæ quoq; terebinthinæ uncias novē adijciunt.

Emplastrum Nicolai *ῥῆμαρ*, conglutinans lacunas.

Squamæ æris uncias quatuor, ferruginis rasilis, spumæ argenti, singulorum unciam unam & dimidiam, mali terræ longi, & rotundi, uniuscuiusq; unciam unam, aluminis scissilis & rotundi, chalcanthi, sulphuris ignem non experti, cuiuslibet unciam unam, gallæ omphacitidis, id est immaturæ uncias quatuor, salis ammoniaci, misys, origani, chamæleonis, cadmiæ botrytidis, ueratri candidi, singulorū unciam unam, peucedani uncias treis, seminis apij uncias duas, symphyti radice unciam unā, cerussæ sesquiunciam, succi mandragoræ unciam dimidiatam, chalcitidis unciam unā cum dimidia, Samij asteris, thuris masculi, aloës, singulorum unciam unā, bdellij, opij Thebæi, cuiusq; uncias duas, zingiberis troglitidis unciam dimidiā, guttæ ammoniaci thymiamatis unciam unā, scenogræci uncias sex, succi perdicidis tantundem, ceræ flauæ uncias treis, colophonæ libras duas, pityinæ, farinæ, uniuscuiusque libram unam, mastiches unciam unam, picis atræ libras duas, olei ueteris libram unam, styracis tantundē, opopanax libram unam & dimidiam, aceti quantum satis est.

Ictios ad scrophulas, atq; abscessus splenis, articularum, coxendicisq; affectus.

Habet spumæ argenti denarios centum & uiginti, olei ueteris sextarios duos, aceti sextarium unum, æruginis sesquidenarium, corticis pini denarios octo, chamæleonis unā cum radice euphorbij, hypocistidis succi, propoleos, zingiberis, enulæ campanæ, pyrethri, singulorum denarios sedecim, ceræ libras treis.

Emplastrum Neronis ad plagas, & omnem dolorem carnosarum partium.

Olei ueteris libram unā & dimidiam, spumæ argenti libram unam, ceræ, pityinæ, uniuscuiusq; uncias septē cum dimidia, guttæ ammoniaci thymiamatis uncias quatuor, cerussæ tantundem, galbani, mannæ, zingiberis, thuris, singulorum unciam unam.

O xera polychrestos, id est ad multa utilis.

Plcis aridæ libras duas, ceræ libram unam, guttæ ammoniaci thymiamatis unciam unam, resinæ terebinthinæ seslibram, galbani, manne, singulorum uncias duas, aceti sesquifextarium.

Aceratus Galeni, cōglutinandi, præterea maturandi hucera suppurandi quum obtinens, rhicinino ueteriue oleo tanq̃ in emmotū (hoc est liquidū, medicamen quod linteolis conceptis excipitur, hulceribusq̃ inditur) eliquatum.

Spumæ argenti libras treis, olei rhicinini aut perantiqui libras quatuor, aceti acerrimi, squamæ æris, atræ chalcitidis, æruginis, uniuscuiusq̃ uncias duas. Spumam argenti ad strigmentosam usq̃ balneorum crassitudinem cum oleo decoquito, deinde inijce metallica multis diebus cum aceto macerata.

Emplastrum ex metallicis.

Chalcitidis unciam unam, misyos uncias duas, squamæ æris, thuris, singulorū uncias treis, colophonie uncias duas, galbani sesquiuunciam, ceræ libram unam, olei uncias quindecim, aceti quantum satis est.

Harmenia catagmatica.

Chalcitidis uncias quatuor, squamæ æris unciam unam cum dimidia, æris combusti unciam unam, thuris uncias duas, olei, aceti, singulorum libram unam. Coquito metallica in aceto & oleo, donec impolluta reddantur, deinde thus inijcito.

Melinum emplastrum Serapionis.

Spumæ argenti libram unam, ceræ uncias septem, guttæ ammoniaci uncias treis cum dimidia, galbani, ferruginis, singulorū denarios novem, colophonie uncias septem, myrrhæ denarium unū, olei heminam unā cum dimidia, coquito spumā argenti cum oleo, tantisper dum mundificetur, deinde immitte reliqua.

Emplastrum Aniceton, quasi dicas insuperabile, conglutinans, distrahens, squamas remouens, & incuruationibus succurrens.

Baccarum lauri, iridis aridæ, thuris, singulorum denarios sexaginta, Bæris cremati denarios uiginti, nitri, salis, guttæ ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque denarios uiginti, pyrethri, uuæ passæ agrestis, hordei, grani cnidij, sinapis, piperis, stercoris columbini, mali terræ, cymini, æruginis, cyperi, seminis erucæ, cuiuslibet denarios octo, aceti heminas duodecim. Contere & leuigato sub ardentissimo caniculæ æstu, donec acetum euanescat, deinde infunde decocti aridarum ficuum crassissimi uncias novem, quibus confusis pangito pastillos & arefacito. Inter utendum autem ex ipsis pastillis uncias duas solutas aceto, resinæ uncjs tribus, ceræ Tyrrhenicæ, olei, singulorum uncjs duabus admisce.

Emplastrum Nicotopæ, hoc est ex lolijs.

Plcis libram unā, pitynæ uncias nouē, ceræ Tyrrhenicæ uncias quinque, olei uncias treis, bituminis attaminati uncias duas, lolleacæ farinæ sextarium unum, aceti quantum satis est.

Αἰὶ συκαμῖν ἰνῆ, id est ex succo mororum.

Spumæ argenti, picis aridæ, seu taurini, singulorum uncias octo, resine terebinthinæ uncias treis, ceræ uncias quinque, æruginis rasilis, opopanacis, galbani, singulorum unciam unā, olei rhicinini uel susini uel admodum uetusti heminam unam, picis liquidæ tantundem, succi mororum, cuius fructus sycomora appellantur, cotylam unam.

αἰγυμωρ.

Aeris cremati, aluminis scissi, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum unciam unam, ceræ Colophonix, seu porcini, uniuscuiusque libram unam, aceti quantum sufficit.

10

Emplastrum Indicum ad nomas, & hæmoptoicos.

Ceræ resinæ frictæ, picis aridæ, bituminis liquidī, zacynthiæ, singulorum libram unam, cerussæ, chalcitidis, misyos, atramenti metallici, aluminis scissi & rotundi, gallæ omphacitidis, id est immaturæ, mallicoriorum, cuiuslibet uncias sex, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex cinere aspidum, scrophulas (quas Græci chceradas dicūt)

& podagras distrahendi dissipandiq; uim obtinens.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitæ, bituminis Iudaici, singulorum denarios trecentos sexaginta, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammoniaci thymiamatis, spumæ nitri, adipis uitulini, denarios trecentos quadraginta, lapidis pyritæ aqua non extincti, cineris aspidum, olei ueteris heminas duas, pharmaco refrigerato cinerem insperge. Præparatur aut & absque cinere, propterea quod aliqui ægre ferunt. Neque inefficacior lapis Alius est.

20

Lexena desiccans & distrahens.

Guttæ ammoniacæ thymiamatis, plumbaginis, singulorum denarios centum, sinapi denarios octo, radicis chamæleontis denarios sedecim, colophonix denarios centum, squamæ æris, struthij radicis, quinque, euphorbij & æruginis, uniuscuiusque denarios octo, aristolochiæ denarios sedecim, pyrethri denarios octo, olei ueteris heminā unam, & rhanphani quantum sufficit. *Aliter:*

Lexena metasyncritica, & humorum euacuatua.

Chalcanthi uncias duas, auripigmenti unciam unam, hellebori nigri, thoracum cantharidū, singulorum sesquidenariū, sandarachæ uncias treis, ceræ librā unā & dimidiatā, phryctes librā unā, olei heminas duas.

Macedonicum emplastrum.

Ceræ, colophonix, picis, seu taurini, libanoti, æquas portiones eliquans, & tollens ab igne applica & affinge libanotum.

Pilula ad ignita.

Cerussæ, spumæ argenti aqua non extinctæ uisæ singulorum uncias treis, ceræ sesquiunciā, bernicarij, rosacei, uniuscuiusque unciam unā, liquefacta aridis infundens pange pilulas. Inter utendum aut olei uncias sex cum duabus uncis ceræ eliquato, & infice medicamenti unciam unā.

40

& ru

& rudicula agitato siue deſpumato, refrigeratum uero cum aquæ uncijſ nouem contunde: ego roſacei uncias quoq; treis admiſceo.

Al' ῥοſας, id eſt ex rubrica pictorum, incenſione carens, quod hiſ qui uel ultro uel per uim torti ſunt, ſeruit.

OChræ Atticæ libras duas, cretæ libram unam, ſpumæ argenti uncias octo, uino diſſolue, ceræ, colophonix, picis pityinæ, ſingulorū libram unam, reſinæ terebinthinæ uncias octo, olei libras duas. Reſoluitur autem hoc modo: ceræ libram unam, olei ueteris libras treis, medicamenti huius libram unam, uino contunde.

10 **E**mplaſtrum *ῥῖς καὶ ῥοſας*, id eſt ex liquore cedri, conglutinans, diſcutiens & exterens.

CEræ, picis aride, uniſcuuiuſq; libram unam, colophonix uncias octo, Liquoris cedri uncias ſex, quibus eliquatis, ſimul donec à ſordibus perpurgentur, elixa.

Aliud emolliendi uim habens.

MAlacticon emplaſtrum recipit ceræ, picis, ſingulorum uncias octo, colophonix denarios uiginti quinque, propolcos denarios ſeptendecim, liquoris cedri denarios uiginti.

ῥῖς καὶ κριόπις, id eſt ex pumice aphuloſicum.

20 **M**Yrtei libras duas, ceræ libram unam, pumicis cremati & uino extincti denarios ſex, ſquamæ ſtomomatis tantūdem, aeris combuſti, cretæ cimolix, ſingulorū denarios quinque, ſupra linteolum concerptum quod uulneribus inditur, græce *μύρτις* appellatum, & ſpongiam ex aqua.

Emplaſtrum Paula, ſcrophulis & bubonibus deſtinatum.

HAbet ceræ, colophonix, nitri, uniſcuuiuſq; libram unam.

Emplaſtrum *ῥῖς καὶ ῥοſας*, ad anthraces.

Nitri toſti uncias treis, ceræ, olei, colophonix, ſingulorum ſeſquiunciam, ſucci Cyrenaici aut Medici denarios decem. Inditur penicillus uulnerarius, quem *ἰμμορῖς* nuncupant.

30 **E**mplaſtrum *ῥῖς καὶ ῥοſας*.

ACcipit anemones unguibus detractis unc. duas, ceræ uncias quinque, olei uncias quatuor, reſinæ uncias quinque cum dimidia, colophonix libras duas & dimidiatam.

Emplaſtrum Macharionis uiride, iſchiadicis, articulorum cuneationibus & abſceſſibus.

OPopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iſcos, guttæ ammoniaci thymiamatis, mali terræ, uniſcuuiuſq; unciam unā, reſinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, hoc eſt ex uuis immaturis, ſingulorū uncias ſeptē.

Aliud uiride ſimplex.

40 **H**Abet libras treis, ceræ libram unam, ferruginis raſis ſelibram, thuris denarios uiginti quinque, aceti quantum ſufficit.

Aliud uiride, ad perhumida & ſuperexcreſcentias carnis.

Colophonix uncias ſex, æruginis raſæ unciam unam & dimidiam,

ceræ uncias duas, salis Cappadocici unciam unam, rosacei uncias duas, aceti quantum satis est.

Peganera ad pleureticos.

RVtæ uiridis libram unam, butyri sesquilibram, terebinthine uncias quindecim, hyssopi pharmaci uncias quindecim, opoponacis uncias treis, galbani uncias treis, anethi libram unam.

Emplastrum *ἑλκυστῆρος*, hoc est ex pinguisimo myrrhae flosculo, coxendice, artubus, tumoreq; infectatis.

CEræ, olei ueteris, coniae, protofactæ, singulorū libram unam, phryctes, nitri Alexandrini, nitri candidi, resinæ terebinthinæ, uniuscuiusque uncias sex. Nitri utrunq; genus in lixiuio eliquato.

Emplastrum *ἑλκυστῆρος*, ad abscessus & scirrhos tumores.

OLei antiqui, ceræ, spumę nitri, saponis, lixiuij, cuiusq; libram unam, resinæ terebinthinæ uncias sex, galbani, propoleos, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorū unc. unā: preparato perinde atq; proximū.

Emplastrum *ἑλκυστῆρος*, id est ex salibus.

CEræ uncias quatuor, olei libram unam, salis communis uncias quatuor, spumę nitri tantundem, cerussę uncias octo, aceti uncias duas: leuigentur. Aliter: Salis communis, nitri, singulorum uncias quatuor, ceræ, olei ueteris, uniuscuiusq; uncias sex, aquæ marinæ quantum satis esse uidetur.

Emplastrum *ἑλκυστῆρος*, id est petasone, tophos expediens.

Apochyma.

PErnæ porcinae, ueteris pinguetudinis, guttæ ammoniaci thymiamatis, casei antiqui bouilli aut caprini, adipis taurini, apochymatis, quod est ramenti nauigij, singulorum libram unam, medullæ cerui uncias octo, hyssopi cerotæ uncias treis, cyprini uncias sex, uini Aegyptij quantum satis est.

ἀπὸ κνίφιδος ad tophos & alios omnis generis insensilis duricie tumores. Obtinuit autem appellationem

Pampathes.

SPumæ argenti libram unam, olei ueteris sextarium unū, squamæ gris unciam unam, æris cremati tantundem, cinnabaris scrupulos duodeuiginti, magnitæ uiui unciam unam, lapidis Phrygij denarios sex, lapidis pyritæ, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singulorum unciam unam, diphrygis uncias duas, aloës unciam unā & dimidiam, galbani sesquiuunciam, lapidis onitæ Scythici grāmata octodecim, lapidis hæmatitæ unciam unam, propoleos librā unam, & grāmata uigintiocto, ceræ uncias septendecim, lapidis perdicite unciam unam, in alio perdicite habetur, betonicæ unciam unā, & diobolos octo, gentianæ unciam unam, mali terræ longi & rotundi denarios quatuor, chamæleonis nigri unciam unā, dictamni scrupulos quadragintaduo, resinæ siccae libram unam, adipis struthocameli librā unā. Lapides cum spuma argenti cōterito, adijciens floris salis libras duas particulatim, quoad totum moletur.

ἀπὸ λιπώσεων, ad tophos articularum experientia comprobatum.

PRotostacti uncias sex, nucum Ponticarū quas *λιπώσεων*, id est minores nuces appellant, interanei unc. duas, spumæ nitri uncias sex, olei uetusti libram unam, saponis Gallici uncias quatuor, mellis uncias octo, ouorum albuminum paria tria, ceræ uncias decem, resinæ terebinthinæ uncias duas, in protostactō leuigato & eliquato.

διὰ τὸ περὶ αἵματος cerota, ad podagræ dolorē sedandū admiranda.

MArtio mense diem quintū agente in domo subterranea olei cōmunis sextarios duos in cacabū injiciens, coquito lignis ex uitibus, & quando ebullierit immitte turpænæ marini piscis libram unū, & asphaltis animantis, quod quidam madanudan appellant, sanguinis uncias quatuor, & hæc unā usq; dum carnes piscis dissoluantur elixato, uel donec frigrantur: deinde extrahens colans uel infunde olei cere symmetrum usque ad spissitudinem, ut tenerrima molliissimaq; conficiatur cerota, quā impingendo linleo superinducito.

Ταρπνα.
Ασφαλὲς.

Medicamentum ex lotto multo podagricum.

HAbet lotij multi masculi sextarios quatuor, spumæ argenti, olei uetustissimi mystrum unum, eliquans quamplurimum omnia donec glutinosa reddantur, decoquito usq; ad puritatem.

ἀπὸ λίθο αἰσίου αἰθέρος, id est ex lapidis asij flore Philagrii ad scirrhus.

RAdicis peucedani, floris lapidis asij, sin is ad manū nō sit, salis, guttæ Rammoniaci thymiamatis, lanæ succidæ cōbustæ, cuiusq; uncia unā, mali terræ rotundi, pumicis, canini stercoris, æruginis rase, squamæ æris, misyos, singulorum grammata octodecim, castorij scrupulos duos, deuiginti, myrrhæ uncias treis, aceti acerrimi tantundē, cere uncias duos, decim & dimidiam, pityinæ picis, uuarū, cuiusq; uncias octodecim cum dimidia, dioboli sex, olei perantiqui, & aceti acerrimi quantum satis est.

Ex eodem lapillo Galeni emplastrum.

CEræ, resinæ terebinthinæ, uniuscuiusque libram unam, lapidis asij, Cmannæ, singulorum uncias treis, cyprini uncias duas, aquæ lutois quod sufficit.

ἀπὸ ἀλὸς αἰθέρος, hoc est ex flore salis arthriticum in summi morbi uigoris declinatione.

Resinæ terebinthinæ frictæ, pityinæ, ceræ uniuscuiusq; libram unā, picis aridæ, aluminis fissi, salis floris, singulorum libram dimidiam, coquito in diplomate.

Emplastrum trophocarcoticum, hoc est carnem nutriens huiusmodi.

Rosacci, resinæ terebinthinæ, mellis, singulorū unc. ij. cerussæ, butyri, uniuscuiusq; unciam unā, alij uero etiā thuris admiscant uncia unā.

Italicum sordes expurgans & incarnans.

ERinæi, caprifici inquam, hoc est ficus syluestris fructus, teneram corticem in oleo decoctā porrice, & eliquans in oleo, ceræ rubæ quantum satis est, penicillo uulnerario utere.

Entaticum.

SAtyrj, genitalis ceruini, lotij scinchi, singulorum uncias duas, seminis cruceæ, pyrethri, hordei, ceræ, cuiuslibet denarios quatuor, resinae terebinthine denarium unum, oua struthiorum troglitorum tria, stelliones treis, olei laurini uel irini quantū satis est. Irrigantur uiuentes in aceto stelliones, uase diebus quadraginta in fimo recondito.

Emplastrum Chryse enamos.

THuris, aluminis fissi, singulorum uncias duas, colophonice, resinae, cuiuslibet libram unam, olei uncias treis, auripigmenti uncias duas, aceto dissolue auripigmentum.

Catagmaticum Oribasij.

10

Pluis, uuarū, libram unam & uncias quatuor, spumæ argenti tantundem, thuris uncias octo, resinae terebinthine uncias quinque, adipis taurini libram unam & uncias quatuor, galbani, opopanacis, cuiusque unciam unā, ceræ uncias quatuor, olei ueteris librā unā, aceti uncias quinque.

Catagmaticum ad fracturas cum uulnere & sine uulnerebus, ex monumentis Heracliti.

Pluis aridæ mystrum unum, spumæ argenti tantundem, mannæ mystrum dimidium, adipis uitulini mystrum unum, ceræ Tyrrenicæ uncias uigintifex, opopanacis denarios octo, æ ruginis rasilis, Cyprij æris, singulorum minas quinque & centum, resinae terebinthine mystrum unum cum dimidio, æris unciam unam, rhicini aut ueteris olei heminam unam, aceti cotylam dimidiā.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

Meliloti uncias quatuor, cardamomi uncias duas, lanæ admodū sorpidæ uncias sex, macerans in uini sextarijs duobus per triduum, coquito donec pusillum relinquantur, & extrahens colans ue, uino admisce olei uncias treis, & denuo usque ad maximæ partis etiā uini consumptionem elixato, inde colophonice unciam unam, resinae terebinthine tantundem adijce. Sunt uero qui ceræ quoque uncias decem admisceant, & hyssopi herbæ unciam unā concoquunt pariter cum alijs. Alij lanas uino abluunt, desiccantesque uinum cum sordibus, quod etiā pinū appellant. Inter utendū uero, iniiciunt ex eo unc. iij. & reliqua quæ admodū dictū est.

De symmetria ceræ ad oleum.

Sequentia huius
capitis in codicibus
et græco. 24.
capituli adnotatur.

Si unctionem quis instar medicaminū quæ dolorem leuant & lassitudinem demulcent, quæ acopa uocantur, instruere uoluerit, olei quadruplum ceræ admisceat: sin ad formam cataplasmatū, duplā ceræ liquidæ partem fabricemus. Quod si medicamentū specie emplastri machinari fuerit consiliū, equis portionibus, ceram & oleum confundemus, si com-
plectens medium inter calidū et frigidū extiterit. Si uero cera uetus fuerit ac pinguis, & quod adhæret frigidū, oleum quantitate ceram parum excedat, quemadmodū & quādo cera pinguior fuerit, ac id quod circumfunditur calidum est, cera nōnihil olei quantitatem exuperet. Esto autem momentum illud, duodecima pars medijs ad utrumque; undecim enim uero uel

40

uel tredecim olei uncias, cum ceræ libra permiscebis.

Ex monumentis Antylli de elixatione medicaminum quæ emplastris immittuntur. Spuma argenti.

IN decoctionibus medicamentorum spuma argenti in oleo elixatur. Oportet autem leuigando spumam argenti rursum cum oleo ut lubricitatem quandā induat conterere, deinde clementi uulcano continenter agitando decoquere. Principio igitur turget, bullæq; instar tumescit, imminente uero iam absoluta decoctione, colorem feculentiozem præfert. Mensuram aut decoctionis esse scias, quum uidelicet ex decoctione aliquid secedit, & ab inquinamenti uindicatur.

Plumbago.

SPumæ argenti modo, plumbago quoq; elixetur: modus uero eius decoctionis, non solum dum non inquinat amplius, fit, sed quum ex igneo colore in uermicularem & ualde floridum commutatur.

Aesustum.

AEs uero crematum decoquitur non intra initia statim injectum, sed emplastro iam semidecocto. Modus autem decoctionis esto, quum non admodum exiguum imponitur, colorem induit, atque uermiculum reddit emplastrum.

20 Sori & Diphryges.

SOri præterea atq; diphryges cum decoctione immittuntur: finis uero decoctionis diphrygis quidem, quādo iam squamam colorem præfert. Sori autem nullum peculiarem modum habet, sed omnibus communem, dum uidelicet non inquinans exhibet emplastrum.

Chalcitis.

Chalcitis more aeris decoquitur, & moderatur eius decoctio, dum aliquantisper rubicundius & puniceum magis efficitur emplastrum.

Flos aeris.

30 **F**los aeris instar omnino aeris decoquitur, finem & rationem decoquendi cæteris communem obtinet.

Atramentum sutorium.

Atramentum sutorium, quod Græci χαλκωδον nominant, mediæ quidem decoctioni immittitur. Decoctum autem acriorem inducit emplastro colorem. Quod si alia etiam quæ non contrariantur obtineat, acrius adhuc reddit emplastrum.

Misy.

Misy ultimo quidem & perfectæ decoctioni immittitur, proprium autem decoquendi modum non habet.

Auripigmentum, Sandaracha, Plumbum.

40 **A**uripigmentum & sandaracha in fine quidem decoctionis tandem iniunguntur, plumbum uero deustum mediæ elixationi immiscetur.

Cerussa.

Cerussa in candida quidem emplastra, perfectæ tandem decoctioni

inditur, conseruat enim eo pacto colorem, & uehementius dealbat: In nigra uero, confestim à principio, decoctum enim multo nigrius efficitur.

Aerugo.

Mittitur in emplastra uiridia rubigo post decoctionē: in quibusdam uero neq; ab initio statim in ollam mittitur, sed cum aceto cōfritae & manenti in pila affunduntur alia, in melinis aut semicocta iam præparatione inseritur: Iustam quidem nacta decoctionē, colorem præfert giluum. In his autem quæ geminam speciem & bicolorem ut uocant præferunt, post principia statim coquimus rubiginē, postea enim iuxta decoctionem, primum quidem melinum inducit biceps factum, postremo autem cereum induit colorem.

Alumen.

Alumen magna ex parte post decoctionem inditur, proprium tamen decoquendi modum nullum habet.

Miltos, Cadmia, Pompholyx.

Rubrica, quam miltos dicunt in fine, cadmia & pompholyx initio decoctionibus induntur.

Sales, Nitrum, Sulphur.

Salia & nitrū mediæ decoctioni, sulphur extremæ tandem inferuntur: Cæterum elixatio eius nigricat emplastra.

Terræ ac lapides, Pumex, Conchylia.

Terræ quæuis, & lapides cuncti magna ex parte in fine imponuntur: Pumex item & cōchulæ crematæ, exactæ iam decoctioni immiscenēt.

Oleum, Cera.

Oleum autem si quidem ab initio immittatur resinæ aut pici liquidæ, inconsistent emplastrum efficit. Postquam igitur decocta constiterint, adiiciendum est oleum, reliquæ uero pinguedines infusæ circa mediam decoctionem immittere expedit. Vnguentum autem irinum quidem decoctionem admittit, cyprinū autem & rosaceum minus, cætera uero nullam omnino: quocirca in fine decoctionis immittenda sunt. Cera sola priuatim non decoquitur, eliquatur etenim, neque cum resina liquida, neque addita pice humidior, manet enim inconsistent, sed solenni consuetudine solet indi uel oleo puro, uel cum oleo so quopiam ex metallicis decocto, uel resina aut pice præelixata, & consistet citius alijs: quæ possunt inferi.

Resina.

Resina arida adiecta cera pariter inditur, humida uero ante alia omnia per se decoquitur, nisi admodum parum accipiat.

Pix.

Pix præ alijs cunctis immittitur: modus autem decoctionis est, liquide quidem, dum consistit: sicq; uero, maxima ex parte cōcoqui, usq; dum nihil amplius bullæ modo tumet neq; turgescit.

Apochyma.

Apochyma, Ramentum nauis.

A Pochyma leuigatū, cribroq; à suis superuacaneis sequestratū, tum denique decoctum emplastro impingitur: quod si fuerit molle, cum oleo diluitur. Cæterum prior ratio exactior est, propterea quod in altera residentia non obseruatur.

Asphaltos, bitumen.

Bitumen quoq; principio statim ad decoquendum immittitur, neque leuigandum id conterendumq; est, quoniam scabredines fici & oliuarum acinis similes continet: sed in crassas adeo partes confringere, cumq; aceto decoquere, non commouendo interim, quousque non amplius ampullarū modo turgeat, expedit. Nos uero, inquit Timocrates, in oleo elixantes, uoti facti sumus compotes.

Propolis.

Propolis quoq; emollienda & elixanda est, nō enim penitus sub decoctione cōfunditur. Quod si emplastrū cerā quoq; accipiat, oportet unā cum cera propolim pariter galbani more contusam immittere.

Gutta ammoniac.

Circa mediā decoctionem gutta ammoniac imponenda est. Oportet aut hanc leuigatā, si fieri potest, & tenuem inspargere: sin minus cum liquore quopiam cōterere, atq; ita inijcere: si *ῥῆμα* quidē fuerit emplastrū, cum uino aut aceto: sin uero syringiacū (quali fistulatoriū dicas) uel chœriacum, omnino cum aceto: si uero mollificatorium, cuiusmodi sunt dactylica, cum aqua. Deinde strigmenti crassitudinem inducentes, sic deniq; alijs refrigeratis infundere, ne ebulliat. Admisceť opopanax multo serius quā ammoniacum, omnino aut modica decoctione eget. Est uero etiam illud cum uino acetoue antea leuigandum.

Galbanum.

Galbanū nullā omnino decoctionē sustinet, sed eo qđ impollutū reddit emplastrū, tollere ab igne expedit, et mollificātes ipsum inijcere.

Sagapenum.

Contunditur sagapenum in mortario, & ubi teneritudinē assumpserit, sublatur ab igne cum emplastro mollificatur.

Aloe.

Aloēs quoq; usus in emplastris post decoctionem approbatur.

Succus papaueris.

Succus papaueris ante diem unum in aquæ momento irrigatur, dein de in mortariolo extenuatur, mox ad hunc modum instructus infunditur, emplastrumq; thapsia deniq; effingitur, uel liquore aliquo diluitur.

Bdellium.

Bdellium quoq; leuigatum inditur postquam ab igne remotum fuerit emplastrum: at si in pingue admodum incidat, adeo ut nequeat leuigari, sagapeni more contundendo, & emplastri formam inducendo, ita cum emplastro post elixationem eliquabimus.

Libanius & manna.

THus pariter & manna decoctioni iam absolutae insparguntur, uiscositate quadam strigmenti instar, cum melle pauculo acetosae aut aqua aut uino inducta: si humorē quempiam participat emplastrum, myrrha cum perfecta decoctione inditur.

Semina, radices, herbae.

Nulla neque seminum, neque radicum, neque herbarum decoctionem nullam sustinent, quae de causa leuigatis & in mortariolo depositis liquida infunduntur.

De malagmatis & epithematis. Cap. XVIII

10

EX medicaminibus quae emolliendi uim habent, & ob id malagmata Graece dicuntur, alia quidem medijs imponuntur, diuturno iam tempore inflammatis, uel his quae indurescunt, uel ignescunt, uel perfrigerantur, uel destillationibus & fluxionibus infestantur: alia articulis oppillatis, & perinde atque cuneis obturatis, uel nervis frigore uexatis, uel alijs etiam corporis partibus obturatis competunt. De his itaque capite de emplastris memoratum est, & de acopis fusijs enumerabuntur. Ex his autem quae medijs congruunt, quae priuatim ac proprie epithemata nuncupantur, quae sanè stomacho & iocinori adhibentur, qualiacumque quidem fuerint, roborante potentia egent per adstringentia, absque enim his, periculum est, quum haec membra uitae praecipua instrumenta sint: quapropter ex aromatis potissimum componuntur. Stomacho igitur pro suo munere non coquendi, inflatione uel laboranti, ea quae ex seminibus & meliloto, aloë, absinthio, sampsocho, nardo, & mastiche denique constituuntur, applicanda sunt. Iocinori uero, quae ex myrobalanis, gutta ammoniac, adipe, & chamamelino confiunt. Lienem autem, quae ex calce aqua non extincta, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, aerugine, gutta ammoniac & aceto contextuntur, conueniunt. His uero qui fluxu & destillationibus circa aluum impetuntur, expediunt malagmata (sic enim medicici qui eis utuntur uulgo cognominant) ex cenanthe, alumine, melino, & alijs astringentibus confata, etiam si contraria his quae emolliendi uim habent, potentia constent. Quibus autem uiscera igne quasi flagent, quemadmodum in febrilibus accidit ardoribus, his malagmata & epithemata est croco, rosaceo, succo seminis lini, aut sereos, aut herba sanguinali, adipe suillo & spuma argenti, conducunt. Refrigeratis porro, quae conficiuntur est succo balsami, folio, cassamo, pipere. Pectori autem, in sanguinis nepe uomitu & excretionibus, quas αἱμαρροιας, id est reiectiones Graeci cognominant, astringentia & desiccantia, & quae ex alumine, salice, & bitumine contextuntur. In tabe uero, quam phthisin Graeci appellant, malagmata quae ex bacis lauri, marrubio, cardamomo, lixiuio constant, expediunt.

20

30

40

Malagma

Malagma *ἡ μάλαντος*, id est ex festula campana.

Accipit croci, nardi Gallicæ, cyperi, cardamomi, ireos, myrrhæ, singulorum uncias duas, meliloti libram unam, guttæ ammoniaci thymiamatis libram unā, ceræ libras treis, resinæ terebinthinæ librā unam, cyprini libras treis, gleucini libras duas, bdellij uncias sex, quidam admiscet etiam cypheos uncias duas, uini quantum satis est.

Malagma Polyarchij, ex libris de compositione medica-

mentorum *κατὰ γένος* Galeni.

Habet id ceræ, resinæ terebinthinæ, bdellij, guttæ ammoniaci thymiatidis, cardamomi, cyperi, singulorū mystrū unum, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, ligni cinnamomi, uniuscuiusq; denarios uiginquinq; olei cyprini heminā unā, uini Italici quantū sufficit. Præpara, & cum res postulat utere, interdum quidem syncero & indiluto, interdum uero cera oleo cyprino dissoluta.

Aliud Polyarchium.

Igni balsami, costi, ireos, cyperi (qui odoratus angulosus iunctis est) myrrhæ, rotundi odorati iunci floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellij, amomi, folij, croci, cassiæ, pyrethri, mali terræ longi, singulorum unciam unam, guttæ ammoniaci thymiamatis unciam unam cum dimidia, phryctes uncias treis, resinæ terebinthinæ libram unam, medullæ ceruinæ uncias duas, ceræ libras duas, succi balsami uncias sex, uini uncias octo.

Malagma Philagrianum.

Croci sumit unciam unam & semissem, aloës, guttæ ammoniaci thymiamatis, bdellij, styracis, uniuscuiusq; unciam unā, adipis anserini uncias duas, hyssopi pharmaci uncias quatuor, palmularū uncias duas, ceræ libram unam, nardi uncias sex, amelini uncias sex, uini quantum ad aridarum specierum eliquationem satis est, macerans per triduum ter in die palmea rudicula commoue: deinde simul oleo decocta, secundo quidem die cardamomum aqua pridie irrigatum, tertio autem crocus uino: sunt præterea qui croco aliās quinq; uncias myrrhæ adijciunt. Vbi uero percolata fuerint, oleum quidem syncerum referuatur, secem uero specierum omnem in pastillos conformantes atq; desiccantes, habent id quod appellatur crocomagma.

Mendesium.

Dictum quidem Mendesium est, eo quod in Aegypto, ubi loci nascitur mendes, inueniatur. Recipit autem olei balanini libras decem in alio legitur, sextarios decem, myrrhæ, cassiæ fistulæ, singulorū uncias treis, resinæ terebinthinæ unciam unam, aliās sextarios decem, cinnamomi uncias treis. Illud non decoquitur, sed iniectis aridis agitur ad dies sexaginta, deinde resina terebinthina eliquata, in partem olei immittitur, mox inde denuo mouetur alios dies septem, & ita referuatur.

MAstiches, ceræ, styracis, singulorum uncias treis, hyssopi medicamenti semunciam, opobalsami sesquiunciam, nardini, gleucini, olei omphacini, uniuscuiusq; uncias treis, medullæ ceruinæ unciam dimidiam, resinæ terebinthinæ unciam unam.

ai εμπαξας, id est ex uua acerba & immatura,

Embole prima.

HAbet aspalathi, spathæ, dactylorum, melilotorū, ireos, iunci rotundi odorati floris, xylobalfami, rosarū aridarū, calami odorati, singulorū uncias iij, olei omphacini libr. decē, omphacis succi sextarios decē.

Secunda Embole folij.

GVtæ ammoniacæ, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassami, uniuscuiusq; uncias treis, in alio etiam nonnunquam & amabi uncias treis, uini quantum satis est.

Embole Tertia.

Thuris, guttæ ammoniaci thymiamatis, storacis bdellij, myrrhæ, mastiches, singulorum uncias treis, uini quantum satis est, ceræ dealbatæ uncias quinque, opobalsami uncias sex, quidā habet uncias octo. Præirrigantur diem unum, primæ quidem embolæ species in succo omphacis & oleo, secundæ uero in altera pelui, in uino Aminæo, aut alio ueteri & odorato, mouens quauis die rudicula palmea, tertio per triduum, à quo tempore coquito in cacabo dealbato: principio species primæ embolæ species confestim immitte cum uino, melius uero si prius cribretur, sic eadem ipsa inijcito oleo puro, & ubi decoxerit ad perexiguas uisni reliquias, ne comburatur oleum, tollens ab igne cola, & inijce rursum tertiæ embolæ species oleo non impuro, succulenta prius in mortariolo cum uino ueluti dixi diluta, excepto styrace, is enim iniectus cum alijs prompte soluit. Coquito carbonibus hætenus dum tibi bene habere uideatur, & remouens ab igne, finito refrigerari, postera aut die accurate colans oleū, & calfaciens sufficienter ad ignem, ceram indito, & auferendo rudicula agitato & despumato. Vbi aut refrigeratum fuerit, inijce opobalsamum, & uitreis uasculis reponito.

Gleucinum Embole.

Olei sextarium unum, musti Aminæi sextarios sex, aspalathi uncias quatuor, rudiculæ palmæ uncias sex, floris rotundi iunci odorati tantundem, meliloti uncias quatuor, rosarum unciam unam, myrrhæ uncias treis, foliorum lauri uncias duas, dendrolibani, xylobalfami, enulæ campanæ, singulorū uncias sex, mali terræ longi, ireos, cuiusq; uncias treis, hæc simul in musto macera.

Embole secunda.

Celticæ uncias quatuor, balsami uncias duas, cyperi, cassiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorū uncias treis, calami odorati,

cati, caryophyllorum, folij, uniuscuiusque unciam unam, cardamomi uncias quatuor. Balsamum in uino fragrante & perodorato irrigato.

Embole tertia.

Mastiches uncias quatuor, myrrhæ troglitidis, bdellij, singulorum uncias duas, ladani uncias treis, styracis liquidi, thuris masculi, cuiuslibet uncias quatuor, opobalsami uncias sex, nonnulli admiscunt etiam croci uncias duas. Confice quemadmodum & *δι' ὑδατος*, excepta cæra. In præsentia autem oportet diebus septem duarum embolarum species irrigare & infundere.

Nardus Cizicina, Embole prima.

Olei primatis sextarios decem, aspalathi, cepæarum, enulæ campanæ, ireos, xylobalsami, mali terræ, cardamomi, rotundi iunci odorati floris, singulorum uncias sex, sampsuchi uncias quatuor, herbæ sabinae uncias duas, quidam adijciunt his calami quoque odorati uncias duas. Irrigato hæc in uini odorati sextarijs quatuor.

Embole secunda.

Cassia, balsami, aliâs cassami, arnabo, singulorum uncias duas, spicæ nardi uncias treis, caryophyllorum unciam unam, costi, amomi, cuiuslibet uncias duas, quidam etiam celticæ uncias duas adhibent, atque hæc quidem in uino excipiuntur.

Embole tertia.

MYrrhæ troglitidis, aloës, thuris, singulorum uncias duas, styracis uncias treis, mastiches uncias quatuor, opobalsami uncias sex: sunt uero qui etiam croci uino dissoluti unciam unam admisceant. Præparato etiam illam, quemadmodum dictum est.

ἀνδρόποδος.

Suscipit spicæ nardi, folij, euphorbij, piperis, costi, adarcæ, singulorum unciam unam, mastiches unciam unam & dimidiam, opobalsami uncias sex, nardi libram unam, ceræ libras treis.

πικρὴν ἀνδρόποδον.

Styracis unciam unam, mastiches uncias duas, ceræ albæ uncias treis, sopopanacis uncias quatuor, nardi uncias quinque, soleati folij uncias treis, guttæ ammoniaci unciam unam, cassiæ uncias sex, ladani.

εὐωδίας, hoc est odoriferum.

Accipit croci, aloës, mastiches, absinthij, styracis, cenanthes, cassami balsamiue, caryophylli, singulorum uncias treis, nardi libram unam, ceræ tantundem, melini uncias sex, dactylos palmarum duodecim, uini quantum opus est.

Baium malagma.

Cardamomi, cassiæ, cenanthes, celticæ, baulaustiorum, propoleos, singulorum grammata octo, sabinae, cassami seu balsami, amomi, cuiusque grammata sex, floris rotundi iunci odorati diobolos octodecim, ireos grammata iij, caryophylli sesquiscrupulū, thymiamatis crinati unc. duas,

thuris, myrrhæ, cuiusq; unciam unam, ladani uncias sex, bdellij, mastiches, aloës, nardi, lentiscini, cuiuslibet semunciam, zygiae pityines, resinæ terebinthinæ, cuiuslibet uncias treis, opobalsami unciam unam, guttæ ammoniaci thymiamatis diobolos sex, ceræ uncias sex, cenanthio disciolue, succulenta & arida cõtunde: aliàs etiam piperis scrupulos duodeuiginti. Sunt item qui moschi scrupulum unum adiiciunt.

Malagma Galenium.

Habet croci unciam dimidiam, aloës unciam unã, mastiches uncias treis, seminis absinthij diobolos octo, cenanthes tantundem, dactylos magnos treis, ceræ uncias treis, olei melini uncias sex.

10

Malagma Erythrium, hoc est rufum.

Styracis uncias quinq;, malorũ cotoneorum uncias uiginti, masuchæ uel masuaphij, croci, singulorum denarios decem, psichorũ, cypheos, utriusq; denarios decem, cenanthes uncias duas cum dimidia, cassami, absinthij, singulorũ denarios decem, caryophylli diobolos quindecim, guttæ ammoniaci thymiamatis grammata decem, opobalsami grammata sex cum dimidio, nardi uncias quinque, colophonix, gleucini melini, uniuscuiusque uncias decem, rosacei denarios decem, propoleos uncias quinque, resinæ terebinthinæ uncias decem, mellis cochliaria decem, folij denarios decem, spicæ nardi tantundem, ceræ uncias septem & semis, uino Phalerno uel Aminæo eliquato.

20

Malagma Nisi, spleni consecratum & ad omnẽ duritiem.

Ceræ libram unam, guttæ ammoniaci thymiamatis librã unam, olei cyprini tantundem, croci unciam dimidiam, aliq; uero unciam unã, aceti quantum satis est.

Malagma Citrinum.

Ceræ, colophonix, uniuscuiusq; libram unam, guttæ ammoniaci thymiamatis, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathos octo, arida contere aceto.

Malagma cureos.

30

Habet picis siccæ libram unam, ceræ, pityinæ, guttæ ammoniaci thymiamatis, nitri, baccharum lauri aridarum, seu i taurini, singulorũ libras duas, farinæ scenogræci sextarium unũ, pollinis tantundem, chamaeleontis nigri radice aridæ libram unam.

Malagma ex stercore caprino Oribasij, lienosis, hydropicis, & iocinoris duritia affectis destinatum.

Olei cyprini uel olei antiquissimi libras treis, ceræ libras duas, meræ caprarum, baccharum lauri decorticatarum, ireos Illyricæ, singulorum sextarios decem, resinæ terebinthinæ libram unam, napyos, nitri, cyperi, radiculæ seminis, corticis radice capparis, cuiuslibet uncias treis, colocynthidis interanei uncias duas, scenogræci unciam unã. Arida nunc quidem eliquatis excipiuntur, nunc aceto trita & macerata. Atqui si uenter fluore infestetur, non adiungenda colocynthidis est.

40

Malagma

Malagma ex spirathis, spongia hydropicis.

Constat ex picis brutæ libris duabus & dimidia, nitri libra una, in-
Cteranei colocynthidis fæctus, pyrethri, opopanacis, grani cnidij, sin-
gulorū uncijis tribus, corticis radices capparis, thuris, ireos, adipis tau-
rini, elaterij, squamæ æris, seminis apij, lathyridum, uniuscuiusq; uncijis
sex, baccarum lauri sextario dimidio, scœnogræci farinæ uncia dimidia,
fellis taurini uncijis duabus, olei cyprini sextario dimidio, cere lib. una,
phryctæ libris tribus, excrementi caprini, hordei, cyperi, cardamomi,
cuiuslibet uncijis sex.

Malagma ὀξὺς ἀλαφρὸν, id est ex baccis lauri contextum.

Accepit ceræ, resinæ, picis, baccarum lauri, adipis taurini, singulorū
libram unā, nitri, guttæ ammoniaci thymiamatis, cuiuslibet uncias
sex, aceti quantum res ipsa postulat.

Malagma ὀξὺς ἀσπυρίων, id est ex seminibus.

Cardamomi, cyperi, labinæ, nitri, baccarum lauri, cassiæ, meliloti,
scœnogræci, nardi Gallicæ, seminis apij, sampsuchi, anisi, radices pa-
naxis, thuris, guttæ ammoniaci thymiamatis, resine terebinthinæ, singu-
lorum uncias treis, mellis, ceræ, nardi, uniuscuiusq; lib. unā, adipis tauri.

ἀσπυρίων, hoc est graecolens pleureticum.

Abet pityinæ librā unā, cere, rutæ uiridis, cyprini, singulorū uncias
sex, sulphuris ignē non experti, opopanacis, sagapeni, cuiusq; dena-
rios quatuor: quibusdā uero placet adiungere galbani denarios quatuor.

Malagma ὀξὺς ἀσπυρίων, quod est ex sampsucho.

Ceræ librā unā, resinæ terebinthinæ libras duas, sampsuchi, baccarū
lauri, scœnogræci, singulorū sextarium unū, nardi quantum satis est.

Malagma Ἀπολλοφάνης ad iocinorosos.

Ceræ denarij octoginta, resinæ terebinthinæ, mannæ, singulorum
denarij quadraginta. Fecem irini contunde thoracē usq; ad puden-
da contra duritiā stomachi & iccoris illinito. Propoleos uncia sex, sty-
racis uncia duæ, mastiches uncia una, resinæ terebinthinæ uncia dimi-
dia, fecis nardi quantum satis est.

Malagma ὀξὺς αἰνουθῶν.

Oenanthes, aloës, croci, acaciæ, aluminis fissi, rosarum aridarum, ab-
sinthij succi, gallæ, omphacij, rhoos Syriaci, mannæ, cuiusq; dena-
rius unus, olei myrsinati, ceræ, singulorum libra una, dactyli palmæ in-
gentes, uini Aminæi quantum satis est.

Malagma Ἀνθύλιον.

Abet aluminis scissi unciam dimidiam, aloës unciam unā, mastiches
diobolum unū, enanthes grammata sex, omphacij grāmata octo,
rosarū aridarū tantundem, rhu Syriaci diobolos decem, acanthes Aegy-
ptiæ scrupulos decem, balaustiorū grammata uiginti, gallarū diobolos
quindecim, ceræ uncias quinq; olei melini quantum satis est.

Malagma ὀξὺς γυγέρων, id est ex acinis.

Continet croci, sandycis, enanthes, singulorū unciam unā, aluminis

aridi uncias quatuor, balauftiorum, omphacij, rofarum, floris myrtorū siccorū, uniuscuiusq; uncias duas, ceræ dealbatæ libram unam, olei mei lini libras duas, malorum cotoneorū uncias quatuor, phœnicobalanos decem, uini Aminæi quantum satis est, acinorū aridorum uncias octo: In usu autem medicamenti uncias treis ceræ.

Confectio Anethina.

A Nethini uiridis uncias sex, meliloti uncias duas, chamæmeli tantundem, capita papaueris uiridia decē, quibus elixis adiunge decoctio- nis libras treis, & olei. Quando aut consumptum fuerit decoctū, infice adipis porcini recentis libras duas, leuigansq; seorsim scillæ affatæ in- teranei uncias duas, & medullæ cerui uncias totidem, omnia misce.

Ambrosia Lexipyretos.

H Abet spumæ argenti libram unā, adipis porcini recentis uncias sex, succi feminis lini uncias sex, ceræ dealbatæ uncias nouem, rhodini libram unam, mellis uncias treis, croci unciam unam. Nonnulli etiam lu- tea ouorum decem cruda adiungunt.

De Acopis & Synchrisma^{is} & Dropacibus & Sina-
pismis. Cap. xx



Copa quidem dicuntur, propterea quod præcipue contra ^{acopos}, id est labores ac lassitudines, sensusq; dolorosos, ueluti intensiuos, hulcerosos, & ossium deniq; ex lassitudine dolo- res adhibentur. Succurrunt præterea alijs quoq; compluri- bus affectionibus: nam alia quidem calfaciendi uim habent, alia uero im- mixta facultate sunt prædita. Thermantica igitur, hoc est calorifica, ex pipere, pyrethro, hordeo, & id genus alijs contexta, neruorum dolo- ribus bene faciunt, algoribusq; intensis, & ijs quæ ægre cal fieri possunt. Emollientia uero ad duritias, & scirrhus, & articulos densos quasiq; cu- neo obturatos conferunt, quorum materiam in capite de emplastris enu- merauimus. Amicticis uero ex lemnestide, quæ adarce est, hordeo, eu- phorbio, grano cnidio & consimilibus concinnatis, in malis diuturnio- ribus, & difficulter cedentibus, quibus sinapismi etiam usus congruit, utimur. Acopa porro cuncta mediā inter cerota & emplastra consi- stentiam habere cōuenit. Synchrismata autem et si ^{acopos} per omnia fer- me respondeant, consistentiam tamen liquidiorē quodammodo obti- nent. Cæterum dropax duplicem præparationem admittit, hanc qui- dem cum emplastro, aliam uero cum malagmate communem, & assi- milem. Nonnulli uero ipsum quoq; calidum quum res postulat, illiniunt. Verum acoporum & emplastrorum eadem omnino ac compar est ma- teria. Vsum autem cataplasmat^{is} præstat, hisce quidē languoribus qui- bus sinapismus competens, cum ante sinapismū ad corpus sinapi præ- parandum, tum post sinapismum ad affectionis reliquias amputandas applicatus: Conficitur præterea sinapismus (est autem is remedium ex sinape subactō, quod alicui corporis parti usque dum cutem exulceret, & cruento colore suffundat imponitur) ex materia quidem non uaria, sed

Acopa.

Synchrismata.

Dropax.

sed efficacissimus tamen est, diutinis potissimum affectionibus post di-
 etam aliorum praesidiorum facultatem expediens. Commodè præte-
 rea magnaq; cum utilitate capiti, cum primis in cephalæa, hemicrania,
 morbo sacro, quem Græci *ἀνταλγία* uocant, uertigine, & mania, hoc est
 furore adhibetur: thoraci uero, in difficultate anhelitus, seu asthma-
 te, orthopnoea, tussi diuturna. In diutino uero catarrho, unâ cum thoracè
 capiti quoq; sinapismus imponendus est. Iam uero & stomachū ipsū
 & uentrem uniuersum in chronicis eorundem languoribus sinapi ex-
 hulceramus. Accommodum porrò ischiadicis, podagricisq; & lingua
 30 lis corporis partibus languidis & flacciscentibus, aut aliâs quodāmodo
 ita ut calore refocillari nequeant, perfrigeratis est remedium. Esto autē
 efficaciae medicaminis modus quidam, quoniam dolore insigniter affi-
 cit, liuidiorem insuper & tumidiorem carnem efficit, cumq; lauacris pu-
 stulæ clementer ebulliunt. Quod si sensus etiam pereat, animaduer-
 tendum est, quoniam non sentientes ignorant, quantumuis immodice
 combusti: tanto frequentius resecto identidem hulcere, uigilandum est.
 Ex acutis præterea affectionibus desidiōsa quidem obliuione, in expu-
 gnabiliq; somni necessitate laborantes, quos Græci *λυαργεῖς*, Latini
 ueternosos uocant, & aliâs grauiori ad altiorem quietem impetui obno-
 40 xios, & catocho oppressos (hos Græci ab occupatione & detensione
καταβολῆς, illos à delatione in profundiorē somnum *καταφροσύνης* appel-
 lant) sinapizamus, principio quidem cruribus seu brachijs: Vbi autem
 materia ad statum peruenit, in capite: Eorum uero qui incalfactorie
 perfrigerantur, cruribus & cubitis sinapismus adhibendus est. Auer-
 sandus autem sinapismus in continenter febrientibus, & hulus habentibus,
 & cartilaginosis, macilentioribus, comburuntur enim interdum
 & denigrantur partes non carnosæ sinapismo.

Acopum Bromium.

30 **S**vmuntur ceræ, colophoniæ, resinæ, singulorū libra una, adipis por-
 cini uncia quatuor, butyri uncia sex, althææ, scenogræci, seminis lini
 uniuscuiusq; libræ duæ, olei libra una, galbani uncia duæ cum dimidia.
 Succum pariter cum oleo usque dum maior succi pars consumatur deco-
 quens, reliqua cum cera & galbano iniice.

Pocellum.

Liquoris althææ, & scenogræci, & seminis lini, & rutæ & cymini, sin-
 40 gulorū libræ duæ, medullæ cerui libra una, olei ueteris, pinguetudi-
 nis anserinæ, opobalsami, nardi, cuiusq; libra una, ceræ, colophonis, resi-
 næ, cuiuslibet libra una cū dimidia, euphorbij, resinæ terebinthinæ, opo-
 panacis, cuiusq; unc. sex, castorij unc. tres, herbarū uero ex quibus suc-
 cus exprimit, singulorū lib. una adnectenda est. Decoque instar proximi,

Acopum Azanitzæ.

Sui porcini libræ geminæ, pinguedinis tauri, resinæ, colophoniæ,
 hyssopi pharmaci, ceræ, singulorum libra una, galbani uncia tres.

Acopum Basilij.

Althææ, chamæmeli, meliloti, seminis lini, scenogræci, singulorum sesquiuncia, amomi unc. tres. Hæc in uino Ascalonis, aut Ciliciensi sextarijs octo per uniuersum triduum macerantur, & ad mellis usq; spissitudinē elixantur, deinde liquoris libræ quinq; cum oleo ueteri, pondo librarum quatuor cum dimidia, usq; dum liquoris medietas tantū super sit decoquantur, & immittitur butyri unc. sex, resinæ terebinthinæ uncia quatuor, adipis anserini uncie quindecim, medullæ ceruinæ cum olei momento leuigati & eliquati uncia quinq; ceræ dealbatæ libræ tres.

Acopum Lysipontum.

Piperis, castorij, styracis, mastiches, aloës, enulæ campanæ, ireos, singulorum uncia quatuor, euphorbij, costi, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, cassiæ fistulæ, hordei, cuiusq; unc. iij. adarces, amomi, bdellij, ligni balsami, uniuscuiusq; uncia duæ, malabathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorū uncia una, succi balsami libra una, nardi, cyprini, leucini, cuiuslibet libræ duæ, ceræ libra una.

Acopum à fœtore *συνδεδισ* appellatum, ex libris de compositione medicamentorum *κερὰ γυγιος* sumptum.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum denarij uiginti quatuor, galbani, guttæ ammoniaci thymiamatis, cuiuslibet denarij sex, olei heminae duæ, medullæ ceruinæ denarij octo. Vtere sincero & dissoluto.

Aliud *συνδεδισ* à fœtore dictum.

Resinæ terebinthinæ denarij sedecim, ceræ denarij uiginti octo, hyssopi, mellis, singulorū denarij sex, medullæ ceruinæ uncia sex, guttæ ammoniaci thymiamatis, galbani, spumę nitri, baccarum lauri, uniuscuiusq; uncia sex, olei ueteris sextarius unus, uini cyathi duo: Nonnulli castorij quoq; uncias treis adnectunt.

Acopum barbaricum *δι' εὐφροβίης*, id est ex euphorbio coxense dice dolentibus, & ad alia multa utile.

Opopanacis uncia una, ceræ Tyrrhenicę libra una, resinæ terebinthinae librae duę cum dimidia, galbani uncia una, guttę ammoniaci thymiamatis uncia duę, euphorbij, castorij, piperis albi, singulorū unc. duę, medullæ ceruinæ uncia quatuor, hyssopi uncia quatuor, lemnestidis, est autem adarce, uncia dimidiata, olei styracini, laurini, irini, amaracini, singulorum uncia sex, olei ueteris libræ duæ, hedyroi uncia sex.

Pyxis.

Colophonæ librā unā & dimidiā, terebinthinæ unc. octo, guttę ammoniaci thymiamatis un. iij. thuris unc. nouē, olei ueteris lib. ij. succi seminis lini lib. unā, lactis bouilli librā unā, adipis anserini unc. sex, butyri unc. octo, ouorū xxiij albumina, præparans in buxco uase reconde.

Acopum *συνδεδισ*, Galeni.

Semini elates costi modius Italicus unus, quod est sextarij duodecim, olei libræ quindecim, ceræ libræ quatuor, resinæ strobilinæ uel terebinthinæ uncia quatuor. Contundendo semen elates mitte in oleū, & sinens

& finens diebus quadraginta, exprimēdo porrice, atq; admisce reliqua. Vtere cōtra spontaneas lassitudinū molestias, & pareses, solutiones iue, & articularū perfrictiones. Quod si urgeat necessitas, coquendū est elates semen cum oleo, permiscendo ne comburat aquæ sextarios quatuor, in podagricis scilicet & arthriticis affectionibus.

Aliter idem.

OLei heminae uiginti quinq; quod est sextarij duodecim cum dimidio, fructus elates mystri unū, hoc est sesquilibra, resinæ abiegnæ librae tres, pineæ uel terebinthinæ tantundem, ceræ libra una.

10

Διαιγάς, id est ex alno, ad eodē languores.

LOco fructus elates, alni (quæ populus nigra est) fructus parē quantitatem iniiciens, cætera quoq; eodem cum illo modo præpara.

Zosimi synchrisma ad tremores, famigeratū ac nobile.

HAbet pityinæ uncias sedecim, ceræ uncias iij, olei uetusti libr. unā, Hopopanacis unc. ij. adarces unc. i. euphorbij tantundē, nitri unc. iij spumæ nitri tenerioris unc. iij. Nitrum, euphorbiū & adarcen cōtere cum uino, deinde liquorē panacis indito, simulq; cōtere. Seorsim uero liquida cum anchusā liquefacito ut coloretur, atq; refrigerando excipe.

Dropax Gallus Oribasij.

20

ACcipit colophonix, thus referentis pityinæ, & xylodis, hoc est ligneæ appellatæ, in sola Italia prouenientis, apochymatis, picis aridæ, ceræ, singulorū lib. iij. picis brutæ libras duas, nitri librā unā, bituminis, galbani, adarces, pyrethri, uniuscuiusq; unc. sex, opopanacis, euphorbij, hellebori albi, piperis, cuiuslibet unc. quatuor, sulphuris ignem non experti unc. treis, castorij, guttæ ammoniacæ, uuxæ passæ syluestris, cuiusq; uncias duas, olei cucumerini librā unā, ligni balsami uncias sex.

Aliter simplex.

30

HAbet ceræ libram unam, picis aridæ libram unā & dimidiam, brutæ libram unam, pityinæ sesquilibram, frictæ libram unam & quadrantem. Locum nitro prius ablucens imposito.

Sinapismi præparatio.

ANte diem unū ischades aqua tepida irrigandæ sunt, & sequenti die egregie & præualide exprimendo strenue leuigandæ, deinde acre sinapi, cuiusmodi Syriacū & Aegyptiū est, priuatim cōterito, affundens dilutū, quod græce *ἀμιγρῦμα* appellant, & massam placentam uel conficiens misceto. Si quidē uolentius uoluerimus exulcerare, duas partes sinapis ad unā ischadū misceto: si uero obscurius atq; mitius, contrariū facito: sin medio quodā modo & mediocriter, ex quo utraq; confundito. Cæterū sinapi ante contritionē aceto dilutū, quemadmodū aliqui faciūt, inefficacius redditur. Atqui à sinapis purgatione & lauacri usu, si dolor intensus, & rubore suffunditur locus, bullæq; oboriuntur, linteum succo malux cum rosaceo immergētes, applicemus, deinde rosaceo ceroto ad dita cerussā utamur. In flaccidis uero ac dissolutis in quibus sensus læsus est ac perijt, multum diuq; aduertere oportet animum, detegendo &

Apobregma.

speculando; non sentientes etenim sæpenumero supra modum inflama-
mati sunt & cōbusti, & caprarū baccæ cum aceto cataplasmatis instar il-
litæ, expeditiores q̃ sinapi sunt, potissimū in his qui laborāt coxendice.

Διαγραφικὸν μέλανος, id est ex atramento scriptorio rubrificans proprie,
hemicanicos potissime, ex monumentis Alexandri.

Miscentur in confectiōe eius euphorbii, atramētī librarii, singulorū
denarij quatuor, myrrhæ troglitidis, crocomagmatis, piperis albi,
cuiusq; uncia tres, croci denarij duo, aceti quantū opus est ad leuigan-
dum hæc egregie, & ad spissitudinem strigmentorum balneorū. Atq;
tum illinito, à medio superciliorū inchoās usq; ad tempus totū, præcipue
si pilis denudatus sit: postq̃ refrigeratum fuerit, rursus illinito, & ubi
remediū belle officiū suū peregerit, hominē affectū in lauacrū deducito.

Oleorum & unguentorum concinnationes diuersæ.

Unciōnū & unguentorū oleorum uel unguinosorū, simplicia quidē
sunt, quū una modò species oleo indi: quæ uero præparant ex pluri-
bus, composita. Ex simplicibus rursus aliqua sanè ex floribus oleo indi-
tis constituntur: uerbi causa, rosaceū, chamæmelinū, susinum, aliqua ue-
ro ex fructibus & seminibus, aliqua uero ex germinibus quibuscūq; exem-
pli gratia, ruta, & quæ cum oleo decoquunt. Quoniā aut flores elixatio-
nem nullā admittūt, insolantur potius: uerū si ualentiorē quidē habeant
fragrantia & minime euanescentē, plurimis diebus insolata, tenuioris es-
sentia partū, & usui multo cōmodiores redduntur: ē quorū grege ha-
bentur, rosaceum & chamæmelinū. Quicunq; aut imbecilliores, prom-
ptiusq; digerunt flores, insolationē minus perferūt, facile perspirabilia,
quemadmodū liliū & uiola. Ex his aut oleis quæ fructus & semina con-
stituunt, alia quidē ex ipsis integris oleo iniectis conficiunt, puta melinū:
alia uero concisis uel alteratis, oleoq; quod in eis cōtinetur separato, siue
cōpressis ipsis in cochleis, uel ex aqua calida dispartitis, ueluti caryinum
(hoc est oleum ex nucibus) sesaminum, amygdalinum, lentiscinum, lau-
rinum, rhicininū, raphaninū, & id genus alia. Composita uero, ex plan-
tis magna ex parte odoratis, oleo cum uino, uel musto, uel aqua decoctis
& detractis præparant: cōmixtis præterea cum oleo quibuscūq; succis, in-
terdū uero etiā adipibus aut medullis. Ex istiusmodi aut quæ exacte qui-
dem oleosam consistentiā habent, simpliciter græce *μύρα*, id est unguēta,
uel *ἀλάμματα*, hoc est unctiōes dicuntur: ut gleucinū, nardinū, cucumeri-
num, cyprinū. Quæ uero cōsistentiam acoporū obtinent, cerā aut resinā
aut eiusmodi quippiam suscipientia, *μυράκια* quoq; cognominantur: uer-
bi causa, decamyron, & amaracinum, atq; his similia: atq; hæc quidem
per unum duntaxat diem decoquunt, quæ non admodū ex diuersi gene-
ris materia constant, quemadmodū metapium, mastichinū, cucumerinū:
alia uero ex duobus aut tribus aut quatuor rebus oleo iniectis: primum
quidem ijs quæ egre consumunt decoctis: uerbi causa, aspalatho, spathe,
arbore thuris, lauro; deinde uero aromatibus, folio, spica nardi, amomo,
herba

μύρα.

Alumina.

Myracora.

herba sabina, postremo uero succis & adipibus & medullis: si uero contingat, etiam cera & resinis iniectis: balsami porro succus nunquam omnino decoquitur. Post exactam decoctionem moderate refrigeratum aliquid unguento immittitur. Ipsorum præterea unguentorum, quædam decoctionem minime admittunt, alia admiscuntur tantummodo, sicuti mendedium. Sunt autem qui uiride facientes unguentum, intingunt id ipsum post detractiorem ab igne in libras quinque olei, æruginis rarsæ accurate leuigatæ unciam unā & dimidiā inficientes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Iam uero uires & effectus, simplicia quidē unguenta specierum quæ ipsis indita sunt, uel ex quibus cōtusus conficta sunt, obtinent, ueluti materiæ rationem cōtinentē oleo: uariorum uero omnis quidem natura in calidū nutat & declinat, sed insigniter calida & emollientia, tum incuruatis, tum obturationibus succurrunt: e quorum classē sunt, metopium, mendedium, marciatum: moderatius quidem pentamyrion, decamyrion uero uehementius est, ut summam quoque cutem radat & incidat. Cæterum mediocriter quidem calida, tenuium partium & dolorum mitigatiua & sympeptica sunt: quale est fusinum, amaracinum, irinum, crocinum, pholeatinum. Quædam autem præterquam quod calfaciunt admodum, desiccant etiam & abstergunt: cuiusmodi est tum cyprinum, tum cucumerinum. Quædam uero caloris quidem satisfaciunt, sed maiorem corroborandi uim obtinent, quo nomine stomacho potissimum & extis dissolutis accommodata sunt: eius farinae sunt, mastichinum, nardinum, gleucinū: Valentius adhuc robur indit oleum unguentum uel ex omphaco confectum. Nonnullis postremo unguentis mulierculæ propter solam odoris gratiam utuntur: uerbi causa, pholeato, & spicato, & commageno, & quæ mochelæa nomenclaturam obtinent.

Rosacei præparatio.

Miscuntur in confecturam rhodini, rosarum rubearum detractis unguibus & per diem noctemque refrigeratarum uncias tres, olei omphacini sextarius Italicus unus. Summa cura ac diligentia uasculum extrinsecus ne diffusetur & euaporet operculans, sub dio ad quadraginta dies in solato, quibus diebus elapsis deponito, non quidem in solum aut pauimentum, sed in tabulam seu asserem. Quidam uero loco expositionis ad solem ad puteum aquæ frigidæ quadraginta dies appendunt uasculum, propterea quod ex frigore obseruet amœnum ac gratum odorem. Aliqui in terram denique hoc ipsum defodiunt.

Chamæmelini præparatio.

Conficitur ex chamæmelorum floris, sine albis folijs refrigerati & resecti per diem naturalem unū uncias duabus, olei sextario Italico uno, operiendo uascis os raro linteolo, quò commodius exhalet, in soleatur etiam hoc ipsum ad dies quadraginta, post quas diligenter ac tuto operculans reponito.

Olei anethini præparatio.

ANethi uiridis comæ refrigeratæ unciam unam, olei dulcis sextariū Italicum unum, pari modo insolato. Confici autem potest ad tempus anethinum, ubi insolati denegatur copia: aridi namq; anethi comam cum oleo in diplomate uasculo elixantes, utuntur, & chamæmelino consimiliter. Minoris uero efficaciae sunt hæc quæ ex uiridibus confiunt, præsertim quàm sint insolata.

Crinini, id est Lilini, quod alij eo quod in Sufis pariter inueniatur, Sufinum appellant, confectio.

Foliorum liliorū candidorū consimili modo refrigeratorū unciae duæ, 10 in Italicum olei sextarium iniectæ constringuntur exacte ne exhalet, & in solē pandunt dies treis, quibus transactis primis floribus exemptis & proiectis aliæ duæ unciae aliud triduū immittuntur, & sic reponunt. Sufinum Lilinum ue compositum.

Sumito olei sextarios, calami odorati libras quinque, myrrhæ quincuncem, cardamomi libras treis, foliorū lilij detractis unguibus & refrigeratorū libram unā, cinnamomi uncias treis, croci Cilicij quincuncem. Præparationē uniuerſam in treis iniectiones diducito. Primū quidē myrrham & calamū uino per quinque dies macerantes ter in die agitemus, tum oleo ad paucissimum decoquamus. Secundo uero cardamomum aqua 10 per triduum macerando cōmouentes, pari rursus ratione cum oleo ad horam unam simul elixemus: deinde detrahentes oleo puro liliorū tertiam partem injiciamus, & lapso iam triduo colando aliam liliorum tertiam partem injecito, quam iterum post triduū colans & repurgans, primæ ultimam liliorū tertiā partem cum rosaceo leuigato immitte: transactis tribus alijs diebus oleo detractō, cinnamomum contusum loco arababo uel cassiæ, duplum carpesium injice, & reponito.

Iaton.

IAtum, alij quidem purpurarum, aliqui uero crocinorum, alij albarum Iuiolarum unguibus detractis foliorum uncias treis, in olei omphaci 30 ni Italicos sextarios quinque injicientes præparant, & accurate ne liberius exhalet undique constringentes, decem diebus insolare solent, ter ipsa post triduum commutantes, perinde atque lilia: ad conseruandum præterea pauca quædam exacte arida immittunt.

Olei Melini, id est ex cotoneis malis, præparatio.

Conficitur melinum ē malis cotoneis foris tunica exutis & concisis pariter cum corticibus, deinde ipsorum uncijs tribus in olei omphacini sextarios Italicos decē iniectis, et quadraginta dierū spacio insolatis.

Olei Sesamini confectio.

Oleum sesaminum sit concisis aut contusis sesamis, & per sportam in 40 testulam expressis, in aqua calida oleo ipso discreto, & uitreis uasculis reposito.

Old

Olei Raphanini præparatio.

RAphaninū quoq; oleum in Aegypto ē raphanorū graciliū radicum concisorum & selectorum semine, cæterorum more conficitur.

Olei Cicini, id est Rhicini præparatio.

ET illud cæterorum modo in Aegypto fieri cōsuevit ex semine rhicini, quod appellatur ab insecti similitudine *ρεῖν*, compari ratione concisi uel leuigati.

Olei Populnei confectura.

VERIS tempore quando magna circa semen resinæ est copia præparatur, grana namq; diffringentes nigrae populi unc. iij. horū in dulcis olei sextariū unū immittunt, et dies quadraginta sub sole torrefaciūt, uel in diplomate tribus horis decoquunt, & ita colantes reponunt.

Oleum Amygdalinum.

CONFICITUR etiam amygdalinum prædictorū more, amygdala amara & pura cōtunduntur, & aqua exigua insparguntur, & ceu dictū est, discernunt. Quidam autē conquassatorū amygdalorū uncias duas in dulcis olei Italicum sextarium immittentes, in diplomate elixant.

Oleum Amygdalinū, quod & Metopium nuncupant.

AEGYPTIJ huius olei inuentores, metopii illud appellauerūt, eo quod **20** galbanum accipiat: planta namq; ex qua galbanum conficitur, metopium nuncupatur. Constat autē ex his, olei omphacini sextarijs uiginti, amygdalorū amarorū libris duabus, cardamomi libra una, floris rotūdi iunci odorati, calami odorati, carpobalsami, singulorum libra una, myrrhae, galbani, cuiusq; uincijs sex, terebinthinæ libris duabus, uini perodori ad macerandū arida sextarijs quatuor, mellis Attici libris tribus. Resina nam & galbanum leuigādo, cum parte olei soluentes inijcemus alijs decoctis, & tunc ipsum mel: mixta uero diligenter omnia eximendo, dum adhuc tepidum est colemus, spissum namq; euadit refrigeratum.

Oleum Balaninum, id est ex unguentaria glande.

30 **B**ALANINUM quoq; oleum congeneri cum oleo amygdalino modo fit, ex glandibus quercus.

NUCEUM quoq; ad balanini instar ex iuglandibus uetustis cōficitur.

Olei Laurini faciendi ratio.

PVRUM quidem laurinū oleum cōsimilem faciendi rationem habet, ex fructu lauri, bacca inquā: mixtū uero hoc modo cōficitur: maturarum oliuarū sextarius unus in baccarū lauri sextarios duos inditur, cōte-

runturq; omnia & exprimunt: sunt qui utriusq; æquale pondus misceant.

Oleum Lentiscinum.

40 **L**ENTISCINū quoq; oleum ut laurinū præparatur ex fructu lentisci bifariam cum per se, tum adiectis oleis non maturis, sed crudis.

Oleum Mastichinum.

MASTICHINUM simplicissimū hoc modo paratur. Mastiches in Chio

insula naræ uncia una, omphacini olei sextario Italico permiscetur, & in diplomate decoquitur: nonnulli uero absinthij etiam & styracis unciam unam adijcere consueuerunt.

Mastichinum longe uarius.

Svmuntur olei sextarij quinquaginta, enulæ campanæ libræ quinq, xylobalsami libræ decem, florum lentisci libræ quinq, cardamomolibræ septem, mastiches libræ quinq, xylomastiches libræ octo, terebinthinæ libræ tres, absinthij comæ libra una, uini fragrantis sextarij quinque, aquæ sextarij decē. Macerata uino arida ante tres dies commiscens oleo & aquæ, & elixant horas sex, tumq; mastiche & terebinthina injiciuntur, & exacte cōmiscendo percolantur, & refrigerata reponuntur.

Sicyonium, hoc est cucumerinum simplex.

Comparatur illud ex radice cucumeris syluestris refrigerata, uncij8 duabus in olei Italici sextarium iniectis, & in diplomate decoctis.

Sicyonium compositum.

Olei sextarij decem, cucumeris agrestis radicis seruefactæ libra una, serpylli, meliloti, singulorū unc. sex, tēdarū picearū pinguiū, althææ singulorū unc. quinq, scolopēdrj unc. sex, scenogreci sextarij duo. Pre-macerat scenogrecū aqua primo diem unā, deinde colatur, & immittuntur dictis cum oleo etiam uini sextarij duo, omnibusq; decoctis adijciuntur medullæ ceruinæ cum olei momento leuigatæ & eliquatæ unc. iij, adipis gallinarū uncia totidē, ac denuo colatū oleū conde: Neq; desunt qui torrerisub sole ipsum post decoctionē dies quadraginta permittāt,

Aliud Sicyonium efficacius.

Elaterij succi sextarios treis, mali terræ longi, styracis, enulæ campanæ, hyssopi, ireos, colocynthidis, pulegij, origani, cyperi, dendrobani, centaurij, daphnophyllorum, uniuscuiusq; uncias duas, olei sextarios quinq; : miscens, usq; dum succi exiguum relinquatur, decoque.

Oleum Cyprinum ex monumentis Posidonij.

Olei sextarius unus, cyperi, enulæ campanæ, ireos, singulorum libra una, samfuchi, hyssopi, seminis uiminis, saluæ, cuiuslibet unc. tres, floris cyperi libra una. Alia quidem omnia uino per diem prius macerata, elixantur cum oleo horis sex: colato aut oleo puro cyperus inijcitur, si quidem ad manum sit, uiridis cum mollibus tenellisq; ramulis acopis: sin minus, alia arida: Contusa igitur cum exigua aqua, coquuntur horam unam & dimidiam. Quod si placuerit immergere ipsum, post remotionem ab igne in fere æruginis puri libram unam cum dimidia. Ceterū Posidonius ferruginis uitans acrimoniam, post decoctionē (inquit) per triduum oleum in cacabopulchro bonoq; linito, tingaturq; non impediēte ipsius facultate.

Alia descriptio Cyprini.

Foliorū cypriorū, foliorum lauri, ireos, cyperi, saluæ, singulorū uncij8 tres, arboris thuris, mali terræ longi, seminis uiticis, cuiusq; unc. iij, enulæ cāpanæ, aspalathi, cuiuslibet unc. sex, rutæ unc. duæ, cupressi tantundem,

tundem, olei sextarios decem. Hæc antea macerata in uino ac oleo decoque, & colans iniice rursum xylobalsami, et ligni cassiæ, singulorū uncias quatuor, sampsuchi, cymini, myrti, styracis, mastiches, cuiusq; uncias iij. opopanax uncias duas, floris cyprini uncias sex, eruginis unciam unam.

Olei amaracini compositio.

ENulæ campanæ sumuntur libræ decem, ligni balsami libræ uiginti, cyperi libræ p̄cto, floris rotundi iunci odorati, aspalathi, herbæ sabi-
næ, singulorū libræ octo, opopanax, seminis amaraci, cuiusq; libræ duę,
olei præcipui honoris sextarij duo, uini odorati xestæ quinq; alia quidē
omnia primā embolen uino irrigata constituūt, secundam aut, herba sa-
bina: & illa quidem sex horis decoquantur, hæc uero tribus. Quidam
autem etiam illam tingentes, ferruginis uncias treis adhiçunt.

Iriui olei conficiendū ratio.

IReos, aspalathi, cyperi, singulorū accipiunt libræ quinq; succi panacis
quadrās, anchusæ unc. iij. olei unc. triginta, aquæ sextarij quindecim.
Sunt qui ad hæc floris etiā lentisci unc. sex apposuerint, cassiæq; quadran-
tem, xylobalsami unc. sex, nardi Celticę unc. sex. Omnia cōtusa aqua &
oleo dieb. quinq; macerās, coquito in diplomate horis sex, & deponito.

Crociniū, in quo alterius etiam crocomagmatis compositio.

HAbet olei acerbescens amcenū odoris librā unā, calami aromatici li-
bras quinq; myrrhę troglitidos unc. quinq; cardamomi unc. septē,
croci ex Cilicia unc. sex, primæ quidē embolæ calamus esto, & myrrha
uino prius leuigata, piperis albi grana quadraginta, myrrhę troglitidos
denarium unum concidens & cribrans, rursum in pila conterere adhiçiens
olei nardini librā unā: ubi autem atrius redditur medicamentū, nucum
cortices comburens & conterens, in mortarium iniice, deinde opobalsa-
mi cochliaria tria, ceræ libram unam & semis adnecte.

De cenanthariorum præparatione. Cap. XXI

Enanthia nō inde appellationē sortita sunt, quod cenanthen,
hoc est labruscā fuscipiant, quoniā haud omnia cenanche cō-
stant cenanthia, sed ratione uini ipsius, liliorum item flos no-
men claturam hanc indidit. Cæterum cenanthariorum usus
à quibusdam solius fragrantiae & deliciarum gratia assumitur, post laua-
ra profundendo ipsa, mentasq; ipsæ ueluti spongia abstergēdo. Quin
admicula quoq; recte utentibus conferūt dissolutis & contractis, si ro-
borantibus stomachū cataplasmatibus admisceantur, his item qui ex mor-
bo, maxime febrili refocillantur & conualescunt, si post lauacrorum exi-
tum circumfundantur eadem, & naribus etiam dum spirantibus adhi-
beantur, trahuntur nanq; in altum & corroborant cum animale tum
uitalem spiritum. Conducunt præterea his qui præcauere ne in mor-
bos pestiferos incidunt, student, eiusmodi aeris mutatione apparente.
Est præterea Posidonij quod mesopotamium appellatur, eiusmodi.

Cenanthij præparatio.

Cassiae, myrrhae, thuris, folij, amomi, mastichæ, costi, carpobalsami & opobalsami, uniuscuiusque unciae tres, styracis pinguis unciae quatuor, uini odorati, guttæ ammoniaci Italici sextarii decem. Contundens omnia & cribrās, styracem uero in tenues partes distrahens, in spacio si oris lagenam ponito cum folijs liliorum perfrigatorum ante diem unum unguibus sigillatim detractis: sint autē lilia numero; deinde uinum infunde & opobalsamū, mixtaque simul & cōmota ante iniectionem, obstructoque ore lagenæ in solato dies quadraginta, & in balneo post restitutam sanitatem utere: & undique domū uasque aspergens, & spongas immergens, uultui quoque adhibeto. Alia: Costi unciae tres, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singulorum uncia una, amomi unciae tres, cassiæ, cenanthes, calami, cuiusque unciae nouem, styracis, opobalsami, cuiuslibet unc. iij. lilia trecēta, uini Phalerni sextarii decem. Præpara pari modo.

De Thymiamatis & Cyphi. Cap. xxii



Cyphos materia media quodāmodo inter trochiscos & antidota est: utimur autē ipsis, nūc quidē odoris gratia uaporantes, quemadmodū & thymiamata, nunc uero odorantes ea, quod concoquāt destillationes à capite in partes subiectas, & coryzas, & obstructions referent, quæque caput molestant, expurgent. A pestilentialibus præterea morbis cyphi tuetur & præseruat, sumiturque per os cum cōtra hæc, tum ut pectoris crassos humores cōcoquat, & aduersus iocinoris frigidiores afflictiones: unde prisici quoque cyphoides antidotos inuenerunt: Inditur item remedijs facultatibusque compositis, sed potissime epithematis & antidotis.

Rhodatum thymia.

Habet costi, amomi, myrrhae, cassiæ, singulorum unciam unam, styracis, chias, bdellij, conchulæ Indicæ (quam *ινυχα* dicunt) musci, ladanij, uniuscuiusque uncias duas, rosarum purgatarum uncias undetriginta, succi balsami, uinique quantum satis est.

Thymia Crinatum, hoc est lileaceum.

Liliorum unguibus detractis libram unam, styracis protij uncias nouem, spicæ nardi uncias treis, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchularū Indicarum crematarū, mellis, singulorum unciam unam & semissem, opobalsami uncias quinque, uini quantū opus est. Leuigato & dissolue, pangitoque pastillos.

Cyphi magnum, quod liliacum cognominant, contextū ex xxxvi.

Styracis, myrrhae, bdellij, ladani, aspalathi, enulæ campanæ, cuiusque unciae sumuntur sex, nardi Gallicæ, folij, seminis cupressi, guttæ ammoniaci thymiamatis, uiscerum nuclei pinei, uel loco ipsius conchularū Indicarum ingentium duæ, fructus balsami singulorū quadrans, cassiæ, ireos, seseleos, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, cuiuslibet quincunx, rosarum aridarū, croci, spicæ nardi, herbæ fabinæ, a sphodelliradicis,

radicis, alij uero succi, singulorum unciae quatuor, lacaphthi (est aut pini cortex) uel alterius cuiuspiam arboris unciae nouem, costi, floris rotundi iunci odorati, cuiusq; unciae duae, baccae iuniperi magnae quadraginta, & paruae quinquaginta, amomi, resinae terebinthinae, dactylorū purorū, cuiusq; libra una, ficuum aridarū acinis exemptis, uuarū passerum à nucleis purgatarū, uniuscuiusq; librae duae, mellis despumati librae quinq;. Posidonius autem uini quocq; odorati sextarios treis adijciebat.

Aliud Cyphi ex uiginti octo compositū, Seleniacum appellatū.

10 **C**onstat ex bdellij, enulae campanae, singulorū uncijis septem, rotundi iunci odorati uncijis duabus, sphagni quincunce, baccis iuniperi exilibus quinquaginta, cardamomi quincunce, aspalathi uncijis septem, cassiae fistulae uncijis quinq;, spicae nardi uncijis duabus, cyperi quincunce; radicis asphodeli, herbae sabinae, singulorū uncijis quatuor, seminis eupressi, nardi Gallicae, malabathri, cum folijs rosarū aridarū, cuiusq; quadrante, costi, croci, singulorum uncijis duabus, ladani, myrrhae, cuiuslibet uncijis septem, ischadum pinguium, uuarū passerum uinaceis exemptis, uniuscuiusq; libris duabus, nucleorum pineorum uncijis octo, resinae terebinthinae libra una, styracis uncijis septem, palmularū pinguium libra una, mellis libris quinq;, uini fragrantis quantum satis est.

20 **P**reparatio Masticha, quod uocant nonnulli Masaphium. Cap. XXIII



Habet meliloti uncias decem, ligni balsami, aspalathi, herbae sabinae, myrrhae, amomi, floris rotundi iunci odorati, daphnophyllorū stactes, styracis, calami odorati, sampsuchi, singulorum uncias duas, ireos quincuncem, folij, croci, uniuscuiusque unciam unam, opobalsami unciam dimidiam, commeos libram unā, rosarum siccarum uncias sex, uini quod satis est.

De Pessis ex Anyllo. Cap. XXIIII

30 **P**essis mulierū naturalibus subiiciunt, sunt aut differentiae eorū tres, alij namq; emolliendi, alij uero astringendi, alij deniq; uasa meatusq; referandi uim obtinent. Emollientibus itaq; in foeminarū locellorum inflammationibus, & huiusmodi perfrictionibus, & suffocationibus, quum sursum uersum mulieris uulua currere uidetur, & auersionibus, ac inflationibus deniq; utimur: Conficiuntur autē e cera Tyrrenica, cyprino, fusino, pinguedine anserina uel gallinacea, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, scenograeco, & id genus alijs. Aperientibus autem ora uenarum, ubi menstruam purgationem retentam prouocare studemus, uel uteri conuulsiuam aut systolen emendare statuimus, fabricant. Præterea eiusdem 40 modi quocq; pessi ex melle, artemisia, dictamno, brassicae succo, glycyrriza, liquore porri, ruta, scammonia & consimilibus conficiuntur. Sciptici autem contrariam facultatem his quae ora uenarum aperiunt, praestant. muliebres namq; profluium comprimunt, & apertum contrahunt uterum.

& prolapsum restituunt. Astringentium materia iam pridem capite de collyrijs enumerata est. Oportet aut pessi crassitudinem strigmentosam pauloq; crassiorē efficere, deinde lana gracili penicillo uulnerario ex lin- teolis conceptis simili duplicata, medicamentū excipere, locellorumq; muliebrium ori apponere, filumq; oblongum propendentem, quo fa- cile dum uidetur liceat eundem pessulum extrahere.

Pessulus croceus, ad inflammationes, apostrophas, durities, & inflationes uteri.

ACcipe ceræ dealbatæ, medullæ uituli, singulorum denarios sede- cim, medullæ ceruinæ denarios tredecim, adipis anserini denarios octo, adipis gallinacei tantundem, mastiches denarios quatuor, hyssopi pharmaci denarios treis, mellis denarios duos, croci denarios octo, rosa cei quantum opus est. Crocū lacte humano dilue.

Aureus & emolliendi uim habens pessulus.

CROCI, hyssopi, singulorū denarium unum, medullæ cerui denarios duos, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, cuiuslibet denarios treis, ouorum assatorum uitellos sedecim, irini & rosacei, utriusq; æquas portiones quantum satis est. Thus quoq; muliebres purgationes cit, & ad matricis affectiones eximie conducit. Est autem pessus. Nar- di unguenti uncia sex, ceræ Tyrrhenicæ quincunx, unguinis susini un- ciæ quatuor, adipis porcini recentis quadrans, adipis anserini & galli- narum, medullæ ceruinæ, unguenti amaracini, singulorum uncia duæ, seui taurini, resinæ terebinthinæ, hyssopi, cuiuslibet uncia una. Eliqua- tur in diplomate, quemadmodum omnes alij pessi.

Enneapharmacus, id est nouem rebus constans pessus.

ROSACEI unguenti, rhicinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ atq; butyri, æquales partes.

Tianus ad uulnam emolliendam.

HABET ceræ uncias sex, colophonix uncias quatuor & dimidiā, adi- pis taurini, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum uncias qua- tuor. Guttam ammoniacam aqua dissolue.

Pessus cognomento Aegyptia.

MELLIS, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei, uel susini, croci, cuiusque partem unam. In his autem quæ inflammatione uacant, & sordidis, ferruginis quoq; semissis inditur.

Gone sylleptica.

HABET butyri uncias sex, hyssopi pharmaci, medullæ ceruinæ, adi- pis anserini & gallinacei, resinæ terebinthinæ, aloës, singulorum quadrantem, ceræ Tyrrhenicæ uncias sex, rosacei libras duas, myrrhæ, cassiæ, uniuscuiusq; uncias duas, spicæ nardi unciam unam, mellis quan- tum res postulat.

De succis

De Succedaneis, hoc est quæ inter se commutantur medicamentis,
ex monumentis Galeni. Cap. xxv



QUum in Alexandria mulier quædam (inquit Galenus) graui morbo cum summo uitæ discrimine opprimeretur, lychnida mihi, quò laboranti subuenirem, postulauit: quæ quum ad manum non esset, nisi confestim lychnidis loco acanthij semine, cuius tum copia erat, usus fuisset, mulier hæc superis cõcessisset ab oris. Amicorũ itaq; precibus persuasus, reciprocorũ medicaminũ (quæ græce *ἀντὶ τοῦ λυχνιδίου*, latine succedanea dicuntur) libellum *κατὰ στοιχεῖον*, id est, per alphabeti ordinem exponere aggressus sum.

A



Brotani loco sumitur Origanium.

Abſinthij, Abrotanum.

Acaciæ, Lentisçi succus.

Acanthæ, Ceratia acanthi.

Acanthij feminis, Semẽ lychnidis

Aconiti, Radix ireos syluestris.

Acori, Afari radix.

30 Actææ, Glaucium, aut impuberis, alui excrementum.

Actææ, Acantha.

Adianti, Aphroscelinum.

Aethiopica oliuæ, Lachrymæ acaciæ partes duas.

Agarici, Euphorbium.

Agriostaphidis, Daſtyli Syriaci.

Alicacabi, Semen folani.

40 Aloës Indicæ, Aloës uiridis folia, uel glauciæ, uel stercus ibidis,

uel lycium, uel centaurium.

Aluminis, Pix liquida bryttia.

Ammi, Anisus.

Ammoniaci thymiamatis, Pro-

polis.

Ammoniaci salis, Sal Cappadocũ.

Amomi, Acorus.

Amyli, Aridum pollen.

40 Amygdalorum amarorum, Ab-

sinthium.

Anacardis, Psychæ herba.

Anchusæ, Hyacinthus.

Anisi, Daucus.

Aracis, Sefamum.

Armoracæ, Cardamomum Baby-

lonicum.

Aristolochiæ rotundæ, Aristolochia

longa.

Argemones, Seriphe.

Armenij lapidis, Atramentum li-

brariorum Indicum.

Afari, Gingiber.

Asbesti, Adarce.

Asij lapidis, Gagate lapis, uel sal ammoniacus crematus, uel sandaraca.

Aspalathi, Semen uiticis.

Aphodeli radices, Betæ succus.

Atramenti futorij, Squama æris.

Auripigmentum, Sandaracha.

B

(ca.

B Alauftij uice, Malicoria cadu-

Balsami succi, Staſte myrrhæ.

Bdellij, Sphagnus aromaticus.

Buprestis, Blattæ.

Butyri, Lactis bouini congelatũ.

C

C Alaminthæ loco, Menta sylue-

stris.

Calamiodorati, Sphagnus.

Calliceræ, Fœnogræcum.

Camili, Antutus.

Canchrij, Baccæ lauri.

Cantharidum, Phalangia.

Capparis radices, Radix ericæ, uel

myricæ.

Cardamomi, Cyperis ammoniacae
 Cassie, Māna, cinnamomi duplū.
 Castorei, Silphium.
 Cadmiæ, Leucographe Aegy-
 ptia, Cyrannia.
 Cedriæ, Cedride.
 Ceruinæ adipis, Suilla.
 Ceritiæ, Ostrea.
 Ceræ, Sepimentum cum propoli
 coquitur & conteritur.
 Cerui adipis, Adeps anseris.
 Ceruini cornu, Cornu caprillum.
 Cerussiæ, Scoria plumbi.
 Chalbanes, Sagapenum.
 Chalcanthi, Aeris squama.
 Chameleontis succi, Succus salicis
 uel lapathini syluaticæ radicis.
 Chamædryos, Rumicis syluestris
 Chamæmeli, Anthemis. (radix.
 Cicis, Strigmentū palestrarum.
 Cicidis, Myricæ fructus.
 Cicutæ seminis, Semen coriandri.
 Cedrini liquoris & fructus, La-
 danum.
 Cineris cypriæ, Ciniphyllium.
 Cinnabaris, Rhodoides.
 Cinnamomi, Cassiæ duplum.
 Cissebati, Semen alicacabi.
 Clinopodij, Heliotropium.
 Cnici, Viticis semen, uel Cymini.
 Colocynthis, Semē gallæ quod
 est crotonis.
 Colophonix, Rafura nauigij.
 Comaræ, Ammoniacū thymia-
 Corallij, Moly. (ma.
 Costi, Cedrini liqres & fructus.
 Cotyledonis, Anacardi.
 Crinanthemi, Aphrodisium.
 Croci, Crocomagma. (rini.
 Crocodili adipis, Adeps canis ma
 Crocomagmatis, Aloë Indica.
 Cymini, Semen brassicæ.
 Cymini Aethiopici, Melanthiū.

Cynaræ radicis, Radix aspalathi.
 Cynosbati, Alicacabi semen.
 Cyperi, Iuniperus magna.
 Cypheos, Ischas cremata.
 Cucumeris, Anchusa.

D

D Aphnidū loco Serpyllū ari-
 Dauci seminis, Semē sij. (dū.
 Dictamni, Saluia.
 Diphrygis, Lapis phrygius.
 Dorycnij, Semen alterci.
 Dracunculi, Aphrosinum.

E

P Ro Ebena, Lotinum aridum.
 Ebisci radice, Folia mori.
 Elaterij succo, Eiusdem herbe suc-
 Elelisphaco, Nepita. (cus.
 Helleboro nigro, Radix papyri.
 Eneaphyllo, Potamogitum.
 Epithymo, Colocynthis semen. 20
 Ericæ fructu, Galla omphacitis.
 Erini folijs, Fimus ibidis.
 Erisei folijs, Mori folia.
 Eruce semine, Erysimi semen.
 Erysimi semine, Struthium.
 Euphorbio, Stercus palumbis.
 Eupatorio, Chamæpithys.

F

F Ellis cameli uicē gerit, Fel asca
 Fellis catæ, Fel cameli. (labotg. 30
 Fellis hyenæ, Fel perdicis.
 Fellis simiæ, Fel cameli.
 Fellis uiperæ, Fel ichneumonis.
 Floris salis, Sandaracha.

G

S Vccedit gallæ Fructus myrice.
 Gentianæ radici, Apij odorati.
 Glichoni, Hyssopus.
 Glycyriæ succo, Sycamini suc-
 Gongilidi, Heliotropium. (cus. 40

H

P Ro hedere succo, Persici succus
 Hedichroo, Amaracinum.
 Humi-

Humida pice, Succus panacis.
 Hyacintho, Flos isateos.
 Hyenæ adipe, Vulpis adeps.
 Hyenæ felle, Fel perdicis.
 Hyoscyami semine, Cynosbati fru
 Hyperico, Aneti semen. (ctus.
 Hypocistide, Acacia.
 Hyssopo, Medulla uituli.

I

- 10 **V**Ice Iontis, sumit Atramentū.
 Ippuridis, Chamæpithys.
 Iridis Illyricæ, Helenium odoratū
 Itæ succi, Succus leissiatrī.
 Iunci odorati, Cardamomi.

L

- L**Oco Ladani, Sampsuchū ac
 cipito.
 Lapathi radici, Pyrethri radice.
 Lapidis pyriti, Lapidē pyrobolū.
 20 Lapid. phrygi, Lapidē argyriten
 Lapid. magnitis, Lapidē phrygiū
 22 Lapidis asij, Lapidem gagaren.
 Lathyridum, Granum cnidium.
 Lepidis, Erythrodanum.
 Lepidij radici, Folia capparis.
 Leporis marini, Cancrū fluuiatē.
 Leucini floris, Struthion.
 Libani, Ampeliten.
 Lini seminis, Fabæ succum.
 30 Lybistici, Semen staphylini.

M

- P**Ro Malabathro, sumitur Cas
 sia, uel nardus Indica.
 Magnesena hyelina, Pryelū Italicū
 Malis cotoneis, Melilotum.
 Malua, Foenogracū. (longum.
 Malo terræ rotūdo, Malum terræ
 Madragora, Oleæ lachryma.
 Mandragoræ succo, Draconium.
 40 Manna, Libani cortex.
 Mastiche, Schœni cardia.
 Medulla cerui, Adeps cerui uel
 medulla uituli.

Meliloto, Lotum syluestre.
 Melle, Defrutum sapāue.
 Melle Attico crudō, Mel aliud
 despumatum.
 Meo, Myrobalanum.
 Myrsinite, Succus mori.
 Misyi cyprio, Rubrica pictorum
 Cypria.
 Myochode, Muscæ tantundem.
 Molibdæna, Spuma argenti.
 Mororum succo, Rubi folia.
 Myrobalano, Peucinum.
 Myrra Troglitide, Calamus odo
 Myrti oleo, Lentiscinum. (ratus.
 Myrto, Succus mori.
 Misy, Succus Cyprius.
 Misy assato, Diphryga.

N

LOco Nardi Syriacæ, Iuncus
 odoratus.
 Nepitæ, Menta syluestris.
 Napyos, Gongylidis semen.

O

VIce Ocimi sumit Sisimbriū.
 Ocimoidis, Syluestris mēta.
 Oenāthes succi, Ampelini arboris
 Olei rhicinini, Oleum laurinum.
 Olei ueteris, Duplū olei coquitur
 cum adipe suillo uetere.
 Oliuæ Aethiopica, Lachrymæ
 acaciæ partes duæ.
 Oliuæ lachrymæ, Hypocistidis suc
 Omphacis, Galla immatura. (cus.
 Onocardia, Psicolotanis.
 Opobalsami, Succus myrsini.
 Opopanax, Lac sycamini.
 Orizæ, Hordeacea farina.
 Ormini, Lini semen.
 Oenithogallorum, Anthalli.

P

PApaueris locū supplet Man
 dragoræ succus.
 Peristereonis, Chameleuce.

Pityocampæ, Vespæ in cedriam.
 Piperis, Zingiber.
 Polij feminis, Semen erucæ.
 Polypodij, radix Chamelgæ uel
 Chamæleontis.
 Polytrichi, Absinthium.
 Propolis, Ladanum.
 Psilij, Lens.
 Pulegij, Hyssopus.
 Pyrethri, Zingiber.
 Phu, Sphagnus.

P Ro Quercus uisco, Chamæ
 leon. **R**

L Oco Rapæ, Heliotropium.
 Radicis rumicis, Ciniras.
 Raphanini olei, Rhicininum.
 Resinæ pineæ, Resina terebinthina
 Resinæ colophonix, Apochyma.
 Rhodoidis, Sinopis.
 Rosarū siccarū, Persæ folia sicca.
 Rotundi iunci odorati, Cardamo
 Rhu, Centaurium. (mum.
 Rubiginis ferri, Scoria ferri.
 Rubrica pictorum, Misij Cypriū.
 Rumicis, Pyrethri radix.
 Recrementi plumbi, Helcysma.
 Recrementi Cyprij, atramentum
 metallicum Aegyptium.

S

L Oco Sabini, accipit Oleū rhi
 cininum.
 Sagapeni, Pini resina arida.
 Salamandræ, Lacerta uiridis.
 Salis ammoniaci, Sal cappadocū.
 Saluix, Nepita.
 Sampsuchi, Rhus Megericus.
 Santonici, Abrotanum.
 Sarapoidis, Radix pæoniæ.
 Satyrj feminis, Eruca.
 Scammonix, Crotones rhicini.
 Schœni odorati, Cardamomum.
 Schini, Polygoni radix.

Scillæ, Bulbus.
 Scingi, Satyrium.
 Scordij, Caput albi papaueris.
 Scorix plumbi, Helcysma.
 Seminis hypocistidis, Tragacanthæ semen.

Semperuiui, Lactuca.
 Sepiæ crustæ, Pumex.
 Serpylli, Potamogiton.
 Sefami, Semen lini.
 Sinapi, Cardamomum.
 Sifonis, Anisi.
 Silymbrij, Ocimū uel Basilicum.
 Sparagi Lybice, Radix scenticulij.
 Sphagni odorati, Rotundus iun-
 cus odoratus cultus.
 Sphecle, Sandaracha.
 Sphodeli, Cypriæ cinis.
 Staphydis satiuæ, Dactyli.

Stercoris uulturis, Fimus colum- 20
 binus.

Stercoris turturis, excrementum
 palumbi.

Stimmeos secti, Squama æris.
 Styracis, Castorium.
 Strobilorum, Semen cucumeris.
 Struthij radices, Radix ueratri nigri.

Strychni radices, Veratrū nigrū.
 Succu carpassi, Succus myrti. (zæ. 30
 Succu peucedani, Succus glycyri.
 Succu rhododaphnes, Vilcus
 quercinus.

Succu cucurbitæ, Succus mori.
 Succu Cyrenaici, Succus Syriacus
 Succu papaueris, Succus mandra-
 goræ.

Succu salicis, Nigredederg succus.
 Succu gallæ, Succus mori.

Succu mori, Succu hederæ. 40

Succu Syriaci, Mori succus.

Succu panacis, Lac Sycamini.

Succu polygoni, Succu plātaginis.
 Sulphu.

Sulphuris extincti, Sandaracha.

Symphyti, Centaurium.

Syrici, Spuma argenti.

Troximi, Maiunium.

Trixaginis, radix rumicis syluest.

V

Vlcem terræ Samiæ gerit Leu
cographe Aegyptia.

Terræ Erythriadis, Calx thebaica

Terræ apalæ, Plumbum.

Terræ asteris, Cimolia.

10 Thapsiæ succi, Chamæleon ater.

Thymi, Satureia.

Tichymalli, Chamæleon.

Tiscendra, Asphodeli radix.

LOco uini rhodini sumitur uis
num austerum.

Vini Italici, Vinum Mendesium.

Vulpis adipis, Vrsinus adeps.

Vulturis stercoris, finus columbi

X

(nus.

LOco Xylobalsami, Violarum
albarum radix.

Z

Vlce Zingiberis, Pyrethrum.

De ponderibus & mensuris. Cap. xxvi



Pondus grauitate, mensura uero uasis concauitate, à mensore
diudicatur, siue sicca, siue liquidà existat quantitas. Esse aut
earum quas dimetimur rerū triplicē differentiā liquet, unam
ponderis quidem, alterā aridæ essentia, quæ ueluti in cumu-
lum possunt aggerari: tertiā humētis. Sunt aut huiusmodi cum ponderū
20 tum mensurarum plurima, & quæ experiri à nemine facile queant, gene-
ra, non uarijs modò regionibus, sed & diuersis admodum utentium mo-
ribus. Quocirca eorum duntaxat quæ in cōmuni maxime omnium usu
tenentur, mentionem facere instituiamus.

De notis ponderum atq; mensurarum.

QVandoquidē aut aliqui nō integris literis, sed per characteres, pre-
scriptasq; notas huiusmodi significant, satius utiq; fuerit nos quo-
que priscorū uestigia sequi, primitusq; ipsos characteres & signa expli-
care. Principio igitur χ literæ quotiēs alpha insidet, chalcū, hoc est æreo
lum, eiusmodi nimirū figura \times portēdit: si uero \circ incumbat, choa, id est
30 congiū, \times . si α , chcenicem, \times . si ν , chemā, \times . Cæterum litera κ si qui-
dem \circ superadditū habeat, cum obliqua linea inferius cornu secante, ce-
ratiū demonstrat, κ . Sin ν supra κ insideat, cyathū, κ . si \circ , cotylam,
hoc est heminā, κ . Quod si circumpuncta linea in obliquū planē flexa
pingatur, obolū ostendit, \circ . si geminæ circūpunctæ characteres, binos
obolos significat, $\circ\circ$, qui grāma, hoc est scrupulum faciunt, quod capi-
talis eius uocabuli litera γ annexū habens γ , à recta quadam linea disse-
ctum significat, γ . Duæ autem lineæ copulatæ, atque altera parte in an-
gulum flexæ, instar λ duorum cornuū ad rectam lineam, drachmam qui
denarius est ostendunt, λ , cui cognominis est quam holcam indigitant.
40 Proprie aut holcam λ cui in medietullo \circ litera adiecta est, portendit, λ .
Atqui ubi λ appositum \circ est, libram declarat, λ . Nonnulli tamen per
aliud λ literā se inuicem oblique dissecantē libram significant, λ . Por-
rò quū γ litera in ipso sui angulo \circ adiacentem habet, unciam indicat, γ .

V

4

¶ uero ubi in summo medio ⁊ superimpositum habet, minam, *μ*. si uero ha
beat, mystrum, *μ*. si *ς*, medimnū *μ*. si *ο*, modium denotat, *μ*. Cæterū ⁊ cui
⁊ cum ⁊ apposita est, tryblion significat, *τϑυ*. si quando *ξ* pinxeris ⁊ iuxta
adiicias, xestam, id est sextarium, *ξ*. si *ο* adlocueris, oxybaphū *ξ*. Qui
dam uero xestam per *ξ* literam recta linea sectam designant, ad hunc
modū, *ξ*. Si ⁊ præterea scribas & *μ* adiicias, heminā denotabis, sic, *μξ*.
Quod si quando ⁊ effigiaueris iuxtaq; ⁊ cum litera *μ* locaueris, ceramiū
conficies, hoc modo, *μξμ*.

De Ponderibus.

Mina Attica & Aegyptia uncias continet sedecim, mina Rhomana 10
uiginti. Libra unc. habet duodecim. Vncia drachmas, quod est de
narios octo. Drachma habet grammata, id est scrupulos treis. Gramma
obolos duos. Obolus uero ceratia tria. Ceratium chalcos, id est arēolōs
duos & duas partes. In obolo chalci sunt octo.

De humenium dimensionibus.

Ceramiū Italicū continet choas octo. Chus xestas, hoc est sexta,
Crios sex. Xesta cotylas duas, quæ alij quidā & tryblia dicunt. Cotyle
quam tryblion quidam nūcupant, in sunt mystra magna tria, oxybapha
uero[†] quatuor. Habet quippe mystrū magnū oxybaphū, id est acetabulum
unū. Oxybaphū uero sesquicyathū. Cyathus uero chemas paruas, 20
mystræe exigua duo. Quod si humentiū ponderū mensuram dijudica
re laboras, permulta quidem in examine ipso deprehendes discrimina,
quemadmodū in olei & uini & mellis exemplo explanabimus. Enime
ro mel grauius quā uinum quarta parte ac decima est, quo fit, ut pars
ponderis tantū nō tertia melli accedat: habet etenim eadem uini mellisq;
mensura totū uini pondus, & eius tertiam. Oleo uero mel dimidia parte
grauius est: complectitur enim totum olei, & præterea dimidium ipsius.
Vinū uero nona parte saltem ipsum grauitate excedit, totū nanq; ipsius,
& nonam eius partem cōtinet. Cæterū harum rerū maior perspicuitas ē
subscripta particulari ponderū formula liquebit, qua per seriem quandā 30
quid in genere hæc discrepent, cōstituemus, oleum nempe, uinū, & mel.

Italicū ceramiū, quæ &	Olei.	Vini.	Mellis.
amphora, habet libras	LXXXII	libr. LXXX	libr. CVIII
Chus, congius, libras	IX	libr. X	lib. x semis
Xestes, sextarius, uncias	XVIII	unc. XX	unc. XVIIIs.
Cotyla, hemina, uncias	IX	unc. X	unc. XIII s.
Magnum mystrum uncias	III	unc. III scrup. VIII	unc. III s.
Oxybaphū, acetabulū, drac.	XVIII	unc. II scrup. XII	drac. XXVIII
Cyathus habet denarios	XII	den. XII scrup. III	un. II den. II
Mystrum paruum denarios	VI	scrup. XX	denar. IX

Cæterum Oribasius secundum Adamantinū inquit, sextariū quidem
Italicū, mensura uini habere unc. uigintiquatuor, pondere uero libram
unā, uncias octo: sextariū mellis habere pondere libr. duas cum semisse:

De

De mensuris Aridorum.

Aegyptia artaba continet modium unum. Modius uero tum Aegyptius tum Italicus habet choenices octo, choenix sextarium unum, sextarius semisextarios duos, quas heminas quoque nuncupat, hemina habet cyathos octo, Atticus medimnus habet semisextaria (quae Graeci *quiverre* apellant) duodecim, hemiectum choenicas iiii. Sic medimnus continebit minas quadragintanoue, sextarios nonaginta sex: Verum istiusmodi mensurarum pondus exprimere arduum est, eo quod aridae usae haud modico inter se discrimine trutinando, lancisque momento dissident.

Sales Theriaci.

- O**nfectura salis theriaci ad hunc modum praeparatur. Sumito uiperas statim a uenatione quatuor, deinde salis ammoniaci uel communis modium Italicum unum, in mortario obiter nec admodum minutatim contunde, cum gentianae libra una & dimidia, mali terrae rotundi tantundem, comae tenuis cetauri lib. ij. carda momi, marrubij, singulorum unc. sex, scordij, apij, trixaginis Cretici, cuiusque lib. i. seminis rutae domesticae sextarijs duobus. Melle haec Attico uniens, medium ipsorum in ollam uacua conijcito, deinde uiperas uiuentes iij. mox squillas tenellas recentes quinque minutatim concidito, illisque adijcito, sic aliam mixturae partem super aliam inijcito, & ubi aulam accurate operculaueris, tribus aut quatuor foraminibus eandem perforato, quo per ea uapor tibi concoctionis mensuram significet: Principio namque fumus ingens proflire uidebitur, caliginosus, & ualde turbidus, indicans ignem iam feras cremare: ubi summo studio animaduerte, ne huius fumi aerem ex serpentium exhalatione infectum attrahas: deinde ubi uapor euanuerit, & tenuem quandam flammam per foramina ejci conspexeris, tum ipsa amussatim elixata esse conijcito, ollamque ab igne ita remoueto diem & noctem refrigerans: postea referans ollam & carbones auferens, accurate contundito, atque cum eiusmodi mixtionibus per cribrum traicito, seminis scilicet rutae syluestris, hyssopi Cretici, cuiusque unc. ix. seminis foeniculi, nardi Celticae, spicae Scythicae, cuiuslibet uncij sex, petroselini Macedonici, malabathri, foliorum, cuiusque unc. una, amomi, botryos, ormini seminis facti, singulorum uncij tribus, summitatum origani, cacuminum thymi, singulorum unc. duabus, baccharum iuniperi, piperis albi, foeniculi, singulorum libris octo, laserpitij radices unc. x. zingiberis non forati, satyrj seminis uel radices, pulegij, seseleos maseotici, mentae unc. sex, cassiae fistulae unc. ij. cinnamomi unc. i. Ipse quidem bestijs non combustis praeparauimus, sed ipsarum pastillos, ueluti in theriaca docui, commiscendo etiam his quae cum feris deuruntur, quod amaritudinem qua praedita sunt, in adustione exuant, tantam pastillorum mensuram admixta, quantam uiperas quatuor habere coniecurabam, & sales effecti sunt uere praestantissimi.

LECTORI.

Si quid in hoc opere mutilum forte abruptum ue cōperies, optime Lector, exemplaris græci, quod unicum & quidem prodigiose deprauatū interpreti præstō erat, uitio id accidisse putato: Minutiora quidem quæ in longo uolumine solent interdū irreperere, pro sua sagacitate quilibet facile castigabit. Cæterū quæ alicuius momenti nobis uisæ sunt, hic subscribenda curauimus. Folio 176. uersu 2. pro oleo irino iusto pondere & castorio, lege, olei irini sece & castorij. Fol. 181. uer. 8. pro uix arida, lege, sorba arida. Fol. 225. uer. 41. pro accenditur, lege, plenus sit. Fol. 427. uer. 14. qui facile concitantur, legendum, pro concitatis. Quum in super autor græcus in calce libri septimi inter pondera & mensuras characterem 12: pro ceratio posuerit, quo tamen aliās breuiata dictione pro *κεντροποιον* usus est, interpretes ambiguitate characteris semel atq; iterum deceptus, ceratium uertit, quum pro ratione generis, numeri, & casuum, crematum scribendū fuerat: cognosces autem hoc ipsum, ubi ceratio pondus aliud adiunctum esse deprehendes.

BASILEAE, PER ANDR. CRATANDRYM, ET IO.

BEBELIUM, MENSE MARTIO, AN.

M. D. XXXII.





